

PRAXEOS MEDICAE VNIVERSAE PRAECEPTA

AVCTORE

IOSEPHO FRANK

IOANNIS PETRI FILIO, AVGVSTISSIMO IMPERATORI ET TOTIVS
ROSSIAE AVTOCRATORI A CONSILIIS STATUS, EQVITE ORDINIS
ST. ANNAE, ST. WLODIMIRI, THERAPIAE SPECIALIS ET CLI-
NICES IN CAESAREA VNIVERSITATE VILNENSI PROFESSORE
EMERITO, PLVRIMARVM ACADEMIARVM ET SOCIETATVM
MEDICARVM SODALI.

PARTIS SECVNDAE

EDITIO ALTERA EMENDATA ET AVCTA.

VOLVMINIS PRIMI SECTIO PRIMA,

CONTINENS

DOCTRINAM DE MORBIS SYSTEMATIS NERVORVM
IN GENERE ET DE IIS ENCEPHALI IN SPECIE.

CVM TABVLA AENEA.

L I P S I A E

SVMPTIBVS BIBLIOPOLII KUEHNIANI
CICIDCCCXXII.



LECTORI.

Ex praefatione ad editionem denuo elaboratam partis operis primae elucet, nos, ne possessores antiquioris editionis detrimentum, quod evitari potuisset, capiant, statuisse, *operis partem secundam*, etiamsi curam typis divulgandam, utpote jam pridem majori studio conscriptam, plane intactam relinquere et dumtaxat *supplemento* locupletare. Quodsi modo a coepto consilio recedimus, partis quoque secundae editionem, non quidem ex toto

denuo elaboratam, sed valde tamen emendatam et auctam, exhibendo, ratio in desideriiis multorum doctorum aequae ac bibliopoli nostri quaerenda est.

Ad ripas Larii.

Auctor.

DE MORBIS
SYSTEMATIS
NERVORUM.

Frank Praez. II. I.

A



CAPUT I.

De morbis systematis nervorum in genere.

§. I.

De argumento generatim.

1. Quemadmodum *Monarcha* populum, ex Syst. quo opulentiam suam parat, gubernat; ita *systema nervorum*, reliquas corporis humani partes, illi <sup>nerv. conside-
ratio.</sup> custodiam, fulcrum et alimentum largientes, regit. Imperat enim pulpa in encephalo et specu vertebrali inclusa, plurimorum nervorum ope, visceribus, quot quot sunt, regitque illorum functiones. Praeterea cerebrum, cerebellum, medulla oblongata et spinalis, nec non nervi eorumque plexus ac ganglia, suas quoque agnoscunt functiones, potissimum *sensum* et *motum* respicientes, quarum functionum perturbationes, *morbos systematis nervorum* proprie dictos, constituunt.

2. HIPPOCRATES quamvis cerebrum pro viscere <sup>Doctrinae
historia.</sup> unice humorum absorptioni dicatum habuerit ¹⁾, et nervos cum tendinibus confuderit ²⁾; attamen

A 2

de

1) Aphor. VII. 30.

2) Lib. de arte. Sect. I. Aphor. VI. 10.

4 DE MORBIS SYSTEMATIS NERVORUM

de morbis encephali ³⁾, de consensu nervorum ⁴⁾, deque causis dolorum et spasmodum ⁵⁾ profundas possedit notiones. PLATO sensuum imperium atque principia psychologiae stabilivit ⁶⁾. STOAE studium temperamentorum debemus ⁷⁾. ARISTOTELES doctrinam sensuum ⁸⁾ et somni ⁹⁾ explicuit. THEOPHRASTUS pulchre de olfactu ¹⁰⁾, vertigine ¹¹⁾ et virium jactura ¹²⁾ disseruit. HEROPHILUS cerebrum sat bene describens ¹³⁾, nervos primum pro instrumentis sensationum ¹⁴⁾ declaravit. Quarum partium functiones propius adhuc intellexit ERASISTRATUS ¹⁵⁾. *Empirici*, si excipias praecepta a philosophia EPICURI depromta, nil doctrinae systematis nervorum addiderunt. Neurologiam plane ignorabat ASCLEPIADES ¹⁶⁾, quod in genere de *Schola methodica*, anatomiam negligente, valet. Restaurator hujus scientiae et imprimis neuro-

3) Passim in capitibus sequentibus loca indicabuntur.

4) Aph. V. 50. — Liber de hernia. Sect. VI. p. 37.

5) Aphor. VI. 39. 6) TIMAEUS.

7) SENECA de ira lib. II. c. 18. CICERO de finibus bonorum, et malorum, c. 22.

8) De anima Lib. II. III. 9) De somno et vigilia.

10) De odoribus, interpret. FURLANO et TURRANO.

11) De vertigine p. 259.

12) De lassitudine p. 267.

13) GALEN. de usu partium. Lib. VIII.

14) RUFUS de appellat. part. c. h. Lib. II. p. 65.

15) GALEN. et RUFUS l. l. c. c.

16) GALEN. de locis affectis. Lib. II. p. 260. RUFUS l. c. p. 65.

rologiae, MARINUS ¹⁷⁾ est. CELSI in doctrina morborum encephali merita plus vice simplici celebrantur. ARETAEUS docte de chiasmo nervorum disseruit ¹⁸⁾ ac tetanum et phrenitidem morbis nervosis adscripsit ¹⁹⁾. CASSIUS de animi pathematibus, de cerebri inflammatione occulta, et de consensu partium nervoso, praeclare locutus est ²⁰⁾. GALENUS nervum sympathicum magnum ²¹⁾ et recurrentem ²²⁾ exacte descripsit, originemque nervorum sensui inservientium, e cerebro, motui autem dicatorum e medulla spinali derivavit ²³⁾. MARCELLUS ob lycanthropiae, quam exaravit, historiam ²⁴⁾ nobis memorabilis. Jam vero astrologia et magia ex Oriente Romam petentes ²⁵⁾, praecipue in medicina ad morbos nervorum spectante, quorum plurimi a daemone repetebantur ²⁶⁾, caput

17) GALEN. de nervorum dissectionibus. p. 205.

18) Caus. acut. Lib. I. c. 7. p. 34.

19) Ibid. Lib. II. c. 3. p. 15.

20) Naturales et medicinales quaestiones. Ed. GERSHORI. Tigur. 1562.

21) De usu partium. Lib. XV. p. 542.

22) De nervorum dissect. p. 205. De usu partium Lib. XVI. p. 540.

23) Ibid. Lib. XV. p. 534. C. FR. HALLER historia neurologiae veterum. Erlang. 1795.

24) EUDOCIA apud VILLOISON. anecd. graec. p. 290.

25) SPRENGEL Versuch einer pragm. Geschichte der Heilk. 2. B. p. 123.

26) ΠΟΡΦΥΡΑ. de abstinentia ab esu animal. Lib. II. p. 192. Edit. Lugd. 1620.

6 DE MORBIS SYSTEMATIS NERVORUM

put extulerunt. Amuletorum hinc, exorcismorum, verborum formularumque magicarum ²⁷⁾, et manipulationum ²⁸⁾ non dabatur finis. Interea genuinam, de quibus agitur, morborum doctrinam non solum sustinuerunt, sed locupletarunt quoque observationibus pretiosis in curriculo hujusmet libri saepius celebrandis, artis medicae coryphaei COELIUS AURELIANUS, ORIBASII, AETIUS, ALEXANDER TRALLIANUS et PAULUS AEGINETA. Arabes in doctrina morborum systematis nervorum nil praestiterunt, si excipias S. EBN SERAPION, de variis doloris capitis speciebus ²⁹⁾, et de aliis quibusdam cerebri morbis ³⁰⁾ nec non de hysteria ³¹⁾, — RHazes, de hypochondriasi ³²⁾, de melancholia ³³⁾, de epilepsia et lethargo ex vitiis primarum viarum ³⁴⁾ et de dolore faciei ³⁵⁾, — ALI, de morbis melan-

27) Origo orientalis harum rerum vel ex eo elucet, quod Tartari hodieum adhuc Lithuaniam inhabitantes iis ad morbos tum Christianorum tum Judaeorum curandis utuntur. De Judaeis id non mirum, cum libri eorum (Jun. quod omnis probus liber sit. p. 456, idemque de vita contempl. p. 475) germina magiae et astrologiae contineant.

28) Vetulae, quae vulgus in Lithuania adhuc pro sagis (Czarownice) agnoscit, recens natos convulsionibus correptos variis manipulationibus, instar magnetismi animalis, subiciunt, et fertur, aliquando cum successu.

29) Breviar. Tr. I. c. 6. f. 4. a. 30) Ibid. c. 20. f. 8. a.

31) Tr. V. c. 27. f. 55. b. 32) Lib. I. c. 8. f. 6. a.

33) Lib. I. c. 3. f. 6. b. 34) Lib. V. c. 1. f. 96. a.

35) Lib. I. c. 5. f. 10. d.

melancholicis³⁶⁾ atque ERM SINA de cephalalgia³⁷⁾, de inflammatione cerebri et mania³⁸⁾, de vertigine³⁹⁾, de apoplexia⁴⁰⁾ etc. disserentes. Seculo XIV. epidemia choreae St. Viti⁴¹⁾, attentione nostra digna. Seculo XV. ANTONIUS GUAJNERIUS memorabilia circa manias et epilepsias tradidit⁴²⁾. Seculo XVI. raphania observata est⁴³⁾. Hoc ipso seculo et magis adhuc seculis sequentibus, magni viri⁴⁴⁾ anatomiam et physiologiam cerebri, medullae

36) Theor. Lib. IX. c. 7. f. 60. d.

37) Lib. III. c. 3. p. 451. 38) Ibid. Tr. 3. f. 1. Tr. 41. 17.

39) Ibid. c. 24. p. 489. 40) Ibid. c. 12. p. 509.

41) BREVIVS ann. 1374. No. 18. p. 1501.

42) Opus praecclarum ad praxin. Lugd. 1534.

43) SCHWENCKFELD Theriotroph. Siles. Lignic. 1603.

44) VESALIUS de corporis humani fabrica. Lib. VII. c.

4. ed. 2. Basil. 1555. FALLOPIUS observation. anat.

tom. Venet. 1561. VAGOLIUS de nervis opticiis epi-

stola. Patav. 1573. Ejusd. anatomia. Frf. 1593. LAU-

RENTIUS historia anatomica. Francf. 1602. STE-

PHAN. de dissect. part. corp. hum. p. 837. ACHIL-

LINUS anap. in Mundin. CASSERIUS tabul. anatom.

Frf. 1632. SYLVIUS in BARTHOLIN. anatom. reform.

p. 312. WILLISIUS cerebri anatom. Amstel. 1664.

BIDLOUS anat. hum. corp. Tab. X. f. 2. Amstel. 1685.

LEEUWENHOEK philosoph. trans. Y. 1674. p. 121.

Y. 1677. p. 899. Y. 1685. p. 883. PAYERUS de rete

mirabili cerebri, ejusque descriptione accuratiori et

usu. v. Miscell. nat. cur. dec. II. ann. 5. 1686. p. 355.

DUVERNEY de la structure et du sentiment de la

moëlle (Mém. de l'Ac. de Paris. a. 1700. hist. p. 14.

mém. p. 196). PACCHIONIUS diss. physiol. anatomic.

8 DE MORBIS SYSTEMATIS NERVORUM

dullae spinalis et nervorum excolendo, simul viam, ad pathologiam et therapiam morborum systematis nervorum magis magisque perficiendam aperuerunt. Enim vero PARACELSI tentaminibus, hanc viam per alchimiam, astrologiam, necromantiam, chiromantiam occludendi, feliciter obstitit WYERUS ⁴⁵⁾. Porro pretiosas observationes, sin-

gulos

de durae meningis fabrica et usu. Rom. 1701. RANDELTUS anatomia cerebri, mechanicam ejus atque physiologiam comprehendens (Miscell. nat. eur. dec. III, a. 9—10. 1701—1703. opp. p. 76). EUSTACHIUS tabul. anat. tab. 17. 18. c. 4. edit. a LANCIS. Rom. 1714. LITTRE grains glanduleux dans la dure mère et leur usage (Mém. de l'Ac. de Paris a. 1701. hist. p. 82) observations sur l'eau qui est dans les ventricules du cerveau (ibid. 1711. hist. p. 29). GARENHOT observations anatomiques sur les sinus du cerveau (Mém. de Paris a. 1728. hist. p. 21). HEINTREUS diss. de nervis eorumque praestantia in corpore humano, 1725. SAKTORINUS obs. anatom. c. 3. Venet. 1724. De structura et motu fibrae in BAULIVIT opp. p. 770. Du PETIT mémoire dans lequel il est démontré que les nerfs interscostaux fournissent des rameaux, qui portent des esprits dans les yeux (Mém. de l'Ac. de Paris a. 1727 hist. p. 7. mém. p. 1). RUYSEHIUS epist. anatom. IX. HUMAULD observation sur un rameau de nerfs assez considérable partant du plexus gangliiforme semilunaire (Mém. de l'Ac. de Paris a. 1734. hist. p. 34). HENCKELIUS de adipis cervini et cerebri humani perennitate (Act. nat. eur. Vol. III, p. 344). ZINN de l'enveloppe des nerfs (Mém. de Berlin 1753. p. 130) allique. ⁴⁵⁾ Praest. Daemon. Lib. III. c. 5. p. 223. c. 16. p. 276. c. 8. p. 281.

gulos morbos systematis nervorum illustrantes, suppeditarunt: AMATUS LUSITANUS ⁴⁶⁾, VICTORIUS TRINCABELLA ⁴⁷⁾, FRANCISCUS VALLERIOLA ⁴⁸⁾, DIOMEDES CORNARUS ⁴⁹⁾, REMBERTUS DODOENS ⁵⁰⁾, FELIX PLATER ⁵¹⁾, PETRUS FORESTUS ⁵²⁾, SALLUS DIVERSUS ⁵³⁾ etc. Totam autem morborum systematis nervorum classem, quae scilicet ex humo-
moribus

46) Cent. II. cur. 70. p. 192 (De aphonía ex vitio nervi recurrentis). Cent. I. cur. 9. p. 31. (De noxis vigiliarum).

47) Consil. med. Lib. I. cona. 23. col. 63. Lib. III. 67. col. 519. (De consensu nervorum ad morbos explicandos).

48) Obs. med. Lib. I. obs. 7. p. 163. (De cura melancholiae ex amore), ibid. Lib. V. p. 304. (De inflammatione medullae spinalis).

49) Consil. Lips. 1599. Consil. 10. p. 84. (De gravi auditu a nixu sub partu). Obs. 7. p. 13. (De aphonía ex compressione nervi recurrentis a tumore in pectore).

50) Medic. obs. exempl. c. 2. p. 4. (De concussionibus cerebri).

51) Obs. Lib. 1614, Basil. (De animi pathematum imperio), ibid. Lib. I. p. 7. (De medicamentis ad spinam vertebralem dirigendis), ibid. p. 11. 14. (De morbis cerebri). Et Praxis medic. Basil. 1666.

52) Lib. I. 19. (De mania biliosa). Lib. III. 39. (De lethargo periodico). Lib. VI. 7. (De phrenitide a vermibus). ibid. p. 38. (De aphonía a vermibus). Lib. X. 25. (De Lykanthropia), ibid. 41. (De catalepsi).

53) De affect. particular. c. 1. p. 199. (De inflammatione substantiae corticalis cerebri). cap. 2. p. 208. 213. (De cholera sicca antiquitatis, ad hypochondrias revocanda). c. 18. p. 300. (De somnambulismo).

10 DE MORBIS SYSTEMATIS NERVORUM

moribus extravasatis ortum ducit, CAROLUS PISO descripsit ⁵⁴). Alteram ejusdem doctrinae partem, morbos videlicet convulsivos, THOMAS WILLIS illustravit ⁵⁵). Auctor iste, hypothesibus valde indulgens ⁵⁶), litem celebrem cum HIGHMORE ⁵⁷) de hypochondriasis et hysteria sede habuit ⁵⁸). Hoc autem malum graphice a SYDENHAMO delineatum est ⁵⁹), qui praeterea vel in aliis morbis nervosis, indicationes pro diaeta lactea, equitatione, venae sectione, purgantibus, opio, castoreo, cortice cinchonae, ferro etc., ut a tanto viro expectandum erat, stabilivit. GREGORIUS CHEYNE doctrinam iatro-chemicorum cum iatro-mathematica jungens ⁶⁰), hypothesibus praeter modum addictus, utilia nihilominus ad morbos systematis nervorum curandos vulgavit praecepta ⁶¹). Plurima
eorum

54) Selectionum observationum et consiliorum de praetervis hactenus morbis adfectibusque praeter naturam ab aqua seu serosa colluvie ortis, liber singularis. Ponte ad Monticulum, 1618.

55) Pathologia cerebri et nervosi generis specimen, in quo agitur de morbis convulsivis et de scorbuto. Oxonii 1667.

56) Op. c. ex. gr. p. 6. et 125.

57) De passione hysterica et hypochondriaca. Jen. 1677.

58) WILLISII opp. affectus hysteric. et hypochondriac. pathologia vindicata.

59) *The entire Works*. London 1769. an epistle treating on the small-pox and hysteric disease. p. 368.

60) De natura fibrae. Lond. 1725.

61) *English malady, or treatise on nervous disorders of all kind*. Lond. 1733.

eorum et FLEMINGI opus ⁶²⁾ continet. Neminem doctorum latet, ERNESTUM STAHL sanguinis imperium in dolores excitandos, affinitatem hypochondriasin inter et haemorrhoides, ac melancholiam inter et calculum patefecisse ⁶³⁾ et praestantissimas pharmacorum compositiones detexisse ⁶⁴⁾. FRIDERICUS HOFFMANN, quamvis propriam doctrinam per hypotheses de fluido nerveo et aethere adumbraverit; attamen, quid in morbis nervosis excitandis valeant sanguis, imprimis venae portarum, obstructions viscerum abdominalium, acida primarum viarum, venena, animi pathemata, debilitas ⁶⁵⁾, quidque ad eos sanandos conferant, nitras potassae, aquae minerales, balsama, vinum, liquor suus anodynus, camphora etc. docuit ⁶⁶⁾. A principiis illius ea BOERHAAVII ⁶⁷⁾ parum differunt. STAHLIUM potius secutus est SAUVAGES ⁶⁸⁾,
cul,

62) Neuro-pathologia, seu de morbis hypochondriacis et hystericis. Lib. III. Poema. Eborac. 1740.

63) Diss. de inflammationum vera pathologia. Hal. 1698.

64) *Gründlicher Bericht von den balsamischen-blutreinigenden und confortirenden Pillen, wie auch auf sonderbares Verlangen, von des rothen Fluss-Magen- und Steinpulvers zuverlässiger sonderbaren Wirkung und rechtem Gebrauche*, Hall. 1716. Opp. om.

65) Diss. de morbis ex atonia cerebri nervorumque nascentibus. Hall. 1708.

66) Opp. omnia.

67) Praelectiones academicae de morbis nervosis, quas edidit VAN-EMM. Lugd. Bat. 1761.

68) Nosologia methodica. Amst. 1768.

12 DE MORBIS SYSTEMATIS NERVORUM

cui, praeter nosologiam, multum et physiologia⁶⁹⁾ debet. Commemoratione quoque respectu hujus scientiae digni sunt: UNZER⁷⁰⁾, MÜLLER⁷¹⁾, GODART⁷²⁾, BONNET⁷³⁾, CARRÈRE⁷⁴⁾, et ROGER⁷⁵⁾ ac relate ad pathologiam SUCHLAND⁷⁶⁾ et BÜCHNER⁷⁷⁾. — HALLERI de *fibrae muscularis irritabilitate* magnum inventum⁷⁸⁾, illudque stupendum de *electricitate*, atque progressus anatomiae et physiologiae systematis nervorum, viris nun-

69) *Motuum vitalium causa*. Montep. 1744. *De animae imperio in cor*. 1760. *De viribus vitalibus*. 1769.

70) *Gedanken vom Einfluss der Seele in ihren Körper*. Hall. 1751. *Philosophische Betrachtungen des menschlichen Körpers*. Hall. 1750.

71) *Betrachtungen über die Art und Weise der Mitwirkung der Nerven zu den Muskeltzusammenziehungen*. Frf. 1753.

72) *La physique de l'âme humaine*. Berl. 1755.

73) *Essai de physiologie*. Lond. 1755. *Essai analytique sur les facultés de l'âme*. Copenh. 1760. *Contemplation de la nature*. 1764.

74) *Diss. de vitali corporis et animi foedere*. Perpignan. 1758.

75) *Specimen physiologicum de perpetua fibrarum muscularium palpitazione*. Goett. 1760.

76) *De affectione nervorum*. Regiom. 1747.

77) *Diss. de atonia nervorum morbisque inde oriundis*. Hal. 1749.

78) *Comment. Soc. R. Goetting. Vol. II. p. 114. Mémoire sur la nature sensible et irritable des parties du corps animal*. Lausanne 1756.

nunquam satis colendis tribuendi⁷⁹), doctrinae,
de

79) VATERO de fibris cerebri in hydrocephalo nato evidentiâ observatis (Miscell. acad. nat. cur. dec. III. ann. 9. 10. 1701. 1705. p. 294). STUART *experiment to prove the existence of a fluid in the nerves* (Philos. transact. Y. 1732. p. 327). HUBERO diss. de medulla spinali, Goett. 1741. MORGAGNIO epistola de illis, quae in academ. Bononiens. ab A. M. VALSALVA recitatae sunt (Comment. Bononiens. T. I. O. p. 377). MORAND *observations anatomiques sur quelques parties du cerveau* (Mém. de Paris a. 1744. hist. p. 5. mém. p. 342). HARTLEY *Betrachtungen über den Menschen, seine Natur, seine Pflicht und Erwartung. A. d. E. Rostock 1772*. LONGHINO de nervo intercostali, deque nervis octavi et noni paris, deque accessorio 1744. De nervis durae matris, Argentor. 1773. SCHMIDDELIO de controversia nervi intercostalis origine, 1747. MACRELIO de quinto pari nervorum cerebri, Goett. 1748. *Observations anatomiques sur la glande pinale* (Mém. de Berlin. a. 1765. p. 91). *Recherches anatomiques* (ibid. a. 1753. p. 61). *Diss. anatomiques sur les nerfs de la face* (ibid. 1751. p. 19). *Observation anatomique sur un second noeud du second rameau de la cinquième paire des nerfs* (ibid. 1749. p. 84). BONDET *recherches anatomiques sur la position des glandes et sur leur action. Paris 1751*. WALSDORFIO exper. circa motum cerebri, durae matris et venarum in vivis animalibus institut. Goett. 1753. ROEDERERO de cerebro. Goett. 1758. BARTIN *mém. sur la circulation du fluide nerveux* (Mém. de Paris 1759. hist. p. 75. mém. p. 300). MONROO de cerebri et nervorum administratione. Harling. 1763. *Discoveries respecting the brain and nerves* (Med. and philos. comment. by a

14 DE MORBIS SYSTEMATIS NERVORUM

de qua agimus adspectum, haud parum immutavere.

soc. in Edinburgh. Vol. 6). *Bemerkungen über Structur und Verrichtungen des Nervensystems*, M. Anm. v. SOEMMERRING. Leipz. 1787. ROBINET *doutes sur l'existence des esprits animaux dans les nerfs* (Res. I. de la soc. typogr. de Bouillon, p. 358). ELLER *exposition anatomique de l'origine et de la formation du ganglion* (Mém. de Berlin 1764, p. 108). HIRSCHIO *paris quinti nervi. encephal. disquisit.* Vienn. 1765. HAAERO *de gangliis nervorum*. Lips. 1772. *De ventriculis cerebri tricornibus*, Lips. 1789. *De secundo ramo paris quinti nervorum*. Lips. 1793. *De nervo phrenico dextri lateris duplici parisque vagi per collum decursu*, 1790. LE CAT *traité des sensations et des passions*. Paris 1767. *Traité de l'existence et de la nature et des propriétés du fluide des nerfs dans le mouvement musculaire*. Berlin 1765. IERNFLAMMIO *de vasis nervorum*. Erlang. 1768. *Praktische Bemerkungen über die Nerven*. Erlang. 1774. *De acervulo cerebri* (Nov. act. nat. cur. Vol. 8. p. 162). JOHNSTON *essay on the use of the ganglions of the nerves*. Lond. 1774. *Physiol. und patholog. Untersuchungen über das Nervensystem*. A. d. E. mit Anmerk. v. MICHAELIS. Leipz. 1796. FARR *philosophical inquiry into the nature, origin, and extent of animal motion*. Lond. 1774. NEUBAUERO *descriptio anatomica nervorum cardiacorum*, Frf. 1773. SABATIER *mémoire sur quelques particularités de la structure du cerveau et de ses enveloppes* (Mém. mathem. et physique. a. 1773. p. 593). *Mémoire sur les nerfs de la dixième paire* (ibid. p. 553). MEDICUS *von der Lebenskraft*. Manh. 1774. FONTANA *ricerche filosofiche sopra la fisica animale*. Firenze 1775. BÖHMERO *diss. de nono pare nervoy*.

verè. Nihilominus antiquo adhuc tramite, egregiè
caeterum scriptores, R. WHITT⁸⁰⁾ et LORRY⁸¹⁾,
perge-

cerebri, Goett. 1777. WRIENBERGO observat. anat.-
nauroi. de ganglio plexuque semilunari (Comment. Soc.
R. Goett. Vol. II. P. I. p. 79). Observ. anat.- nau-
rol. de nervis viscer. abdominalium (ibid. Vol. XV).
Observat. anat.- medio. de nervis pharyngis (ibid.
Vol. VII. P. I. p. 135). Observat. anatom. de quinto
pare nervor. encephal. Goett. 1777. KLINTIO comment.
anat. da nervis brachii, Goett. 1784. Observat. anat.-
physiol. de nervis artarias venasque comitantibus (Com-
ment. Soc. R. Goett. Vol. VII. P. I. p. 93). LUD-
WIGIO diss. de cinerea cerebri substantia, Lips. 1779.
De plexibus nervorum abdominalium, Berolin. 1783.
THOUZET *mémoire sur la nature de la substance du*
cerveau (*hist. et mém. de la Soc. R. de méd. a.* 1786).
MOLINELLIO de ligatis sectisque nervis octavi paris
(Comment. Bonon. T. III. C. p. 67. O. p. 280). CAL-
DANI *esperienze ed osservazioni dirette a determinare,*
qual sia il luogo principale del cervello, in cui più
che altrove, le fibre midollari dello stesso viscere s'in-
croccicchiano (*Saggi di Padova. T. I. p. 71*). FROTS-
CHERO *descriptio medullae spinalis ejusque nervor.*
icon. illustrat. Erlang. 1788. YRZY *physiologische*
Beobacht. über die willkührlichen und unwillkühr-
lichen Bewegungen der Menschen und Thiere. Leipz.
1789. JÖRDENSSIO *descriptio nervi ischiatici.* Erl. 1788.
STYXIO *descriptio nervi cruralis et obturatorii.* Jen.
1789. BANGIO *descriptio nervorum cervicalium.*

80) *On nervous disorders.*

81) *De melancholia et morbis melancholicis.* Paris. 1765.
Sur le mouvement du cerveau et de la dure mère (*Mém.*
de math. et phys. T. 3. p. 277. 344).

16 DE MORBIS SYSTEMATIS NERVORUM

pergebant. Reformatio enim pathologiae et therapiae morborum systematis nervorum incomparabilem Tissotum expectabat, auctorem operis classici ⁸²⁾, quamvis totam doctrinam non comprehendentis, attamen, tum ob selectum literaturae, tum ob thesaurum observationum propriarum tumque ob elegantiam sermonis, omni nostra laude auperioris. Quot quot de eodem argumento inde scripserunt, BURSERIUS ⁸³⁾, BRUCKMANN ⁸⁴⁾, MICHEL ⁸⁵⁾, BALDINGER ⁸⁶⁾, COMPARETTI ⁸⁷⁾, MARGRAVE ⁸⁸⁾, KÜHN ⁸⁹⁾, REUSS ⁹⁰⁾, NEAL ⁹¹⁾, VAN DER BELEN ⁹²⁾, PRICHARD ⁹³⁾, TISSOTI vestigia legere.

82) *Oeuvres T. IX. Contenant le traité des nerfs. Lausanne.*

83) *Institut. med. pract. T. III. Mediol. 1785.*

84) *Diss. de morbis nervorum obs. cum epicrisi. Goett. 1780.*

85) *De causis, indole et theropia morborum nervosorum qui in Belgio observantur. Amstel. 1783.*

86) *Neurologie physiologico-pathologica. Opusc. p. 187.*

87) *Occursus medici de vage eegritudine infirmitatis nervorum. Venet. 1780.*

88) *Considérations et conjectures sur les fonctions et les maladies des nerfs. Paris 1785.*

89) *Praktische Abhandlung einiger, das Nervensystem betreffenden Krankheiten. Breslau 1786.*

90) *Versuch einer Einleitung in die allgemeine Pathologie der Nerven. Prag und Leipzig 1788.*

91) *Praktische Abhandlungen über die Nervenkrankheit. Berlin 1790.*

92) *Diss. de praecipuis affectionibus nervorum. in Collect. diss. Lovan.*

legere. Pathologia quæm *nervæam*, aut *solidi vivi* vocant, et in qua, præter allatos auctores ⁹⁴⁾, PRESSAVIN ⁹⁵⁾ et POMME ⁹⁶⁾ excelluerunt, pathologia hujusmodi vim nervorum sæpe ultra debitos limites extendendo ⁹⁷⁾, et morbos plurimos ex vitio generali systematis nervorum repetendo, qui evidenter ex irritatione speciali vel cerebri, vel medullæ spinalis, vel nervi unius alteriusve pullulant, perfectioni doctrinæ morborum systematis nervorum ipsius obstitit. Idem effecisse arbitramur nefandam materialismi doctrinam, ab HUME ⁹⁸⁾, DE LA METTRIE ⁹⁹⁾, PRIESTLEY ¹⁰⁰⁾, REIL ¹⁰¹⁾, CABANIS,

RICHE-

93) *A treatise on diseases of the nervous system.* Lond. 1822.

94) Edit. 2. P. I. Vol. I. §. VIII. 4.

95) *Abhandl. von den Nervenkrankheiten.* Nürnberg. 1772.

96) *Traité des affections vaporeuses des deux sexes, on maladies nerveuses.* Paris 1784. *Supplément.* Paris 1804.

97) c. c. SCHARFFER über die Nerven und einen Theil ihrer Krankheiten. Nürnberg 1782.

98) *Treatise on human nature.* Lond. 1739.

99) *Histoire naturelle de l'ame.* A la Haye 1745. *L'homme machine.* Leide 1748.

100) *Disquisitions relating to matter and spirit.* Lond. 1777.

101) Chr. HUSELAND's Journ. der pr. Heilk. 1816. Junius p. 110. Nicht Anklage, sondern Klage von Candidus. Errat anonymus in eo, quod REILUM solum in opere prope ante mortem suam scripto (*Allgemeine Therapie*) materialismum defendisse asserit, cum idem jam a. 1803. in *Rhapsodien über die Anwendung der psychischen Curmethode auf Geisteszerrüttung* fecerit.

Frank PRAX. II. I. 1.

B

18 DE MORBIS SYSTEMATIS NERVORUM

RICHERAND ¹⁰²⁾, BURDACH ¹⁰³⁾ etc. jactatam, ac licet luculenter ab eximio TRALLES ¹⁰⁴⁾ et a SUMAREZ ¹⁰⁵⁾ refutatam; a multis cheu! praesenti aevo admissam; nec non systema BRUNONIS, genuinae medicinae veluti sepulcrum. Fateri enim adigimur, *universam* morborum systematis nervorum doctrinam tempore, quo scribimus, vix aut ne vix quidem profectum accepisse. Quid enim recentissimi scriptores, REIL ¹⁰⁶⁾ et HOVEN ¹⁰⁷⁾, ad morbos systematis nervorum exactius cognoscendos feliciasque curandos contribuerint, incassum quacaivimus. Debuissent tamen TISSOTUM antecellere, post quem anatomia, physiologia, et pathologia systematis nervorum una cum therapia morborum ad illud spectantium magis magisque locupletata sunt, tum pretiosis operibus ¹⁰⁸⁾

tum

102) *Nouveaux élémens de physiologie*. Paris 1814.

103) *Vom Baue und Leben des Gehirns*. Leipz. 1819 — 26 („Dass die menschliche Vernunft nur die zur größten Höhe gesteigerte Naturfähigkeit sey, und dass die menschliche Seele als Einzelheit aus dem organischen Leben erwache“).

104) *De machina et anima humana prorsus a se invicem distinctis*, commentatio. Lips. 1749.

105) *The London medical and physical Journal* 1813. July.

106) *Ueber die Erkenntniss und Kur der Fieber*. 4. B. Halle 1802. Ed. nov. 5. B. 1824.

107) *Versuch über die Nervenkrankheiten*. Nürnberg. 1813.

108) KIRKLAND *dissertations on the brain and nerves*. Lond. 1774. BARTHEZ *nouveaux éléments de la science de l'hom-*

l'homme. Montp. 1778. VICQ-D'AZYR *recherches sur la structure du cerveau, du cervelet, de la moëlle allongée, de la moëlle épinière et sur l'origine des nerfs de l'homme et des animaux* (Mém. de Paris 1784. Hist. p. 8. Mém. p. 495. 543. 566). *Mémoire sur la description des nerfs de la seconde et troisième paire cervicale* (Ibid. a. 1777. Hist. p. 11). *Traité de l'anatomie du cerveau*. 2. édition. Paris 1813. PLATNER de principio vitali. Lips. 1777. *Quæstiones physiologicae*. Lips. 1794. PROCHASKA de structurâ nervorum tract. anatom. Viennæ 1779. *Disquisitio anatomico-physiologica organismi corporis humani ejusque processus vitalis*. Vienn. 1812. SOARFA *annotationes anatomicæ de nervorum gangliis et plexibus*. Mutin. 1779. *Tabulæ neurologicae ad illustrandam historiam anatomicam cardiacorum nervorum*. Pavie 1794. *De nervo spinali ad octavum cerebri accessorio commentatio* (Act. acad. med. chir. Vind. T. I. p. 337). METZGER *animadvers. anat.-physiol. in doctrin. nervor.* Regiom. 1783. PREFFING de structura nervorum. Argent. 1782. WALTER *tabulæ nervorum thoracis et abdominis*. Berolin. 1783. *Anatomisches Museum, beschrieben von desselben Sohne*. Berlin 1796. *Museum anatomicum*. Berol. 1805. KWIATKOWSKI *theses anat. physiol. de nervor. deussatione et gangliis*. Regiom. 1784. MICHAELIS *über die Regeneration der Nerven*. Cassel 1785. BLUMENBACH *institut. physiologicae*. Goett. 1787. *Specimen physiologiae comparatæ inter animalia calidi et frigidi sanguinis* (Vol. 8. Comment. Soc. R. Goetting.). ANDEMANN *Versuche an lebendigen Thieren*. Gött. 1787. *Versuche über das Gehirn und Rückenmark*. Gött. 1787. GÜNTHER *cerebri nervorumque distributionis exposit.* 1789. FISCHER *descriptio anat. nervor. lumbalium, sacralium et extremitat. inferior.* Lips. 1791. STROCK de quinque prioribus en-

20 DE MORBIS SYSTEMATIS NERVORUM

cephali nervis. Goett. 1791. BENNEDICT diss. qua demonstratur, cor nervis carere. Mogunt. 1792. PAYERAS diss. sistens tertii et quarti nervor. cervicalium description. Hal. 1793. GAUTIER de irritabilitatis notione, natura et morbis. Hal. 1793. SCHAEFFER *über die Sensibilität als Lebensprincip in der organischen Natur.* Frankf. 1793. CH. F. LUDWIG scriptores neurologici minor. select. Lips. 1793—1795. SCHMIDT comment. de nervis lumbal. eorumque plexu anat. pathol. Vienn. 1794. OSLANDER vera cerebri humani circa basin ineisi imago, cum observationibus de cerebro et medulla spinali, novaeque nervos acque ad plantarum vasa hydrargyro implendi methodo (Comment. Soc. Goetl. Vol. XVI. Phys. p. 77). HULL *observations on the nervous system of different animals* (Mem. of the Soc. of Manchester. Vol. 6. P. 2. p. 475). BUTNER functiones organo animae peculiares. Diss. Hal. 1794. BRANDIS *von der Lebenskraft.* Hannover. 1795. CRUIKSHANK *experiments of the nerves, particularly on their reproduction, and on the spinal marrow of living animals* (Phil. transact. Y. 1795. p. 177). HAIGHTON *experimental inquiry, concerning the reproduction of nerves* (Philos. transact. Y. 1795. p. 190). *Experiments made on the laryngeal and recurrent branches of the eighth pair of nerves etc.* (Mem. of the medical soc. of London. Vol. 3. p. 422). RITTER singulares quaedam anatomicae observationes in cerebro, in thorace, in abdomine (Nova acta nat. cur. T. III. p. 533). REIL *Archiv für d. Physiologie.* 8—19. B. De nervorum structura. Hal. 1796. RUDOLPH comment. de ventriculis cerebri. Graisswald. 1796. DARWIN *economia or the laws of organic life.* Lond. 1796. HUMBOLD *sur l'influence de l'acide muriatique oxygéné et sur l'irritabilité de la fibre organisée.* Versuche über die gewisse Muskelfaser. Berl. 1797. AN-

DERICH

BARSH tract. anatom.-physiol. de nervis corporis humani aliquibus. Regiom. 1797. HALL experiments and observations upon the structure of nerves (Philos. trans. Y. 1798. p. 1). The Croonian lecture: on the irritability of nerves (Ibid. Y. 1801. p. 1). Observations sur les fonctions du cerveau, lues à la Soc. R. de Londres, le 28. Mai 1814. Trad. des transactions philosophiques par M^s. MAGENDIE. Y. Journ. de méd. chir. et pharm. T. 32. Mars. 1815. LARREY notice physiologique sur les nerfs de la vie animale, avec une planche représentant le télégraphe électrique, de S. T. SOEMMERING (TATNA Bulletin des sciences médicales. T. 5. p. 217). BARONIO ricerche intorno ad alcune reproduzioni, che si operano negli animali così detti a sangue caldo e nell' uomo (Mem. della Soc. Italiana. T. 4. p. 489). BICHAT anatomie médicale. FABRICIUS neurologia. BRUNS. 1806. BURDACH Beyträge zur nähern Kenntn. d. Gehirns in Hinsicht auf Physik, Med. and Chirurg. Leipz. 1806. AUFERKANT Handbuch der empirisch-menschlichen Physiologie. Tübing. 1801. ROSSI sur la structure du cerveau (Mém. de l'Acad. de Turin. a. 1805—1808. T. 9). YELLOLT a case of a tumor in the brain, with remarks on the propagation of nervous influence (Medico-surgical transact. Vol. L. p. 181). MALACARNE questioni anatomiche e chirurgiche dilucidate (Mem. della Soc. Italiana. T. 3. p. 219). BARBA osservazioni microscopiche sul cervello. Napoli. 1807. PROUT essay physiologique sur la sensibilité. Paris 1806. CUVIER sur les différences des cerveaux considérés dans tous les animaux à sang-rouge (Soc. philomat. a. 3. T. 2. p. 17). RICHERAND mèm. sur les mouvements du cerveau (Mém. de la Soc. méd. d'émulation. a. 3. p. 197). DORIGNY observations sur les mouvemens du cerveau (Annal. de la soc. de méd. de Mont-



Montpellier. T. 20. p. 193). PORTAL mémoire sur un mouvement qu'on peut observer dans la moëlle épinière (Mém. de l'Institut Nation. des sciences et arts. T. 11. se. math. et physiq. mém. p. 151). DUMAS exposé de quelques expériences propres à déterminer, quelle est l'influence des nerfs de la huitième paire sur la coloration du sang (SEDILLOT rec. périod. de la Soc. de méd. de Paris. T. 33. p. 353). DUCROTAY DE BLAINVILLE expériences sur l'influence de la huitième paire des nerfs dans la respiration (Nouv. Bulletin de la soc. philomatique. T. I. p. 226). MARTIN the experiment of cutting the recarrent nerves, carried on further than has hitherto been done (Med. essays and obs. by a Soc. in Edinb. Vol. 2. p. 114). KEUFFEL diss. inaugur. de medulla spinali, Hal. 1810. RAMSAY anatomy of the Heart, Cranium and Brain adapted to the purposes of medical and surgical practitioners; to which is added, in notes, observations on Laws of life and sensation. 2. edit. Edinb. 1803. ROLANDO saggio sulla vera strattura del cervello dell'uomo e degli animali, e sopra le funzioni del cervello, Sassari 1809. GALL Anatomie und Physiologie des Nervensystems im Allgemeinen und des Gehirns im Besondern. Paris 1810. ALEXANDER diss. medico-chirurgica de tumoribus nervorum, Lugd. Bat. 1810. Neue Samml. auserl. Abhandl. 1815. LUCAE observationes anatomicae circa nervos arterias adjuvantes et comitantes. Francf. 1810. — De cerebri in homine vasis et motu, inclitae Heidelbergensi reipublicae literariae valedicens, quaedam verba etc. Heidelb. 1812. NYSTEN recherches de physiologie et de chimie pathologiques. Paris 1811. BRODIE philos. transact. Y. 1811. SOERMMEERINO de basi encephali et originibus nervorum ex cranio egredientibus. Goett. 1778. Vom Hirn- und Rückenmark. Mainz 1788. Tabula basos encephali. Francf.

Francf. 1799. *Academ. annotat. de cerebr. administr. anatom.* Monac. 1810. *Ueber das Organ der Seele.* Königsb. 1796. *Diss. de lapillis, vel prope vel intra glandulam pinealem sitia.* Mogunt. 1785. *Ueber den Saft, welcher aus den Nerven wieder eingesaugt wird, im gesunden und kranken Zustande des menschlichen Körpers.* Landshut 1811. NIEMEYER *de origine paris quinti nervorum cerebri.* Hal. 1812. REIL's *Archiv für Physiol.* 11. B. 1. St. WENZEL *de penitiori structura cerebri hominis et brutorum.* Tubing. 1812. SNIADOCKI *teorya jestestwo organicznych. w Wilnie.* 1811. SPRENGEL *institutiones medicae.* T. I. cap. 8. LE GALLOIS *recherches experimentales sur le principe du sentiment et du mouvement* (SEDILLOT *recueil périodique de la Soc. de méd. de Paris.* T. 35. p. 423). *Mémoire sur la section des nerfs de la huitième paire* (Nouv. *Bulletin de la Soc. philomat.* T. 2. n. 13. p. 101). *Expériences sur le principe de la vie, notamment sur celui des mouvements du coeur et sur le siège de ce principe.* Paris 1812. CARUS *Versuch einer Darstellung des Nervensystems und insbesondere des Gehirns.* Lpz. 1814. CROSS in *annals of philosophy etc.* by TH. THOMSON. Lond. 1815. Februar. art. V. J. FR. MECKEL *Handbuch der menschlichen Anatomie.* 1. B. Halle 1815. *Absch. vom Nervensystem.* SPIX *cephalogenesis sive capitis ossis structura, formatio et significatio per omnes animalium classes, familias, genera, ac aetates digesta atque tabulis illustrata, legesque simul psychologicae, cranioscopicae ac physionomicae inde derivatae.* Monachii 1815. SMERDON *experiments on functions of the nervous system.* V. *Medical and physical journal* by FOTHERGILL and WART. 1815. Mai. TIEDEMANN *Anatomie und Bildungsgeschichte des Gehirns im Foetus des Menschen, nebst einer vergleichenden Darstellung des Hirnbaues in den Thieren.* Nürnberg.

Nürnb. 1816. A. K. BOCK *Beschreibung des fünften Nervenpaares und seiner Verbindungen mit andern Nerven, vorzüglich mit dem Gangliensysteme. Meissen* 1817. Ejusd. *Nachträge zur Beschreibung des fünften Nervenpaares. Ibid.* 1821. Ejusd. *Die Rückenmarksnerven nach ihrem ganzen Verlaufe, Vertheilungen und Verbindungen. Leips.* 1827. Ejusd. *Abbildungen der Rückenmarksnerven, nebst Erklärungen der sieben Kupfertafeln. Ibid.* 1827. Ejusd. *Accurata nervorum spinalium descriptio. Lips.* 1828. J. BRACHET *mémoires sur les fonctions du système nerveux ganglionaire. Paris* 1822 et 1830. J. SWAN *observations on some points relating to the anatomy, physiology and pathology of the nervous system. London* 1822. FOVILLE et PINEL *recherches sur le siège spécial des différentes fonctions du système nerveux. Paris* 1823. P. FLOURENS *recherches expérimentales sur les propriétés et les fonctions du système nerveux, dans les animaux vertébrés. Paris* 1824. Versio germanica auctore Becker. Leipzig 1824. F. VACQUIÉ *précis historique et critique des travaux sur le système nerveux de l'homme. In Journ. universel des sciences médicales. T. 35. p. 5. 129. 256.* CH. BELL's *exposition of the natural system of the nerves of human body. With a republication of the papers delivered to the R. society of the subject of nerves. Lond.* 1824. Ejusdem *Appendix to the papers on the nerves. Lond.* 1827. BOGROS *nouvelles découvertes sur la structure des nerfs. In Revue médicale. Mai* 1825. LURI *encephali anatomica descriptio. Romae* 1826. PH. HENSLEN *über die Bestimmung des Nervensystems. In neue Lshren im Gebiete der physiologischen Anatomie. 2. B. Nürnb.* 1826. FR. NASSER *Zeitschrift für die Anthropologie. 1826.* MEXHAUX *considérations anatomiques sur la moëlle allongée. In annales des sciences naturelles. Août* 1827. Ejusdem
sur

— tum experimentis de animali electricitate ¹⁰⁹⁾ etc.

— tum

sur le système nerveux d'après les idées de Mr. Blainville. In *Archives générales de médecine*. Mai 1827. BLAINVILLE in *Archiv. générales de médecine*. Mai 1827. MAHUC *anatomie analytique*. Tableaux représentant l'axe cérébro-spinal chez l'homme, avec l'origine et les premières divisions des nerfs qui en partent. Paris 1828. C. GIRAUX DE BUXAREINGUES *philosophie, physiologie, politique et morale*. Paris 1828. Ejusdem *observations sur l'origine et les circonvolutions du cerveau et du cervelet*. *Bulletin des sciences médicales*. Février 1829. ROSENTHAL *Beitrag zur Encephalotomie etc: über das Gehirn und Nervensystem*. In *FRONIEP's Notizen aus dem Gebiete der Natur- und Heilk.* B. 25. No. 2. Juli 1829. 109) AUCTORIBUS GALVANI de viribus electricitatis in motu musculari commentarius. Bonon. 1791. VOLTA *Schriften über die thierische Electricität*. Prag 1792. PFAFF *über thierische Electricität und Reizbarkeit*. Leipz. 1795. TREVIRANUS *über den Einfluss des einfachen Galvanismus auf die thierische Reizbarkeit*. V. GILBERT's *Annalen* 8. B. 1. St. p. 44. RITTEN *Beiträge zur nähern Kenntniss des Galvanismus und der Resultate seiner Untersuchungen*. Jena 1800. PILGER *Versuch durch den Galvanismus die Wirkung verschiedener Gifte und Arzneimittel auf die erhöhte oder verminderte Reizbarkeit der Nerven zu prüfen*. Gießen 1801. Nysten *nouvelles expériences Galvaniques faites sur les organes musculaires de l'homme et des animaux à sang rouge*. Paris a. XI. Sur l'histotre du Galvanisme et analyse des différens ouvrages sur cette découverte. Paris 1802. TROMSDORFF *Geschichte des Galvanismus*. Erfurt 1802. NAUCHE *Joarn. du Galvanisme*. Paris 1803. AUGUSTIN *Versuch einer voll-*

26 DE MORBIS SYSTEMATIS NERVORUM

—tum invento magnetismi animalis¹¹⁰⁾—tum fragmen-

ständigen systematischen Geschichte der Galvanischen Electricität. Leipz. 1803. ALDINI *essai théorique et expérimental sur le Galvanisme*. Paris 1804. HEIDMANN *vollständige Theorie der Galvanischen Electricität*. Wien 1806.

- 110) Videantur MEYER *Abhandlung über die Entdeckung des thierisch. Magnetismus*. Carlsr. 1781. D'ESTON *Beobachtungen über den thierischen Magnetismus*. Carlsr. 1781. BOECKMANN *Archiv f. Magnetismus*. Strassb. 1787. GÜMLIN *über den thierischen Magnetismus*. Tüb. 1787. HEINECKE *Ideen und Beobachtungen den thierischen Magnetismus und dessen Anwendung betreffend*. Brem. 1800. PEZOLD in REIL's *Archiv für Physiologie* 11. B. WEINHOLT *Heilkräfte des thierischen Magnetismus nach eigenen Beobachtungen*. Leipz. 1802. PUYSEUR *du magnétisme animal considéré dans les rapports avec diverses branches de la physique générale*. 2. edit. 1809. KLUGE *Versuch einer Darstellung des animalischen Magnetismus als Heilmittel*. Berlin 1811. edit. 2. 1815. BARTELS *Grundsätze einer Physiologie und Physik des animalischen Magnetismus*. Frankf. 1812. DELUZE *histoire critique du magnétisme animal*. Paris 1813. STIRGLITZ *über den thierischen Magnetismus*. Hannov. 1814. HERZOG *neuest. Journ. d. Erfindungen*. 2. B. 3. 4. St. 1812. VOLZART *Askläpietion*. Berlin 1812. MONTÉORE *du magnétisme animal et de ses partisans*. Paris 1812. WOLTERS et HENDRIKS *Bydragen tot den tegemoordigen Staat van het animalisch Magnetismus in ons Vaderland*. Gröning. 1814. GEDERSHÖLD *Journal für animalisch. Magnetismus*. Stockholm 1815. CADOT *considérations philosophiques et morales sur le magnétisme animal, ses principes et ses rapports avec le fluide nerveux*. St. Petersb. 1816. LICHTENSTAEDT

mentis ¹¹¹⁾ — tumque monographiis inter quas respectu cerebri et cerebelli eminent, quae (ne de antiquioribus ¹¹²⁾ loquamur) sedulitati debentur

C. F.

Untersuchungen über den thierischen Magnetismus, St. Petersburg 1816. Cfr. *Coup d'oeil sur le magnétisme animal*, Ibid. 1816 (Auctore PARROT?) et *Briefe über eine magnetische Kur*, Ibid. 1816. (Auctore BARO?). J. B. WILBRAND *Darstellung des thierischen Magnetismus als einer in dem Gesetze der Natur vollkommen gegründeten Erscheinung*, Frankf. 1824. J. C. L. ZIERMANN *geschichtliche Darstellung des thierischen Magnetismus als Heilmittel*, Berlin 1824. J. L. PICHÉ-GRANDCHAMP *mémoires de F. A. MESMER sur ses découvertes*, Paris 1826. *Exposé par ordre alphabétique des cures opérées en France par le magnétisme animal depuis Mesmer jusqu'à nos jours (1774 — 1826) suivi d'un catalogue complet des ouvrages françois, qui ont été publiés pour et contre le magnétisme*, Paris 1826. *Esquisse de la nature humaine expliquée par le magnétisme animal*, Paris 1826. A. BERTRAND *du magnétisme animal en France*, Paris 1826. L'HERMÈS *Journ. du magnétisme animal*, Paris 1826. A. DUPAN *letters physiological and moral upon animal magnetism*, London 1826. A. W. VOLKMANN *dis. observationes biologicae de magnetismo animali*, Lips. 1826.

111) Auctoribus PLOUCQUET *dis. de morbis neuricis*, Tub. 1792. TABOR *Abhandl. über die Nervenschwäche*, Carlsr. 1792. THOMSON *inquiry into nature, causes and method of cure of nervous disorders*, Lond. 1795. AUTERRIETH *dis. de natura et medicis morborum neuricorum generatim spectatis*, Tub. 1806.

112) JASON A PRATIS *de cerebri morbis*, Basil. 1549.

28 DE MORBIS SYSTEMATIS NERVORUM

C. F. BURDACH ¹¹³⁾, R. POWEL ¹¹⁴⁾, B. A. SERRES ¹¹⁵⁾,

J. HEURNIUS de morbis, qui in singulis partibus capitis humani insidere consueverunt. Leid. 1594. A. VESIO in GALENUM de capitis affectionibus. Lugd. 1594. BLACVOD ergo maxima pars morborum a cerebro. Paris 1602. MONTAGNANA consilia de aegritudinibus cerebri. Frf. 1604. FR. HILDEBRANDI apicilegia de cerebri et capitis morbis internis. Frf. 1612. PH. MONTALTO ELIANUS de internis capitis affectibus. Paris 1614. VIC. A CRUCE ALBANUS de morbis capitis frequentioribus. Romae 1617. J. QUERCATANUS tetras gravissimorum capitis affectuum. Marp. 1617. J. CAMAGNESI brevis facillaque methodus curandorum capitis affectuum, Cadomi 1618. H. PASCHATI decas de gravissimis capitis affectibus. Lubec. 1618. TH. GROSSI lectiones de morbis capitis et thoracis. Ferrar. 1628. HILDEBRANDI diss. de nonnullis capitis affectionibus. Leid. 1655. URSINUS diss. de affectibus capitis internis. Lips. 1657. ISRA. DIZMEBRANDI de morbis capitis et thoracis. Traject. 1664. TH. WILLIS op. cit. CUMINIUS diss. de cerebro ejusque pathologia in genere. Leid. 1684. MAJUS diss. de praecipuis capitis affectionibus. Rinteln 1691. L. BELLINI de morbis capitis. In opp. Venet. 1708. HORATIUS diss. Problematum medicorum decas, gravissimorum capitis affectuum cognitionem illustrans. Vit. 1708. J. M. MÜLLER de capite ejusque affectibus. App. ad obs. et ent. med. Norimb. 1714. HALLERI DE DONLHOFF tractatus de morbis capitis. Ratisb. 1721. JOH. JAC. WÄFFER observationes medico-practicae de affectibus capitis. Scaph. 1727. BÜCHNER diss. de morbis cerebri ex structura ejus anatomica deducendis. Erford. 1741. J. LAZARUS de morbis internis capitis. Amst.

RES ¹¹⁵), F. LALLEMAND ¹¹⁶), G. F. J. SAHMEN ¹¹⁷),
L. E. BAYLE ¹¹⁸), R. HOOPER ¹¹⁹), A. MONRO ¹²⁰),
J. ABERCROMBY ¹²¹) etc. ¹²²).

3. Quo

1748. GREYSINGER diss. de diagnosi morborum capit-
tis. Viennae 1764. FR. GENNARI de peculiari structu-
ra cerebri nonnullisque ajs morbis. Parm. 1782.
- 113) *Beiträge zur nähern Kenntniss des Gehirns in Hin-
sicht auf Physiologie, Medicin u. Chirurgie. Leipz. 1806.*
- 114) *Merkwürdige Fälle zur Aufklärung der Pathologie
des Gehirns. Ex medical transactions in HUTELAND'S
Journ. der pr. Heilk. 1817. Sept. p. 93.*
- 115) *Recherches sur les affections organiques du cer-
veau. In Annuaire médico-chirurgical des hôpitaux et
hospices civils de Paris. Paris 1819.*
- 116) *Recherches anatomico-pathologiques sur l'encéphale
et ses appendices. Montpellier (Versio germanica auctore
WENZ. Lips. 1825). Cinquième lettre 1830.*
- 117) *Die Krankheiten des Gehirns und der Hirnhäute,
pathologisch diagnostisch bearbeitet. Dorpat 1826.*
- 118) *Traité des maladies du cerveau et de ses membra-
nes. Paris 1826.*
- 119) *The morbid anatomy of the human brain, being
illustrations of the most frequent and important or-
ganic diseases to which that viscus is subject. London
1826. With XV. color. engravings.*
- 120) *The morbid anatomy of the brain. Edinb. 1827.*
- 121) *Pathological and practical Researches of the brain
and spinal chord. Edinb. 1828. Versio germanica au-
ctore BUSCH. Bremen 1828 (Legi etiam meretur ABER-
CROMBY de eodem argumento in The medical and
surgical journal, Vol. 14 et 15).*
- 122) WISENHELMANN diss. pathologia cerebri. Gotting.
1803.

Propositi-
um no-
strum.

3. Quo ampliores autem fiunt doctrinae limites, quoque major factorum ac opinionum accedit copia; eo difficilior quoque ordinis rerum, praecipue inter compendii confinia, tradendarum, evadit conservatio. Magna praeterea in hoc invenitur difficultas, quod emolumentum ex notionibus, quas scientiae auxiliares (physica, anatomia, physiologia) suppeditant, trahatur, quin in morbis describendis et curandis via experientiae et observationis derelinquatur. Nec satis est, hic ut alibi, instar legum physicarum naturae scrutatorum incedere: constat enimvero, doctrinam morborum systematis nervorum nexum summum cum praeceptis Religionis et disciplinae moralis agnoscere, quo nexu, antiquitati probe noto¹²³), sive neglecto sive spreto, medicorum ordo non amplius, ut decet, Altari et Throno fulcrum, sed utrisque flagellum, ideoque societatis veluti subversor evadit. Quae singula dum perpendis, quam grave propositum, morbos systematis nervorum exponendi, esse debeat, facile intelliges. Quin immo plane nobis desperandum foret, nisi spes adhuc in id locari posset, quod ex collectione tot factorum, quot aliorum et nostra circa morbos systematis nervorum experientia suppeditat, tale oriri debeat corpus doctrinae

123) PLATO de fortuna domestica. ZENO sermone de pudicitia. PYTHAGORAS salubr. praecepti. DIOGENES LAERTIUS de vita et moribus. ALBERTI diss. de medicinae et doctrinae moralis nexu. Et: Disputatio de morum et morborum consensu.

doctrinae, quale hucusque desiderabatur. Sufficit postremo spem nostram, opus, cujus utilitas saltem ex parte labori impenso respondeat, perficiendi, ordo, quo in serie morborum systematis nervorum exponenda usi sumus; incipiendo scilicet a simplicissimo encephali morbo, *dolore capitis*, et progrediendo ad *encephalitidem*, *hydrocephalum*, *apoplexiam*, *cataphoram*, *agrypniam*, *rhonchum*, *jactationem*, *crampum*, *ardorem* et *pavores in somno*, item ad *somnia terrifica*, *incubum*, *somnambulismum*, *somniationem*, *ecstasin*, *catalepsin*, *vertiginem*, *hypochondriasin*, *amnesiam*, *moerorem*, *iram*, *amorem*, *vitalis taedium* et *suicidium*, *deliria*, *ebrietatem*, *paraphrosynen a venenis*, *manias* ¹²⁴⁾, *rhachialgiam* ¹²⁵⁾, *rhachialgitidem*, *hydro-rhachitidem*, *neuralgiam in genere* et *protopalgiam in specie*, *neuritidem* et *ischias*, *tremores*, *motus spasmodicos vagos*, *choream St. Viti*, *convulsiones*, *epilepsiam*, *paralysin*, *tetanus* et *rhapsantiam*, quorum morborum doctrinis annectuntur *tractatus de morbis oculorum*, *aurium* et *cavitatum nasalium*. De *syncope nervosa* in capite de *animi deliquiis* ¹²⁶⁾. De *hydrophobia* loco jam indicato ¹²⁷⁾. De *morbis ex affectione nervo-*

rum

124) Clauditor tractatu *manias* prima ista sectio partis secundae voluminis primi.

125) Oreditur sectio secunda ejusdem voluminis a doctrina rhachialgiae.

126) Part. II. Vol. II. sect. II. cap. XXII.

127) Part. IV. Vol. II. sect. I.

32 DE MORBIS SYSTEMATIS NERVORUM

rum textui viscerum inhaerentium sparsim in toto opere ¹²⁸).

§. II.

Symptomata. Necroscopia. Analysis chemica.

Sympt.
genera-
tim.

1. Sicuti in doctrina morborum cutis opportunum credidimus, primum elementaria illorum aymptomata explanare; ac *terminos* sic statuere *technicos*; ita et relate ad morbos systematis nervorum agemus.

Dolor.

2. *Dolor* ¹⁾ est perceptio ingrata et molesta, quam vel invitus homo conatur tollere, cujusque idea non relinquit sui memoriam.

Anaesthesia.

3. *Anaesthesia* ²⁾ est abolitio sensus.

Paralysis,
Paresis.

4. *Paralysis* ³⁾ est musculorum laxa immobilitas, nullo nisu voluntaria superanda. Levior ejusdem mali gradus *paresis* ⁴⁾.

5. *Spas-*

128) E. c. ibi de asthmate, cardialgia, hysteria, ubi morbi pulmonis, ventriculi et uteri exponuntur.

1) *Ἀλγία*, seu *ἰσθμία* (SWEDIAURK novum nomenclologiae methodicae systema. Vol. I. p. 366). ГЕРМ. *Schmerzen*. GALL. *Douleur*. ANGEL. *Pain*. RUSSIC. Боль. POL. *Ból*.

2) Ab α privativo et αἰσθησις, sensus.

3) Α παρά, vitiose, et λύσις, debilitas. LAT. Resolutio nervorum. ГЕРМ. *Lähmung*. GALL. *Paralyse*. ANGEL. *Parly*. RUSS. Паралич или лишение чувствительности и движения въ какой либо части тела. РОСОН. *Odyssie czlonkow, Paraliti*.

4) Α πάρεσις, torpor, languor, seguities musculorum ad motum.

5. *Spasmus* est fibrarum muscularium con- Spasmus.
tractio involuntaria.

6. Quae de causis, sedibus et effectibus mor- Necrosco-
borum systematis nervorum notiones certas possi- pia.
demos, has maxima ex parte *anatomiae patho-*
logicae debemus. Thesaurum inde notionum re-
late ad *encephalum* obtinuimus. — Egentes adhuc
quoad *specum vertebralem* aumus, et egentissimi
relate ad *nervos* 5). In excolendâ anatomîâ pa-
thologicâ morborum systematis nervorum, respi-
ciendum est ad vitia modo *ossium* et *membrana-*
rum, *pulpae* *nerveae* pro fulcris et involacris in-
servientium; modo *vasorum sanguiferorum* et
lymphaticorum, ad hanc *pulpam* nutriendam et
forte quid ex ea absorbendum 6) dicatorum; mo-
doque ipsius *substantiae cerebri*, *medullae spi-*
nalis et *nervorum*.

7. *Analysin chemicam* ad morbos systematis Analysis
nervorum dilucidandos parum contribuere posse, chemica.
veremur. Interea chemicis debemus experimenta
nonnulla de cerebri 7), vel *pulpae nervorum* na-
tura,

5) VOIGTEL *Handbuch der pathologischen Anatomie*.

1. B. p. 660. . AUFENRIETH diss. de hactenus praeter-
viam nervorum lustratione in sectionibus hydrophobo-
rum. Tübing. 1802. SOEMMERLING op. c. *Ueber den*
Soft etc. p. 73.

6) SOEMMERLING l. c.

7) FOURCROY *mémoire sur l'analyse chimique de plu-*
sieurs cerveaux (*Bulletin de la soc. philomatique* T. I.
p. 37). VAUQUELIN *analyse de la matière, qui con-*
Frank Praez. II. l. 1.

34 DE MORBIS SYSTEMATIS NERVORUM

tura, de ejusdem in materiam adipo-ceream transitu, de indole calculorum in capite aliisque systematis nervorum partibus inventorum, atque de natura liquidi in ventriculis cerebri, in specu vertebrali et in vaginis nervorum extravasati.

§. III.

C a u s s a e.

Genera-
tim.

1. *Causae* morborum systematis nervorum vel in ipso corpore humano, vel in rebus illud ambientibus, vel in utrisque simul existunt. *Causae* in ipso corpore humano existentes, nunc cerebrum, medullam spinalem et nervos, aut saltem membranas has partes involventes detinent, nunc vero in imperio, quod affectiones morbosae systematis ossium, vasorum tum lymphaticorum tum sanguiferorum, nec non viscerum in cavitatibus pectoria, abdominis ac pelvis reclusorum, in genus nervosum exercent, locatae sunt.

Vitia haec
reditaria.

2. Systema nervorum prae omni alio, vitiis a parentibus ad proles, vel ab avis ad nepotes, alterutrius vel utriusque sexus propagatis, determinato plerumque vitae tempore, diversa aliquando sub forma ¹⁾, evolvendis, subjicitur ²⁾.

3. Haud

stimule le cerveau humain (Nouv. bullet. de la soc. philom. 1811. p. 368). Cfr. *Annales du Museum d'histoire naturelle*. T. 18. MAGENDIE *journal de physiologie expérimentale*.

1) E. c. ab epilepticis, maniacis, et vice versa.

2) Inter recentiores de hoc argumento legantur ADAMS

3. Haud pauci systemate nervorum labefactato nascuntur, cui labefactioni congenitas, ut monuimus³⁾, ansam porrigere videntur res, vel actam conceptionis circumdantes, e. c. ebrietas, terror, aversatio aut effrenis libido conjugum; — vel in evolutionem embryonis agentes, e. gr. animi pathemata, violentiae externae, morbi febriles, chronici matris gravidae; — vel partum circumdantes, forte anni tempus, immaturitas aut maturitas recens nati, nunc solitarii nunc gemelli, nunc levi opera nunc cum difficultate in lucem editi; — vel aliae adhuc ignotae. Aliquando dispositio morbosa congenita systematis nervorum tantummodo in uno latere⁴⁾, vel una in parte⁵⁾ obvenit.

4. Quodvis temperamentum characteres fortiter exaratos exhibens conditionem systematis nervorum plus minus morbosam⁶⁾ annuntiat.

Vitia congenita.

Temperamentum.

C 2

5. Nil

(a philosophical dissertation on the hereditary peculiarities of human constitution, with Inquiry into the provisions made by nature, to prevent the deterioration of the race, and how far they can be imitated or improved by art. Lond. 1814) et WOLLSTEIN (über das Paaren, Verpaaren der Menschen und der Thiere, nebst einer Abhandlung über die Folgen und Krankheiten, die aus der Verpaarung entstehen. Altona 1815).

3) Edit. 2. P. I. Vol. I. sect. I. Introd. ad stud. clin. § XV.

4) Vide SPRENGEL (Institut. Vol. II. p. 378) de chiasmo nervorum.

5) TISSOT l. c. p. 223.

6) FR. HOFFMANN diss. de temperamento, fundamento

Idiosyn-
crasia.

5. Nil magis de specifica conditione systematis nervorum variis hominibus propria testatur, quam *idiosyncrasiae*, temperamentis teneri plerumque progenies, quaeque pro re nata sensus visus, auditus, odoratus, gustus, tactus afficiunt, ac praeterea tum a consuetudine, tum ab adassociatione idearum pendent. Portentosum effectum idiosyncrasiae, *antipathiae* sistunt, quae non immerito omnis aevi medicorum attentionem ad se traxerunt 7). Docent illae, systematis nervorum speci-

morum et morborum in gentibus. Opp. T. V. p. 103. *Klämer Abhandl. von den Temperamenten. Schaffh. und Frankf. 1760.* FICKER comment. de temperamentis hominum, quatenus ex fabrica corporis et structura pendent. Gott. 1796.

- 7) Praecipui de *antipathia* scriptores sunt: FRACASTORUS, Opp. VROA de art. medend. Lugd. 1564. Lib. II. c. 3. p. 239. PRUCERUS oratio de sympathia et antipathia rerum in natura. Erf. 1574. AVOLI de causis sympathiae et antipathiae. Venet. 1580. JESSENIUS A. JESSEN diss. de sympathiae et antipathiae rerum naturalium causis. Vratislav. 1599. ZWINGER de antipathia humana. v. fasc. diss. select. No. 1. RATTRAY aditus novus ad occultas sympathias et antipathias causas. Glasg. 1658. LETSCHNIUS diss. de sympathia et antipathia corporum naturalium. Vitenb. 1660. LIPSIUS diss. antipathiae singulares. Jen. 1678. EBERHARD diss. sistens sympathias et antipathias historiam. Brem. 1682. SCHWELINGIUS diss. sympathiae et antipathiae historia physice explicata. Brem. 1682. WILZICH diss. de sympathia et antipathia. 1697. RUDOLPH diss. de antipathia humana. Basil. 1700. VOISIN diss.

specificam et plus minusve morbosam conditionem corpus humanum imperio multarum rerum subijcere, quae vulgo nullum in illud sensibus obvium effectum producant⁸⁾, cujus rei in morborum systematis nervorum aetiologiâ semper memores esse juvabit, ne facta, de quibus rationem reddere nequimus, ideo pro falsis declaremus⁹⁾.

6. Ad partem incomprehensibilem aetiologiae nostrae quoque pertinet *nisus imitandi*¹⁰⁾, quo
homi-

Nisus
imitandi.

de antipathia humana. Basil. 1701. MENTZ diss. antipathiae physicae phaenomena ad suas causas revocata. Lips. 1708. REMBERTUS notae in Anaxagorae et Democritum de sympathia et antipathia. Hamb. 1712. HERMSTAEDT *wunderbare Kräfte der Natur durch die Sym- und Antipathie*. Rothenb. 1776. PASSEMENT *essay sur les antipathies*. Paris 1811. PETROZ articulus *antipathie* in *Dictionnaire des sciences médicales* Parisiâ edito. T. 2. p. 200.

8) Cfr. Appendix ad caput XIV. Diarium diei 18. Maii.

9) Axioma philosophicum antiquum: *ab ignorantie modi non valet consequentia ad negationem existentiae rei*, pulchre a celeberrimo LA PLACE (*théorie analytique des probabilités*. Paris 1812. p. 358) explicatur, ubi ait: „Nous sommes si éloignés de connaître tous les agents de la nature et leurs modes d'action, qu'il seroit peu philosophique, de nier l'existence des phénomènes, uniquement, parcequ'ils sont inexplicables dans l'état actuel de nos connoissances; seulement nous devons les examiner avec une attention d'autant plus scrupuleuse, qu'il paroît plus difficile de les admettre.“

10) Inter ea multum hic electricitatem valere, ex factis infra tradendis (Append. ad cap. XIV. Diar. diei 20.

homines praesertim juvenes et excitabiles in morbum nervosum, quem adspiciunt, facile ipsi conjiciuntur¹¹⁾. Nervi illorum hinc ita nervis aegrorum respondere videntur, uti chorda musica quiescente alteri unisonae oscillanti.

Aetas.

7. Quaevis aetas ad peculiare systematis nervorum morbos viam sternit¹²⁾. Infantes maxime malis encephali et specus vertebralis nec non plexuum nervorum abdominalium subjiuntur, quod tribuendum est (ne amplius dicamus de violentiis sub partu) cerebro molliori, nervorum crassitie¹³⁾, sanguinis majori affluxui ad caput, fontanellae diutius apertae, dentitioni, imbecillitati vertebrarum et tardae processuum spinosorum forma-

Maii) concludo. Vellem porro, ut *simiarum* nisus imitandi examini peculiari subiceretur, acopo observandi, num ille quid commune cum nisu imitandi morbo habeat, nec ne? Interea legi meretur quod VIRXY (*histoire naturelle du genre humain*. Paris ann. IX. T. 2, p. 243) de *imitationis* in homines imperio eleganter exposuit. OSLANDER (*über die Entwicklungskrankheiten in den Blüthenjahren des weiblichen Geschlechtes*. Gött. 1820. I, Th.) *nisum*, quem *imitationis* vocavi, sub nomine *adfectus mimetici* describit.

11) BAGLIV. prax. med. cap. XIV. §. 2. NICOLE *naturalisme des convulsions*. Soleure 1733. KAW BOERHAAVE impetum faciens. §. 394. 406. TISSOT l. c. p. 289. MOREAU DE LA SARTHE in *Mém. de la soc. médico, d'émulation*. Vol. 2. p. 189.

12) B. LOEWENTHAL diss. de *neurosibus secundum diversas vitae aetates*. Wurceb. 1824.

13) SOMMERHING l. c. p. 64.

formationi, morbis hepatis, acidis primarum viarum, vermibus intestinalibus, fasciarum vestiumque arctae nimis applicationi, cunarum agitationi violentae ¹⁴⁾, portandi rationi incongruae, nutrimenti defectui, excessui, depravationi (praecipue si nutrix vino aut alcohol abutatur, animi pathematibus excrucietur, libidinosa fuerit ¹⁵⁾), lapsibus saepe nimis a nutricibus occultatis, aëri corrupto cubiculorum, frigori et pharmacis ad somnum conciliandum exhibitis. Maxime *epocha pubertatis* morbis systematis nervorum favet, quod tum rapido partium ad illud spectantium incremento, tum imperio partium genitalium potissimum in plexus nervorum abdominalium et in medullam spinalem ¹⁶⁾ adscribendum esse existimamus. *Aetas media*, nisi veneris abusus, potus liquorum fermentatorum, opificia insalubria animique pathemata locum inveniant, parum morbis nervorum, exceptis vesaniis, favet. Contra ea *senectus*, nervis corrugatis, exsiccatis, quodammodo consumptis ¹⁷⁾ instructa, multum, inprimis ad morbos cerebri, disposita est.

8. Fe-

14) PLATNER progr. de somno infantum ex agitatione motuque cunarum. Lips. 1740.

15) PHAVORIUS apud A. GELLII Noct. Atticar. lib. XII, cap. I.

16) Cfr. cap. de *Chorea St. Viti*, ubi demonstrabitur, pubertatem ita in medullam spinalem, ubi dentitionem in cerebrum, influere.

17) SEILER anatomiae corporis humani senilis specimenu. Erlang. 1800. p. 117. LUCAS op. c. §. 12.

Sexus.

8. Feminae, cerebro ampliori, nervis (exceptis olfactoriis, opticis, ischiadicis, plexuque hypogastrico et uterino nec non filamentis ex plexibus nonnullis mesaraicis venientibus) subtilioribus, ast copiosioribus instructae¹⁸⁾, prae maribus et fortius morbis systematis nervorum subjiciuntur. Cujus phaenomeni ratio praeterea quaerenda est in cultu ornatuque, in servitute qua vivunt, in nexu uteri et ovariorum cum universo corpore et in peculiaribus functionibus sexualibus, de quibus infra.

Animi pathemata.

9. Fertilissima causa morborum systematis nervorum in *animi pathematibus* invenitur, quod abunde demonstrarunt NICHOLS¹⁹⁾, CLARK²⁰⁾, BACCKER²¹⁾, GAUß²²⁾, ZÜCKERT²³⁾, CAMERARIUS²⁴⁾, DE BEAUCHEME²⁵⁾, FALCONER²⁶⁾, TISSOT²⁷⁾,

NIE-

18) SOEMMERRING diss. de basi encephali et originibus nervorum. Goett. 1778. WALTHER Tab. nervor. thoracis et abdominis. Berol. 1788. FISCHER descriptio anatomica nervorum lumbalium, sacralium. Lips. 1791.

19) Praelectio de anima medica. Lond. 1750.

20) Dissertation concerning the effects of the passions on human bodies. Lond. 1752.

21) De affectibus animi. Cantabr. 1755.

22) De Regimine mentis. Lugd. Bat. 1767.

23) Von den Leidenschaften. Berl. 1768.

24) De efficacia animi pathematum.

25) De l'influence des affections de l'âme dans les maladies nerveuses des femmes. Montp. 1781.

26) Diss. on the influence of the passions upon disorders of the body. Lond. 1788.

27) Op. c.

NIEMEYER ²³⁾, COGAN ²⁹⁾, MORTESAN ³⁰⁾, DEBREUZE ³¹⁾, CHARPENTIER ³²⁾, BILON ³¹⁾, GODEFROY ³⁴⁾ et MAASS ³⁵⁾. Examen animi pathematum speciale docebit, quodvis eorum peculiarem affinitatem quibusdam cum nervis et visceribus habere. Ordinur a gaudio.

10. *Gaudium*, debitos inter limites tam salu- Gaudium. tare, si illos excedat, gravissima nervorum phaenomena produxisse est visum ³⁶⁾. Idem de gaudii effectum, *risu* ³⁷⁾, valet; qui praeterea de actione gaudii in nervos diaphragmatis testatur.

11. *Moeror* potissimum nervis pulmonum, Moeror. cordis, ventriculi et hepatis inimicus, specifico glandulas lacrymales afficiens, opusque nutritio- nis

28) Commentatio de commercio inter animi pathemata, hepar, bilemque. Goett. 1795.

29) *A philosophical treatise on the passions*. Bath. 1800.

30) *Traité sur l'influence des passions sur le tempérament et la santé*. Paris 1805.

31) *Act. de la soc. des sciences physiq. et médic. de Liège*. Part. I. p. 4.

32) Ibid. p. 191. 33) Ibid. p. 291. 34) Ibid. p. 355.

35) *Versuch über die Leidenschaften*. Halle. 1. Th. 1805. 2. Th. 1807.

36) *Ephem. nat. cur. dec. II. ann. 9. obs. 22*. MARCEL-
LUS DONATUS L. III. c. 13. *Anecdotes de médecine*
p. 117.

37) CAMERARIUS *memorab. cent. 14. p. 60. 61*. *Ephem.*
nat. cur. dec. II. ann. 8. obs. 176. ann. 9. obs. 22. dec.
III. ann. 2. obs. 10.

42 DE MORBIS SYSTEMATIS NERVORUM

nia et secretionum laedens, veluti morbus per se considerabitur ³⁸⁾).

Desperatio.

12. *Desperatio*, praecipue ex angore animi ob occultum crimen, quo delicatior conscientia, eo peiores, iis tristitiae similes, producit effectus ³⁹⁾).

Amor.

13. *Amor*, si felix, gaudil, alias moeroris ludit scenam, uti abunde debito loco ⁴⁰⁾ demonstrabitur.

Odium,
invidia,
zelotypia.

14. *Odii, invidiae et zelotypiae* actiones, praecipue hepatis et cerebri infensae, limites in morbis systematis nervorum gignendis non agnoscunt.

Ira.

15. Idem de *ira* valet, in speciali capite consideranda ⁴¹⁾).

Timor,
terror.

16. Sicuti effectus *timoris* cum iis tristitiae, ita effectus *terroris* cum iis irae cohaerent. Innumerable in curriculo hujus libri recensenda exempla id confirmabunt.

Pudor.

17. *Pudor*, docente erubescencia ⁴²⁾, praesertim in nervos cordis et cutis, aliquando cum letali eventu ⁴³⁾ agit.

Voluptas.

18. Lentius, ast non minus evidenter, universi systematis nervorum vim infringit *voluptas*, saepe nimis repetita.

19. Do-

38) Cap. XIX.

39) Tissot l. c. p. 385.

40) Cap. XXI.

41) Cap. XX.

42) WALTHER de erubescencia. Lips. 1739. Collect. anat. HALLERI T. II.

43) LEXDEL Misc. acad. nat. cur. dec. II. ann. 4. p. 299.

19. *Dolor* ⁴⁴⁾ non solum ut symptoma morborum systematis nervorum considerandus est, sed etiam ut causa. Qualiscunque illius fuerit origo, dum summum attingit gradum, terribiles excitare valet nervorum turbas.

20. *Tedium*, communis morborum systematis nervorum causa, in peculiari capite ⁴⁵⁾, ut morbus, ad trutinam vocabitur.

21. Quid *studia* nimia et *meditatio* in morbis nervorum excitandis valeant, praesertim ex tractatu de hypochondriasi elucebit ⁴⁶⁾.

22. Illo ipso in tractatu, nec non in eo ^{Imaginatio.} *ma-* niarum, de vitis imaginationis plus vice simplici quaestio erit. Hic sufficiat meminisse, *imaginationem*, ut causam morborum systematis nervorum, praesertim *in sensu universali interno* ⁴⁷⁾, in praeced-

44) SAUVAGES theoria doloris. Montp. 1757. PETIT discours sur la douleur. Lyon ann. 7. BITZIIUS Versuch einer Theorie der Schmerzen 1803.

45) Cap. XXII.

46) Legatur interea: PACHLIN l. c. lib. III. obs. 6. VIRIDET l. c. Vol. 2. p. 646. MEAD monita cap. 3. p. 45. DEMACHY nov. act. nat. cur. T. 8. p. 43. GARIPUY mém. de Toulouse. T. 2. p. 52. VICO mém. de Turin. ann. 10. et 11. Litt. A. B. arts. cap. 3. p. 45. et imprimis CORP essay on the changes produced in the body by operations on the mind. Lond. 1792.

47) Quin enim hypothesium opprobrium incurramus, praeter organa externa sensuum; homini adhuc *sensum internum* tribuere possumus, quem REILIIUS *das Gemeingefühl*, BICHAT sensibilitatem organicam et

44 DE MORBIS SYSTEMATIS NERVORUM

conceptis opinionibus ⁴⁸⁾, in poësi et artium liberalium exercitio alimentum invenire ⁴⁹⁾.

Somnus
et vigi-
liac.

23. *Somnus et vigiliac*, ultra quam par est protractae, aut horis ordini naturae contrariis sibi succedentes, systema nervorum ad morborum seriem disponere, nemo dubitat ⁵⁰⁾.

24. Ean-

HÜNNER coenæsthesin (Ejmsd. diss. de coenæsthesi, Hal. 1794. edita) vocant. Sensus iste in universo systemate nervorum, præcipue vero in gangliis nervorum abdominalium residere, et animam de mutationibus in ipso corpore contingentibus certiore reddere, supponitur.

48) E. c. fides in dies nefastos, spectra, interpretationes somniorum, prædictiones ex chartis lusoriis (*la cabale*), apparitionem avium mali augurii, ululatus nocturnos canum, numerum impari commensalium, utpote mortem præsagientium, et horologium mortis, sonum videlicet oscillatorium noctibus vernalibus familiarem, atque docente DE LA BILLARDIERE (*Gazette de santé. Août 1815*) ab insecto (anobium tessellatum L.) excitatum.

49) Imaginationis in corpus humanum vim præsertim dilucidarunt: AGRIPP. opp. T. I. De occultis philosoph. Lib. I. c. 64. p. 131. Edit. Lugd. DEL-RIO disquisit. magic. p. 21. NYMMA orat. de imaginatione TARD. diss. phys. annex. p. 211. FIENUS de viribus imaginat. conclus. 23. SIOWARD de vi imaginationis p. 22. WOLFF act. acad. nat. cur. Vol. 6. p. 342. LANZONI miscell. nat. cur. dec. III. ann. 3. p. 37. SCHOLZ ibid. dec. I. ann. 2. p. 221. DE MEZA act. soc. med. Havn. Vol. 2. p. 281. MURATORI *über d. Einbildungskraft d. Menschen. A. d. Ital. Lpz. 1785.*

50) Notiones præparatoriae ad capita nostra de cata-

24. Eandem vim *motus et quies* normam excedentes exercent, uti permulta probant facta ¹¹⁾. Motus et quies.

25. De imperio *craniis in cerebrum* facta plurima, ex quibus GALLIUS praepostere systema condidit ¹²⁾, nec non *Cretinismus* ¹³⁾ et observationes Systema ossium.

phora, agrypnia et somniis inveniuntur apud PLATONEM (lib. VII. De lege), LEMNIUM (in exhort. ad vitam optimam instit. c. 26), CARL. RHODIGIUM (lib. XXX. cap. 9), QUERCETANUM (Disert. Polyhist. s. II. c. 9), FRANKHAU (satyr. med. 18. p. 359), TUILIERUM (Ergo decedit quid sanitati a diuturniori somno. Paris 1673), PECHLINUM (lib. III. obs. 41.), MARCELLUM PALISQENIUM (Zodiacus vitae. Gemini vers. 624), KRÜGERUM (de somno morborum matre et filio. Helmst. 1754.), EISELIUM (de somno excedente. Erf. 1707.), ALBERTIUM (diss. de somno morborum causis. Hal. 1726.), L'ABBEUM (ergo pejor vigiliarum quam somni excessus. Paris. 1692).

51) WILLIS l. c. cap. V. p. 46. PERRY on nervous diseases. p. 197. TISSOT l. c. p. 67. STAU von dem Schaden der allzu starken freiwilligen Bewegung des Leibes (Prüfende Gesellschaft in Halle. 2. B. p. 496).

52) FROBIEF Darstellung der ganzen auf Untersuchung der Verrichtungen des Gehirns gegründeten Theorie der Phytognomik des Dr. GALL's. Weimar 1802. WALTHER's kritische Darstellung der Gallischen - anat. - physiolog. Untersuchung des Gehirns - und Schädelbaues. Zür. 1802. Ejusdem: Neue Darstellung der Gallischen Gehirn- und Schädellehre. 1804. LEUBE Entwicklung der Gallischen Theorie. Leipz. 1803. BISCHOFF's Darstellung der Gallischen Gehirn- und Schädellehre. Berlin 1805. WILLERS Gall's Darstellung des Gehirns. Wien 1803. BLÖDE Gall's Lehre. Dresd. 1806. STEFENS

tiones in capitibus de cephalalgia, hydrocephalo et
apople-

dreß Vorlesungen über Gall's Organenlehre. Halle 1805. HUBER Gall's Lehre. Basel 1808. DOUBLE exposition raisonnée sur le système cranologique du Dr. GALL (SÉDILLOT recueil périodique de la soc. de médecine de Paris, T. 27). ACKERMANN Gall'sche Hirn- Schädel- und Organenlehre widerlegt. Heidelberg 1806. Beantwortung der Ackermann'schen Beurtheilung. Halle 1806. RUDOLPHI dubia contra Jos. Gall. (Nova acta academ. Petropolitanae. T. 14. hist. p. 131). Vorbereitung zu Gall's Vorlesungen über die Cranioscopie von einem seiner Schüler. Leipz. 1805. G. S. MAKENZIE illustrations of phrenology with engravings. Edinb. 1820. G. LYON the harmony of phrenology with the scripture doctrine of conversion. London 1823. ROLPH lectures on phrenology. London 1824. CADWELL elements of phrenology. Philadelphia 1824. DE VILLE outlines of phrenology. A treatise of naval discipline, with the explanation of the important advantages, which naval and military discipline might derive from phrenology. 1825. Travels in Phrenologast by Don Jose Balscopo translated from the Italian. G. COMBE elements of phrenology. Edinburgh 1824. Ejusdem system of phrenology. Edinb. 1825. Et letter to Francis Jeffrey in answer to his criticism on phrenology. Edinb. 1826. An apology for the study of phrenology. 1826. STURZENHEIM phrenology in its connexion with the study of physiognomy. Lond. 1826. Phrenological journal. Edinb. 1826. R. W. HAMILTON an essay on Craniology. Lond. 1826. C. OTTO in ny Hygea. Kiöbenhavn. 1826. Tidsskrift for phrenologien. 1827. VIMONT in Revue médicale. 1828. Février p. 200. TH. STONE observations on the phrenological

apoplexia exponendae testantur. Magnam partem morborum *medullae spinalis* a *vertebrarum* vitiis originem trahere debito loco demonstrabitur. Nec *ossa*, prope quae *nervi* decurrunt, semper ad normam constituta sunt *).

26. *Systema vasorum lymphaticorum* tam System. vasor. lymphaticor. arcte cum illo nervorum cohaeret, ut morbi primum detinentes necessario in alterum influere debeant. Meridiana luce clarius id demonstrabimus de morbis cerebri et *medullae spinalis* in specie disserendo. Praeterea facile intelligitur, quantam injuriam tumores, indurationes, inflammationes, suppurationes, exulcerationes vasorum et inprimis glandularum lymphaticarum, nervis inferre debe-

development of Burke, Hare and other atrocious murderers; measurements of the heads of the most notorious thieves in various prisons. Edinb. 1829. G. COMBE answer to observations on phrenological development etc. Lond. 1829. TH. STONE a rejoindre to the answer of G. Combe etc. J. WATTS anti-phrenology. Lond. 1829. W. WILDSMITH an inquiry concerning the relative connexion, which subsists between the mind and the brain, with remarks on phrenology and materialism. Lond. 1829. M. J. WERNER die Lehre von den Ur- und Racenformen der Schädel und Becken des Menschen. Düsseldorf 1830.

53) Cap. XXV. §. CVI. 13.

54) HUNAULD *sur les causes de la structure singulière, qu'on rencontre quelques fois dans les différentes parties du corps humain (Mém. de l'acad. de Paris. a 1740. mém. p. 273).*

48 DE MORBIS SYSTEMATIS NERVORUM

debeant, si perpendatur: plexus lumbarum, iliacum et renalem vasorum et glandularum lymphaticarum plane cum nervis ex plexibus ejusdem nominis implicatos esse, — glandulas mesenterii plexum nervorum mesentericum superiorem attingere, — glandulas lymphaticas, quae ambas diaphragmatis superficies retis amplissimi instar obducunt, cum plexu et nervo phrenico intimum nexum experiri. Idem nexus systema lymphaticum inter et illud nervorum in viscerum contextu animadvertitur. Tandem praeter nexum mechanicum aliae adhuc causae, quae de imperio systematis lymphatici in genus nervorum rationem reddere possent, exstare videntur⁵⁵⁾.

Cor et
vasa.

27. *Cor et vasa circulo cruoris dicata magnam vim in systema nervorum habere atque idcirco proprios morbos facile huic systemati communicare*⁵⁶⁾, etiamsi ACKERMANNO, nervorum originem ex corde repetenti⁵⁷⁾, minime assentiri possumus, nemo mirabitur, qui considerabit: *cerebrum*⁵⁸⁾, carotidum et arteriarum vertebrali-
ope,

55) SOEEMMERRING op. c. *über den Saft n. s. w.*

56) LUXURIAGA tentamen medicum de reciproca atque mutua systematis sanguinei et nervosi actione. Edinb. 1786. HOMOLICKI diss. de vasorum sanguiferorum vi in morbis nervosis producendis. Vilnae 1815. De eodem argumento, cadaverum sectionum ope illustrato, lege: JAMES in *medical and physical journal* by FOTHERGILL and WANT. Lond. 1815. March.

57) De nervi systematis primordiis. Manb. 1813.

58) J. CARSON *on the circulation of the blood in the*

ope, quintam circiter partem sanguinis in corpore contenti accipere, — arterias encephali teneriores esse et molliores fragilioresque, — substantiam corticalem cerebri structuram plane vasculosam ostendere, — ventriculos laterales, plexus choroideos, ventriculum autem tertium et quartum cerebri membranam vasculosam eos obducentem offerre, — piam matrem amplum ex arteriolis et venis compositum rete exhibere, — inter ipsas durae matris laminae plurimis in locis conspicua sanguinis receptacula (sinus) locum invenire, — et venas tum jugulares internas, tum vertebrales, sanguinem ibi collectum suscipere atque (praeter emissaria Sanctorini) ita e capite educere, ut cruor toties stagnare sive refluere debeat, quoties obstaculum quaecunque depletionem aut jugularis dextrae in cavam descendentem, aut jugularis sinistrae in subclaviam, aut venarum vertebraliū in venas subclavas impediat, — pontem Varolii in proprio sulco arteriam basilarem excipere, — *medullam oblongatam* ad axin pariter sulcum, in quo vasculosa membrana decurrit et totum medullae spinalis tractum sequitur, instructam esse, — hanc ipsam medullam spinalem, instar cerebri, a membrana vasculosa, piae matris propagine, nec non ab arteria anteriore et posteriore vertebrali, et a venis vertebralibus, in sinus, qui utrinque columnae

head. In the *Edinburgh medical and surgical journal* 1824. p. 252.

Frank Prax, II. I. 1.

D

lumnæ adstant, dilatatis, circumdari, — *nervos*, in genere, excepto fere unico olfactorio, propria vasa sanguinea, in velamento eorum decurrentia, agnoscere, ac insignem vasorum conglobationem in illis cerebri locis, e quibus priora quatuor nervorum paria egrediuntur⁵⁹⁾, obviam venire, — nervum opticum præterea arteriam centralem includere; hanc autem circa humorem vitreum in reticulum, cujus areolae semifluida retinae substantia implet, expandi, — nervum oculomotorium prope arteriam cerebri profundam originem trahere, — nervum patheticum super sinum cavernosum ascendere, — ramum nasalem nervi ophthalmici, comite arteria et vena, per foramen ethmoideum cavitationem narium subire; — ramum Vidianum profundum in canali carotico serpere; — ramum maxillarem inferiorem, ex ramo tertio paris quinti ortum, non solum cum vasis sanguineis ejusdem nominis incedere, sed et cum iisdem indentium radices intrare, — ramum auricularem, ex eadem stirpe ortum, retro ad arteriam temporalem jacere; — nervum abducentem, ad superficiem externam carotidis cerebialis positum, ita in sinum cavernosum intrare, ut a sanguine hic contento irroretur; — arteriam auditivam internam, nervi acustici mollis sociam, uno ramo, per cribrosa meatus foramella, simul cum filamentis nervis in vestibulum penetrare; — altero, nervum cochleae

59) WENZEL op. c. XXV.

cochleae prosequente, in axes canaliculum gliscere, atque inde ramulos instar radiorum dispergere, qui ad utramque laminae spiralis faciem chordis nerveis intermiscentur; — portionem duram paria septimi per aquaeductum Fallopii arteriam stylomastoideam continentem, decurrere ejusque ramos faciales rete, vasa sanguifera circumdare, efformare; — nervum glossopharyngeum ope arteriae et venae a nervo vago aeparari; — hunc nervum cum vago et accessorio Williaii per idem foramen ac vena jugularis, quamvis aeparatim, exire; — tunc vero glossopharyngei ramum primum ad superficiem externam carotidis descendere; — nervum vagum ad externam superficiem venae jugularis internae locatum esse; — ramum laryngeum superiorem, ex parte cervicali nervi vagi pullulantem, retro ad carotidem, usque ad arteriam laryngeam superiorem, cum qua cellulosa ope nectitur, pervenire; — partem thoracicam vagi, sinistrorsum, super arcum aortae ascendere; — ex hac ipsa stirpe ramos cardiacos, praecipue plexum cardiacum superficialem efformantes, nec non nervum recurrentem nasci, qui nervi dextrorsum arteriam subclaviam, et sinistrorsum arcum aortae amplectuntur; — plexum pulmonalem posteriorem retro ad vasa majora et tracheam locum habere; — par nonum prope arterias vertebrales oriri, sub vena jugulari interna descendere; — omnes nervos spinales cum arteria et vena ejusdem nominis e specu vertebrali exire; —

par primum nervorum cervicalium praeterea in viciniis arteriarum vertebraliū et nervos dorsales haud procul ab arteriis intercostalibus jacere; — plexus brachiales vasa sanguinea brachii amplecti; — nervum cruralem prope arteriam ejusdem nominis crus attingere et venam saphenam concomitari; — nervum obturatorium cum arteriis et venis obturatoriiis societatem inire; — nervum ischiadicum ad poplitem, circa arteriam et venam popliteam, ad tibiam autem, circa arteriam tibialē sedem habere; — nervum phrenicum, inter arteriam et venam subclaviam pectori intromissum, ante vasa pulmonalia, dexterius in latere venae cavae superioris, comite per longitudinem arteriola, descendere, ac utrinque pericardio apponi; — nervum sympathicum magnum, utpote ex nervo Vidiano et ex nervo abducente originem trahentem, cum carotide et sinu cavernoso commercium alere; — praeterea ganglion illius cervicale superius, retro ad carotidem internam locatum esse, atque nervos molles, inferius in conspectum venientes, ad bifurcationem carotidum rete constituere et vasa sanguinea hic locata concomitari; — nervum cardiacum superficiale super arteriam thyreoideam inferiorem ascendere, prope arteriam subclaviam decurrere, et super truncum anonymum versus aortam proficiscendo, inter atria cordis cum socio alterius lateris connubium inire; — ex ganglio cervicali medio ramos cardiacos, arteriam thyreoideam, vertebralem et subcla-

subclaviam circumdantes, oriri; — ganglion cervicale inferius retro ad originem arteriae vertebrae situm esse; — plexum cardiacum sedem inter vasa majora et cor invenire, atque ramos, arterias coronarias concomitantes, largiri; — inter ganglion cervicale inferius et ganglion thoracicum nervum intercostalem laquei instar arteriam subclaviam circumdare; — nervos intercostales utriusque lateris per filamenta nervea, quibus aorta descendens et vena cava ascendens incumbit, conjungi; — nervos hujusmodi per hiatum aorticum in abdominis cavum intrare; — aortam tunc a reti conspicuo nervorum, sese ad pelvim usque extendente, concomitari; — rete hoc nervorum toties subdividi, quoties aorta novos ramos largitur; — plexum coeliacum ramos largiri, arteriam phrenicam, hepaticam, gastroepiploicam dextram, coronariam ventriculi et lienalem, comitantes; — et plexum renalem eodem pacto se habere relate ad arterias renales, plexum spermaticum internum relate ad arteriam spermaticam internam, ac plexum mesentericum inferiorem relate ad arteriam mesentericam inferiorem. Imperium autem inter cor vasaque majora et systema nervorum reciprocum esse, *nervi arterias adeuntes* ⁶⁰⁾, iisque unice dicati, docent.

28. Pa-

60) LUCAS quaedam observationes anatomicae circa nervos arterias adeuntes et comitantes, Francf. ad Moen. 1811.

Sanguis.

28. Palam ex istis fit, medicos omnis aevi ⁶¹⁾ minime errasse, cum *plethoram*, vasa sanguinea *nimis distendentem*, et vicinam pulpam nerveam *verisimiliter praeter modum comprimentem*, forte et nimis nutrientem, inter communes morborum nervorum causas recenserent. Verum et *sanguinis penuriam*, vasa non satis distendentem, ac forte vicinae pulpa nerveae debitum gradum compressionis et nutrimenti recusantem, systemati nervorum non parcere, effectus haemorrhagiarum, et venae sectionum docent. Quoad *indolem sanguinis*, cum TISSOTO ⁶²⁾ quidem credimus, *qualitatem* abnormem posse systemati nervorum insensam fieri, at deficientibus hac in re adhuc factis, nil certi statuere audemus.

Monitum.

29. Priusquam ad examen imperii, quod viscera variis morbis detenta in systema nervorum, aut varias illius partes exercent, accedimus; opus est, ut de *consensu nervorum*, ab egregiis commentationibus illustrato ⁶³⁾, recta habeatur notio.

Obji-

61) HIPPOCRATES aph. 39. lib. VI. SWIETEN comment. T. IV. p. 489. TISSOT l. c. p. 125.

62) l. c. p. 168.

63) FERNELIUS pathologia. cap. De morbo per consensum. TRINCATELLA l. c. BALLONIUS ergo partium principum sympathosia. Par. 1611. BAUSNERUS de consensu partium corporis humani. Lib. III. Amstel. 1676. PRIO l. c. p. 150. ETTMÜLLER diss. corpus humanum sympathicum. Lips. 1701. FR. HOFFMANN diss. de consensu partium, praecipuo pathologiae et

**Obijcitur quidem doctrinae consensus: corporis
humani**

praxeos medicae fundamento. Hal. 1717. REGA de
sympathia seu consensu partium corporis humani,
1721. STRYDONK de consensu partium in morbis ven-
triculi, Traj. 1736. CARTHEUSII diss. de necessaria
consensus partium attentione practica. Francf. 1741.
LARMANS diss. de consensu partium corporis humani,
Goett. 1749 (HALLER coll. diss. pract. Vol. 6. No.
220). RAMM mirum inter caput et viscera abdomina-
lia commercium. Goett. 1771. TISSOT op. cit. T. XII,
p. 1. VÄRGENS diss. de sympathia inter ventriculum
et caput, praecipue in statu praeternaturali. Lugd. 1781.
SCHLEGEL sylloge opusculorum de mirabili sympathia
partium corporis humani. Lips. 1787. MACKEL diss.
de consensu partium corporis humani. 1794. SCHMIDT
diss. de consensu partium corporis humani inter se.
Hal. 1795. CRAWFORD *practical remarks on the sym-
pathy of the parts of the body (Med. essays and ob-
servations by a soc. in Edinburgh. Vol. 3. p. 480)*.
VETZ diss. de organorum corporis humani tam ener-
gia interna, quam cum organis sociis connexione.
Hal. 1797. REIL *Archiv für Physiologie*. 1. B. 1. St.
p. 109. *Fieberlehre* 4. B. p. 24. CARRÉ *mém. de la
soc. méd. d'Emulation* an. 6. p. 386. BICHAT *mém.
sur les rapports qui existent entre les organes à forme
symétrique et ceux à forme irrégulière* (ibid. an. 6.
p. 477). ROUSSEL *notes sur les sympathies* (ibid. an. 6.
p. 508). MALACARNE ibid. an. 5. p. 358. PORTAL op.
c. (Vid. edit. 2. P. 1. Vol. I. sect. I. §. XI. 9(41)). VOIGT
diss. de consensu uterum inter atq. mammae. Lips. 1816.
L. HINZEL diss. sistens nexus nervi sympathici cum
nervis cerebralibus. Heidelb. 1824. Ejsandem *Unter-
suchungen über die Verbindungen des sympathischen
Nerven mit den Gehirnnerven. In Zeitschrift für Phy-*

56 DE MORBIS SYSTEMATIS NERVORUM

humani partes et praeter nervos inter se cohaerere, ac nervos constanter adesse, cum tamen phaenomena consensus haud semper obveniant; ast objectiones hujusmodi disparent, si *consensus ex nexu mechanico* (ob continuationem partium) et *ex adsociatione* (ob similitudinem structurae et consuetudinem simultaneae actionis ⁶⁴) a *consensu nervorum*, atque is *sanus a morbo* distinguatur.

Pulmones. 30. *Morbi pulmonum*, paris octavi, plexum pulmonalem anteriorem et posteriorem formantis, ope, nec non ob obstacula, quae cruori e capite redeunti opponere possunt, plurimis morbis cerebri et nervorum ansem porrigunt.

Trachea. 31. Idem de morbis *tracheae* valet, quae para vicissim imperio non solum cerebri, sed et viscerum abdominalium, ac praecipue uteri aut testiculorum, subjicitur, quod facile ex magnis nervis, quos trachea e pare vago accipit, quod par nervorum ad plexus abdominales efformandos concurrat, explicatur.

Cavitates nasales. 32. *Cavitatum nasalium* amplitudo, — modus, quo lamina cribrosa nares a cerebro separat, — origo, decursus atque finis nervorum olfactoriorum, — curriculum rami ethmoidalis a ramo primo paris quinti, — illudque nervorum a ramo secundo quinti paria ortum ducentium, ex nervis ptery-

siologie. Herausgeb. von TIEDEMANN, TREVIRANUS etc. B. 1. Heft 2. 1825. p. 198 — 236.

⁶⁴) DARWIN op. c. Vol. 2. p. 423.

pterygopalatino, dentali posteriori et infraorbitali, praeter nervum nasopalatinum, emergentium, — ac tandem nexus horum nervorum cum sensibus reliquis, praecipue cum gustu, nec non cum nervo sympathico magno, facile de vi organi odoratus in cerebrum et in reliquum systema nervorum rationem reddunt.

33. Nexus reciprocus *oculorum* cum *systemate Oculi*, nervorum, ut fons plurimorum malorum, intelligitur, si ratio habeatur: propinquitatis oculorum et cerebri; commercii hujus visceris cum oculis per nervos opticos et retinam, per nervos oculi motores ex pare tertio et per ramos quinti paris, qui scilicet ad formationem ganglii ophthalmici, nervorum ciliarium, in iridem abeuntium, originis, concurrunt; — et rami primi paris quinti cum ramo ejusdem secundo, Vidiano profundo dicto, qui cum ramo paris sexti nervum sympathicum magnum efformat, qui nervus cum singulis fere visceribus cohaeret. Nervorum tandem imperio evidenter subjicitur *glandula lacrymalis*, nervulos a primo ramo paris quinti, cum subcutaneo malae jugatos, accipiens.

34. Via pro *aurium* morborum ad *systema Aures*. nervorum propagatione adaptata est per nervum acusticum, seu portionem mollem paris septimi, vestibulum et cochleam providentem, atque per nervum sympathicum parvum, seu portionem durum paris septimi, chordam tympani suppeditantem,

58 DE MORBIS SYSTEMATIS NERVORUM

tem, ac per ramum superficialem nervi Vidiani ad sympathicum magnum accedentem.

Lingua. 35. Res plurimae, *linguam* afficientes, effectum portentosum in systematis nervorum. varias partes exercere, nemo mirabitur, qui perpendit, hoc organon tot nervos diversae originis et decursus habere, quot illi largiuntur nervus glossopharyngeus et hypoglossus ex medulla oblongata orti, nec non ramus lingualis a ramo tertio paris quinti.

Organa salivalia. 36. *Glandulae parotides, submaxillares et sublinguales*; a nervo communicante faciei, a filamentis nonnullis nervorum colli, a ganglio submaxillari et a ramo linguali, ex ramo tertio paris quinti, gubernatae, ob id quod liquidum secernunt, cujus continua excretio ⁶⁵⁾, jactura ⁶⁶⁾ et specifica indoles ⁶⁷⁾ varia et gravia systematis nervorum mala gignere solet, nobis hic memorabiles sunt.

Dentes. 37. *Dentium* difficilis eruptio ac morbi turbas plurimas systematis nervorum excitant, de quibus alias rationem minime reddes, nisi scias, dentes per ramum secundum paris quinti (ramum scilicet dentalem posteriorem et infraorbitalem supeditantem), utpote sympathici magni radicem, universum corpus proprio imperio subficere posse.

Oesophagus. 38. *Oesophagus*, quamvis unico alimentorum transi-

⁶⁵⁾ BURTON *on non-naturals* p. 296.

⁶⁶⁾ TUNNEN *traité des maladies vénériennes*. T. I. p. 187.
TISSOT l. c. p. 71.

⁶⁷⁾ Cfr. Cap. de ira, et de hydrophobia.

transitui dicatus, tamen ob plexus nervorum e pari vago, a quibus circumdatur, in aetiologia morborum systematis nervorum memorabilis est.

39. Nullius autem visceris affectiones morbosae, tum in systema nervorum universum, tum in varias ejus partes, tumque in aliorum viscerum nervos, majori cum vi inflatunt, quam illae *ventriculi*; quatenus hoc organon nervos a pari vago et a ganglio semilunari (hinc et a nervo intercostali) accipit. Quoniam enim nervus intercostalis ex ramo secundo quinti paris, Vidiano profundo dicto, nec non ex pare sexto originem trahit, — et quoniam nervus vagus cum nervo glossopharyngeo par octavum constituit; sequitur, ventriculū necessario consensum agnoscere: cum *cerebro*, utpote communi nervorum illorum origine; — cum *medulla spinali*, propterea quod nervi inde orti intercostali ramos largiuntur; — cum *facie*, eo quod nervus frontalis, ex ramo primo quinti paris, nervus subcutaneus malae et nervus infraorbitalis, ex ramo secundo quinti paris, oriuntur, et communicans faciei, ope rami superficialis nervi Vidiani, cum intercostali affinitatem alit; — cum *oculis eorumque musculis*, quoniam hae partes nervos ex ramo primo quinti paris, atque ex pare sexto, quod, stabilita nervi intercostalis radice, musculum abducentem oculi adit, obtinent; — cum *auribus*, quia ramus superficialis nervi Vidiani, non solum cum communicante faciei, sed et cum portione molli paris septimi conjungitur; — cum

Ventri-
culus.

cum *cavitate narium*, quoniam haec antra ramum secundum quinti paris, ex ganglio sphenopalatino, prope nervum Vidianum ortum, accipiunt; — cum *palato*, ob id, quod illi nervus nasopalatinus, ex ramo secundo quinti paris impertitur; — cum *lingua*, utpote quae nervum ex ramo tertio paris quinti ac nervum glossopharyngeum accipiendo, non solum cum intercostali, sed et cum pari vago affinitatem habeat, cui affinitati nervus hypoglossus (ambobus vix memoratis nervis alligatus) sigillum imponit; — cum *pharynge et oesophago*, propterea quod organa haec ramum pharyngeum, musculo constrictori medio et inferiori addictum, a vago obtinent; — cum *larynge*, ea causa, quod nervus ad musculos laryngis spectans (n. laryngeus) et nervus recurrens ex nervo vago oriuntur, atque recurrens praeterea cum intercostali cohaeret; — cum *pulmonibus*, quum nervus vagus plexum pulmonalem anteriorem et posteriorem suppeditet; — cum *corde*, quoniam nervus vagus ramos cardiacos, plexum cardiacum superficiale magna ex parte constituentes, efformat; — cum *collo*, ob progeniem communicantis faciei (ramus subcutaneus colli) et ob nervos cervicales, quorum singuli nervo intercostali ramos concedunt; — cum *reliquis visceribus abdominalibus et pelvis*, per plexum coeliacum, mesentericum superiorem, renalem, spermaticum internum, mesentericum inferiorem et hypogastricum; — cum *superficie trunci*, per nervos dorsales, qui pariter nervo interco-

tercostali nupti sunt; — cum *lumbis et extremitatibus inferioribus*; per nervos lumbales, crurales et cutaneos femoris posteriores, quoque intercostali junctos; — et tandem cum *extremitatibus superioribus*, propterea quod septem nervi, qui eas adeunt, ex plexu brachiali proficiuntur, hic vero, utpote ex quatuor inferioribus nervia cervicalibus et ex primis nervis dorsalibus compositis, necessario cum intercostali cohaeret.

40. *Functiones ventriculi laesas* hinc undique systemati nervorum infensas fieri posse, mirum non est; ac de effectibus alimentorum, famis, sitis, depravationis succorum gastricorum etc. disserendo, ultro demonstrabitur.

Functiones ventriculi.

41. Perductia rebus in ventriculo elaboratis *Intestina*, ad *tubum intestinale*, ut processus assimilationis, nutritionis faeciumque expulsiōis locum obtineant, quo primum hic obstaculum uno alterove in intestino obvenit, mox varii inde laeduntur nervi; in *duodeno* scilicet, plexus pancreaticus, duodenalis a cerebro abdominali proveniens; — in *jejunō* et *ileo*, plexus mesentericus superior, plexui coeliaco supra, infra plexui renali et mesenterico inferiori alligatus; — in *coeco* et *colo*, plexus mesentericus superior et inferior; — ac in *recto*, plexus hypogastricus, ne de nervis sacralibus, sphincteribus et musculis levatoribus prospicientibus, agamus.

42. *Faeces copiosae, induratae, corruptae*, praecipue in intestino coeco, in colon descendente *Faeces, flatus et vermes,*
ad

62 DE MORBIS SYSTEMATIS NERVORUM

ad flexum iliacum, et in recto, diu remoram facientes, potissimum in robustis et hæmorrhoidariis, et quammaxime in feminis, ubi uterus et ovaria, tum mechanice, tum ob plexum hypogastricum, mox in consensum trahuntur, permultas passiones nervosas gignunt. Interea faeces haud inutile inter debitos limites sistere videntur pondus, saltem iis in debilioribus parumper solito crebrius evacuatis, debilitas, peculiariter systemati nervorum infensa, suboritur. Post choleram, dysenteriam et purgantium abusum, defectus quoque mucii, alias internam tubi alimentaris superficiem obducantis, nervis infensus est. *Flatus* incarcerati faecum instar nervos irritant. Qui vero passim per intestina (et forte per universam telam celluloseam) vagantur, hi non solum tubi alimentaris, sed et aliorum viscerum nervos afficiunt, unde stupenda symptomatum volubilitas atque diversitas. Nil autem effectibus *vermium intestinalium*, maxime nervis abdominalibus infensorum, acquirari potest.

Hepar.

43. *Jecur*, ob plexum hepaticum, e plexu coeliaco ortum ducentem, cum nervis totius corporis, et peculiari modo cum cerebro consentiens, fontem uberrimum aegritudinum systematis nervorum includit.

Bilis.

44. Inter has aegritudines, quae *bili*, copia aut qualitate peccanti, saepe actionem suam ad duodenum, ventriculum aut jejunum extendenti, originem debent, eminentem occupant locum.

45. *Cy-*

45. *Cystis fellea*, cum ductibus suis, praesertim a calculis repleta et obstructa, ita in nervos propinquos, ex plexu hepatico venientes, agit, actionemque suam tam vehementer super universum systema nervorum, sensorio communi non excepto, extendit, ut peculiari prorsus digna sit mentione.

Vesicula
fellea.

46. *Pancreas*, nervis a plexu gastrico et lienali munitum, imperium in universum systema nervorum exercere, ex morbis nonnullis, quibus illa glandula subjicitur, elucet ⁶⁸⁾.

Pancreas.

47. *Splen*, quamvis nervos neque amplos, neque multos a plexu coeliaco accipiat (plexum scilicet lienalem), attamen, dum morbis corripitur, haud raro systema nervorum gubernat.

Lien.

48. Idem de *renibus*, imprimis calculo detentis, dicendum, quod mirum non est, si perpendamus, plexum nervorum renalem cum plexu tum coeliaco, tum mesenterico superiori, tum spermatico interno commercium alere, plexum autem coeliacum diaphragmati, hepati, ventriculo, lieni et omento, — plexum mesentericum superiorem pancreati, mesenterio, mesocolo, intestinis tenuibus et colo dextro ac transverso, — atque plexum spermaticum internum testibus aut ovariis et utero nervos impertire. *Renes succenturiati*, in pathologia non praetervidendi, ramos a plexu coeliaco et renali accipiunt.

Renes.

49. Com-

68) SOEMMERING *Anmerk.* 2. in BAILLIE p. 160.

64 DE MORBIS SYSTEMATIS NERVORUM

Urina.

49. Communi consensu stabilitum est, evacuationem *urinae* copiosam nimis systema nervorum debilitare⁶⁹⁾, illius suppressionem nervis pulmonis⁷⁰⁾ et cerebro infensam esse, ac per lotium tandem res, prius nervis infensa, instar criseos, evacuari.

Vesica urinaria.

50. *Vesica urinaria*, conspicuos nervos a plexu hypogastrico et a nervis sacralibus obtinens, focum aliquando sistit, ex quo systema nervorum, inprimis abdominale, perturbatur.

Uterus et ovaria.

51. Tyrannidem *uterus et ovaria* in singulas systematis nervorum partes exercent. Accusandi sunt nervi sympathici, sacrales, et plexus mesentericus inferior, qui scilicet nervi ad plexum hypogastricum efformandum concurrunt, ex quo plexus componitur plexus uterinus, ne de ramis e plexu spermatico inferiori, utero et inprimis ovariis providentibus, quaestio fiat.

Menstruatio.

52. Jam HIPPOCRATES docuit⁷¹⁾, encephalum et columnam vertebralem *catameniorum* effectum percipere, notando: capitis concussioniones et aurium sonitus praecedere menstruorum eruptionem, illaque prodire, si juxta spinam ardor consequatur. Ac, si ita in statu normali, quid a menstruatione retar-

69) MORGAONI op. c. Epist. IX. §. 7 et 11. TISSOT l. c. p. 75.

70) TISSOT l. c. p. 74.

71) COAC. PRACNOT. No. 541. 518. CHARTER, T. VIII. p. 85.

retardata, deficiente, excedente, irregulariter contingente, aut cessante, expectandum erit?

53. *Feminae saepe coitum foecundum*, ob ca- Concep-
tio.
tervum symptomatum nervorum, fere de vi nar-
coticâ spermatis virilis testantium, ab omni alio
distinguunt. Sunt inter eas, quae solum, dum
sive marem, sive puellam in utero gerunt, malis
illis subjiciuntur.

54. *Graviditas*, praeter incommoda ex uteri Gravidi-
tas.
in universum systema nervorum imperio ortum du-
centia, alia agnoscit, impedito cruoris circulo ac
compressioni nervorum ab utero in vicinia gravi-
tante, nec non timori partus, voracitatisque gravi-
darum tribuenda.

55. Dolores et nixus sub partu, summa defa- Partus.
tigatio inde emergens, mora diuturna infantis in
ima pelvi, jactura sanguinis, timor, et gaudium
ex prolis adspectu, systemati nervorum admodum
infensa sunt.

56. Valet idem de repentina *evacuatione uteri* Puerpe-
rium.
gravidæ, de reliquiis placentae aut cruoris congru-
mati, de lochiorum abnormi conditione, de su-
dore, quo puerperae saepe diffuunt, de reconditis
miliaribus, de adstantium numero, de odoribus,
sonis, refrigeratione et animi pathematibus, puer-
peris maxime infensa.

57. *Mammae*, nervos conspicuos ab interco- Mammae
et nutri-
tio pro-
lis.
stali accipientes, et cum utero vel ob similitudi-
nem functionis consentientes, in aetiologia morbo-
rum systematis nervorum locum sibi vindicant

66 DE MORBIS SYSTEMATIS NERVORUM

eminentem. *Lactis* jactura, et longe magis adhuc, illius intempestiva fuga, id ob rationes necdum satis intellectas confirmant.

Testes.

58. Et *testes* in morbis nervorum producendis vim habent, quodtribuendum est nexui nervorum, quò simul cum funiculis spermaticis instruuntur, qui scilicet nervi, ex plexu renali ortum ducentes, cum nervis reliqui corporis per plexum mesentericum superiorem, quatenus continuationem plexus coeliaci, consentiunt.

Sperma.

59. In sexu utroque *liquoris spermatici* evacuatio praematura aut repetita nimis, potissimum per onaniam aut tribadum negotia, vel illius quoque retentio, praecipue inter feminas coelibes, aut excitatus, sed ob conjugis impotentiam non placatus aestus venereus, interdum et normalis coitus, systema nervorum labefactant.

Cutis.

60. *Cutis* nervos accipit, in *facie*, a pari quinto ramum frontalem, subcutaneum malae, infraorbitalem et auricularem atque a pari septimo portione dura ramum superficialem, — ad *occiput* a nervis cervicalibus nervum occipitalem, — ad *collum* a portione dura paris septimi ramum subcutaneum colli, et a nervis cervicalibus nervum superficialem colli, — ad *dorsum* a nervis dorsalibus ramos posteriores, — ad *lumbos* a nervis lumbalibus et a sacralibus ramos posteriores, — ad *partes genitales* a sacralibus nervum pudendorum communem, — ad *extremitates superiores* ex plexu brachiali nervos cutaneos externos, medios et

et internos, — ad *extremitates inferiores*, a nervo crurali, obturatorio et ischiadico, nervum gluteum superiorem, cutaneum femoris posteriorem, inferiorem, a nervo popliteo nervum cutaneum posteriorem cruris, a nervo tibiali et a nervo peroneo ramum superficialem, qui singuli cutis nervi intimum nexum cum cerebro, sensibus, medulla spinali, nervisque intercostali et vago habent, unde non arduum est intelligere, quo pacto tot *res externae*, utpote immediate in cutem agentes, ad communissimas causas morborum systematis nervorum spectant.

61. Si nempe vel solam actionem chemicam et mechanicam *atmosphaerae* perpendis; jam satis tibi potestas illius sub variis rerum positionibus, morbos systematis nervorum excitandi ⁷²⁾ palam fiet. Peculiares observationes *ventorum actio* suppeditat.

62. Accedit *atmosphaerae temperatura*. Quid enim in morbis systematis nervorum excitandis calor et frigus valeant, nec remota antiquitas ignorabat ⁷³⁾, nec quotidiana experientia comprobare cessat. Quammaxime temperaturae effectus *opus*

E 2

trans-

72) Legatur de hoc argumento BERRYAT *mémoires présentés* etc. T. II. p. 456. TISSOT op. c. Vol. 3. p. 28. ZIMMERMANN *von der Erfahrung*. 2. Th. p. 148. REVE *Fleberlehter* l. c. p. 70.

73) HIPPOCRATES lib. V. aph. 17. 18. 19. 20. GALENUS de morborum differentiis, c. 5. CELSUS lib. 1. c. 2. EBN SINA lib. III. fen. 1. tr. 1. c. 6. p. 433.

68 DE MORBIS SYSTEMATIS NERVORUM

transpirationis attingunt, quo opere laeso quantum systema nervorum patiatum jam dudum intellexerunt SANCTORIUS ⁷⁴), WILLISIUS ⁷⁵), BONNETUS ⁷⁶), TISSOTUS ⁷⁷) aliique.

Humiditas.

63. Nec aqua in atmosphaera soluta, aut sub forma nebularum, nivis, grandinis, pluviarum apparens, in origine morborum systematis nervorum explicanda, praetervidenda est.

Electricitas.

64. Humiditatis in corpus humanum effectus praesertim nexui illius cum calore et *electricitate atmosphaerica* tribuendi videntur; quae electricitas inter omnes res externas evidentissime systema nervorum imperio suo subjicit. Neque id mirum, cum ipsum principium nervosum plures proprietates electricas exhibeat ⁷⁸).

65. Ma-

74) Med. static. 75) l. c. cap. V. p. 6.

76) Sepulchret. T. I. p. 333. 77) l. c. p. 79.

78) Legatur de phaenomenis electricis in Raja torpedine et in gymnoto electrico WALSH (*Philosoph. transact.* T. 63. p. 461. T. 64. p. 465). VOLTA et CONFOLIACCHI (*Annali di chimica.* Vol. 22. p. 223) et HUMBOLDT (*GILBERT's Annalen* 22. B. p. 1), — de effectibus electricitatis galvanicae in sensus, RITTER (*GILBERT l. c.* 7. B. p. 450) et LICHTENBERG (*GREEN's Journal* 6. B. p. 414) et in varias corporis humani functiones REINHOLD (*REIL's Archiv* 8. B. p. 305), BUNTZEN (*Beiträge zu einer künftigen Physiologie.* Kopenh. 1805), PROCHASKA (*Versuch einer empirischen Darstellung des polarischen Naturgesetzes und dessen Anwendung auf die Thätigkeiten der organischen und anorganischen Körper.* Wien 1815), C. F. BEL-

65. *Magnetis* in systema nervorum actio minime desideratur ⁷⁹). Cum ea autem effectus sic dicti *magnetismi animalis*, utpote magis cum *electricitate galvanica* convenientes, quidquid alii dicant ⁸⁰), nequaquam confundi debent.

66. Accessus diurni aut nocturni plurimum Lux, rum morborum systematis nervorum ⁸¹) aliaque phaenomena ad physiologiam potius spectantia ⁸²), de *lucis* in pulpam nerveam vi nullum relinquunt dubium. Imperant praeterea *lux* et *obscuritas* *imaginationi* seu *phantasiae*.

67. *Sonus*, forte potius per electricitatem, *Sonus*. quam per aëris oscillationes propagatus ⁸³), vires receptivas systematis nervorum dum excedit, plurima illius mala excitat.

68. Et quibus atmosphaera pro vehiculo inser- Odores.
vit,

LINCOLN (*sull' elettricità del sangue nelle malattie*), J. J. ROTH (diss. de electricitate in organismum humanum effectus. Monac. 1829).

79) REIL l. c. p. 77. ad experimenta ANDRY et THOUVEY provocans (in *Mém. de la soc. roy. de médecine*. 1799. p. 53).

80) NASSI über die Verhältnisse des thierischen Magnetismus zur Electricität (REIL's Archiv v. B. 2. Heft).

81) TESTA Bemerkungen über die periodischen Veränderungen u. s. w. p. 7, 312.

82) SCHÜTZ in *Denkschriften der Gesellschaft der Aerzte u. s. w.* 1. B. p. 243.

83) Sic et ANDREAS SMIADECKI ex experimentis infra tradendis (appendix ad cap. XIII. diarium diei 17. Maii) concludit.

vit, *res odoriferae* eminentem sibi in aetiology morborum systematis nervorum vindicant locum⁸⁴). Inprimis exhalationes hominum et animalium perpendi merentur.

Exhalationes viventium.

69. Dubium enim non est, *ex hominibus et animalibus viventibus*, praesertim *serpentibus*⁸⁵), quid, systemati nervorum aliorum, si multum excitabile, facile infensum, exhalari, quod, praeter antipathias, morbi sic dicti comitiales, multaque phaenomena magnetismi animalis, forteque nonnullae infantum aegritudines⁸⁶) demonstrant. Exhalationes, de quibus agitur, et effectus electricos producere videntur⁸⁷).

Globus terrester.

70. Quodsi systema nervorum praeter modum excitabile a rebus sensus nostros fugientibus tam eviden-

84) TRILLER opusc. T. I. p. 202. TISSOT op. c. T. 3. p. 380. FODÉRE' apud REIL *Fleberlehre*. l. c. p. 75. et CAPELLINI in *Gesundheitstaschenbuch von einer Gesellschaft Wiener Aerzte*, 1800. HARLER opp. minora. Lips. 1815. Vol. I.

85) ALEX. GARDEN *über die bezaubernde Gewalt der Schlangen*. Ex *London medical repository*. Jan. 1819. in HUFELAND's *Journ. der pr. Heilk.* Julius 1819. p. 114 (Ex odore *Crotali*, cardialgia, vomitus, lipothymia).

86) Plurima facta propria experientia suppeditat, infantum tenellorum, qui toties aegrotabant, quoties a quibusdam hominibus extraneis visitabantur. Alii nutricia quamvis bonae commissi, non prosperabant, ea mutata vero illiço vegeti fieri incipiebant.

87) Cfr. appendix ad cap. XIII. Diar. diei 18. Maii.

evidenter afficiatur, nonne saltem verisimile erit, et *globum terrestrem* ingentes massas corporum omnis generis includentem, vim in illud exercere? Quamvis enim experimentis rhabdomanticis cum virga mirabili⁸⁸⁾ vix aut ne vix quidem subscribere audeamus, attamen legum attractionis universalis et electricitatis galvanicae memores vim metallorum, carbonum fossilium et aquarum subterranearum quosdam in homines eo minus negabimus, cum accessus et recessus maris montesque ignivomi, cumque positio et structura urbium, pagorum, domuum, cubiculorumque in morbos nonnullos nervosos evidenter influat.

71. Effectus *aequinoctii, solstitii*⁸⁹⁾, *phasiumque lunae*⁹⁰⁾, forte et *siderum*, nec non *cometarum* in morbos, qui saepe miro modo certis alligantur

88) J. W. RITTER *Beyträge zur nähern Kennnits des Galvanismus. Tübing. 1805.* AMORETTI's *Untersuchungen über die Rhabdomantie. Berlin 1809.*

89) WEDEL *Pr. de morbis solstitialibus. Jen. 1690.*
MEAD *op. c.* RICHTER *diss. Insolatio, seu potestas solis in corpus humanum. Goett. 1747.*

90) Celsus ait: „Cui caput infirmum est, is si bene concoxerit, leniter perfricare id manibus suis debet, nunquam id, si fieri potest, veste velare, aut ad cutim tondere: *utileque lunam vitare, maximeque ante ipsam lunae solisque concursum.* Cfr. HANSEN *de influxu lunae in corpus humanum. Haec 1724.* MEAD *op. c.* TESTA *op. c.* *Observations on the influence of the Moon on climate and the animal oeconomy. Philadelphia 1800.*

72 DE MORBIS SYSTEMATIS NERVORUM

gantur annis ⁹¹⁾, mensibus ⁹²⁾, diebus aut horis, *firmitati* imperium in systema nervorum patefaciunt.

Defectus
et abusus
religio-
nis.

72. De coelo disserendo, quid proximius *religione*? Pertinet illius defectus ad causas morborum systematis nervorum, quatenus homo, religionis fulcro destitutus, ludibrium adversitatum et animi pathematum evadit, quorum potestatem in morbis nervorum gignendis jam recensuimus. Interea sicuti in rebus omnibus extrema se tangere solent, ita et hic, unde *religionis abusus*, seu *phanatismum* quoque ad aetiologiam morborum nervosorum recipimus.

Leges,
mores,

73. Populi inculti et barbari, vix aliis morbis nervorum, quam iis, qui ex abusu alcoholis et violentiis externis nascuntur, subjici solent. Evolvuntur nempe reliqui morbi systematis nervorum, ea ipsa ratione quâ societas humana majorem culturae gradum attingit. Explicatur id, tum ex conflictu inter leges ad ordinem socialem sustinendum necessarias, et hominum naturales appetitus illis submitteudos; — tum ex effectu turbamatorum politicorum ⁹³⁾, quibus nationes regi-

men

91) Plurimos morbos systematis nervorum absoluto exacte anni curriculo redire vidimus.

92) SANCTORIUS (op. c. sect. I. aph. 65) corpora virorum sava, singulis mensibus ponderosiora fieri, unius nempe duarumve librarum pondere, et redire ad consuetum pondus circa finem mensis.

93) PETIT *sur la médecine du cœur*. Lyon 1806. PINEL

men patriarchale derelinquentes praeda sunt, — tum ex multifariis opificiis et muneribus sanitati adversis, hominibus excultis necessariis redditis, — tum ex mercatura tot angustias procreante, — tum ex scientiis et artibus protracta studia et exaltationem imaginationis postulantia; — tumque ex morum depravatione culturae nationalis male intellectae consueta sequela. Accedunt luxus, lusus chartarum, alea sortium, spectacula theatra- lia, lectio fabularum milesiarum et similia.

74. *Et esculenta et potulenta*, quo magis Alimenta. artis vestigia offerunt, eo magis systema nervo- rum pessumdant⁹⁴). Sic uno ore medici de potu vini et alcohol⁹⁵), cofeae arabicae⁹⁶) et theae viridis⁹⁷) fatentur. Verum etiam cibi simplices carnei aut farinacei, quorum illi sensibilitatem

nervo-

in HUFELAND's *Annalen d. auswärt. med. Litter.* 1. B. 228. ALIBERT *de l'influence des causes politiques sur les maladies*, *Magazin encyclopédique*. ann. IV. T. 5. p. 298. JOSEPH FRANK *sur l'influence de la révolution française sur des objets relatifs à la médecine pratique*. Viena 1814.

94) PISO op. c. p. 163.

95) PISO l. c. p. 164. ROBERT *traité des principaux objets de médecine* 1766. T. 2. p. 65. SWIETEN aphor. 629.

96) POMME l. c. T. I. p. 157. VIRIDET *traité du bon chile*. T. I. p. 48.

97) ANDREE *cases of the epilepsy, hysteric fits*. p. 248. E. PERCEVALL *some brief notices of the deleterious and medicinal effects on green tea*. In *The Dublin hospital reports and communications*, T. 5. 1827.

74 DE MORBIS SYSTEMATIS NERVORUM

nervorum extollere ⁹⁸⁾, hi obtundere ⁹⁹⁾ dicuntur, aut depravati, aut ob idiosyncrasiam adversi ¹⁰⁰⁾ aut in vasis incongruis parati, nervorum systemati saepe detrimentum afferunt.

Venena et
contagia.

75. Pertinent enim *venena*, quocunque demum modo corpori humano applicata, ad efficacissimas morborum nervosorum causas. Nam si ea excipiamus, quae mechanice aut chemice partium structuram destruunt, reliqua, quot quot sunt, praecipue systemati nervorum infensa cernuntur. Sic docent effectus arsenici, muriatis superoxygenati hydrargyri, antimonii, cupri, plumbi, conii maculati et cicutae virosae, atropae belladonnae, nicotianae tabaci, ranunculi acclerati, hellebori nigri, albi, hyoscyami nigri, albi, daturae stramonii, coriariae myrtifoliae, aeuantes crocatae, glandis faginae, opii morphinae, pruni laurocerasi, amygdali communis amari, acidi Borussici, veneni Upas antiar, fructus Taguin, lolii temulenti, secalis cornuti, agarici muscarii, boleti elegantis, phalli impudici, piscium venenosorum, morsus serpentum inprimis ex genere crocilli et colubris, puncturae araneorum, phalangii apuliani, fumi carbonum etc. Vis *contagiorum* in systema nervorum ex doctrina februm exanthematum et impetiginum palam fit.

76. Morbi

98) REIL *Fleberlehre*. l. c. p. 72.

99) BOMARE *dictionnaire d'histoire naturelle*. arvic. *Jarine*.

100) TISSOT l. c. p. 39. 41. VIRIDET l. c. p. 142. *Journ. de médecine*. T. 23. p. 145.

76. Morbi nervorum nonnunquam ex *aliis* ^{Morbi alii.} *morbis*, potissimum per metastasin oriuntur. Solent ita systemati nervorum infensae esse febres intermittentes, continuae, exanthemata, impetigines, diarrhoeae praepostere cohibitae, ulcera antiqua, praecipue scrophulosa, scorbutica, artificialia, phthisis pulmonalis, fluor albus, lues venerea etc.

77. Ipsa denique *pharmaca* haud paucis ^{Pharmaca.} *anam* porrigunt malis nervorum. Praeter remedia enim, quae ex classe venenorum desumuntur, huc recensere licet emetica, drastica, clysteres, nitratem potassae, vesicatoria, corticem cinchonae, spongiam, salia volatilia, oculos cancerorum et arcana varia.

78. Postremo res, quae *modo prorsus mecha-* ^{Irritantia mechanica.} *nico* cerebrum, medullam spinalem et nervos laedunt, comprimunt, distendunt vel alio pacto irritant, creberrime morbos systematis nervorum excitant. Ne enim iterum de violentiis sub partu, de dentitione, de concretionibus bilis et urinae, de flatibus et faecibus, de insectis, quaestionem instituamus; sufficiat vermium nulli visceri parcentium, rerum corpori intrusarum, herniarum, anevrysmatum, ossificationum arteriarum, varicum, sanguinis extravasati, collectionis morbosae seri, puris, exostosium, tophorum, cariei, obstructionum viscerum glandularumque, vulnerum, contusionum, praecipue regionia epigastricae concussionum, luxationum et fracturarum meminisse. Nec *acupunctura* silentio praetereunda.

§. IV.

*D i a g n o s i s.*Genera-
tim.

1. *Diagnoseos* est, *praesentiam* morbi systematis nervorum statuere, eum ad stabilicendas *formas* revocare, illi *nomen* impertire, illius *sedem* determinare, atque *indolem* eruere.

Praesentia
morbi.

2. *Praesentia* morbi systematis nervorum ex symptomatibus affectionem cerebri, medullae spinalis aut nervorum indicantibus, statuitur. Cavendum hoc in opere, ne symptomata nervosa *accidentalia* cum essentialibus confundantur. Praesente enim altero eoque *evidente* morbo, fortuito nervosis symptomatibus stipato, ille morbus, non autem haec symptomata, aegritudinem constituunt.

Forma
morbi.

3. Morbi systematis nervorum sese exhibent, sub *forma* vel *dolorum*, vel *inflammationum*, vel *haemorrhagiarum*, vel *abnormitatum somni et vigiliarum*, vel *anaesthesiarum*, vel *vesaniarum*, vel *paralysium*, vel *spasmodum*.

Qui morbi
ad dolo-
res spe-
ctant.

4. Ad *dolores* spectant variae species *cephalalgiae*, *rhachialgiae* et *neuralgiae*.

Qui mor-
bi ad in-
flamma-
tiones
spectant.

5. Ad *inflammationes* pertinent *encephalitis*, *rhachialgitis* et *neuritis*. Rationi enim oppositum foret, inflammationem cerebri, medullae spinalis et nervorum a doctrina morborum systematis nervorum excludere velle, cum non solum illae inflammationes, essentielles huiusmet systematis aegritudines constituent, sed et fontem sistant, ex quo

quo cohors malorum nervosorum chronicorum evolvitur.

6. Sicuti hæmorrhagiæ in genere magnam cum inflammationibus alunt affinitatem; ita in specie relate ad systema nervorum. Encephalitidi, rhachialgitidi, et neuritidi affines revera sunt *apoplexias* cum cerebrales, tum spinales, tum nerveæ, morbi videlicet ex sanguine, vel ex illius saltem sero, in cavitates encephali, specus vertebralis aut in vaginas nervorum extravasato, oborti.

Qui m.
ad hæ-
morrha-
gias per-
tinent.

7. *Abnormitatibus somni et vigiliarum* adnumerantur *cataphora*, *agrypnia*, *rhonchus*, *jactatio*, *crampus*, *ardor et pavores in somno*, item *somnia terrifica*, *incubus*, *somnambulismus* et *somniatio*.

Qui m.
abnormi-
tatibus
somni et
vigilia-
rum ad-
nume-
rantur.

8. *Anaesthesiæ* amplectuntur *ecstasin*, *cataplepsi*, *amaurosin*, et abolitionem reliquorum sensuum ex vitio nervorum sensui dicatorum.

Quos
morbos
anæsthe-
siæ am-
plectun-
tur.

9. *Vesaniæ* continent morbos, erroribus sensuum et perceptionum, nec non vitiis animi pathematum et facultatum insignitos. Quosque hæc mala, illaeso rationis usu, occurrunt, ad *hallucinationes*, — aliàs, ad *manias* revocantur, inter quas tamen morborum formas certos limites statuere, arduum foret; quamobrem *vesaniis* in genere adscribimus *vertiginem*, *hypochondriasin*, *amnesiam*, *moerorem profundum*, *iram effrenam*, *amorem insanum*, *vitæ taedium ad suicidium ducens*, *deliria*, praesertim ea, quæ a liquorum fermenta-

Quos m.
vesaniæ
conti-
nent.

menta-

78 DE MORBIS SYSTEMATIS NERVORUM

mentatorum ac venenorum narcoticorum usu nascuntur, et varias *maniarum genuinarum formas*.

Qui m.
paralysi
et spas-
mis ad-
scribun-
tur.

10. Qui morbi systematis nervorum *paralysi* et *spasmis* adscribuntur, sponte intelligitur. Ad alia hinc nos convertimus diagnoseos momenta.

Nomen
morbi.

11. Stabilita praesentia et forma morbi systematis nervorum, *nomen* illi impertitur. Desumitur id ex praecipuo symptomate aut ex convolutione plurimorum symptomatum, at non semper absque difficultate. Extant enim haud pauci generis nervosi morbi, quorum symptomata vel adeo volubilia et vaga, vel adeo obscura et indefinita, vel adeo aequivoca et ambigua sunt, ut ad determinatas nequidem formas referri queant. Quoties hinc subtilissima rerum discrimina exactam diagnosin impediunt, nomen morbo per appropinquationem impertitur, aut morbus plurimorum nominum simul sumtorum ope designatur¹⁾.

Sedes
morbi.

12. Impertito nomine morbo, *sedes* illius determinatur. Est autem sedes morborum systematis nervorum, quamvis iisdem aliquando insignitorum nominibus, varia, id est, vel in *toto systemate*, vel in *cerebro*, vel in *medulla spinali*, vel in *nervis eorumque plexibus et gangliis*, vel in *nonnullis harum partium simul*.

Indoles
morbi.

13. Perducto huc diagnoseos opere, *indoles* morbi indagatur. Hoc sub respectu morbos systema-

¹⁾ E. c. uti in appendice ad cap. XIII.

stematis nervorum in *primarios* sive *idiopathicos* et in *secundarios* sive *symptomaticos* dividimus. Illos directe ex systematis nervorum sensibilitate sive aucta, sive imminuta, sive perversa (brevitatis causa *diathesi nervea* dicenda), repetimus; hos ex sequentibus conditionibus morborum.

Diathesis
inflam-
matoria.

14. Nexus cordis vasorumque sanguiferorum cum universo systemate nervorum, atque cruor (principii vitalis verisimiliter fons) pulpa nerveae intime mixtus, *diatheseos inflammatoriae* in systema nervorum imperium explicant. Sic morbi cerebri, *infantiae* addicti, plerumque affluxui sanguinis majori caput versus (inprimis si salutari naturae conamini, sese a nimia humorum copia impetiginum ope sublevandi obstetur) debentur. Mala nervorum, *epocham catameniorum* concomitantia, praesertim ubi uterus proprium recusat officium, saepe a plethora, systematis nervorum parti uni alterive infensa, repeti queunt. Idem de *graviditate*, quâ sanguis alioquin accenditur, ac in circulo suo tot invenire solet impedimenta, valet. In *senectute*, gulae nimis indulgente, parum nutritionis indigente, decrescente lumine vasorum sanguiferorum, saepe ossificationis vestigia offerentium, sanguis facile abundat, ac potissimum in cerebrum et medullam spinalem irruit. Idem omni in aetate accidit, si evacuationes cruoris habituales, sive spontaneae sive artificiales, suppressae fuerint, si potus liquorum fermentatorum, aromaticorum, inprimis calide hausto-

haustorum, aut animi pathemata irritantia, studia, calorque atmosphaerae cruorem exagitent, aut si caussa rheumatica, arthritica, vel alia irritans, sanguinem ad unam systematis nervorum partem attrahat, aut tandem si vestes arctae, mala corporis positio, sermocinatio diuturna, cantus, tractatio tubarum, obstructio alvi, libertati circuitus cruoris obstaculum ponant. Praeterea pulpa nerveae, praecipue encephali, specus spinalis et gangliorum abdominalium ea *conditio venarum*, quae vulgo *vitium* nuncupatur *haemorrhoidale*, saepe infensa est. Sic et *conditio inflammatoria arteriarum* ac *aneurysmata*. Caveamus autem, ne diathesi inflammatoriae et plethorae effectus tribuamus, qui dumtaxat *auctae irritabilitati et contractioni morbosae vasorum sanguiferorum* adscribendi sunt. Ceterum una alteram non excludit causam.

Diathesis
rheumatis.

15. Si imperium, quod cutis temperatura, imprimis frigus nec non transpiratio suppressa in systema nervorum exercent, perpendas; non miraberis, *rheuma* multis morbis systematis illius ansam porrigere²⁾. Aggreditur potissimum involucra cerebri, medullae spinalis et nervorum; hicque non uti alias, fugax est, sed partes, quas sibi elegit, constanter detinere solet. Quanto cum cruci-

2) Persuasus sum morbos systematis nervorum, qui in homines robustos e. c. rusticos, milites etc. incidunt, plerumque originem rheumaticam habere.

cruciatu id fiat, ex tractatibus de cephalaea; rha-chialgia et neuralgia elucebit. Elucebit porro, inflammationes rheumaticas involucrum pulpae nerveae, maxime in exsudationes seri et lymphae coagulabilis pronas esse. Humores hujusmodi exsudati, atque vel inter membranam externam nervorum et eorum internam (*neurilema* dictam²⁾) vel inter hanc et pulpam nerveam collecti, pulpae huic varias molestias inferunt, ex quibus origo haud unius morbi nervosi explicatur.

16. Consensus, quem viscera abdominalia (plexus coeliaci nervorumque paris vagi et intercostalia gratia), cum cerebro, medulla spinali et reliquis nervis habent, de vi *diatheseos gastricae* illas in partes rationem reddit. Maxima sane pars morborum generis nervosi, in hominibus gulae indulgentibus, vitam sedentariam ducentibus, alvi obstructione laborantibus, vel in aetate puerili, ex saburra, acidis, pituita, bile, flatibus et verminibus oritur. Quoniam autem consensus *reciprocus* est, fit etiam, ut morbi systematis nervorum, et praecipue cerebri, vitia abdominalia generent, unde cavendum, ne effectus cum causis confundamus.

17. Conspicuum quoque est *diatheseos arthriticae* in systema nervorum imperium. Neque id mirum, si consideramus, et hujus diatheseos officinam praecipue in visceribus abdominalibus haerere, — arthritidem saepe cum plethora venae portarum

Diathesis
gastrica.

Diathesis
arthritica.

2) REIL *Fieberlehre*. l. c. p. 10.

Frank *Prax*, II. I. 1.

tarunt incedere, — hanc autem plethoram (ob originem venae portae ex vena mesenterica et ex vena lienali, quibus inter alias vena coronaria dextra superaccedit) praecipue vicinis nervorum plexibus tum mesenterico superiori, tum lineali, tum gastrico infensam esse, — bilis secretionem in arthritide facile perverti, unde inevitabilis nervorum hepatis et duodeni irritatio, — arthritidem concretionibus calculosis urinae favere, quae plexui vel renali irritamentum inferendo, tum plexum coeliacum, tumque nervum intercostalem in consensum ducunt, — materiam, sedimentum in urina arthriticorum saepe constituentem, ad ipsum nervorum systema verisimiliter deponi posse, ac ossificationes arteriarum inde generatas, nervis vicinis injuriam inferre debere. Indolem arthriticam morborum systematis nervorum arguimus: si aeger habitum exhibeat arthriticum, sique ex stirpe arthritica originem ducet, — si aetas aut morbi causae arthritidi faveant, — si morbus comparente sedimento arthritico in urina, aut sudore, aut formali podagra sublevetur, — si malum periodice redeat et cum repentinis atmosphaerae mutationibus cohaereat, aut vitia cutis arthritica praepostere fugata subsequatur. Ceterum potest morbus nervosus alterius indolis, fortuito in corpore arthritico residere.

Diathesis
scorbuti-
ca.

18. *Diathesis scorbutica* morbis nervosis haud aliena est. Neque aliter expectandum; cum potiores causae diatheseos scorbuticae, e. g. animi
pathe-

pathemata deprimentia, aërque corruptus, vehementer systema nervorum afficiant, — cum lienis affectio, scorbuticis familiaris; plexus nervorum abdominalium in consensum trahere debeat, — cumque ecchymomata et haemorrhagiae scorbuticorum circa cerebrum et medullam spinalem contingant.

19. *Diathesis scrophulosa* quatenus glandulis lymphaticis, cum systemate nervorum intime cohaerentibus, infensa, ad multorum morborum nervosorum originem explicandam idonea est. Tumores scrophulosi pluries in cerebro⁴⁾, cerebello⁵⁾ et in medulla spinali⁶⁾ detecti sunt. A tuberculis pulmonum, in viciniis plexus nervorum pulmonalis et brachialibus haerentibus, plus vice simplici constrictionem gutturis, oscitationem, singultum, vomitum, torporem, formica-

Diathesis
scrophu-
losa et
rachiti-
ca.

F 2 tionem

4) REIL memorab. clinica, Fasc. III. p. 39. BAUMES Journ. de méd. 1791. Juin. HUYELAND'S Journ. der pr. Heilk. 1814. Febr. p. 29. GENDRIN recherches sur les tubercules du cerveau et de la moëlle épinière. In Annales du cercle médical. Janvier 1823. NASSE Abhandlung über die Geschwülste des Hirn's, als Anhang zu ABERCROMBIE'S Krankheiten des Gehirns. ROMBERG in HORN'S Archiv für medic. Erfahrung. März, April 1824. p. 311. Repertorio medico chir. di Torino. Nov. 1826. p. 497.

5) REIL I. c. RUST Magazin für die gesammte Heilk. B. 17. Heft 1. p. 127. Revue médicale, Juin 1828. p. 370.

6) GENDRIN I. c.

84 DE MORBIS SYSTEMATIS NERVORUM

tionem et dolorem extremitatum superiorum observavimus. Tumores glandularum diaphragmatis, ab aliis jam observati 7), singultum et dolores colli excitasse nobis constat. Nullibi autem affectio scrophulosa glandularum lymphaticarum morbis nervosis frequentius ansam porrigit, quam in *mesenterio*. Cum glandulae hic induratae pruritum narium, pupillam dilatatam, nauseam, vomitum, cruciatusque abdominis socias habere soleant; fit saepe nimis, ut morbi nervosi tunc a vermibus repetantur. Labefactato plexu lumbari vasorum et glandularum lymphaticarum, haud raro dolores et paralysis extremitatum inferiorum obveniunt. Qualicumque in parte nervi a tumoribus bursarum mucosarum, indolis aliquando scrophulosae 8) comprimantur, symptomata nervosa praesto sunt. In *rhachiticis* peculiaris cranii structura 9), praesertim conditio ossis frontis et occipitis, necessario in cerebrum, in scrophulosis volumine auctum 10), ac mollius 11), influere debent.

7) BONET sepulc. anat. lib. II. sect. VII. obs. 92.

8) MONRO of all bursae mucosae of the human body. Edinb. 1788. p. 31. 35. KOCH's Untersuchungen des natürlichen Baues und der Krankheiten der Schleimbeutel. Nürnberg. 1795. p. 128.

9) VERIAC über die Rhachitis oder englische Krankheit. A. d. Holland. 1794.

10) FR. HOEPMANN med. rat. syst. Edit. Francf. 1740. p. 58. ZACCH. PLATNER ars medic. singul. morbis accommodat. Lips. 1765. p. 45.

bent. Morbi nervosi ex vitio rhachitico *specus vertebralis* innumerabiles sunt. Et ad *metastases osseas* ¹²⁾ e vitio scrophuloso - rhachitico pullulantes, quatenus variis systematis nervorum partibus infensa, hic cogitandum est. Verum praeter vim, quam glandulae et ossa a labe scrophuloso - rhachitica contaminata *mechanice* in cerebrum, medullam spinalem et nervos exercere queunt, diathesis scrophulosa alio adhuc pacto in systema nervorum influere videtur. Sic saltem arguere licet ex generali vasorum lymphaticorum in nervos actione ¹³⁾, — ex similitudine, quae nervos eorumque ganglia inter et vasa lymphatica earumque glandulas intercedit, — ex imperio animi pathematum in vitiis scrophulosis excitandis ¹⁴⁾ et spasmodum in glandulas lymphaticas ¹⁵⁾, nec non ex antagonismo vitam sensiferam inter et vitam vegetativam, quarum illa a nervorum, haec a lymphatico systemate sustinetur. Morbum nervosum ex diathesi scrophulosa originem trahere suspicamur, si habitus aegri, si morbi praegressi aut praesentes scrophulas aut rhachitidem indicant, sique remedia

11) PORTAL *observations sur la nature et le traitement du rachitisme. Paris 1797.*

12) VATER *disq. de osteogenia naturali et praeternaturali, in HALLERI collect. disp. anat. Vol. III. p. 227.*

13) SOEMMERING *von dem Soft etc.*

14) HUFELAND *über die Natur, Erkenntniß und Heilart der Scrophelkrankheit. Jen. 1795. p. 47.*

15) SOEMMERING *apud HUFELAND l. c. p. 82.*

dia morbis nervosis aliis accommodata, effectui salutari destituuntur. Verum ne in origine morborum nervosorum definienda, *ex solo* glandularum tumore, aliquando eidem plane causae, quae nervos etiam irritat, e. c. exostosi, tribuendo, ad indolem illorum scrophulosam mox concludamus.

Diathesis
carcino-
matica.

20. Partes *scirrhus* aut *cancer* detentae, instar glandularum labe scrophulosa correptarum, mechanicè systema nervorum irritare possunt. Nec rarum est, tumores scirrhosos in cerebro¹⁶⁾ et in vicinis nervorum latitare. Originem dolorum nonnullorum dirissimorum ex *diathesi carcinomatice* jam FOTHERGILL stabilivit¹⁷⁾ alique jure confirmarunt¹⁸⁾. Concessa affinitate leprae, pellagrae, plicae etc. cum cancro¹⁹⁾, origo carcinomatice malorum generis nervosi, has impetigines vel annunciantium, vel concomitantium, magis elucet. His saltem comparentibus vel evoluto quocunque in viscere scirrbo, permulta symptomata nervosa fugata vidimus. Quamobrem indolem carcinomaticam in morbis nervosis rebellibus toties suspicamur, quoties aetas, familia, sexus aegrotantis, morbi praegressi (praecipue scrophula, arthritidi et syphilidi juncta) carcinomati favent.

21. Tu-

16) VOIGTEL op. c. 1. B. p. 610.

17) Cfr. cap. de Neuralgia.

18) SCHAEFFER in HUFELAND's Journ. der pr. Heilkunde. 1816. Novemb. p. 116.

19) Edit. 2. P. I. Vol. III. sect. II. cap. XX. §. LX. 7. cap. sq.

Diathesis
venerea.

21. Tumores, inflammationes, exulcerationes glandularum, tophi, exostoses et caries ossium *indolis venereae*, cerebrum, medullam spinalem, nervos lacescentes, haud raro morbos systematis nervorum excitant. In genere venerei systema nervorum valde irritabile exhibere solent, quod forte animi pathematibus ad turpem morbum accessoriis, aut *mercurii in hepar influxui* magis, quam ipsi lui tribuendum est. Morbum nervosum ex lue venerea ortum ducere, concludimus, si aeger, nec prima excepta sua infantia, syphilidem expertus sit, — si sanatio illius omnibus non fuerit absoluta numeris, — si luis adhuc signa praesto sint, aut brevi antea evanuerint, — si morbus nervosus accessiones agnoscat vespertinas sive nocturnas, — si aaevis cruciatibus, tunc exacerbatissimetur, — sique hydrargyrum, scopo, suspecti morbi indolem explorandi, adhibitum, inconsuetum levamen attulerit. Exemplis luculentissimis hanc doctrinae partem in capitibus de cephalalgia et de epilepsia recensendis, dilucidabimus, interea monuisse sufficiat, luem syphiliticam vel fortuito cum morbis nervorum societatem inire posse, quod dum accidit, diagnoseos opus magnis difficultatibus circumdatur. Non minores difficultates, in effectibus nocivis *mercurii* in systema nervorum, ab iis luis distinguendis occurrit, inprimis si copia et modus, quo hydrargyrum adhibitum fuit, ignorentur.

22. Imperium plurimarum diathesium in systema nervorum hucusque recensendo, plus vice
Vitia localia.
sim-

simplici de *vitiis localibus* ex illis pullulantibus ac nervorum systema lacessentibus, quaestio fuit. Exemplo sunt, distensio vasorum sanguiferorum, concretiones bilis, urinae, ecchymomata scorbutica, tumores glandularum indolis scrophulosae, venereae, vitia ossium rhachitica, syphilitica etc. Quoniam autem irritamenta hujusmodi ex labe totius corporis originem nanciscuntur et cum hac labe determinatos inter limites cohaerent; plane ea ab *irritamentis mechanicis*, quae scilicet nullo pacto a conditione universi corporis dependent, et per se existunt, distingui debent. Ad haec spectant res peregrinae corpori intrusae, vulnera, contusiones, distensiones, concussiones aliaeque violentiae externae. In iis indagandis omne studium ponendum est. Magna enim morborum systematis nervorum pars, imprimis inter infantes, rusticos, milites etc. inde primam originem derivat. Indagatio mali hic aliquando eo difficilior evadit, cum minimae violentiae externae germen morborum herculeorum constituere, et effectus causam post annos tantum subsequi possint. Susplicamur in genere, malum nervosum a vitio locali primario oriri, si morbus nullius diatheseos signa exhibeat, sique pbarmaca aliàs adversus eum praestantissima, effectum prorsus destituantur. Videri posset morbos nervosos ex vitiis localibus, utpote semper praesentibus, *continuatione et perpetuitate* malorum, sese ab aliis morbis systematis nervorum, a causis minus stabilibus et perseverantibus productis,

ductis, distinguere debere. Ast nil a veritate magis alienum! Experientia nempe edocti sumus, morbos systematis nervorum, ab irritamentis localibus ortum ducentes, facilius quam reliqui *periodice* decurrere. Quod quidem factum difficulter explicatur, sed ob id non minus verum est.

23. Morborum systematis nervorum originem, Diathesis
consulto hucusque in diathesi inflammatoria, rheu-
matica, gastrica, arthritica, scorbutica, scrophu-
losa, carcinomatica, venerea, nec non in vitiis lo-
calibus quaesivimus, ne vulgatissimus error, aegri-
tudinum illarum ortum mox in *perversa ipsius syste-
matis nervorum conditione* quaerendi, per nostra
quoque suffragia, confirmari videatur. Quum *dia-
thesis nervea* nulla symptomata gentilitia agnoscat
arduum de illa evadit iudicium. Signa, quidem
vulgo pro *nervosis* habita, ut urina multa, in-
odora, pallida; sensus constrictivus ad guttur;
oscitationes, extremitates frigidae, calores fugaces,
partiales, et pulsus contractus, affectionem syste-
matis nervorum designant; ast, utrum systema
illud propriâ culpâ, an alienâ laboret, minime
docent. Aetiologia majorem hîc lucem affert. Quo
magis enim constitutio corporis, aetas, sexus et
temperamentum systema nervorum labefactatum
indicaunt, quo evidentius aegritudo ab animi pa-
thematibus, ab humorum, praesertim a sanguinis,
a seminis aut a similis liquoris jactura, a narcoti-
cis, ab odoribus, ab electricitate ac aliis, ut vo-
cant, *imponderabilibus* noxis originem ducit, quo-
que

90 DE MORBIS SYSTEMATIS NERVORUM

que magis morbi curriculum proteiforme est; eo major de *primitiva* seu *nervea* illius natura habetur certitudo. Immo hoc in casu, etiamsi aegritudo per consueta symptomata nervorum in conspectum haud veniat, attamen de illius *indole nervea* vix dubitandum. Sunt enim nervi aaepe instrumenta recondita, quorum ope organa dissita (sicuti machinae theatrales obviae a funibus invisibilibus), moventur. De *essentia* sive *caussa proxima* diatheseos nerveae, nostram sine ambagibus fatemur ignorantiam. Quaerant modo alii rei tam abstrusae originem in liquoris cerebrosi inaequali distributione ²⁰⁾, — in capacitate nervorum aucta ²¹⁾, — in defectu elasticitatis systematis nervorum ²²⁾, — in exsiccatione, tensione, rigore nervorum ²³⁾, — in conditione sive serosa ²⁴⁾, — sive relaxata ²⁵⁾ nervorum, — in liquore aut viscido aut seroso nimis cerebrum humectante ²⁶⁾ — in vitiis spirituum animalium ²⁷⁾, — in anomala mutatione temperaturae irritabilitatis ²⁸⁾, — in

20) Cocchi Bagni di Pisa. cap. 4. p. 202.

21) Lobb *national method of curing fevers*. §. 141.

22) Chayne de fibra. §. 7.

23) Pomme l. c. 24) Piso l. c. p. 159.

25) Smith *diss. upon de nerves*. p. 110.

26) Hill *the construction of the nerves and causes of nervous disorders*. Lond. 1758. p. 21.

27) Sennert de vitiis spirit. animal. v. Prax. med. P. l. cap. XV. Tissot *oeuvres* T. 10. p. 265.

28) Reil op. c. p. 140.

— in mutatione formae et mixtionis pulpae nervese ²⁹⁾ — in processu galvanico ³⁰⁾, — et in debilitate sive asthenia ³¹⁾. Fatebimur interea cum LORRYO ³²⁾, atoniam saltem frequentissime morbos ex diathesi nervea concomitari, atque doctrinam Brunonis de debilitate directa et indirecta ad morbos ex diathesi nervea explicandos non plane vilipendendam esse.

24. Nullibi doctrina complicationum majoris momenti est, quam respectu ad morbos systematis nervorum. Intelligitur id ex nexu reciproco hoc systema inter ac reliquas corporis humani partes. Communissima est complicatio inflammatoria. Qualiscunque nempe caussa pulpam nerveam aut involucra illius, sive in encephalo, sive in specu vertebrali, sive in reliquo corpore, laceassens fuerit, ob legem majoris affluxus sanguinis in partem irritatam, illico plethora aut saltem congestio morbo socia fit *). Praeterea, quoties cerebrum patitur,

Diathesim
suum
complicationes.

29) HOVEN l. c. p. 5.

30) PRATT l. c.

31) FR. HOFFMANN de morbis ex atonia cerebri nervorumque nascentibus. Hal. 1708. BÜCHNER diss. de atonia nervorum morbisque inde oriundis. Hal. 1749. КЛОЕСКОР de morbis animi ex infirmato tenore medullae cerebri. Utrecht. 1753. BROWN elements medicinae, et aëcciae.

32) Op. c. T. II. p. 160.

*) Cfr. BAUMGÄRTNER über den Einfluss der Nerven auf die Bewegung des Blutes. Med. chir. Zeitung. 1829. B. 4. No. 88. p. 163.

92 DE MORBIS SYSTEMATIS NERVORUM

titur, toties functiones viscerum abdominalium periculum, secretiones morbosas largiendi, incur-
runt, unde *complicatio gastrica*. Diathesis scro-
phulosa morbis nervosis ansam porrigens (cum
glandulae lymphaticae non solum partibus syste-
matis nervorum vim inferant, sed et vasa sanguinea
comprimant circuloque sanguinis obstacula po-
nant) plerumque simul et *complicationem inflam-*
matoriam gignit et sic porro.

§. V.

P r o g n o s i s.

Genera-
tim.

1. Dignitas systematis nervorum, momentum
et periculum morborum illud detinentium abunde
patefacit.

P. dolo-
rum.

2. *Dolores* moderati, quatenus animum il-
lico de injuriis certiores reddunt, ac vel invitum
hominem ad causam doloris debellandam impel-
lunt, pretiosum naturae beneficium sistunt¹⁾. Se-
cus dolores immodici et diu protracti. Effectus
sunt: inquietudo, desperatio, vitae taedium, vi-
giliae, laesio facultatum animi, relaxatio sphyn-
cterum, emaciatio, debilitas, paralysis, convul-
sio, inflammatio, gangraena, lipothymia, asphy-
xia, mors. Intervalla inter dolores periodicos, pas-
sivam quidem, at supremam voluptatem conciliant.

3. *In-*

1) JUNKEN de utilitatibus dolorum. Hal. 1757. BÜCH-
NER diss. de salutaribus et noxiis dolorum effectibus.
Hal. 1766.

3. *Inflammatio cerebrum, medullam spinalem et nervos: aut eorum involucra acute vel chronice, detinens, in aegro conscio, prae illa aliarum partium, dolorifica. Nisi resolvatur ejus exitus, morbo primario longe pejores.* P. inflamm.

4. *Haemorrhagiae systematis nervorum effectus inflammationum instar gignunt. Majori adhuc recidivae periculo stipantur.* P. haemorrh.

5. *Ars, natura et tempus, adversus abnormitates somni et vigilationis, valent.* P. abnormitat. somn. et vigilationis.

6. *Anaesthesiae prognosin dubiam admittunt.* P. anaesthesiae.

7. *Vesaniae et convulsiones, propter lucida quibus stipari solent intervalla, saepe sanationis dumtaxat speciem exhibent. Praeterea recidivae subjiciuntur periculo.* P. vesaniarum et convulsionum.

8. *Paralysis deterrimam morborum systematis nervorum formam constituit.* P. paralysis.

9. *Nonnunquam una in alteram transit morbi formam, alias morbi nervorum in alienos prorsus morbos (e. c. febres intermittentes, impetigines) convertuntur.* Animadversio.

10. *Morbi nervosi acuti, febrium et inflammationum — chronici proprias, ab illis non semper absimiles, agnoscunt crises. Qui periodice decurrunt, hi saepe quovis in paroxysmo, phaenomenon criticum, viam ad medendum aliquando indicans, exhibent. Hinc inde fortissimus paroxysmus morbi terminum constituit.* Crisis.

11. Mor-

P. diath. inflamm. et rheumaticae. 11. Morbi systematis nervorum *inflammatorii* et *rheumatici*, si mature et rite curentur, in corpore alioquin sano, vix unquam sanationem respiciunt. Aliàs tales gignere solent reliquias, quales artis auxiliis vix removeri queunt.

P. diath. gastricae. 12. Pro varia causae, morbum systematis nervorum *gastricum* excitantis, indole, plus minus sanationis spei affulget. Hisce morbis diu perstantibus, partes prius ex solo consensu laesae (e. c. cerebrum), tractu temporis proprium contrahunt morbum. Aliàs nervis abdominalibus stimulo morbozo jam aduetis, cessat per consensum excitatus morbus, perseverante ceterum aegritudine primariâ.

P. diath. arthrit. 13. Nisi podagra, aut impetigo, aut ulcus chronicum, aut urina cum sedimento, aut sudores profusi, morbis nervosis ex *diathesi arthritica* frenum injiciant; quo annosior aeger, quo diuturnior morbus, quo gravior cerebri, medullae apinalis aut nervorum affectio, eo magis improviam expectabis mortem.

P. diath. scorbut. 14. Minus periculi in morbis systematis nervorum e *diathesi scorbutica* est, casu haemorrhagiae in cavitates encephali et vertebrarum excepto.

P. diath. rhach. et scrophul. 15. Qui morbi *diathesi rhachiticae et scrophulosae* originem debent, pro varia partium affectarum natura, variam quoque agnoscunt prognosin. Labefactato systemate *ossium* (vitiis spinæ vertebralis quodammodo exceptis), imutatio in melius solum ab incremento corporis expectanda.

Affectis

Affectis *glandulis* morbus quidem nervosus haud raro profligatur, ast facile vel redit vel in *aliam aegritudinem transit* 2).

16. Morbi systematis nervorum, ex *diathesi carcinomatica* comparente scirrho, cancro, impetigine rodente, magno aegrorum levamine evanescere solent. Quid inde?

P. diath.
carcino-
mat.

17. Si *lues venerea*, in corpore ceterum sano, morbo nervoso ansam porrexerit, — sique aeger mercurio necdum abusus sit, felix sperandus est eventus. Immo, miracula hic interdum ab arte producantur. Interdum vero syphilis vitii ossium ansam praebet, quae vel sanata lue remanent ac systema nervorum offendunt.

P. diath.
venereae.

18. Celebratae enim quaestioni: *utrum vitia localia interna sanari queant nec ne?* 3) respon-

P. vitior.
local.

demus:

2) Plures enim observavimus aegros, qui morbos nervosos, praesertim cerebri (quibus tamdiu obnoxii erant, quamdiu tubercula *intacta* in pulmonibus aut in mesenterio latebant), illico amiserunt, dum (tuberculis illis *inflammatis, suppuratis* et sputorum sive diarrhoeae ope *evacuatis*) phthisis pulmonalis aut mesenterica omnibus numeris absoluta caput extulerat. Jam dudum similes collectae fuere observationes (CHEYNE *methode naturelle de guérir*. par. 3. cap. 2. §. 20. ROSA *saggio d'osservazioni*. Obs. 2. TISSOT l. c. p. 211) verum alio propterea modo eas interpretabamur.

3) *Sur la question relative aux maladies organiques, mise au concours pour l'an 1809. par la Société médicale d'Emulation de Paris. Chap. 2. question 2. —: Les maladies organiques sont elles généralement incurables?*

demus: haec vitia dividenda esse in ea, quae cum labe totius corporis cohaerent, atque in ea, quae per se existunt. Prima, quousque vitio universali alligata sunt, illius participant prognosin; altera, nisi manu chirurgica auferri queant, artis eludunt potestatem. Principia hujusmodi prognosi morborum nervosorum adaptando, sequitur: vitia ex diathesi arthritica, scorbutica, scrophulosa, venerea pullulanti, quamvis systemati nervorum irritamentum locale inferentia, sanationem tamen, debitos inter limites, admittere; non ita vero vitia cum nulla corporis generali labe cohaerentia, ac nulla operatione chirurgica tollenda.

P. diathesis nervosa.

19. *Diathesis nervosa* morbos ceteris paribus, minimo periculo stipatos, producit. Auxilio saepe sunt (praeter pharmaca), epocha pubertatis, matrimonium, puerperium, lactatio, cessatio menstruorum, animi commotiones (praecipue amor, terror, spes), mutatio coeli, aetas provectior et imprimis febres alique morbi accidentales.

P. diathesis complicata.

20. Morbos nervosos ex *complicatione* plurimarum diathesium ortos, longe difficiliore curatu, quam simplices esse, sponte elucet.

§. VI.

C u r a.

Generatim.

1. Praecepta medica nullibi sublimiora extant, quam in therapia morborum systematis nervorum. Confluunt nempe cum illis religionis et philosophiae moralis, unde VALESIVS non immerito ex

ex GALENO proficitur ¹⁾: „medicinam esse partem philosophiae morum.“ Et juxta BARTHOLUM THURSIANUM ²⁾ „medicus non solum bonam corporis constitutionem tractat, sed simul animi passionem.“

2. *Religio* est, quae hominem parem reddit, Religio.
cruciatibus immanes perferendi, animi pathematibus saevius resistendi, vitae spem, actionem remedium tam evidenter adjuvantem, conservandi, aut appropinquantem mortem, existentiae felicitioris fretum, firmiter intuendi.

3. *Philosophia moralis* praecepta, non solum Philosophia moralis.
morbos, sed et vitia, ex quibus morbi pullulant, fugandi sicque simul familiarum felicitati, et morali publicae succurrendi largitur.

4. Aegri ita animo et corpore labefactati, ut Indulgentia.
religionis et philosophiae moralis lumen (veluti pharma nimis activa), admittere recusent; *indulgentia*, ad captandam benevolentiam et fiduciam, praeparandi.

5. Felicis enim connubii indulgentiae, religionis et philosophiae moralis ope, medicus aegroti Regimen animi pathematum.
veluti arbiter evadit. Cum vero ad animum in aliis dirigendum, *persuasio* requiratur; *eloquentiae* inde pro medico elucet necessitas. Ne ea cum *loquacitate* confundatur! Noli enim vulneratas animi chordas praepostere tangere!

6. Aegri *attentio* ad nutum dirigenda, ac Regimen mentis.
imago

1) De sacro philosoph. c. 75.

2) Lib. II. Boliatriae.

Frank Prox. II. I. 1.

imaginationi et memoriae pabulum, quod desideramus, suppeditandum. Regula esto, *otium*, morborum multorum fomitem, fugare, aegrosque *occupationibus et oblectationibus* distrahere.

Sensuum
occupatio.

7. *Sensuum* hic inprimis valet *regimen* per *lucis* varios gradus, *colorum* selectum, *odora*menta diversa, *res gustum et tactum* vellicantes, *colloquia et musicam* ³⁾).

Animad-
versio.

8. Reliquum *regimen diaeteticum*, regulas generales non admittit. Sic et *pharmaca* atque *auxilia chirurgica*.

C. morb.
syst.
nerv. ex
diathes.
inflamm.

9. *Morbi systematis nervorum inflammatorii* sub rerum positionibus in specie definiendis postulant:

a) *Sanguinis detractionem generalem*. — *Arteriotomiam* ⁴⁾), praecipue in morbis cerebri com-
men-

3) BRENDÉL de curatione morborum per carmina et cantus musicos. Witteb. 1706. VAN SWIETEN de musicae in medicinam influxu atque utilitate. Lugd. Bat. 1773. DESBOUET sur l'effet de la musique dans les maladies nerveuses. Petersb. 1784. LORRY op. o. germ. vers. Vol. II. p. 151. SPRENGEL de musicae artis cum medicina connubio. Hal. 1800. REIL Fieberlehre 4. B. p. 180. LICHTENTHAL der musikalische Art.

4) GALENUS de cur. rat. per sang. miss. cap. 22. 23. FORTOLUS in GALENUM de arteriarum venarumque dissectione. BEYER diss. problemata circa arteriotomiam. Jen. 1673. CRAUSIUS de arteriotomia. Jen. 1705. BUTTER diss. de arteriotomia. Edinb. 1761. NOERTINGER diss. de arteriotomia, ejus recto usu et injusto. Argent. 1747. aliiq. passim citandi.

mendam 5), propter *aneurysmatis* periculum 6), rejicimus. Contra audacter *venae sectionibus* utimur. Persuasi venas instar nervorum inter se consentire, et HARVAE inventum praepostere medicinae practicae applicitum multum nocuisse, morem potius antiquorum sequimur 7), pro diversa morbi sede diversas quoque venas tundendi; modo ut revulsio 8), modo ut simul depletio localis 9) fiat.

b) *Sanguinis detractionem localem.* — *Hir-*

G 2 *dines*

- 5) R. A. VOOGEL *epist. de sectionis arteriae temporalis subitaneo effectu.* Goett. 1775. — *An improved method of opening the temporal artery etc.* Lond. 1784.
- 6) DESRUILLER in *Journ. complémentaire des sciences médicales*, Avril 1826. p. 170. G. BALLINGALL *a clinical lecture delivered to the students of surgery in the R. infirmary of Edinburgh, at the conclusion of the wintercourse for 1828* — 29. Edinb. Febr. 1829.
- 7) FRANCII *elenchus utilitatis sectionis venarum in pedibus.* Mediol. 1603. COLLADO *adversus.* Genev. 1615. POLIS *diss. de venae salvatellae sectione.* Fr. ad Viadr. 1636. DAVID *recherches sur la manière d'agir de la saignée et sur les effets, qu'elle produit relativement à la partie, où on la fait.* Paris 1763. PLACENTINUS *diss. de vena, quae in morbis particularibus parium corporis sit salutaris incidenda.* Patavii 1756. STAHL *diss. de usu venae sectionis in pede instituendae.* Erf. 1744.
- 8) SEGNER *de derivatione et revulsione per venasectionem.* Goett. 1749. HALLER *diss. pr.* Vol. VII. No. 249. WERNHOF *Opp.* Vol. III. p. 761.
- 9) LENTIN *diss. de praerogativa venae sectionis in partibus laborantibus.* Goett. 1756.

dines applicantur: *cerebro laborante* — ad tempora, ad angulos internos oculorum (et 'prout evacuatio specialis cruoris e sinu vel longitudinali superiori, vel transverso, vel occipitali desideretur) ad nares, ad foramina parietalia, ad processus mastoideos, ad basin cranii, atque, gravissimo in malo, ad singulas has partes simul; *specu vertebrali affecto* — utrimque ad ejus latera; *ganglio aut nervo singulo aegrotante* — quo propius id fieri potest circa partem laesam; et indicatâ haemorrhagiae salutaris restitutione — ad vasa, e quibus cruor quondam fluebat. Quantitas sanguinis extrahendi, non numerus hirudinum applicandarum, determinari debet. *Scarificationes cruentae* admoventur in *morbis capitis* — occipiti ¹⁰⁾; et in illis *nervorum* juxta eorum, ubi licet, decursum.

c) *Sanguinis derivationem*. Obtinetur influxum cruoris in partem affectam aut per arteriarum sive *ligaturam* ¹¹⁾ sive *compressionem* *) minui-

10) HANNERENIUS diss. de scarificatione occipitis morborum capitis auxilio. Lips. 1741.

11) WALTHER's *neue Heilart des Kropfes durch die Unterbindung der obern Schilddrüsen-Schlagadern*. Sulzbach 1817. p. 39.

*) SERAPIO brevior. Tract. I. cap. 20. fol. 8. PARRY *memoirs of the medic. society of London*. Vol. 3. p. 77. Et *Samml. auserless. Abhandlungen zum Gebrauche für pr. Aerzte*. B. 16. St. 2. p. 297. BLAUD *observations sur l'efficacité de la compression des carotides*

minuendo, aut ab illa per *cucurbitulas siccas*, *sina-
pismos* et *balnea partialia calida*, locis oppositis
admota, deducendo.

d) *Lenia alvum evacuantia*, ut *pulveres no-
stros temperantes*¹²⁾, *serum lactis tamarindinatum*,
decoctum ex tamarindis et manna, vel ex *pomis
acidis cum prunis domesticis dulcibus*, *electuarium
lenitivum* et similia.

e) *Salis neutra*, et prae omnibus incompa-
rabilis *nitrus potassae*, maxime ubi cordis arte-
riarumque tumultus systemati nervorum vim
infert.

f) *Acidum carbonicum* et *acida vegetabilia*
(*aecti, tartari, limonum, baccarum oxycoccos,*
pomi punici granati), praecipue ubi *venarum affe-
ctiones*

*dans les cas d'engorgement sanguin du cerveau, suivies
de quelques reflexions sur l'emploi de ce puissant moyen.*
v. Bibliothèque médicale. 1818. Novembre („La com-
pression des carotides peut être pratiquée de deux ma-
nières, savoir: 1° en les approchant l'une de l'autre
et en les appuyant fortement contre la partie infé-
rieure des régions latérales du larynx avec le pouce et
l'index chez les enfants, avec le premier de ces doigts
et celui du milieu chez les adultes; 2° en les compr-
mant d'avant en arrière avec le pouce et l'index; ou
avec le pouce et le doigt du milieu, ou bien encore
avec ce dernier et l'index et en prenant le point d'ap-
pui sur la colonne vertébrale“).

12) R. *supertartratis potassae unciam semis. Nitratis po-
tassae drachmam unam. F. pulvis. Divide in octo par-
tes aequales; cap. ter quaterve de die dosin.*

ctiones cerebro, medullae spinali aut nervis injuriam faciunt.

g) *Temperaturam frigidiusculam*, et pro re nata *applicationem momentaneam glaciei*, *affusionis sive lavationis ope aquae frigidae.*

h) *Victum tenue, vegetabilem aquosum.*

i) *Quietem animi et corporis.*

C. morb.
syst.
nerv. ex
diath.
rheuma-
tica.

10. *Morbi systematis nervorum rheumatici, acute decurrentes, eâdem methodo antiphlogistica, frigoris applicatione solum excepta, curantur.* Quo primum autem impetus morbi inflammatorius fractus est, illico operi transpirationis studendum, ad quem scopum consequendum *remedia antimonialia* reliquis palmam eripiunt. Cura morborum, huc spectantium, chronicorum, illi arthritidis similis est.

C. morb.
syst. nerv.
vor. ex
diath.
gastrica.

11. *Cura morborum systematis nervorum a diathesi gastrica a resolventibus, pro varia illorum indole variis, orditur.* Aggredimur *saburram* — *pulveribus resolventibus* ¹³⁾; *acida* — *magnesiâ, lapidibus cancerorum, pulvere concharum praeparatarum, ostrearum, saccharo, sapone medicinali, borace*; *pituitem* — *muriate ammoniacae, radice cephaelidis ipecacuanhae*; *vermes* — *muriate hydrargyri, oleo ricini communis*; *flatus* — *aqua destillata sive anethi foeniculi, sive menthae*

13) R. pulveris supertartratis potassae unciam semis — tartratis stibii et potassae granum unum. M. divide in sex partes aequales.

thae piperitae, cum infuso *radicis rhei palmati*; bilem — *supertartrate* sive *acitate potassae liquido*, non neglectis *clysteribus resolventibus*. Saburras, pituitam et bilem, si sursum urgent, *emetico*, si deorsum, *purgante* educimus; quod contra vermes quoque et flatus valet. Morbus capitis, ejusque frequens comes, affectio hepatis, *emetico*, propter nisus sub vomitu, interdum adversantur. Saepe maximae illius doses ad effectum obtinendum requiruntur. Nec raro ad *drastica*, mitiora tamen, ut *aloes succotrina*, *cucumis colocynthis* et *convolvulus jalappa* confugiendum. *Radix rhei*, ad masticandum, ita adhibita, ut succus deglutiatur atque caput mortuum rejiciatur, plerumque optime alvum sollicitat, tubique intestinalis vires firmat. Quo ultimo scopo etiam infusa et extracta, quae ex *summitatibus achilleae millefolii*, et ex *herbis cardui benedicti* praeparantur, inserviunt. Ceterum in morbis nervorum chronicis ex labe imi ventris, nihil sero laetis, *saponi*, *extracto graminis liquidi*, *aquis mineralium salia continentibus* ¹⁴⁾, *motui corporis exhilarationi mentis*, *diaetae selectae*, et *climati temperato* aequiparandum.

12. *Morbi systematis nervorum arthritici acute decurrentes*, ut *rheumatici* curantur. In *podagricis morbi vis ad extremitates potissimum infiores* C. morb. syst. nervor. ex diath. arthriti- ca.

14) Edit. 2. P. I. Vol. I. sect. II. cap. VI. §. XXXVIII. 27.

riores deducenda¹⁵⁾. In malo *chronico*, *systema* nervorum a vitio arthritico detentum, urgente magna sensibilitate, *solanó dulcamara*, *aconito napello*, *conio maculato*, praecipue sub forma extracti; — vigente debilitate, herba *betonicae officinalis*, cortice *pruni padi*, radice *amomi zingiberis*, et in genere *gummi resina quajaci officinalis* atque *antimonialium* usu instauratur. Praeter transpirationem simul ad urinae tum copiam tum indolem respiciendum. Promovetur lotium consuetis diureticis, inprimis ope *juniperi communis*, *solidaginis virgae aureae*, *rubi chamaemori*. Praesente in urina acido urico concreto, *sapo*, *magnesia*, *aqua* sic dicta *alcalina mephitica* adhibendae. Illa salibus phosphoricis concretis abundante, ad *acidum nitricum* et *acida vegetabilia* confugiendum. Maxima autem *herpetis* aliorumque impetiginum latentium ratio habenda, earumque evolutio ad cutem promovenda¹⁶⁾. Generatim *ulcera artificialia*, et si aeger fuerit robustus, *balnea maris* praecipua morborum arthriticorum generis nervosi sistunt auxilia.

C. morb. 13. *Morbis nervosis ex diatesi scorbutica*
 syst. nerv. ex diatesi scorbutica. conveniunt aër liber, siccus, *diaeta selecta*, *vegetabilis*, *subacida*, *aqua gaz acido carbonico saturata*, *acida vegetabilia*, *recreatio animi*, *balnea subfrigida*, *extractum fumariae officinalis*,
 infu-

15) P. IV. Vol. I. sect. I. cap. de arthritide.

16) Edit. 2. P. I. Vol. I. sect. II. cap. VI. §. XXXVIII. 35.

infusum radicis acori calami cum tinctura sulphurica aromaticâ Mynsichtii, lenia martialis, ac tempore vernali succi recentes herbarum veronicae, beccabungae, nasturtii aquatici, hederas terrestres, chaerisfolii scandicis, vel earum conservae et juscula. Latente ecchymosi systemati nervorum infensa, et morbo acute decurrente, evacuatio localis sanguinis; aliâs flores arnicae montanae et methodus tonica. Porro primis viis et lienî rheo et extracto chelidonii majoris prospiciendum, atque urinae excretio bacis juniperi communis et acido nitrico sollicitanda.

14. In morbis nervosis scrophulosis methodus medendi 17) placide adhibenda, et imprimis curandum, ne systema vasorum lymphaticorum per pharmaca nimis irritetur, quum pulpa nervosa propinqua magnum inde caperet detrimentum. Tutius auxilium regimen diaeteticum suppeditat. Victus, quo magis nutrit, minusve irritat, eo melior, ut lac, flor farinae, gelatinae praecipue ex regno vegetabili petita, decoctum glandum quercus roboris tostorum cum lacte instar cofeae epotum. Maxime ad bonam aquarum conditionem respiciendum est. Raro vinum, saepius cerevisia tenuis locum obtinent. Temperatura esto modica et atmosphaera sicca. Motui corporis gradatim adsuescat aeger. Evitet studia nimia et venerem praematuram sive immodicam. Balnea tepida

C. morb.
syst.
nerv. ex
diath.
scrophu-
losa.

17) P. IV. Vol. I. sect. I. cap. de scrophulis.

tepidâ illaque maris, prae reliquis commendanda. Ex fonte chirurgico *ulcera artificialia*, in viciniis partium, ubi vitium scrophulosum inprimis pulpae nervae infensum est, eminent. Quodsi morbi vis *pharmaca* absolute exposcat utimur, ubi scrophula systema lymphaticum cerebri, pulmonis, hepatis, uteri occupat — *conio maculato*, *muriate mercurii*, *cinnabari*, *sulphureto antimonii et hydrargyri*, *digitali purpurea*; ubi glandulae colli et bronchorum — *alcalibus* et praesertim *spongiae* et *scillae marinae ustae iodio*; et ubi glandulas mesenterii, — *pulvere contra physconiam*¹⁸⁾. Generatim *urias barytis* et longe adhuc magis *urias calcis* inserviunt. In scrophula recenti externa, *hirudines* circa glandulas tumidas, nervis infensae, conducunt. Serius ad frictiones ope *unguenti hydrargyri grisei* confugiendum. Glandula dura, rebellis, nervos irritans, si fieri potest, extirpanda.

C. morb. syst. nerv. ex diath. carcinomatosa. 15. *Morbis systematis nervorum ex diathesi carcinomatosa*, et ex *plica*, minimâ spe successus, opponimus: *extractum conii maculati*, *hellebori nigri*, *aconiti napelli*, *daturae stramonii*, *aquam pruni laurocerasi*, *succum herbae galii aparines*,

18) R. rasurae cornu cervi, baccarum lauri, nucis moschatae à partes aequales. Obducantur pasta panis, et committantur furno calefacto. His calcinata removeatur pasta et conservetur pulvis, ad cuspidem ocultri ter de die infantibus sex, octo annorum exhibendus.

rines, calendulae officinalis, antimonium, mercurium, balnea sulphurica, ulcera artificialia, electricitatem, jacula ex viperis, ranis, lacertis, Audaces arsenico utuntur.

16. *Syphilide morbo nervoso ansam porrigente, mercurii, juxta praecepta alibi tradenda adhibendi*¹⁹⁾, *vis, opio aliisque narcoticis et, si debilitas urgeat, decocto corticis pruni padi*²⁰⁾ *sustinenda.*

C. morb.
syst.
nerv. ex
diath.
venerea.

17. *Affectiones nervosas ex vitiis localibus, quae cum conditione morbosa totius corporis cohaerent, auxiliis huic conditioni accommodatis aggredimur.* Summa tum aegrorum, tum medicorum patientiâ, adjuvante natura benefica, mala haud pauca, quamvis recondita et rebellia, nisi sanare, saltem lenire, aut ab ulteriori progressu impedire, licet. Sic aneurysmatis aut varicis, systemati nervoso infensi effectus, evacuationibus cruoris repetitis, praecipue localibus, victu parco, quiete summa corporis animique, *elixirio acido HALLERI, digitali purpurea, aquâ laurocerasi, plumbo* temperantur; — sic sanguis in cavitate vel cranii, vel specus vertebralis, diathescos scorbuticae culpa, extravasatus, ac cerebrum vel medullam

C. morb.
syst.
nerv. ex
vitiis localibus.

19) P. IV. Vol. II. sect. I. cap. de syphilide.

20) Multorum annorum experientia me certiores reddidit, *atonias venereae* nullum efficacius tonicum quam corticem *pruni padi* opponi posse, quod et BREMEN, vir cl., testatur. v. HORN'S *Archiv für med. Erfahrung.* 1812. Jan. Febr. p. 41.

dullam comprimens, sive convulsionibus sive paralyti ansem praebens, sub usu regiminis et pharmacorum antiscorbuticorum, absorbetur; — sic glandulae lymphaticae per vitium sive scrophulosum sive arthriticum turgidae ac pulpam nerveam ad convulsiones sive paralyti usque comprimentes, quamvis in recondito loco sitae, ad debitum tamen aliquando reducuntur volumen, si methodo adversus scrophulas commendatae locus concedatur. Idem de exostosi indolis venereae, debitos inter limites, sub usu mercurii valet. — Dum autem vitium locale cum conditione morbosa universi corporis vel cohaerere cessat, vel nunquam cohaeserit, *omne auxilium a cura locali pendet.* Vulnere, nervis infensa, sanare, aliquando ea, utpote praepostere sanata, aperire, — contusionibus, distensionibus, concussionibus prospicere, — luxationes et fracturas componere, ossium fistulas aut res extraneas corpori inclusas extrahere, — partum promoveri, — hernias incarceratas reponere, — venena acria involvere, — anevrysmata et varices secundum regulas artis curare, — sanguinem, violentiae externae causae, extravasatum, pus, serum educere, — hae indicationes sunt, quibus, nisi invincibilia inveniantur obstacula, satisfaciendum est. Interdum persistente vitio locali, nervos irritante, illius, pro tempore saltem, mitigantur effectus, si systematis nervosi obtundatur sentiendi facultas, cui scopo (nisi plethora obstet) *opium*, larga manu adhibitum, optime

optime inservit. Nonnunquam *sections nervi*, sive affecti, sive malorum conductoris, aut ipsa *tumoris nervosi*, aut, si liceat, *visceris affecti extirpatione*, constans magia obtinetur curationis successus. Patet inde *chirurgias in morbos nervosos imperium*.

18. Morbi, ex *diathesi nervea*, praepediuntur: matrimonia inter homines morbis istis, saltem gravissimis, laborantes impediendo ²¹⁾, — alias caelibatui arctissimos limites ponendo ²²⁾, — coitum ad praecepta moralia et diaetetica exercendo ²³⁾, — praecipue ubera nutricis senescentiae proli diu concedendo ²⁴⁾ — in educatione infantum recensitas noxas ²⁵⁾ evitando, — sub incremento corporis victum nutrientem, cibos gelatinosos, motumque in aëre libero concedendo, — onaniae, praesertim in domibus educationi publicae dicatae, occurrendo, — artium liberalium exercitium restringendo — ecclesias, loca publica, theatra, legibus politicae medicae submitiendo, — victum simplicem, remotis liquoribus fermentatis aliisque calidis, eligendo, — aërem purum, debitae temperaturae, inspirando, — somno debitae horis, motui et quieti, ut decet, indulgendo, — animi

Prophylaxis
diath.
nerveae.

21) J. P. FRANK *System einer vollständigen med. Polizey*.

1. B. 2. Abth. 3. Abschnitt.

22) Ibid. 1. Abth. 2. Abschnitt.

23) GRUNER diss. de coitu ejusque variis formis quatenus medicorum sunt. Jen. 1794.

24) TISSOT l. c. 25) §. III. 7.

animi pathemata moderando, — verbo vitam simplicem, uniformem, inediam et luxuriam inter medium tenentem, ducendo.

C. morb.
syst.
nerv. ex
diathesi
nervea.

19. Evolutis jam e *diathesi nervea* morbis, prout universum systema nervorum, aut pars illius laborant, — prout causae et curriculum morbi peculiare indicationes suggerunt, aut indicationes rationales plane deficiunt; remotis quocunque in casu, si liceat, noxis, physicis et moralibus, habitaque ratione virium vitalium ac sensibilitatis sive auctae, sive deficientis, sive perversae partium affectarum, — *auxilia* prorsus varia, tum *pharmaceutica* (*interna, externa*), tum *diaetetica* (*physica, psychica*), vel sub paroxysmo, vel tempore libero, scopo curam sive radicalem sive palliativam obtinendi, summa cum patientia, adhibenda, opponuntur. De singulis speciatim.

Mucila-
gines.

20. Occurrente summa sensibilitate systematis nervorum, praecipue nervorum ventriculi et plexus solaris, ad *res mucilaginosas*, ut *decocta radicis orchidis morionis, althaeae officinalis, emulsionis seminum frigidorum majorum, minorum, pyri cydoniae, plantaginis psyllii, nucleorum amygdali communis dulcium* (cum *amaris* nonnullis), *mucilago gummi mimosae niloticae*, (si aegri dulcedinem perferrent) cum *syrupo adianthi capillorum veneris* aut *emulsivo*, vel *saccharo* confugiendum.

Olea ex-
pressa.

21. Sub iisdem rerum positionibus, et imprimis obveniente insigni intestini duodeni aliorumque

rumque tenuium sensibilitate, *olea expressa*, sicuti pndas maris, ita turbas nervorum compescunt. Exhibetur hinc cochleatim *oleum recens nucleorum* vel *amygdali communis* vel *oleae europaeae*, aut *seminum lini usitatissimi*, vel paratur inde *mixtura oleosa* ²⁶⁾. Si alvus simul aperienda sit, *oleum ricini* ²⁷⁾.

22. *Acida*, quatenus *sensum* nervorum or- Acida.
ganis circuitus sanguinis; secretionum et nutritionis dicatorum *obtundunt* ²⁸⁾, sicque vi narcoticorum, contagiorum aliarumque nozarum obstant; pretiosa adversus diathesin nerveam sistunt pharmaca. Spectant praecipue huc *elixirium actidum Halleri*, *acida tartari*, *clstri*, *aceti*, *phosphori*, et maxime gaz carbonicum ²⁹⁾, sive in aqua selterana sive in *pulvere aëroforo* ³⁰⁾ contentum.

23. *Alca-*

26) R. olei amygdalarum dulcium, mucilaginis gummi arabici, syrupi emulsivi aa unciam unam. M. et affunde aquae libram unam. D.

27) *Castor Oil* Anglorum, Dosis uncia semis quaque vice. Cur ricini communis in provinciis meridionalibus Rosae cultura non ordinatur?

28) SOEMMERRING *über den Saft* etc. p. 111.

29) Cfr. HUYELAND in *Journal der pr. Heilkunde*. 1816. Octob. p. 233.

30) R. Pulveris subcarbonatis sodae drsch. duas, acidi tarttrici sicci drsch. sex, sacchari albi unciam dimidiam. Dosis drachma semis cum aqua sub actu effervescentiae. Vel sic: R. Pulveris subcarbonatis sodae scrupulum unum, D. ad chartam caeruleam. R. Pul-

Alcalia.

23. *Alcalia* vero sensum nervorum jamjam semi-extinctum reficiunt, ac ad novos stimulos recipiendos idoneum reddunt ³¹⁾, quod inprimis respectu *ammoniae* probatum est.

Salia media et neutra.

24. In *salibus medijs et neutris imperfectis*, prout acidum vel alcali praedominatur, actio cum acidis aut alcali convenit. Sic *supersulphas aluminæ et potassae* aut *supertartras potassae* egregios effectus temperantes exserunt: sic *subcarbonas* tum *potassae*, tum *sodae*, tum *ammoniae*, nec non *subboras sodae*, virtutem alcalinum aemulatur. Salia media et neutra *perfecta* systemati nervoso fere indifferentia cernuntur. Excipias tamen *nitratem potassae*, utpote aestum sanguinis specificè compescentem ³²⁾.

Absorbentia.

25. *Absorbentia*, praeterquam quod acida primarum viarum absorbent, peculiari etiam modo nervos ventriculi, ne dicamus universum systema nervorum, afficiunt. *Magnesiâ* saltem, *conchis* prae-

veris acidi tartrici, vel citrini sicci, scrupulum unum. D. ad chartam albam. Solvatur dein prius illa in vase aquae frigidae, ac addatur dein pulvis hic, ac hauriatur sub actu effervescentiae.

31) A. HUMBOLDT *Versuch über die gereizte Muskel- und Nervenfaser*. Berlin 1797.

32) Nitro praecipue virtus celebrati quondam *pulveris praecipitantis* adscribenda est. Sic praeparatur: R. Pulveris nitratis potassae, sulphatis potassae aa unciam semis. Corallorum rubrorum praeparatorum scrupulos duos. Fol. auri No. 1. M. Dosis drachma semis.

praeparatis, pulvere carbonum, fuliginis splendentis, et inprimis lapidibus cancerorum, scopo temperante, cum successu utimur.

26. Cum effectibus absorbentium ii *ossium*, *Ossa*, *unguium* aliarumque partium animalium conveniunt. De *rasura dentis hippopotami, eboris, cornu cervi, cranii humani, talorum leporis, ungulae alcis*, nec non de *pulvere secundinae humanae, lumbrici terrestres, hirundinum exsiccatarum* etc. loquimur, — de quibus rebus FR. HOFFMANNUS fatetur: „*eas afficere partes nervosas, earumque effrenos motus compescere*“³³⁾: quod de nonnullis horum pharmacorum ipsi revera experti sumus. Forte ammonia, phosphorus, gelatina in iis agit. Ut ut sit, artis nostrae in morbos nervosos imperium tam angustis limitibus circumscribitur, ut, pharmaca, seculorum auctoritate suffulta, ob id, quod a priori absurda videantur, sine praevio experimentalis examine rejicere, pro piaculo habeamus.

27. *Corporum combustibilium* in systema nervorum actio medicatrix necdum propatulo est. *Sulphuris* nexum cum *electricitate* suspicamur. Corpora combustibilia.

28. Experimentis ulterioribus relinquimus, *Metalla*, ut determinent: quo pacto varia *metalla* eorumque *oxyda* et *salia* universum corpus humanum afficiant? — an inter ea praesto sint, quae corporis pro electricitate atmosphaerica capacitatem immutent? — an inde electricitatis morbo fluxui

33) Op. c. T. IV. c. I. §. II.

Frank Praex, II. I. 1.

fluxui obstat? — an principium nerveum, utpote tot electricitatis phaenomena exhibens, affinitatem cum metallis intus sumtis agnoscat? — an phaenomena magnetismi animalis, prout aeger variis metallis usus sit, varia observentur? etc. — Interea constat *oxydum bismuthi* vim sedantem, sat permanentem, in nervos ventriculi exercere. Haec ipsa vis in plexum coeliacum aliosque in plexus nervorum abdominalium ab *oxydo zinei* animadvertitur. *Aetas plumbi* sive *crystallisatus*, sivi *liquidus* peculiarem affinitatem cum nervis intestinorum, et instrumentorum motus, agnoscit. Idem de nervis pulmonis contenditur ³⁴⁾. De *graphite*, *plumbagine* et *magnesio* in systema nervorum actione observationes desideramus. Forsan ex eorum vi contra impetigines, ad peculiare in nervos cutis imperium concludere liceret? *Subsulphas cupri* et *ammoniae* ³⁵⁾ vim suam irritantem, alterantem ultra ventriculum et plexus nervorum abdominales, praecipue ad nervum sympathicum magnum extendit. *Mercurius* in universum systema nervorum, praecipue autem in cerebrum et medullam spinalem, imperium habet. Inter praeparata mercurialia peculiari commendatione *cinnabaris*, quatenus nervis amicissima, digna est ³⁶⁾. *Argenti fusi* actio cum ea cupri ammonia-

34) BROUSSAIS *histoire des phlegmasies*, Paris 1808. p. 392.

35) Cuprum ammoniacale.

36) Debetur ei potissimum virtus, jure celebrati nobis-

menstrualis convenit. De auri virtute experientia destituimur³⁷⁾. *Mars*, ut decet exhibitus³⁸⁾, universum systema nervorum corroborat, et in morbis spasmodicis, debilitate stipatis, praesertim in virginibus, laesa simul uteri functione, princeps sistit remedium. Maxime conducunt aquae ferruginae, simul gas acidum carbonicum continentia³⁹⁾. Supplentur a carbonate ferri, ab oxydo ferri⁴⁰⁾ et a tinctura malatis ferri. Indicatis simul remediis volatilibus, tinctura aetherea martialis sive Klaprothi sive Bestuscheffi excellit.

29. *Cortex cinchonae officinalis* peculiarem in nervum sympathicum actionem exercet⁴¹⁾, et musculorum imperio voluntatis subditorum adauget tonum. Non quaevis vero nervorum conditio corticem fert. Tutissimum ejus praeparatum infusum frigidum. Cinchonam aemulantur cortex pruni padi et viscum quercinum⁴²⁾.

Cincho-
na, pru-
nus pa-
dus, vi-
scum
querci-
num.

H 2

30. Sy-

que nativissimi, pulveris antispasmodici rubri Stahlit.
R. Nitri purissimi crystallisati, tartari vitriolati aa
uncias duas. Cinnabaris purissimae draahmam unam
at semis, M. f. pulvis subtilissimus. Dosis a scrupulo
ad draahmam semis bis, ter de die.

37) Foliiis taman auri cum variis formulis elegantiae gra-
tia utimur.

38) Cautalae sub usu hujus pharssai observandae pul-
chre recansitas suare a MARCATO: de tacto praesidio-
rum usu. L. II. c. 7.

39) Edit. 2. P. I. Vol. I. sect. II. c. VI. §. XXXVIII. No. 33.

40) Aethiops martialis. 41) Сокращенно I. c. p. 108.

42) Dosis pulveris scrupulus unus bis terve de die. De-

Amara.

30. Systema nervorum abdominale amara optime instaurant, ut *quassia amara* ⁴³⁾, *centaurea benedicta* ⁴⁴⁾, *gentiana lutea* ⁴⁵⁾, *gentiana centaurium* ⁴⁶⁾, *menyanthes trifoliata* ⁴⁷⁾, *achillea millefolium* ⁴⁸⁾, *verbena officinalis*, *baccaea convallariae majalis* ⁴⁹⁾, *fel bovis tauri* ⁵⁰⁾, quae tamen pharmaca diu continuata, rite monente CULLEN ⁵¹⁾, nocivam exercent vim.

Amara-aromatica.

31. Ubi aeger a principio aromatico non irritatur, potius amara-aromatica, ut *asorus calamus*, *betonica officinalis* ⁵²⁾, *artemisia* sive *abrotanum*

coctum paratur ex uncia semis visci et aquae s. q. ad colat. unciarum decem.

43) A drachma aemis ligni quassiae tota libra aquae, in qua decoquitur, sufficientem contrahit pro usu medico amaritiem.

44) Extractum a drachma ad drachmas duas de die in aqua aromatica.

45) Extractum sub forma pilularum aut tincturae e. c. drachmam ad unciam unam aquae cinamomi. D. s. cochleare coffeanum ad cochleare majus vini.

46) Extractum herbae aut summitatum.

47) Extractum sive infusum herbae.

48) Extractum herbae, florum, eorumque infusum.

49) Pulvis a scrupulo ad drachmam.

50) Sub forma pilularum.

51) Mater. medica. p. 64. „I am truly of opinion, that somewhat deleterious in the whole of the bitters is to be suspected.“ Cfr. GÜNTHER über die medizinische Anwendung des Zuckers, Köln 1816.

52) Herba.

tanum sive absinthium ⁵³), *citrus aurantium* ⁵⁴) adhibenda. Egregiae sunt compositiones: *essentia corticis aurantium cum vino malvasico* ⁵⁵), *elixir stomachicum temperatum Hoffmanni* ⁵⁶), *elixir stomachicum Rosensteini* ⁵⁷) et *tinctura stomachica Whyttii* ⁵⁸).

32. Turbas aut inertiam systematis nervorum cum atoniae notis *vegetabilia aromatica* lenire solent, quorum varia in varios corporis humani nervos praecipuam actionem habent. Sic potissimum afficiuntur ventriculi nervi — a *radice ari maculati*, ab *herba menthae crispae et piperitidis*; diaphragmatis nervi — a *seminibus anethi graveolentis*; intestinorum nervi — a *seminibus cumini*

Vegetabilia aromatica.

53) Extractum herbae ac summitatum sub forma pilularum.

54) Cortex sive flavado, folia, flores.

55) Ad unciam dimidiam de die: ac si major amarities desideretur, cum drachma semis extracti centaureae benedictae.

56) Ph. W. p. 53.

57) R. Cort. aurant. rec. drach. sex. contus. adde extract. gent. rubr. unc. semis. Digere cum libra vini Portugall. Col. D. cochl. cof. unum alterumve in vino vel aqua cismomi.

58) R. Cort. peruvian. pulv. unc. quatuor. Rad. Gentian. Cort. Aurant. aa unc. unam et semis. Misc. infund. spirit. vini Gallici libras quatuor in balneo arenae per dies sex et cola. Subinde cuilibet tincturae librae una vel plures unciae spiritus lavendulae compositi admiscantur. Dosis ut supra (57).

cumini cymini, anethi foeniculi, a radice allii sativi; uteri nervi — a floribus matricariae chamomillae, ab herbis nepetae catariae, origani vulgaris, ligustici, rutae graveolentis, chenopodii olidi; testiculorum nervi — a baccis viticis agni casti; cerebrum — ab herba teucrii mari, a seminibus coriandri sativi, a ligno santali albi, a radice doronici bardelianchis; medulla spinalis — ab herba chenopodii ambrosioidis; atque universum tandem systema nervorum, imprimis nervi motibus voluntariis dicti, ab herbis origani majoranae, santoliniae chamaecyparissi, rosmarini officinalis, dracorephali moldavici, melissae citrinae, thymi vulgaris, hyssopi officinalis, satureiae hortensis, ocimi basilici, teucrii chamaedryos, artemisiae vulgaris, a seminibus atriplicis hortensis, pimpinellae anisi, a radicibus valerianae officinalis et phu, aristolochiae serpentariae, angelicae archangelicae, ireos florentinae, iululae helenii; a floribus tiliae Europaeae, citri aurantiaci, lavendulae spicae, nec non a specie lavendulae stoechadis.

Aromata. 33. Universum quoque systema, atque praecipue nervos olfactus, gustus, ventriculi, partium genitalium et cordis excitant aromata, ut *laurus cinamomum, cassia, sassafras, benzoin, wintera aromatica, epidendron vanilla, maranta galanga, amomum zingiber, cardamomum, caryophyllus aromaticus, myrtus pimenta, piper nigrum et cubeba, nux moschata, flores macis eorumque sive*

sive *aquae destillatae*, sive *olea essentialia*, sive *tincturae*, sive *elaeosacchara*. Ita *oleum cajuput*.

34. Accedit *camphora* aurae instar sese super Camphora.
totum nervorum systema expandens, languentes
semique extinctas illius vires extollens, motus ab-
normes ac dolores cum aut ex debilitate obortos
compescens, cum nervis cutaneis et partium geni-
talium affinitatem peculiarem alens, irritationem
ab hisce ultimis cerebro illatam saepe compescens,
tumultum systematis arteriosi, nervis saepe profu-
cium, excitans, ac per sudorem probabiliter res
subtiles, prius systemati nervorum infensas, eli-
minans.

35. *Moschus*, diathesi nerveae in infantibus Moschus.
et senibus accommodatus, feminis odoris gratia Castoreum.
plerumque adversus, praecipue nervos instrumen- um. Am-
torum motus, diaphragmatis et arteriarum afficiens, bra. Suc-
vires universi systematis nervorum recreat. Idem cium.
castoreum, nervis uterinis, et *ambra grisea*, ner-
vis testicularum praecipue affinis, praestant. De
succino, olim in morbis nervosis usitatissimo, forte
electricam in nervos actionem habente, propria
experientia destituimur.

36. *Succina ammoniac*, nervis summo pere Succinae
excitabilibus accommodatus, in specie systema ammon.
uterinum afficit. Idem de *carbonate ammoniac* Carbonas
empyreumatico valet. *Oleo animali Dippelii*, ammon.
ob intolerabilem foetorem raro uti licet. *Phos-* empyreu-
phorum pro usu interno nemini commendamus. mat. Ole-
um ani-
male Dip-
pelii,
Phos-
phor.

37. Quodsi

Aether.

37. Quodsi stimulus diffusivus ad languentem systematis nervorum actionem rapide excitandam quaeratur, *aether* praesto est *sulphureus*, *nitricus*, *acetosus*. Permanentem magis virtutem *aether sulphureus alcoholisatus* ⁵⁹⁾ agnoscit; ac peculiari prorsus pacto *aether nitricus alcoholisatus* ⁶⁰⁾ nervos viarum urinalium aggreditur, impetum vasorum sanguiferorum simul compescens, flatum expellens, ac nervis summopere sensibilibus optime accommodatus.

Gummi
resinae.

38. Amara inter et volatilia *gummi resinae* locum occupant, remedii genus, praecipue nervis abdominalibus et uterinis amicum ac in genere in morbis nervosis debilitate stipatis pretiosum. Potiores desumuntur a *bubone galbano*, *pastinaca opopanace*, *heracleo gummiifero*, *ferula persica* et incomparabili *ferula assa foetida*.

Aeria.

39. Tentatis incassum pharmacis hucusque allatis, ac obvenientibus signis inertiam nervorum ventriculi indicantibus, ad *aeria* interdum recurrere licet, utpote quae stomachi nervos vehementer vellicando, tum cerebrum, tum alias partes in consensum trahunt, et ad graves aliquando morbos auferendos idonea inveniuntur. Hujusmodi sunt: *semina sinapis nigrae*, *radix anthemidis pyrethri*, *scillae marinae*, *flores cardamines pratensis*, *herba anagallidis arvensis*, *sedi acris*, *juniperi sabinae*,
fructus

59) Liqueur anodynus mineralis HOFFMANNI.

60) Spiritus nitri dulcis.

fructus capsici annui, cantharides. Et actionem irritantem, quam *tartras stibii et potassae, radix cephaelidis ipecacuanhae* aut *asarum europaei* in ventriculi nervos exercent, silentio non praeteribimus.

40. Jam vero ad *narcotica* nos convertimus, Narcoti-
 praevis plerumque erethismo, fontem principii ^{ca.}
 vitalis exhaustientia, facultates animi, sensum et
 motum, secretiones et excretiones caloremque ani-
 malem, perturbantia, suspendentia, delentia;
 quae pharmaca, sive potius, quae venena, pru-
 denter et rite administrata, ad potiora adversus
 morbos systematis nervorum idiopathicos spectant
 auxilia. Praeter generalem autem narcoticorum
 vim, quodvis eorum cum variis systematis nervorum
 partibus specialem agnoscit affinitatem. Ex effe-
 ctibus enim sat constantibus hujusmodi remedio-
 rum concludere licet, afficere *opium* — nervos
 arteriarum, sensuum, non exceptis iis sensus uni-
 versalis interni; *agaricum muscarium* et *atropam*
mandragoram — universum sensorium commune;
hyoscyamum nigrum — nervos opticos et ciliares;
helleborum nigrum — nervos ventriculi, intesti-
 norum uteri et renum; *daturam stramonium* —
 nervos oculorum et partium genitalium; *anemo-
 nen pratensem* — nervos opticos et ciliares; *digi-
 talem purpuream* — hos ipsos nervos, praecipue
 autem nervum supraorbitalem, par vagum et sym-
 pathicum, potissimum in plexu cardiaco; *atropam*
belladonnam — nervos linguae et pharyngis; *co-
 nium*

nium maculatum — nervos glandularum et systematis uterini; aconitum napellum et strychnon nucem vomicam — nervos extremitatum, musculorum, cutis; nicotianam tabacum — nervos ventriculi et intestinorum; lactucam virosam — plexus nervorum pulmonalium et cardiacorum; ne sermonem instituamus de aliis narcoticis, scilicet de croco sativa, cynoglossio officinali, pasonia officinali, ledο palustri, coccinella septempunctata ac acido Borussico, nec non de corporibus illud continentibus, ut prunus laurocerasus, amygdalus communis, amara, prunus padus. Quid de substantiis alcaliis nuper ex maxima allatorum pharmacorum parte extractis, deque illarum variis cum acidis connubiis, potlasimum de morphio, narcotina etc. sentiendum sit, tempus docebit. Inter ea aliorum, mutilationem pharmacorum adversantium, opinioni ⁶¹⁾ adstipulamur.

41. Phar-

61) HUFELAND vir clarus perbelle exclamat. „Was folgt nun für ein Resultat aus allen diesen chemischen Untersuchungen (des Opium's) für den Arzt? — Weder das Morphinum allein ist Opium, noch das Meconum, noch das Narcotin, noch der Extractivstoff, sondern, was selbst der grosse Chemiker Orfila gestohet, die Wirkung des Opiums geht hervor aus der Vereinigung aller dieser Stoffe, und, ich setze hinzu, aus der ganz eigenthümlichen Art der Verbindung und des Daseyns, die aber die chemische Analyse zerstört. Und die Lehre für die Praxis ist: Wer Opium brauchen will, der

41. *Pharmaca* non solum per os suppedi- Phar. ex-
terna.
tanda, sed nervis affectis quo propius id fieri pot-
est, remota aliquando vesicatorii ope epidermi-
de *), admovenda 62).

42. Laborantibus itaque nervis abdominis vel Clysteres,
supposi-
toria.
uteri, juxta indicationes stabilitas, *clysteres demul-
centes* 63), *oleosi* 64), *aromatici* 65), *excitantes* 66),
gummiresinosi 67), *narcotici* 68) praescribendi
sunt.

branche des Opium selbst.“ (*Journal der pr.
Heilkunde*. 1829. Julius. p. 26).

*) *Methodus* sic dicta *endermica*, de qua plurima legun-
tur in *OMODI annali universali di medicina* 1829.
Marzo, Maggio, Luglio, Agosto; 1830. Gennaio,
Luglio.

62) Quam medendi rationem maxime inculcavit FAL-
PLAZEN (prax. tract.) auctor mihi carissimus.

63) Ex decocto seminum lini, aut amyli, aut malvae,
aut althaeae, adulto ad uncias sex.

64) Ex oleo aut amygdalarum, aut olivarum, aut semi-
num lini ad uncias quatuor.

65) Ex infuso florum matricariae chamomillae, herbae
rutae graveolentia, addito illorum oleo cocto.

66) Pro adultis, ex infuso florum matricariae chamomil-
lae ad uncias quatuor, — spiritu nitri dulcis ad scrup-
ulos duos, oleo cajuput ad guttas quatuor (*Enema
anticolicum* VOGELII), aut cum *samphora* subacta ad
drachmam semis, — aut cum *tartaro emetico* ad gra-
ma decem.

67) R. Gummi resinae ferulae assae foetidae, vitello ovo-
rum subactas, drachmam unam. Infusi chamomillae
libram semis. D. vel: R. Herbae rutae, sabinae aa
unciam dimidiam coq. cum s. q. aquae ad colat. un-

sunt. Clysteres quoque ex fumo et ex vapore, nec non suppositoria ⁶⁹⁾ haud negligenda forent.

Injectio
in vagi-
nam.

43. Nisi agatur de virgine, ab injectionibus, praesertim aromaticis ⁷⁰⁾ et narcoticis ⁷¹⁾ in vaginam, magnum in morbis nervosis ex affectione uteri haud inflammatoria, obtinetur levamen. Item a vaporibus infundibuli ope susceptis et in vaginam introductis. Et pessarium ⁷²⁾ orificio uteri introduci potest.

Mastica-
toria.
Gargaris-
mata.

44. In morbis plurimis cerebri masticatoria (apophlegmatismi ⁷³⁾) et gargarismata ⁷⁴⁾, quippe directo

ciarum sex, adde assae foetidae, in olei olivarum uncia una et olei anccini drachma dimidia subactae, drachmas duas. D.

68) Infus. flor. chamomillae unc. quatuor. olei hyoscyami cocti drachmas duas, — aut laudani liquidi Sydenhami guttas viginti.

69) R. Assae foetidae drachm. duas. castor. scrupul. unum. f. c. melle ad debitam spissitudinem decocto suppositorium. Aut R. Theriacae venetae. Pulveris florum chamomillae ʒʒ drachm. duas. F. c. melle suppositorium. Aut R. Fellis tauri, ancci radicia allii, pulver. rad. calam. aromat. ʒʒ drachm. duas. F. c. melle suppositorium (Cavendum, ne immissa in intestinum obliviscamur).

70) Inf. ex floribus matricariae chamomillae atque herba dracocephali moldavici sive rutae.

71) Infusum herbae conii maculati sive hyoscyami nigri.

72) R. Pulv. opii puri, castorei aa scrup. unum, rad. ireos florent. drachm. duas. M. f. c. s. q. mellis pessarium.

73) Radix anthemidis pyrethri, — acori calami, — raphani rustici.

directe in contiguos nervos linguae et palati agentia, conducunt. Et auctus cruoris affluxus ad organa salivalia, et salivae ipsius copiosior secretio emolumentum promittunt. Ubi aeger mentis non compos est, oris tunc cavitas remediis analogis illinitur 75).

45. Per *nares* quoque ad cerebrum patet aditus, ac sane ad languentem illius actionem excitandam, (absente plethora capitis) multum valent *odoramenta* 76), *sternutatoria* 77), *subfumi-*
gia 78),

Odora-
menta,
sternuta-
toria,
subfumi-
gia.

74) R. *Seminum sinapis nigrae*. Radicis *anthemidis pyrethri* aa unciam semis. coqu. e. s. q. aquae ad colat. librae unius, add. mellis acetati unciam unam. D. pro gargarismate. Aut R. *Infusi rosarum rubrarum* libram unam. *Subcarbonatis ammoniac* (*Spiritus salis ammoniaci*) drachmam unam. *Spiritus lavendulae*, mellis rosarum aa unciam unam.

75) *Seminum sinapis nigrae*, *piperis longi*, radicis *pyrethri* aa drachmam unam. Mellis rosarum unæ. duas, M. D. S. pro illinitione oris.

76) *Acetum radicale*, ammonia pura (est ante, ne nimium naribus attrahatur, uti accidit in casu descripto in *Journal de médecine, chirurgie et pharmacie par Mr. LENOUX* 15. Mai), *the aromatic spirit of vinegar*, *ess. de lue*, solutio assae foetidae in aceto radicali, acetum hystericum correctum *Mynsiehti* (VOOZ l. c. p. 9), *spiritus salis ammoniaci vinosus cum essentia castorei et oleo essentiali rutae, corium* (*Juchten-Leder*). Paratur et *globus odoriferus*, vulgo *pomum*. R. Radicis et seminis *paconiae officinalis* aa drachm. duas, foliorum *rutae graveolentis*, *hyssopi officinalis*, seminum *nigellae sativae*, *coriandri sativi* aa drachm. unaro,

126 DE MORBIS SYSTEMATIS NERVORUM

gia⁷⁸⁾, vapores⁷⁹⁾, pessaria narium⁸⁰⁾, res naribus illinitae⁸¹⁾, aut ad eorum vellicationem⁸²⁾ adhibitae.

46. Si-

resinae elsti cretici (ladaui) unciam semis, styracis officinalis cal. drachm. duas, Gummi resinae heraclei gummiferi in aceto sol. q. s. ut fiat *pomum*.

77) Variæ pulverum sternutatoriorum *formulae* apud LUD. VOGELIUM inveniuntur (*Allgemeines medicinisches Formel- oder Recept- Lexicon. Erf. 1804. 2. B. p. 337 sq.*). En nostram, si nicotianas hispanicae pulvis non sufficeret. R. Pulveris herbae origani majoranae, ocimi basilici, radices ireos florentinae, sacchari purissimi aa drachmas duas. D. Licet scrupulum pulveris radicia asari europaei addere. Euphorbium pro periculoso declaro errhino cum CULLENTO. Exhibentur errhina mane jejuno ventriculo.

78) Capilli humani aceto prius madefacti et dein nsti, pennae accensae, aut R. Gummi galbani, cornu cervi rasi aa drachm. duas. Castorei drachmam semis. Projiciatur portio hujus pulveris super carbones et fumum excipiat seger. Vulgus in Lithnanis summo cum fructu in variis morbis nervosis utitur *subfumigis* ex *herbis aromaticis* et *narcoticis* elicitis, quam medendi rationem commendo. Adhiberi solent: *anthyllis vulneraria*, *hypericum perforatum*, *mentha crispa*, *thymus serpyllum*, *gnaphalium arenarium*, *drosera rotundifolia*, *medicago lupulina* et *falcata*, *artemisia abrotanum*, *onopordon acanthium*, *polygonum aviculare*, *tormentilla erecta*, *parnassia palustris*.

79) Ex aqua et aceto rosarum.

80) Ex butyro majoranae, addita, si fortis exposcatnr stimulus, radice pyrethri.

81) R. Succi herbarum rutae graveolentis, origani ma-

46. Sicuti a salivae aucta excretionc, ita a *Laery-*
rebus laeymas elicientibus, a *caepis* scilicet, de- *mae eli-*
 tracto cortice, naribus admotis, a *foliis clematis* *ciendae.*
rectae contritis, ac ab odore *cochleariae armora-*
ecae emolumentum expectandum.

47. *Auribus* tandem *pharmaca* prudenter in- *Pharma-*
 trudi possunt, ut effectum in cerebrum exercent. *ca auri-*
cularia.

48. Postremo *sensus tactus* auxilia, nervo- *Alia ex-*
 rum abnormem conditionem corrigentia, admit- *terna.*
 tit; ut *varia balneorum genera*, *epithemata*, *un-*
ctiones, *frictiones*, *fasciae*, *emplastra*, et *auxilia*
chirurgica validiora. Nec *amuleta* omnino sper-
 nenda.

49. *Balneum aquae tepidae* (a 15 — ad — *Varia*
 29 gr. Th. R.) in morbis nervosis idiopathicis cum *balneo-*
 erethismo, calore ardente cutis, insomniis aliis- *rum ge-*
 que phaenomenis in specie indicandis, omnium *nera.*
 consensu ²¹⁾ inter potiora auxilia locari meretur.

Eligi-

foranse, aceti fortissimi aa p. aequales. Penicillo vel
 penna hinc intinctis, nares intrinsecus inungantur.
 Val sic: R. Castorei, assae foetidae aa p. aequ. solv.
 in aceto fortissimo. D. adiam usui. Etiam sic: R.
 Succi radicum raphani, caeparum, ireos, aa p. aequ.
 D. S. ut supra. Aut indatur naribus gutta olei essen-
 tialis lavendulae spicae, vel balsamus vitae HOFFMAN-
 ni externus gossypio exceptus.

82) Ope spicae frumanti, setae porciniae, straminis, pili
 crascloris etc.

83) Fr. HOFFMANN de balneorum ex aqua dulci prae-
 stantissimo in affectibus internis usu. Opp. Vol. V.
 Edit. genev. 1748. Cfr. TISSOT l. c. MARCARD aber

Eligitur potissimum aqua fluvistilis, ac prout actio major desideretur sive emolliens, sive tonica, sive irritans, sive narcotica, balneo tepido *lac*, *oleum* ⁸⁴⁾, *sapo*, *juscula carnea* ⁸⁵⁾, *species emollientes* ⁸⁶⁾, *globuli martiales* ⁸⁷⁾, *vegetabilia aromatica* ⁸⁸⁾, *narcotica* ⁸⁹⁾ adduntur. Quae ceterum balnea a *thermis*, quas natura suppeditat ⁹⁰⁾, longe antecelli, nemo inficiabitur. *Balneum calidum* (a 29 — ad — 34 gr. Th. R.) rarius et non nisi in morbis nervosis cum sensibilitate deficiente locum obtinet. Indicatio enim majori caloris gradu potius ad *balneum siccum* ⁹¹⁾, *vaporis* ⁹²⁾, *terrae ther-*

die Natur und den Gebrauch der Bäder. Hannover 1793. REIL l. c. p. 176.

84) MARGARD l. c. p. 222. Et oleum per se pro balneis adhibebatur in morbis nervosis (SAVANAROLA de balneis omnibus Italiae).

85) *Bains de tripes.*

86) Herba malvae rotundifoliae, radix althaeae officinalis, semina lini usitatissimi, furfures.

87) *Boules martiales.*

88) Herbae dracocephali moldavici, salviae officinalis, origani majoranae, thymi vulgaris, artemisiae vulgaris, juniperi communis, radix acori calami etc.

89) Herba conii maculati, hyoscyami nigri, ledi palustris — et apud divites, veterum Romanorum more, petala croci sativi.

90) P. I. Vol. I. sect. II. cap. VI. §. XXXVIII. No. 21.

91) *Bains d'étuves sèches.*

92) *Bains de vapeurs.* L. c. operis. adde SCHILLING über den Gebrauch der Dampfbäder und Douchen.

thermalis ⁹³⁾, *stercoris* ⁹⁴⁾ aut *arenæ* ⁹⁵⁾ confugitur. — *Balnea frigida* (sub gr. Th. R. 15), dummodo caute ⁹⁶⁾ et brevi temporis spatio adhibita, in morbis ex sensibilitate nimia, perversa vel et deficiente, egregie conducunt. Maxime *balneum maris* ⁹⁷⁾ aut *fluminis rapidi*, cum undis scilicet vi corpus allidentibus, præcipue cum *immersione*, *præcipitatione* ⁹⁸⁾, *natatione* ⁹⁹⁾, præsentente custode, commendari merentur. *Balnea sub-calda pedum* ¹⁰⁰⁾ vel *manuum* ¹⁰¹⁾, *simplicia* aut *composita* ¹⁰²⁾, nec non *semicupium*, theoriam *revulsio-*
nis confirmant. *Balnea frigida* æmulantur, *lotio*,
adspers-

Leipz. 1829. CRR. HILLER *das Dampfbad, seine Einrichtung, Wirkung und Anwendung*. Dresd. 1829.

93) *Bains de boues* ad 30—34 gr. Th. R.

94) *Bains de fumier*.

95) ORIBASIIUS de siccatione per arenam ex HERODOTI libro de remediis extrinsecus occurrentibus. Cap. VIII. ARTIUS de insolatione et arenæ aggestione, ac aliis vaporatoris fomentis ex Antyllo. LORREL in HUFSLAND'S und HARLESS'S Journ. der pr. Heilk. 1815. Juny p. 56.

96) De periculo balnei frigidi lege, præter MARCARDUM, LORRYUM. Op. c. T. 2. p. 366.

97) L. op. citato. 98) *Sturz-Bad*.

99) GRÜNER de natatione frigida magno sanitatis præsidio. Jenæ 1788.

100) FR. HOFFMANN de pediluviorum usu. Opp.

101) ALBERTI de menuluvii usu medico. Hal. 1746.

102) Cum sale, fursuribus, seminibus sinapis nigrae, radice cochleariae armoracæ.

*adpersio cum aqua frigida, balneum irrorans*¹⁰³⁾ et *embrocatio*¹⁰⁴⁾. Aliquando *balnea localia frigida et calida*, variis corporis humani partibus simul cum successu adhibentur. Postremo *balneum aeris*, quod FRANKLINII nomen obtinuit, quo scilicet hominis denudatum corpus atmosphaerae per quoddam tempus exponitur, silentio non est praetereundum. Et *balnea* ope variorum *gasium* commendantur¹⁰⁵⁾.

Epithemata.

50. *Epithemata humida, sicca*, nunc partibus, in quibus systema nervorum praecipue affectum est, nunc locis cum illis maxime consentientibus, *frigida*¹⁰⁶⁾, *calida*¹⁰⁷⁾, *emollientia*¹⁰⁸⁾, *resolventia*¹⁰⁹⁾, *anodyna*¹¹⁰⁾, *aromatica*¹¹¹⁾ applicantur. Spectat huc et *fokus animalis*¹¹²⁾.

51. Un-

103) Traufbad. ANGL. Shower bath.

104) Tropfbad. GALL. La douche.

105) HUVSLAND's Journ. der pr. Heilkunde 1816. Octob.

106) Glacies contusa sive nix in vesica porcina, — aqua frigida, — fomentatio frigida Schmuckert, — folius cephalicus Vogleri (ex aqua fontis, muriate ammoniacae, et vino, addito, si placeat, nitrate potassae).

107) Uroci aqua fervida repleti, lateres, lintea, furfures, cineres, avena calefacta.

108) Mica panis albi cum lacte, — cataplasma ex herba malvae, althaeae, aceminibus lini, spongia lacte aut aqua tepida imbuta.

109) R. Saponis alicantini uncias tres, solve in aquae calcis libra duabus, adde alcohol uncias quinque. — Acetas ammoniacae, — vapores, — species sic dictae resolventes siccae.

51. *Unctionem emollientem* ¹¹³⁾, *irritan-* Unctio-
tem ¹¹⁴⁾, *anodynam* ¹¹⁵⁾, praecipue autem *frietio-* nes, fri-
nem siccam ¹¹⁶⁾, *humidam* ¹¹⁷⁾, secundum curri-

I 2

culum

110) Mica panis albi cum lacta et croco, cum laudano, herba malvae cum herba hyoscyami aut conii maculati (ast caute et solum in locis a cerebro remotis), in emplasma redacta, — aut *sacculi* ex iisdem herbis *stocis* aut aliis aromaticis formati. R. Baccarum et foliorum myrti communis, baccarum lauri, farinae seminum trigonellae foeni graeci, radicis ireos florentinae aa unciam unam. Conc. d. pro sacculo.

111) R. Panis tostii ad magnitudinem palmae, inspergo superficiei pulveris cinnamomi, nucis moschatae, florum macis aa scrupulum unum, irroretur vini malacensis fervidi q. s. et applic. inter lintea subtilissima — species aromaticae Pharm. Borussicae.

112) Canis, felis, gallina corporis parti viva applicita, attactus cum vola manuum, forte ob solum calorem, forte magnetismi animalis causae, effecta in systema nervorum non destituuntur. Idem de pellibus vulpinis, leporinis, aut de plumis anserinis, columbarum, forte ob electricitatem valet. Interdum fons cum animali recentissime mactato ac dimidiato, vel cum visceribus adhuc calidis conspicuos effectus producit.

113) Cum oleo olivarum, amygdalarum, seminum lini, adipe (adepe variorum animalium domesticorum, ferorum, ipsiusque hominis apud veteres in usu erat).

114) Cum succo euphorbiarum, chelidonii majoris, oleo terebinthinae, solutione phosphori in oleo.

115) Cum oleo hyoscyami, opio in oleo subacto.

116) Cum melle, pannis lencis, simplicibus, vel fumo thuris, mastichis, benzoes, imbutis, — cum pectine setaceo.

culum columnae vertebralis et nervorum affectorum, non negligendam esse, debitis locis palam fiet. Aliquando *fascia* nervorum sensibilitatem imminuit, tonumque auget. Eum languentem excitant *urticatio, vellicatio, pectinatio*.

Emplastra.

52. Minus incommodi pariunt ac diuturniorem actionem exerunt *emplastra* varia, *emollientia* ¹¹⁸⁾, *irritantia* ¹¹⁹⁾, *anodyna* ¹²⁰⁾, super caput, ad columnam vertebralem, ad regionem epigastricam, hypogastricam etc.

Auxilia chirurgica validiora.

53. Praeter indicationes jam stabilitas ¹²¹⁾, manus chirurgica exposcitur aliquando in morbis nervo-

117) Praeter frictiones cum vino calido, alcohol camphorato, spiritus et balsami varii mihi familiares sunt, e. c. spiritus lavendulae simplex, compositus, liliorum convallium, rosis marini, melissae, mastichinus, nardis moschatae, saponatus, — balsami rutae, majoranae, lavendulae, caryophyllorum, cinnamomi, opodeldoci, vitae externus Hoffmanni, tinctura cantharidum.

118) R. Spermatis ceti, olei amygdalarum, cereae flavae p. aequ. f. emplastr.

119) Emplastrum cantharidum perpetuum *Janini*; item *Hoffmanni*, *sinapismus*, — epispasticum *Fulleri* — de majorana — *Schiffenhausii*.

120) R. Galbani, in tinctura castorei soluti et colati, drachmas tres, tacamahacae drachmas duas. Misc. f. emplastrum (antihystericum *Sydenhami*). R. Emplastri de ruino, uncias duas. Olei liliorum drachmas duas. Terebinthinae venetae, drachmam unam. Opii, camphorae, sacchari saturni aa scrupulum unum (Empl. anodyn. *Fulleri*). — emplastrum aromaticum Ph. Borussicae — de belladonna — camphoratum *Stahlii* — de cicuta cum ammoniaco — foetidum Ph. B. — de galbano crocatum — de nicotiana, — E. saponaceum *Barbetti*. E. *Schiffenhausii*.

121) No. 17.

nervosis idiopathicis, tum ad dolorem excitandum, tum ad aegrorum adtentionem quandam in partem dirigendam, tum ad nervorum torporem removendum, tum derivationis gratia. Loquimur praesertim de *fonticulis, setaceis, mord, malleo aestuante* ¹²²), *ferro candente, cucurbitulis siccis et erinium evulsione*.

54. Praeter vim quam *amuleta* in imaginationem hominum credulorum exercent, aliam a *natura rerum appensarum* repetendam, inprimis respectu *radicis anthemidis pyrethri et succini* (utpote corpora aromatica et electrica) admittimus ¹²³).

55. *Balneum electricum, aura electrica, educatio scintillarum* (e parte corporis humani denudata sive panno laneo cooperta), et *ictus electrici*, in morbis cum deleta a praeviis causis traumaticis sensibilitate, permultum praestant ¹²⁴).

56. Idem de *galvanismo*, applicationis facili-
Galvanismus.
 oris et commodioris, valet *). Praeterea electricitas

122) MAYOR *neue glückliche Anwendung der örtlichen Hitze.* IN HUSELAND's Journ. der pr. Heilkunde 1829. Julius. p. 104.

123) *Coralla collo appensa, florente sanitate lacte rubentia, ingruente morbo (verisimiliter vitiosae transpirationis culpa) palluisse vidi.*

124) Auctoribus de usu medico electricitatis, qui a PLOUCQUET recensentur (Repertorium), addi debet STEINBUCK: *Neuere Erfahrungen von der Heilkraft der Electricität.* v. HUSELAND's Journ. der pr. Heilkunde. 1816. Novemb. p. 85.

*) FARRÉ-SALAPART *du galvanisme appliqué à la médecine et de son efficacité dans le traitement des maladies nerveuses etc.* Paris 1828.

134 DE MORBIS SYSTEMATIS NERVORUM

citas galvanica principio vitali magis homogenea est. Quodsi electricitatis et galvanismi virtutes in morbis curandis hodiedum minoris fieri soleant momenti, id immodicae primum laudi tribuendum.

Magnetis-
mus ani-
malis.

57. Sors eadem *magnetismum animale* ad-
secuta est; de quo mirabili phaenomeno respectu
therapiae ¹²⁵⁾ sufficiat meminisse: *contrectationi-
bus corporis aegroti* (discipulis in arte provectio-
ribus indicandis) *systema nervorum* ita aliquando
affici, ut inde pro cura plurimorum morborum
in eo nidulantium haud parum expectari liceat.

Magnetis
applica-
tio, Per-
kinismus.

58. *Magnetem* ¹²⁶⁾ et *Perkinismum* ¹²⁷⁾ ad
curam morborum systematis nervorum commenda-
tos, nunquam adhibuimus.

Regimen
diaeteti-
cum.

59. Singula autem hucusque recensita auxilia
parum vel nil proficerent, nisi simul *regiminis
diaetetici* summus haberetur respectus. *Cibi, mor-
bis uervorum cum nimia sensibilitate* accommodati,
sunt lactei, farinacei, oleracei, porro carnes junio-
rum animalium, avium, piscium, amphibiorum,
fructus horaei, juscula carnea cum avena, hordeo
et herbis sive radicibus subamaris. *In morbis cum*
sensi-

125) Quatenus ad pathologiam spectat Cap. XII. §. XLVI.
2. agamus.

126) TISSOT l. c. Vol. 4. p. 703. LA ROCHE *analyse des
fonctions du système nerveux*. ANDRY et THOURET
l. c. BOLLEN *Nachricht von einem mit dem künstlichen
Magnete gemachten Versuche in einer Nervenkrankheit*.
Hamb. 1775. C. A. BECKER *der mineralische Magneti-
tismus und die Anwendung in der Heilkunst*. Mühl-
hausen 1829.

127) HERHOLDT *von dem Perkinismus*. Kopenh. 1798.

sensibilitate deficiente victus indicatur minus blandus, succulentus, aromaticus, juncula cum cerevisia, vino, et ovio. *Morbi cum anomalis systematis nervorum* cibos exposcunt nulla regula generali determinandos. Juvat hic aliquando *jejunium*, alias *crapula*. In genere tamen morbi e diathesi nervea originem trahentes victum uniformem, facili digestionis, minime flatulentum, pinguedinis expertem, stricto determinatis horis sumendum, reliquis sensibus, praecipue odoratu, gratum, rite masticatum, exposcunt. Sensibilitati morbosae auctae, aqua pura, aquae gase carbonico saturatae, lac, serum lactis; — oppositae, liquores fermentati, praecipue cerevisia, hydromel, vinum, taphia, accommodata sunt. Anomaliae nervosae et hic regulas generales respuunt, quod imprimis de usu theae viridis, cioccolatae et cofeae, nervis nunc infensis, nunc salutaribus, valet. *Aër*, pro re nata siccus, humidus, montuosus, vallium, maritimus et maxime climatis mutatio, veluti totius curae animam constituunt. Generatim *temperatura* modica et constans, morbis e diathesi nervea pullulantibus optime convenit. Et in *vestium* sive *indumentorum* selectu peculiaris diligentia adhibenda ¹²⁸). Addiscant praeterea medici a chirurgis

128) Concesso enim caloris, humiditatis et electricitatis in systema nervorum influxu, aliter fieri haud potest, quam quod vestes, rebus istis pro vehiculo inservientes, vel non inservientes, in morbos hujus systematis influant. Valet id potissimum de lana, serico, pellibus, nec non de ornamentis metallicis: quae metalla,

gis necessitatem, varlis in morbis variam *corporis positionem* ordinandi! Nullibi sane praecepta huc aspectantia majoris momenti sunt, quam in morbis praesertim cerebri et medullae spinalis, in quibus scilicet a positione corporis sive erecta sive horizontali, sors aegrorum pendet. — Ad specialem doctrinam indicationes, quae *motum* et *quietem* respiciunt, remittimus. Ibi stabiliuntur quoque tempus et duratio, quae *somno* et *vigiliis* concedi possunt; eorum ratio, ad cibum, potum, motum, quietem; temperatura dormitorii; conditio lecti, et quid de instinctu, sese sub somniis, per varias suggestiones, manifestante, cogitandum sit. Neque silentio praeteribimus modum *excretionum* corporis ita dirigendi, ut ad labefactatum systema nervorum instaurandum concurrant. *Regimen mentis* saepe primum occupabit locum.

Cura comp-
licatio-
num.

60. Quoties in morbis systematis nervorum *complicationem* arguimus, toties eam primum *methodo praeparatoriâ* abigere studemus. *Complicationes inflammatoriae* et *gastricae* quum omnium communissimae sint, patet curam multorum illorum morborum sanguinis detractionibus, et alvi evacuationibus, SYDENHAMÎ ad exemplum, ordinandam esse.

DE

vel in aegrorum cubiculis, imprimis ut lectorum sulcra, nequaquam indifferentia sunt.

DE
MORBIS ENCEPHALI.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

CAPUT II.

De dolore capitis.

§. VII.

Definitio. Doctrinae limites. Literatura.

1. *Sensatio molesta, variae indolis, e toto* Definitio.
capite aut e parte illius emanans, capitis dicitur
dolor 1).

2. De hoc dolore quatenus *symptomate* fe- Doctri-
brium intermittentium et continuarum, pestis, nae limi-
typhi, exanthematum, ac impetiginum jam egi- tes.
mus, saepiusque adhuc in curriculo hujus operis
acturi sumus. Nunc de illo ut morbo *per se*, vel
reconditae aegritudinis *unico vel saltem praecipuo*
effectu quaestio fit. Morbus hic ob frequentiam,
ob summos cruciatus, et ob difficultatem sanatio-
nis 2), medentium attentione inprimis dignus est.

3. Pro peculiari illius studio, praeter aucto- Literatu-
res de morbis capitis in genere 3) (illis disserta- ra.
tionum inauguralium 4) non exceptis), opera pro-
poni-

1) GERM. *Kopfschmerz, Kopfschmerz*. GALL. *Douleur de tête*. ANGLO. *Head-ach*. ITAL. *Mal di testa*. POL. *Ból głowy*. ROS. *Головоболѣе*.

2) De doloribus capitis, scandalo medicorum difficulter removendo. Diss. JUNKERI, Hal. 1741.

3) Cap. I. §. I. 2.

4) SACHSEN diss. de dolore capitis. Basil. 1577. OLTHERMANN disp. patholog. I. De cephalalgia. Rostoch. 1607.

ponimus HIPPOCRATIS ⁵⁾, CELSI ⁶⁾, GALENI ⁷⁾,
ORIBA-

HELAKH *diss. de dolore capitis. Fr. ad Viadr. 1612.*
FABRICIUS *diss. de cephalalgia. Rostoch. 1617.* SALZ-
MANN *diss. de speciali dignotione et curatione morbo-
rum. Diss. I. de dolore capitis. Argent. 1617.* SCHAL-
LER *diss. I. de dolore capitis. Wittenb. 1617.* SCHIL-
LING *diss. de dolore capitis. Lips. 1619.* AMPERO
diss. de dolore capitis. Rostoch. 1619. SENNERTUS
diss. de cephalalgia. Wittenb. 1630. HORATIUS *diss.
de cephalalgia. Tubing. 1636.* JAC. FABRICIUS *de no-
vantiqno capitis morbo et dolore. Rost. 1640.* MASIUS
de dolore capitis. Regiomont. 1640. ZIMMERMANN
diss. de dolore capitis. Regiomont. 1640. MORBIUS
*diss. de dolore capitis. Jen. 1653. et: diss. de cepha-
lalgia. Helmst. 1671.* HABBACH *diss. de dolore capi-
tis. Altd. 1657.* SCHENK *diss. de dolore capitis. Jen.
1665.* HILBRAND *diss. de neuralgia. Jen. 1668.*
FRITZ *diss. de cephalalgia. Vienn. 1672.* KEMPER *diss.
de capitis dolore. Jen. 1672.* MEINOMIUS *diss. de ce-
phalalgia. Lips. 1672.* SCHALLER *diss. de cephalalgia.
Leid. 1672.* JOHANN *diss. de dolore capitis. Rinteln
1674.* ABEND *diss. de cephalalgia. Leid. 1675.* SCHEL-
HAMMER *diss. de capitis dolore. Jen. 1678.* BODOLO
diss. de cephalalgia. Leid. 1680. BOHN *diss. de cepha-
lalgia. Lips. 1680.* BRUNO *diss. de cephalalgia. Altd.
1683.* GUMBERT *diss. de cephalalgia. Leid. 1684.*
WEDER *diss. de cephalalgia in genere. Jen. 1686.* Ejusd.
diss. de dolore capitis. Jen. 1707. SCHLITT *diss. de
cephalalgia particulari. Ultr. 1689.* HENNINGER *diss.
de cephalalgia. Jen. 1691.* MAPPUS *diss. de cephalal-
gia. Argentor. 1691.* VAUGHAN *diss. de cephalalgia.
Leid. 1692.* LEXDEM *diss. de dolore capitis. Ultraj.
1697.* PAULI *diss. de dolore capitis. Lips. 1697.* NURS

ORIBASII ⁹⁾, AETII ⁹⁾, ALEXANDRI TRALLIANI ¹⁰⁾,
PAULI AEGINETAE ¹¹⁾, SERAPHIONIS ¹²⁾, EBN SI-
NAE ¹³⁾, AVICENNAE ¹⁴⁾, POLIDAMI ¹⁵⁾, FORESTI ¹⁶⁾,
PORTII ¹⁷⁾, ROLFINKII ¹⁸⁾, MERCURIALIS ¹⁹⁾, ZA-

CUTI

diss. de capitis dolore. Harderov. 1898. HANNEMANN
diss. de dolore capitis et epilepsia. Kil. 1706. HEL-
WIGIUS diss. de cephalalgia. Lugd. Bat. 1719. FR.
HOFFMANN diss. de dolore cephalico. Hal. 1731. Ejusd.
diss. de cephalaea Hal. 1735. HESSEN diss. de cepha-
laea. Erf. 1743. BRENDL diss. de dolore capitis. Got-
ting. 1747. BRYFUS diss. de dolore capitis. Gies. 1749.
TH. MORGAN diss. de dolore capitis. Edinb. 1769. C.
STAPLETON quid capitis dolor? quae ejus species?
quae causae? quae curandi methodus? Lovan. 1777.
VAN DER BELEN diss. de dolore capitis. Lovan. 1787.
PLOCQUET diss. de cephalalgia. Tubing. 1787. GAR-
MANN diss. de dolore capitis. Argent. 1788. VON
OPDORF diss. de dolore capitis. Lugd. Bat. 1789.
Duae praeterea dissertationes de dolore capitis auctori-
bus HUDELST et POLKA exstant in JOS. EXNER diss.
med. in universitat. Vindobon. habit. ad morbos chro-
nicos pertinent. Vindob. Vol. 2. 1789. J. G. HEINEN
diss. de capitis dolore. Berol. 1830.

5) Liber de flatibus. §. 13.

6) Lib. IV. c. 2.

7) Pr. III. Tr. II. cap. 35.

8) Synops. lib. VIII. c. 18—20.

9) Tetrab. II. serm. 2. c. 40. 41.

10) lib. I. c. 10. 11. 12.

11) De re medica.

12) Breviar. Tr. I. c. 8. f. 4. s.

13) Lib. III. c. 3.

14) Canon. lib. III. Fen I. Tract. 2. cap. I.

15) De capitis doloribus. In libris de re medica. Basil. 1540.

16) Lib. IX. obs. 54. 58. 82. 83.

17) Encomion de capitis dolore. Florent. 1551.

CUTI LUSITANI ²⁰⁾, NIC. PISONIS ²¹⁾, FEL. PLATERI ²²⁾, BALLONII ²³⁾, RIVERII ²⁴⁾, TISSOTI ²⁵⁾, BURSERII ²⁶⁾, ALBRECHTI ²⁷⁾, PARISSETI ²⁸⁾, J. FARMERI ²⁹⁾, M. HAASII ³⁰⁾, W. VAUGHANI ³¹⁾, F. H. BITTNERI ³²⁾, ne de auctoribus, *speciales morbi nostri species* ³³⁾ (ab ALEXANDRO TRALLIANO primum stabilitas) perlustrantibus, loquamur.

§. VIII.

18) Methodi cognoscendi et curandi affectus particulares etc. Disp. I. de dolore capitis. Jen. 1640. Diss. de dolore capitis. Jen. 1635. 1668. Ordo et methodus cognoscendi et curandi dolorem capitis. Jen. 1671.

19) Consult. T. I. p. 14. Consult. 167. T. II. c. 38—72. T. III. p. 54. T. IV. p. 187.

20) De med. princ. hist. lib. I. No. 5.

21) De cognoscendis et curandis morbis.

22) Praxis. lib. II.

23) Consil. lib. I. p. 114. III. p. 1. 85. 93. 109.

24) Cent. I. obs. 11. 14. 17. Cent. II. obs. 16. Cent. III. obs. 37. 40.

25) Op. c. 26) Institut. med. pract. Vol. III. cap. 1.

27) *Die Kopfschmerzen, ihre schnelle Linderung und gänzliche Heilung.* Hamb. 1809.

28) *Dictionnaire des sciences méd. T. 4. article Cephalalgie.* p. 418—427.

29) *Practical observations on certain affections of the head commonly called head-aches.* London 1822.

30) De capitis dolore disquisitio. Gotting. 1823.

31) *An essay on Head-aches and their cure.* Lond. 1825.

32) *Tractatus de cephalalgia.* Vindob. 1825.

33) NICOLAI diss. de variis doloris capitis speciebus. Hal. 1763.

§. VIII.

Species. Symptomata. Necroscopia.

1. Est nempe dolor capitis nunc transitorius Variae species. et tolerabilis (*cephalalgia*), nunc pertinax et saevus (*cephalaea*), nunc dimidium capitis occupans (*hemierania*), nuncque fixus una tantum in parte (*clavus*).

2. *Cephalalgia* ¹⁾ vel derepente vel lente invadit. Dolor est aut vagus, hac illave in parte magisurgens, aut universum caput aequali vi detinens, cum perceptione gravitatis, punctionis, distensionis, compressionis, pulsationis aut simili. Caput, saltem frons, temperaturam plerumque auctam exhibet. Dolor nonnullarum horarum aut nycthemeri spatio, nunc illico, nunc sensim sensimque, praevio plerumque somno, evanescit, vix unquam vel minima porrecta occasione rediturus, unde *cephalalgiae* divisio in *insolitam* ²⁾ et *habitualement* ³⁾.

3. *Cephalaea* ⁴⁾ praedam, in quam saevit, Cephalaea. per hebdomadas, menses et annos ⁵⁾, nunc continuo,

1) Α κεφαλή, caput et ἄλγος dolor.

2) *Soda Arabum*. Vid. AVICENNAE Canon. L. III. fen I. tract. 2. cap. I.

3) KRONIUS diss. de cephalalgia habituali cum vertigine. Argentor. 1755.

4) Gr. κεφαλαία.

5) Diram cephalaeam per quindecim annos, vix vix horula somno concessa, saevientem, in virgine pridem, tunc plurimorum infantum matre, sub oculis habui.

tinuo, nunc periodice certis horis⁶⁾, diebus, septimanis⁷⁾, mensibus⁸⁾, anni temporibus⁹⁾, detinet. Aeger vel statuae instar immobilis jacet¹⁰⁾, vel prehensum manibus caput undique volutat, vel desperabundus corporis positionem continuo mutat. Nunc caput tanta gravedine afficitur, ut a magno pondere humum premi videatur¹¹⁾, — nunc dolor adeo distendens est, ac si caput esset divulsurus, unde aeger partem affectam comprimere aut ligare satagit; — nunc dolor pulsat¹²⁾ et ferit, quo in casu praecipue temporibus infensus esse solet; — nuncque pungit, ac ictus instar

6) Ut febres intermittentes larvatae cephalicae et cephalaea vancrea.

7) BUNSENIUS op. c. Vol. I. §. LXV.

8) Juvenem judaeum a. 1815. sanitati restitui, qui jam a septem mensibus tolerabili quidem, sed continua cephalaea laborabat, quae autem constanter omni tricesimo sive tricesimo primo die, accedentibus symptomatibus clavi ad verticem ita invalescebat, ut aeger vehementer convelleretur. Paroxysmus nycthemerum perdurabat.

9) Cephalaea veri, autumnio, sive utrisque simul addictas observavi.

10) Lego immo de viro quinquaginta octo annorum qui toties feroci cephalaea corripiebatur, quoties caput erigebat (HUSELAND's Journ. der pr. Heilk. 1825. Sept. p. 65).

11) Carebaria a *μάχη*, caput, et *βῆρος*, gravitas, pondus. HECKER diss. de carebaria. Lugd. Bat. 1757.

12) Adstantes pulsationem audivisse ferunt. — (FABR.

star aures inprimis lacessit ¹³⁾. Pars capillata capitis aliquando squamulas furfuraceas vel tumores exhibet, crines saepe flaccidi, exsiccati, rigidi ¹⁴⁾, facile canescunt et copiose defluunt, quod et de barba valet ¹⁵⁾. Facies nunc rubra tumidula, sicca, calida, nunc pallida, collapsa, sudore frigido cooperta. Pulsus saepe contractus, creber, — aliàs plenus et lentus, ut observavimus, ad quadraginta ictus in sexagesima horae parte. Oscitationes, suspiria et ejulatus frequentes. Sensuum officium laeditur. Oculi, circulis lividis circumdati, turbidi, splendentes, interdum rubentes, cum cephalaeae augmento moti, inflammati ¹⁶⁾, pupillam vel contractam vel dilatatam exhibentes, lucem aegrè ferunt vel plane respuunt, ac ex orbitis protrudi videntur. Aliquando copiose involuntaria lacrymatio. Saepe auditus acutissimus, cum

HILDANUS cent. I. obs. 1. GALLAT in *Journ. de médecine*. T. 44. p. 524).

13) Ex una aure ad alteram saepe recurrens. Vid. BALDINGH's *new Magazine* XI. p. 56.

14) „Die Frau Gräfin Harrach, geborne Lichtenstein, in Wien, war den heftigsten Anfällen von Kopfschmerz unterworfen (1800). Ihr Friseur sagte ihr dieses Kopfschmerz jedesmal vorher, indem er die Kopfhaare gleichsam sträuben fand und sie kaum in liegender Stellung zu erhalten wusste.“ Ex schedis Paternis.

15) Sub terribili cephalaea, qua vir judaeus Vilmensis 1817. excruciabatur, barbam prius nigram, spatio paucorum dierum candidam evasisse vidi.

16) BUNGEIUS l. c. §. IX. in notis.

Frank Praez. II. I. 1.

K

cum susurra, aibilo, tinnitu aurium; quorum cerumen nunc deficit, nunc, declinante inprimis morbo, copiose secernitur. Haud raro serum, lymphæ coagulabilis aut pus ex meatu auditorio emanant. Nares plerumque siccae, aëri imperviae, nonnunquam serum acre largientes. Sapor interdum deletus, saepe depravatus, amarus acilicet, acidus, quandoque metallicus ¹⁷⁾. In nonnullis aestio frequens, stridor dentium, tumor parotidis. Loquela nonnunquam interrupta. Sunt, qui torporem brachiorum ac motus convulsivos tum musculorum faciei tum aliorum experiantur. Vigiliae continuæ, aliàs sopor, non sine continuata doloris perceptione. Nonnulli delirant, vertiginosi fiunt, vel in lipothymiam ¹⁸⁾ incidunt. Fere omnes anorexia et ructibus, plurimi nausea et vomitu seroso, saepe aeruginoso, plerumque levamen, saltem pro tempore, afferente, laborant. Urina saepe copiosa, pallida, aliàs pauca, tincta.

Hemicrania.

4. *Hemicraniam* ¹⁹⁾ nemo scriptorum ²⁰⁾ Tissoto ²¹⁾

17) Aegros novi, qui sub lancinante capitis dolore effectus quasi galvanismi linguae appliciti percipiebant.

18) Sic in nobili femina Vilnensi cephalæsam continuam quidem observavi, quæ vero bis terve de mense ita inalescebat, ut aegra prius convulsa lipothymiae experiretur.

19) A Gr. *ἡμικρανία*, ab *ἡμῶν*, dimidium. GRÆC. *Halbseitiges Kopfsch.*

20) ARÆTASUS de morbis chronicis. L. I. cap. 2. GALLENUS de hemicrania. ALEXANDER TRALLIANUS l. c.

SOTO²¹⁾ et FOTHERGILL²²⁾ pulchrius delineavit.
Capitis iste dolor frequenter et exacte²³⁾ perio-
dis²⁴⁾,
K 2

C. 18. AVICENNA l. c. c. 37. SENNERTUS diss. de hemi-
crania. Vrb. 1662. BEYER diss. de hemicrania. Jen.
1674. KRIEGER (SCHRADEN) disput. med. de hemi-
crania. Helmst. 1690. BRÜCKNER diss. de hemicrania.
Lugd. Bat. 1693. WAGNER diss. de hemicrania. Altd.
1697. POSTY diss. de hemicrania. Hal. 1738. VAN
DER LINDEN de hemicrania menstrua. Leid. 1760.
FORDYCE historia febris miliaris et de hemicrania.
Lond. 1766. BUERSINKH diss. de hemicrania. Duisb.
1774. SCHOBELT tract. de hemicrania. Berol. 1776.
LOEBEN diss. sistens hemicraniae aetiologiam. Viennae
1786. NICOLAI diss. hemicraniae aetiologia. Jen. 1786.
Ejusd. Diss. de hemicraniae therapia. Jen. 1788. J.
CHR. AVON diss. hemicraniae therapiam sistens. Jen.
1787. REIL de hemicrania sic dicta vera. Hal. 1791.
BRAND de heterocrania apud Hippocratem. Francf.
1800. FORTY's vom halbseitigen Kopfweh in ACKEN-
MANN's Magazin für Aerzte. St. 1. MÜLLER prakti-
sche Bemerkungen über die Art des halbseitigen Kopf-
wehes etc. Frankf. 1813. PELLHAM WARREN in me-
dical transactions. 1813. No. 18. DAVILLERS in Di-
ctionnaire des sciences médicales. T. 33. art. migraine,
p. 391—400.

21) Oeuvres. T. 13. chap. 22.

22) Remarks on that complaint commonly known under
the name of the sick Head-Ach. Vid. Medical observa-
tions and inquiries. Vol. 6. p. 103. Works p. 597.

23) JUNKER diss. de hemicrania horologica. Hal. 1747.
PETRUS SALIUS DIVERSUS exemplum refert (Annot.
in lib. ALTOMANI cap. XII. p. 894) viri religiosi, qui
per tres annos et menses septem, unoquoque die lunae

dis ²⁴⁾, nunc omni mense circa catameniorum epocham ²⁵⁾, nunc bis terve de anno aut et longo saepius redeuntibus, alligatur. Immo hemicrania continua, nisi a violentia externa, sat raro obvenit. Quae periodos servat hemicrania, haec a tristitia et digestionis incommodis, aliquando a fame ²⁶⁾, a surditate ²⁷⁾, a pulveris nicotianae aversione ²⁸⁾, a rhoncho sub somno, a tensione musculorum cervicis ²⁹⁾ annunciari solet. Ingruente paroxysmo aeger solitudinem quaerit, lucis, loquelae, soni et motus impatiens est, atque loqui victumque capessere recusat. Ingruit jam horror, qui per horam unam alteramve continuo crescit, inde per plures horas, immo per diem unum cum dimidio et ultra ³⁰⁾, stationarius fit, quo tempore aeger,

hemicraniam perpeusus erat. Hemicraniam omni die *mercurii* redeuntem, Pater meus in uxore Comitissae Emanuel Khewenhüller Mediolani observavi. Illius consilium pro simili casu Constantinopoli obveniente a. 1817. per litteras exposcebat. Novocomensem puellam omni die dominico *hemicraniae* obnoxiam nosco. Simile exemplum legitur in HUSELAND's *Journ. der pr. Heilkunde* 1829. Februar. p. 76.

24) De PRÉ historia hemicraniae periodicae. Erf. 1723.

25) VAN DER LINDEN diss. de hemicrania menstrua. Lugd. Batav. 1662.

26) WILLIS l. c. cap. I. p. 174.

27) TISSOT l. c. p. 104. 28) Idem, ibidem.

29) Sic in aegra crudeli hemicrania laborante reperi.

30) Paroxysmum ad 76 horas protractum vidit TISSOT l. c. p. 98.

aeger, paucis casibus exceptis ³¹⁾, lectum petere cogitur, donec praevio vomitu, plerumque, at non semper ³²⁾ cum levamine peracto, aut sudore partiali ³³⁾, aut lacrymatione ³⁴⁾, aut effluvio seroso e nare ³⁵⁾, somnus beneficus, aliquando sopor, paroxysmo finem imponit. Dolor plerumque idem latus, frequentius sinistrum ³⁶⁾, sibi eligens ³⁷⁾, aut a regione temporali incipit et ad suturam sagittalem ascendit, aut a radice nasi ad occiput protrahitur, aut uno temporis puncto dimidium capitis, cujus suturae findi videntur ³⁸⁾ aut

31) WÄFFER aeger (obs. 47) plus in lecto patiebatur.

A ventione in curru vomitum promovente, aut et sine isto, levamen vidit TISSOT l. c. p. 197.

32) Jam N. PISO (l. c. p. 70) et TISSOT (l. c. p. 98) differentiam inter vomitum symptomaticum et criticum in hemicrania statuerunt.

33) TISSOT l. c. p. 105. Ego autem contrarium in femina *Lugani* degente die 29. Martii 1829. reperi. Haec, modo phthisi pulmonali laborans, in juventute feroci hemicraniae lateris dextri obnoxia fuit; quo in latere nunquam sudavit. Choreis interveniens, facies, quippe latus alterum sudore irroratum, alterum siccum exhibens, larvâ munita videbatur.

34) TISSOT l. c. p. 106. 35) WÄFFER l. c. obs. 76.

36) JUNCCKER conspect. med. Tab. 47.

37) Rarae sunt observationes, quarum WÄFFER (l. c. obs. 49) et TISSOT (l. c. p. 102) meminere, ubi scilicet paroxysmi hemicraniae alternatim dextrum et sinistrum capitis latus latinebant.

38) N. PISO in se ipso.

aut re vera interdum discedunt³⁹⁾, cujusque volumen aliquando augetur⁴⁰⁾, occupat. Loca maxime dolentia ac saepe attactum respicientia⁴¹⁾ sunt frons, oculus et tempora⁴²⁾. Arteriae temporales hic chordae instar tensae observantur. Hinc inde ecchymoses palpebrarum, frontis, genarum etc. obveniunt. Et haemorrhagia spontanea e vertice observata est⁴³⁾. Praeterea diversae in consensum trahuntur partes, praecipue a pari quinto nervorum originem trahentes: aliquando enim
dolent,

39) Suturam frontalem fissam viderunt STALPART VAN DER WIEL (L. I. obs. 1) et FABRIC. HILDAN. (Cent. I. obs. 1. cent. II. obs. 7). Dehisebat sutura lambdoidea in casu in histor. morborum Wratislav. p. 50. descripto. Suturae sagittalis dehiscens meminerunt SENNERTUS (Prax. lib. I. c. 21. cui est titulus de morbis solutae unitatis in capite et cerebro) et BOOTTIUS (observationes medicae de affectibus omissis, secundum editae cum praefatione H. MEIBOMII, Helmsl. 1664. cap. 4. De suturarum dissectione). Ipse exemplum in uxore medici et professoris Lycei Novocomii florentis coram oculis habeo. Vide similia apud GABRIELEM CLAUDENUM in Misc. acad. nat. cur. dec. II. an. 4. 1685 p. 275. LUCAM SCHROEGERIUM ibid. dec. II. an. 9. 1690. p. 451. et CHRISTOPHON. DE HELWICK in Ephem. nat. cur. cent. IX. X. p. 301.

40) *Klinische Bemerkungen über einige chronische Krankheiten von NEUBURG. Frankf. am M. 1812.*

41) N. PISO l. c. WEPFER obs. 50. 51.

42) Vocatur tunc *Crotaphis* a CAELIO AURELIANO de morbis chronicis. L. I. cap. I.

43) *Revue médicale* 1829. Mars. p. 445.

dolent, strident dentes, gingivae intumescunt ⁴⁴⁾, maxilla inferior aegre movetur, saliva depluit ⁴⁵⁾, loquela difficilis voxque nunc acuta, nunc profunda evadit, oculus lucem minime fert, diplopia laborat ⁴⁶⁾, inflammatur ⁴⁷⁾ et auditus acutus fit. Obvenit interdum scapulae aut brachii dolor ⁴⁸⁾, aut convulsio ⁴⁹⁾, aut sensus formicationis in manu ⁵⁰⁾ saepeque pedum frigus *). Pulsus ab initio contractus et frequens.

5. In clavo ⁵¹⁾, seger in parvo admodum ca- Clavus,
ovum.
pitis, plerumque cervicis spatio, dolorem, ac si
clavus acutus ibi infixus esset, percipit. Pars do-
lens

44) HORST lib. VI. obs. 25.

45) LINDENIUS in Act. Haflu. Vol. III. obs. 66.

46) Ruricola quinquaginta annorum, *εὐαγρος*, cephalalgiae crebrius obnoxius, die 2 Martii dira corripitur hemicrania lateris sinistri, qua vigente omnia objecta dupla comparcent (FR. AB HILDEBRAND ann. schol. clinic. med. Ticinensis. Papiae 1826. P. I. p. 207).

47) FORST. lib. IX. obs. 60. et PLATER lib. II. obs. p. 356.

48) WEPFER l. c. obs. 57. 58.

49) COLLIN de febribus intermittentibus. p. 158.

50) TISSOT l. c. p. 112.

*) CHOMEL *considérations sur les céphalalgies chroniques. Revue médicale. Mars 1830. p. 484.*

51) BORELLI cent. 1. obs. 38. CAMERARIUS diss. de clavo. Tubing. 1703. ARNOLD diss. seger clavo capitis periodico laborans. Erf. 1703. HAEISTERUS progr. de morte *Silli Italici* ex clavo insanabili. Helmat. 1734. WILKE diss. de isto capitis dolore, qui dicitur *clavus*, Jen. 1795.

lens sensum nunc ignis, nunc glaciei exhibet. *Ovum* ⁵²⁾ dicitur malum, a clavo vix distinguendum, ubi scilicet dolor, in majori spatio, magnitudinis circiter ovi, comprehenditur. Utrumque malum periodicum et hystericis familiare est hincque cum oscitatione, inflatione colli et flatibus obvenit.

Necroscopia.

6. Post graves capitis dolores in *cadaveribus* observata sunt, ne amplius dicamus de suturarum discessu, mala *cranii* conformatio, praecipue illius obliquitas ⁵¹⁾, ossium capitis tenuitas ⁵⁴⁾, crassities ⁵⁵⁾, mobilitas ⁵⁶⁾, caries ⁵⁷⁾, tophi ⁵⁸⁾, exostoses ⁵⁹⁾, abscessus ⁶⁰⁾, sanguis ⁶¹⁾, mercurius

52) KONSEL diss. de ovo seu passione galeata, cephalaea specie. Argentor. 1755.

53) MORGAGNI l. c. epist. LXII. §. 15.

54) LIEUTAUD hist. anatom. T. II. lib. IV. obs. 6.

55) Cranium magis compactum ac crassum in viro cum terribili cephalaea in nosocomio Vindobonensi defuncto reperi.

56) Os frontis mobile (Eph. nat. cur. dec. I. an. 6. 7. obs. 184. BONET l. c. sect. I. obs. 105. append. obs. 92).

57) HIPPOCRATES *negl roisour*. II. v. opp. p. 469. VIREUSSENS *histoire des maladies externes*. VOGEL *chirurg. und medicin. Beobacht.* p. 405. MURBINNA *Beobachtung. I. Th. No. 6.* GASTELLIER in *Journal de medecine, chirurgie et pharmacie par Mr. LEROUX*. T. 33. 1815. *Mat.*

58) Durae matri adhaerentes (BONET l. c. obs. 83).

59) Lethalis exostosis prope processum falciformem (J. P. FRANK interpretationes clinicae. P. I. Tubing. 1812. p. 301).

rius in diploe⁶²), tumores superficiaei cranij adhaerentes⁶³), erosio *galeae aponevroticae*⁶⁴), vitia *pericranii*⁶⁵), conversio musculorum illi adhaerentium in materiam adipo-ceream⁶⁶), eorum supurationes⁶⁷), *durae matris* in cerebrum depressio⁶⁸), suppuratio⁶⁹), exulceratio⁷⁰), callositas⁷¹), tumor⁷²), fungus⁷³), ossificatio⁷⁴), lapillus⁷⁵),

60) PETIT *traité des maladies chirurgicales*. T. I. p. 159.

61) LAMBERT *commentaires et oeuvres de chirurgie*. No. 1.

62) MAYERNE *prax. med.* L. I. cap. 8. p. 76.

63) WEFER l. c. p. 35. FORDYCE l. c. §. 33.

64) In aegro supra dicto (18).

65) Pediculi sub iis (BONET l. c. sect. I. obs. 115). FORESTUS lib. IX. obs. 43. Pus inter pericranium et cranium (HALLERUS obs. ad calcem de morbis internis. No. 3).

66) In femina nosocomii Vindobonensis.

67) Attamen magis post rheumatismum auctum capitis, quam post legitimam cephalaeam.

68) REGHELEN *osservazioni*. 69) Cap. sequent.

70) In viro in clinico Vilnensi defuncto.

71) MORGAGNI *epist.* l. art. 10. 14. BONET l. c. obs. I. *Samml. auserl. Abh. für pr. Aerzte*, 20. B. p. 564.

72) BONET l. c. sect. III. add. obs. 5. BALDINGER diss. de cephalgia ex tumore durae matris scirrhoso. Jen. 1771. *Tumeur encéphaloïde développée sur la dure mère comprimant les lobes moyen et antérieur du cerveau* (*Journ. complémentaire du dict. des scienc. médicales*. 1826. Mai. p. 251).

73) Praecuntibus WENZEL et WALTHER, A. G. H. *Scriptio nonnulla de fungi durae matris et diagnosi commentatio*. Vratia. 1825. H. D. RINGLINO diss. quae-

pillus⁷⁵⁾, cohaesio morbose laminae illius exterioris per pseudomembranas cum cranio⁷⁶⁾, tumores glandularum Pacchionii⁷⁷⁾, serum⁷⁸⁾, gelatina⁷⁹⁾, polypi⁸⁰⁾ et cruor⁸¹⁾, inter laminas
durae

dam ad fungi durae matris pathologiam. Berol. 1828. G. H. ENERMAIER *über den Schwamm der Schädelknochen und die schwammartigen Auswüchse der harten Hirnhaut.* Düsseldorf. 1829. R. SCHLEICHEN diss. fungi durae matris observatio singularis. Berol. 1829.

74) J. CH. POHLIUS progr. de dura matre passim ossea facta. Lips. 1764. In sinistro latere (*Medical observations and inquiries.* Lond. 1784. Vol. 6), ossicula figurae grautorum passerarum, quorum apices durae matri, bases vero minutis foraminulis cranio insidebant (CONNADI *Handbuch der pathologischen Anatomie.* p. 532), os in processu falciformi (CHESLEDEN *philos. tractat.* No. 381. VATER progr. de ossificat. Wittemb. 1726. in HALLERI collect. disp. pract. T. IV. p. 842. MORGAGNI epist. XXV. 8. WEPFER l. c. obs. LX. p. 182), ossificatio juxta suturam sagittalem (*Karlsruher Annalen der Heilk.* 1824. Heft 1. p. 93. HOOVER op. c. Tab. V) etc.

75) CONNADI *Handb. d. pathologischen Anatomie.* p. 532.

76) In plurimis cadaveribus.

77) Juvenis scrophulosus, ex phthisi (cui cephalaea socia erat) in nosocomio Vindobonensi demortuus, praeter tubercula pulmonum, tumores quoque glandularum Pacchionii exhibuit.

78) Ichorosum et foetidum (DE LAMANA in *Journal de médecine par ROUX* 1770. T. 33. p. 508).

79) Saepius hoc phaenomenon inveni.

80) In sinu falciformi (DE HARN rat. med. P. I. p. 97).

81) STAMZ pr. de cephalalgia iliaco-haemastica. Hal. 1698.

durae matris collecti, sinuum turgor⁸²), concre-
tio morbosa, durae matris cum pia matre⁸³),
hanc membranam inter et illam vermes⁸⁴), con-
crementa calculosa⁸⁵), inter piam matrem et ce-
rebrum extravasata varia⁸⁶), piae matris excres-
centiae⁸⁷), substantiae cerebri, cerebelli inflamma-
tio⁸⁸), color abnormis⁸⁹), cum membranis ad-
haesio morbosa⁹⁰), abcessus⁹¹), ulcera⁹²), con-
sum-

82) TONNELÉ *mémoire sur les maladies du sinus veineux de la dure mère*. Paris 1829.

83) Membranas cerebri inter se et cum cerebro ita concretae vidi, ut sine laceratione disjungi non possent.

84) BARNIENI exempl. med. cap. 6. ZACUT. LUSITANI praaxis admirab. med. lib. I. obs. 6. FARNELLI univ. med. cap. VII. p. 439.

85) Ephemer. nat. curios. dec. I. an. 8. obs. 48.

86) Ad basin cerebri materies puriformis (PLENCIA soc. et obs. medica. p. 51. VALLISSENI opp. III. p. 167), item ad os ethmoides (BONET l. c. obs. 42—59).

87) RENEAULME in *mémoires de Paris* 1699.

88) BONET l. c. obs. 2. 3. 6. 11. 16. 73. 79.

89) MONRO *three treatises on the brain*. Samml. auserl. Abh. für pr. Aerzte. 17. B. p. 303. PLOUCQUEST l. c.

90) Cerebellum cum membranis suis firmiter sinistror-
sum cohaerebat (MORGAGNI l. c. 25).

91) In lobo posteriori cerebri et infundibulo (BONELLI obs. med. phys. cent. I. obs. 38), in haemisphaerio dextro (BANG in Act. reg. soc. med. Havn. Vol. I. p. 12).

92) Ulcus omnem partem anteriorem cerebri destruens (STÖRK an. med. II. p. 250), ulcus cerebelli (STOLL *Heilmethode*. 3 B. 4. Th. p. 251); in haemisphaerio

sumptio⁹³), induratio⁹⁴), mollities⁹⁵), herniae⁹⁶),
 excrescentiae⁹⁷), ossa⁹⁸), scirrhi⁹⁹), calculi¹⁰⁰),
 tumores varii¹⁰¹), nempe steatoma¹⁰²), tubercu-
 la¹⁰³),

cerebri dextro (PORTAL in *mémoires de l'académie des sciences*. 1780. p. 315).

93) Pars haemisphaerii dextri (ANDERSON in *Sammlung. auserl. Abhandl. für pr. Aerzte*. 1. B. 3. St. p. 711), cerebellum in mucum resolutum (MONTROSSA fasc. petholog. 1790. p. IV).

94) Cerebellum consistentiae cartilagineae cum carie ossis occipitis et sero in ventriculis cerebri, post gravem cephalaeem reperit GASTELLIER l. c.

95) L. ROSTAN *recherches sur l'émolissement du cerveau*, ouvrage dans lequel on s'efforce de distinguer les diverses affections de ce viscère par des signes caractéristiques. Paris 1823. 2. Edition.

96) DONALD MONRO in *Med. transactions. Lond.* 1772. Vol. II.

97) Tres excrescentiae spongiosae a cerebri corticali substantia ortae (LIEUTAUD l. c. T. II. obs. 208).

98) Ad lineam cum dimidio in lobo anteriori sinistro cerebri (LENTIN's *Beiträge zur ausübenden Arzneywiss.* 2. Aufl. 1. B. p. 476. Tab. 2. f. 2. 3).

99) In sinistra cerebelli parte (MORCAON. l. c.), cerebello (HARDEN epistrium obs. anatomicarum, p. 239).

100) Substantie calcareae involucri nervi optici adcreta (HAEN *Heilmethode*. 3. B. 6. Th. 6. Kap. p. 186), magnitudinis pisi in nervo optico in sua origine (BLEYNT zodiac. gallic. ann. I. April. obs. 24. p. 81. SCHURIO lithologie. p. 100. 250), insuper beccae mori J. KANTMANN de calculis in corpore humano. Obs. I. p. 1. SCHENK obs. lib. I. obs. 76. p. 113).

101) Ad nervorum opticorum exitum e cerebro (PLATER

la¹⁰¹), tumor cysticus¹⁰⁴), massa sanguinis congesti¹⁰⁵), turgor vasorum¹⁰⁶), ossificationes carotidum¹⁰⁷), anevrysmata¹⁰⁸), varices¹⁰⁹), collectio

obs. T. I. p. 182), in cerebri anteriore parte (Ibid. p. 102), in centro cerebelli (BATESAU observ. faîtes 1716. HAMMAN diss. sistens tumorum morbosorum in cerebro observationes novas, Lips. 1818. FR. BELLMAN diss. de cerebelli degenerationibus. Bonnae 1825. H. CALOW diss. de tumoribus cerebri, Berol. 1828). Praeter genera tumorum exposita CALOW adhuc *tumores albos firmos* (BALLIE Anatomia des krankhaften Baues der wichtigsten Theile des menschl. Körper. A. d. E. Berlin 1794. p. 254. et SOMMERING Zusätze zu Ballie, Berlin 1794. p. 340) et *tumores fungosos* (LIEUTAUD hist. anat. med. Amstelod. 1798. Vol. 2. p. 372. BAILLIE l. c. p. 254. EARLE medical tractat. Vol. 5. p. 234) statuit.

102) RHODIUS observat. cent. I. obs. 55. BONELLUS observ. med. physic. cent. II. obs. 78. ABERCROMBIE l. c. THOMANN annot. 1800. p. 398. MARINO in Memorie di matematica e fisica. T. 4. SALTER in The Edinb. med. and surgical journ. 1815. Octob.

103) MÉRAT in Journ. de méd. de Mrs. CORVISART etc. T. II. 1808. et Journ. de méd. chir. et pharm. T. 30. 1815.

104) STOLL rat. med. P. I. p. 285. TORRE obs. dec. I. No. 4. MÉRAT l. ult. cit. T. 33. 1815. Mai. HOOPER op. c. Tab. XIII. RUST Magazin für die gesammte Heilk. B. 17. St. 1. p. 123.

105) KREICH Beyträge zur pathologischen Anatomie. Berl. 1813. LXVI.

106) BONET l. c. sect. 1—12. MORGAGNI epist. I. art. 17.

107) BONET l. c. obs. 87. 88. WALLISIUS cerebri. anat. cap. 7. p. 95. SWERTEN op. c. §. 1010.

lectio morbosae seri¹¹⁰⁾, cruoris¹¹¹⁾ in ventriculis cerebri, polypi¹¹²⁾, aër¹¹³⁾, vitia plexuum chorbideorum¹¹⁴⁾, glandulae pinealis¹¹⁵⁾, pituitariae¹¹⁶⁾ aliarumque¹¹⁷⁾, hydatides¹¹⁸⁾, taenia hy-

dati-

108) MORGAGNI epist. III. No. 8. 109) Cfr. §. X. 13 (34).

110) BRVNIUS obs. cent. I. No. 37.

111) Polypi sanguinei in sinibus (Act. med. Berol. dec. I. Vol. I. p. 48).

112) Pseudomembranae (BURKHARDT l. c.).

113) LIEUTAUD l. c. lib. III. obs. 55. MEISQMIUS v. KREIBERGER l. c. §. 29.

114) Duplo majores observavi. HOOFF op. c. Tab. XII.

115) In substantiam caseosam commutata (Samml. für pr. Aerzte. 20. B. p. 369), concrements calculeosa in ea (Act. erudit. Lips. 1699. p. 306), tumor illius (BLAKE transact. of a soc. for improvement of medical and surgical knowledge. Vol. II. p. 192).

116) Sabulo repleta (LAMBERT commentaires et oeuvres chirurgicales, No. 1). P. RAYER observations sur les maladies de l'appendice sur-sphénoïdal, glande pituitaire du cerveau. In Archives générales de médecine. 1824 (Ex volumine illius glandulae aucto derivat auctor: „douleur, pesanteur à la partie antérieure de la tête, apathie, diminution de la mémoire, engourdissement, assourdissement, avec cécité plus ou moins complète, le plus souvent des deux yeux“).

117) Glandulae scirrhusae in cerebellis (VANDERMONDE in Journ. de méd. T. 4. p. 137), in cerebro (Samml. med. Wahrnehm. 4. B. p. 159).

118) BALME Journ. de méd. T. 41. p. 504. BORELLI hist. et obs. variot. cent. II. obs. 38. YELLOLI in Med. chir. transact. published by the med. and chir. soc. of Lond. 2. Vol. 1813. BASLEY in London medical repository

datigēna ¹²⁰), seu *Cysticercus cellulosus* ¹²⁰); insecta eorumque larvæ ¹²¹) et nuclei ¹²²) in sinibus frontalibus, vitia cordis ¹²³), arteriarum ¹²⁴), tubi intestinalis ¹²⁵), hepatis ¹²⁶), lienis ¹²⁷) et renum ¹²⁸).

§. IX.

C a u s æ.

1. Ad capitis dolorem *dispenunt*: vitium hæreditarium, sæpe ad plura ejusdem familiae individua extensum, violentiæ cranio sub partu peculiarem formam imprimentes, corporis constitutio

Praedisp-
ponentes.

1826. Febr. et HORN's *Archiv für med. Erfahrung*

1826. Jan. Febr. p. 164.

119) HUYLAND's *Journ. der pr. Heilk.* 5. B. p. 914.

120) RUDOLPH's *Entozoorum synopsis*. Berol. 1829. p.

180. NASS's *Zeitschrift für Anthropologie*. 1823. Heft

8. p. 197.

121) VOIGTEL op. c. T. I. p. 293.

122) MECKEL *neues Archiv der pr. Heilk.* 1. B. No. 12.

123) *Die Krankheiten des Herzens etc.* v. KREYSIG. Berl. 1814. 1. Th. p. 357.

124) e. c. *aneurysmata aortae* (HORN l. c. 1826. Jan. Febr. p. 161).

125) GERTON und JULIUS *Magazin der anal. Literat. der gesamm. Heilk.* 1829. Mai. Jun. p. 489.

126) FORST. lib. IX. obs. 48. 127) FORST l. c. obs. 49.

128) FORST l. c. obs. 50. CRESTON *Untersuchung*. No. 6. BARTHOLINUS et SCHRADER hemicraniam illius lateris observavit, cujus rem calculo laborabat (KREIBERBERG l. c. f. 16).

gracilis, temperamentum senile¹⁾, vita sedentaria, capitis scribendo, delineando, acu pungendo, sive ex visus imbecillitate, sive ex prava consuetudine, inclinatio, et intensio mentis: Quaevis aetas illi favet. Ceterum feminae prae maribus, homines ingenio praediti prae stupidis, scrophulosi et rhachitici prae sanis illi subjiciuntur.

Excitan-
tes.

2. Pars causarum ex cadaverum sectionibus elucens, ut adhaesiones morbosae, pachymembranae, callositates, extravasata, suppuraciones, de frequenti doloris capitis origine vel ex praeviis, vel ex praesentibus inflammationibus: encephalitis clare testantur. Utroque in casu malo ansam porrigere solent: violentiae externae, ut ictus, contusio, lapsus, concussio, compressio²⁾, vulnera capitis, insecta, corpora peregrina in aurium meatu³⁾, in cavitatibus nasalibus⁴⁾, vermes huc ex oesophago migrantes⁵⁾, in ipso cerebro nidu-

len-

1) Sensibilitatem morbosam, ut crassam cephalaeae, jam BALLONIUS accusavit. Epid. II. p. 162.

2) Plebejae austriacae quondam caput mitris auro contextis ornato solitae, saepius inde cephalaeam patiebantur.

3) Musca in eo (Eph. nat. cur. cent. VIII. obs. 17), globus vitreus (FABR. HILDANUS cent. I. obs. 4).

4) Recens luculentissimumque exemplum cephalaeae ab insectis Dr. LUDOVICUS FRANK (Salzburg. med. chirurg. Zeitung. 1815. No. 37) retulit. Aliud exstat in Nouveau Journ. de médecine T. 10. Juillet 1821. p. 233. Observations sur deux vers sortis du nez d'une femme (qui avoit dormi aux champs).

5) BARTHOLINUS epist. medicinal. cent. VI. epist. 74. BURSARIUS l. o. §. VII.

lantes ⁶⁾, dentium vitia ⁷⁾, vulnera colli ⁸⁾, capillitium prolixum ⁹⁾, deficiens ¹⁰⁾, resectum ¹¹⁾, praesertim in plicosis, capillorum denigratio ¹²⁾, cōsmetica ¹³⁾, positio incongrua corporis ¹⁴⁾, in-

primis

6) Negata eorum existentia a MORAGNIO (epist. I. No.

9) extra omnem dubia ionia agram nunc posita est.

7) FABRIC. HILDANUS cent. II. obs. 10. PORTAL *cours d'anatomie médicale. Vol. IV. p. 197. Cfr. P. III. Vol. I. sect. I. cap. X. §. XXXIX. et J. L. PARÉ œuvres de chirurgie. T. I. p. 125.*

8) LENTILI miscell. II. p. 502.

9) Nuneii cujusdam uxor, Viennae eousque habituali capitis dolori obnoxia erat, quousque prolixum, quo ornabatur, capillitium non rescinderetur. Cfr. Ephemer. nat. curios. dec. I. ann. IX et X. obs. 12. PAULLINI cent. III. obs. 12.

10) Calvi eousque capitis doloribus et malis oculorum obnoxii, quousque capillitio artificiali non uterentur, haud raro obveniunt.

11) Plurimas feminas nosco, quae, antequam sibi elegantiae male intellectae gratia capillitium rescinderent, nunquam capitis dolorem, quem dein saepius, praesertim hyemali tempore, experiebantur, perpassae erant.

12) PORTAL *cours d'anatomie médicale. T. 4. p. 388.*

13) Anno 1824. Vindobensem cognovi feminam, quae post usum diuturnum aquae cosmeticae plumbum et bismuthum continens, primum crines amittere incepit, deinde tanta exorueista est cephalaea, ut visus et auditus inde laesae fuerint. Sequebatur tandem colica, tabem minitans. Detecta remotaque interea causa, aegra convalescit.

14) STOLL praelectiones I. p. 314.

Frank Prax. II. I. 1.

L

primis sub somno ¹⁵⁾, fertilissimo doloris capitis fonte, si diu nimis protrahatur, si deficiat, si ei inconsuetis horis indulgeatur, si quis obdormiens derepente expergeat, si dormitoria sint humida, recenter dealbata, calida nimis, fumo carbonum ¹⁶⁾, vel odoribus fortioribus inquinata, si lectus afflatu aëris aut radiis solaribus ¹⁷⁾ expositus, — porro insolatio ¹⁸⁾, influxus, ut ferunt, solis ¹⁹⁾ et lunae ²⁰⁾, aër nocturnus, nebulosus, frigus ²¹⁾, electrici-

15) Qui capite, ut decet, elevato obdormire sunt soliti, si profundius decumbere cogantur, in cephalalgiam incidunt.

16) Vix hiems unus alterve decurrebat, quin mihi dirissimae hinc ex causa cephalaeae, saepe cum vomitu, aliquando cum ~~ap~~ipsothymia, ne dicam de asphyxia, obvenissent. Ea hoc quidem ex fornacibus, ut vocantur, *suedicis*, per quos dormientium viis ignaro aut ebrio famulo committitur, pendet: vix enim in Lithuania, uti in Italia, carbonem ardentem calefaciendi gratia cubiculis importantur.

17) Ex hac causa ipse CAR. PRISO summum hemioroniae paroxysmum expertus est (Obs. 12. p. 74).

18) Communis causa inter rusticos, viatores, et praecipue milites, galeis metallicis instructos. Cfr. GALLENUS de rem. eupor. cap. I. ALEX. TRALLIAN. lib. I. c. 16. FORNERIUS lib. IX. obs. 12. RIVIERIUS obs. cent. II. No. 21. SUMMERE in *Journ. de médecine*. T. 5. 6. p. 241. 435. alique cap. sequent. §. XV. citandi.

19) *Ephem. nat. cur. dec. I. an. VI et VIII. obs. 8.*

20) *Ephem. nat. cur. dec. III. an. V. VI. obs. 81.*

21) Refrigeratio pedum communis habitualis cephalaeae

citricitas ²²), galvanismus ²³), lux nimia ²⁴), soni acuti, fortes, pharmaca, imprimis opium, atropa belladonna ²⁵), digitalis purpurea ²⁶), hyoscyamus, nicotiana ²⁷), arsenicum ²⁸), potus liquorum fermentatorum, ebrietas ²⁹), vina praecipue sulphure ³⁰), plumbo ³¹) adulterata, cerevisia plantis nar-

L 2

coticis

caussa excitans. Et a balneis frigidis intempestive adhibitis gravem capitis dolorem excitatum observavi.

- 22) Appropinquante tempestate cum tonitru, coelo ceterum id necdum indicante, duae matronae, quarum una Viennae, altera Vilnae quondam habitabant, constanter gravi cephalaea afficiebantur, quam brevi post tremor, sudores frigidi et lipothymia subsequebantur.
- 23) Plurimi, quibus galvanismus ad surditatem tollendam applicui, in cephalalgiam incidebant. Cfr. GRIMM *Archiv der pr. Heilkunde für Schlesien* 3. B. 1. St. No. 5. OSTHOFF in HOHN'S *Archiv* 3. B. p. 290. GRAFENREITER'S *Versuche* p. 100.
- 24) Radii solares, solum, nive coopertum, allidentes, non tantum oculis, sed et cerebro infensi sunt.
- 25) Uxor comitis B., cui ob saevam tussim convulsivam, qua ultimis graviditatis mensibus vexabatur, folia atropae belladonnae praescripti, in terribilem capitis dolorem incidit. Idem symptoma a baccis ejusdem plantae comestis Viennae observavi.
- 26) Non solum dolor ad regionem supraorbitalem, sed cruciatus ad varia alia capitis loca sub usu digitalis observantur.
- 27) *Med. Commentarien von Edinb.* II, Dec. 1. B. p. 41.
- 28) VICAT delect. observ. praet. Opp. No. 2.
- 29) PLATER lib. II, obs. p. 356. FORESTUS lib. IX. obs. 58.
- 30) HOFFMANN de dolore cephalico, obs. I. Opp. p. 282.

coticis mixta, jejunium, inprimis post crapulam, cibi copia vel qualitate peccantes, e. c. esus cancrorum marinorum ³²⁾, dulcia, flatu ³³⁾, vermes ³⁴⁾, taenia ³⁵⁾ non excepta, bilis, alvi obstructio, motus corporis vehemens, vectio per strata inaequalia viarum, — vestes collum ³⁶⁾, pectus, abdomen arctantes, — animi pathemata, potissimum moeror, ira, sed et gaudium, coitus ³⁷⁾, onania, retentio seminis citra consuetudinem, veneris desiderium, evolutio pubertatis, menstrua nimia, irregularia, deficientia, graviditas, lochia retenta, suppressa, lactatio ³⁸⁾, lactis depravatio ³⁹⁾, evacuationes consuetae suppressae, inprimis sudor pedum ⁴⁰⁾, fluor albus ⁴¹⁾, haemorrhoides,

31) Ephem. nat. cur. dec. III. an. IV. obs. 30.

32) BARTHOLINUS bist. anat. cent. VI. hist. 57.

33) FIENUS de flatibus. c. 14.

34) Cephalalgiae crebro in Lithuania (vermibus intestinalibus admodum favente) originem debent Cfr. BARTHOLINUS l. c. hist. 3.

35) *Giornale di medicina pratica di BREMA*. Vol. II. c. 3.

36) e. c. collare arctum, consulto applicitum, ut milites exhausti faciem rubram aueci plenam exhibeant.

37) FORESTUS obs. LIX. obs. 29.

38) TISSOT l. c. p. 117. REYS in op. infra citando.

39) NICOL. PISO de morbis cognoscendis et curandis. L. I. cap. 8. p. 52.

40) A sudore habituali pedum sponte suppresso dira cephalaea, de qua supra (§. VIII. 2 (18)), originem traherat. J. F. D. LONSTEIN *observations sur la nature et l'importance de la sueur habituelle aux pieds* (Journ.

des, epistaxis, effluxus puris, seri ex auribus, intermissio venesectionis, sanatio praepostera tinnese, psorae, ulcerum antiquorum, febrium intermittentium, — metastases morbillorum ⁴²⁾, variolarum, typhi ⁴³⁾ et contagium venereum.

3. Qui hypotheses de causa proxima doloris capitis desiderant, in veteribus de calida et frigida intemperie cerebri, de vaporibus ad caput ascendentibus, de quatuor elementis encephalo insensibilibus, delectamentum invenient.

§. X.

Diagnosis.

1. Doloris capitis, morbi saepe simulati, stabilita, ut mali principalis, praesentia, determinataque forma, in specialem illius sedem inquirendum. Est autem *sedes* doloris capitis aut in *integumentis cranii et musculis subjacentibus*, aut in *galea aponevrotica*; in *pericranio*, aut in *cranio ipso*, aut in *membranis cerebrum involventibus*, aut in *cerebri, cerebelli et medullae oblongatae*

sub-complémentaire du dictionnaire des sciences médicales. 1826. Mai, p. 212).

41) Medici hunc album pro debilitatis effectu habentes, aegrasque injectionibus adstringentibus continuocurantes, morbo eo suppresso, aegras aliquando in terribiles capitis dolores conjiciunt.

42) *Münchener neues Journal für die Chirurgie* 2. B. 1. St. p. 108. GAY in *recueil périodique de la société de Paris* 2. T. No. 9.

43) Edit. secund. P. I. Vol. II. sect. II. cap. I. §. VI. 7.

substantia sive corticali sive medullari, aut in arteriis, venis, glandulis encephali propriis, aut tandem in plurimis locis simul ¹⁾).

Indoles.

2. Ut facilius *sedes* morbi determinari possit, simul *indolis* illius ratio habenda. Est enim dolor capitis effectus aut *constitutionis morbosae universalis*, aut *irritamenti mechanici* prorsus localis.

Dol. capitis inflammatorius.

3. *Dolor capitis inflammatorius* ²⁾, cui praecipue haemorrhagiae suppressae, vitia cordis et arteriarum (inprimis illius hypertrophia istarumque anevrismata ³⁾), potus liquorum fermentatorum, animi pathemata, insolatio, occasionem praebent, quique potissimum ex sanguine nimia vi vel in arterias cerebri ³⁾, cerebelli et medullae oblongatae irruente, vel in sinibus stagnante, vel aegre per venas redeunte ⁴⁾, hinc ex processu inflammatorio originem trahit, nullamque formam respuit, dolor, inquam, capitis inflammatorius

cogno-

1) Quam morbi analysin ne quis, ut monui, BICHATII principiis tribuat, cum jam illius elementa in operibus citatis PLATERI et FR. HOFFMANNI contineantur.

2) ROTARIUS de cephalalgia calida. Leid. 1682.

3) VIDUS VIDIVS opp. omn. lib. VI. PELLESTAN *clinique chirurgicale*. T. 2. fig. 1. F. E. SCHILBACH diss. sistens casum anevrismatis in capite virginis sexagenariae rariorem. Jen. 1825.

3) HUME in *Transactions of a society for the improvement of medical and surgical knowledge*. Vol. 3. p. 258.

4) In cephalaea a dilatatione venarum orta, malum a positione corporis supina valde augebatur, testis HUME l. c. p. 259.

cognoscitur (praeter signa generalis morborum systematis nervorum inflammatoriorum) per cruciatum gravativum, distendentem, pulsantem, a motu auctum, per vibrationem carotidum et temporalium, per oculorum splendorem, per faciem modo rubram, modo pallidam, aestumque frontis, per ponderis sensum in orbitis, per aurium tinnitum nasique siccitatem.

4. *Dolor capitis rheumaticus* ⁵⁾, in regionibus septentrionalibus communissimus etiam homines alias cephalaeis non obnoxios eligens, affectiones rheumaticas oculorum, gingivarum ⁶⁾, narium, faucium, artuum, sequens, sedem in tegumentis capitis, in galea aponevrotica, in pericranio aut in ipsis membranis et ventriculis cerebri figens ⁷⁾, a rheumatismo acuto capitis ⁸⁾ (ob febris defectum) et a *neuralgia faciali* ⁹⁾ distinguendus, saevos, acutos, diurnos ac nocturnos cruciatus excitat.

D. cap.
rheuma-
ticus.

5. *Dolor capitis catarrhalis* ¹⁰⁾, a rheumatis-
tico

D. c. catarrhalis.

5) TRAWEN diss. de cephalalgia ex intemperie frigida. Lugd. Bat. 1676.

6) GR. HORSTIUS, P. II. obs. 24.

7) RADEMACHER in HUFELAND's Journ. der pr. Heilk. 1818. August p. 64.

8) Edit. secund. P. I. Vol. III. sect. II. cap. XXX. §. CV. 3.

9) Hemierania, quam WEPFER *crudalem* appellat, aliasque exempla a TISSOTO enarrata (l. c. p. 121) claras notas protopalgiae exhibent.

10) Syn. *Cephalaea coryza*. DESCHAMPS traité des ma-

tico parum diversus, maxime ad regionem sinuum frontaliū percipitur, ponderis ingrati ac ardoris molesti sensu, sociis lacrymatione, siccitate narium et sternutatione. Remittit ille horis matutinis, exacerbaturque vespere, saepe tunc intercurrente calore veluti febrili.

D. c. gastricus.

6. *Dolor capitis gastricus* ¹¹⁾, errorum in diaeta, acidorum, vermium, bilis, animi pathematum effectus, plerumque sub forma hemicraniae periodicae, inter urbium incolas, sensiles, vitae sedentariae addictos, obveniens, a jejuniō aequae ac a pastu auctus, si pendeat ex ventriculi aut duodeni affectione ¹²⁾, frontem, tempora et oculos, si ex hepate capitis latus dextrum occupans, in genere debilitate, halitu ingrato, facie pallida, ad latera nasi subflava; genis profunde rubentibus ¹³⁾, stillicidio sanguinis e nare, plerumque dextra, lingua spurca, noctu sicca, nausea,

ladies des fosses nasales et de leurs sinus. Paris 1804.
 SCHWARTZ in *Beyträgen zur Kenntniss der Hirnkrankheiten* (Rheinisch-Westphäl. Jahrbücher für Med. und Chirurg B. 8. St. 3. p. 1).

11) N. G. BALFEMANN de cephalalgia imprimis illa quae consensualis ex abdomine est. Helmst. 1755.

12) Dolorem capitis ex ventriculo ab eo ex intestinis tenuibus necdum duce WARREN (*Medical transactions* 1813. No. 18) distinguere addidit.

13) *Factem rubram*, ut commune imbellicentis ventriculi signum, jure statuit G. REES: *Practical observations on disorders of the stomach, with remarks on the use of bile in promoting digestion, Lond. 1810.*

sea, vomitu, tussicula, alvo tarda, haemorrhoidibus, urina crassa, sedimentosa, aquosa, instruitur. Sedem doloris capitis gastrici in ipso cerebro, ex consensu ¹⁴⁾ laborante, quaerimus. Quum vero consensus reciprocus sit, cavendum ne primariam cerebri affectionem, turbas ventriculi-intestinatorum, hepatis pro effectu agnoscentem, pro dolore capitis gastrico declares ¹⁵⁾.

7. *Dolor capitis arthriticus* ¹⁶⁾, cum podagra, erysipelate, herpete, zostere ¹⁷⁾, fluore albo, haemorrhoidibus ¹⁸⁾, sudoribus habitualibus, catarrhis chronicis nexum sumpsit, praecipue juxta suturarum decursum saevit, haudque raro symptomata, cerebri ipsius affectionem indicantis, (maxime sensum ponderis ad verticem, somnolentiam, impotentiam oculos libere movendi etc.) socia agnosit ¹⁹⁾.

D. c. arthriticus.

8. Dolor

14) *Of those head-aches which arise from morbid sympathies.* In *The Edinburgh med. and surgical journ.* 1825. Octobr. p. 240.

15) Pulchre hoc argumentum enucleavit Dr. PARIS: *On head-aches arising from indigestion (The family oracle of health. 1826. No. 42 p. 206).*

16) MUSGRAVE de arthritide anomala. c. 14. 16. Hæz in *Prod. act. soc. med. Havn.* p. 87. STOLL *rat. med.* Vol. V. p. 435, et *Ephem. nat. cur. dec. III, ann. V* et VI. obs. 155, ann. VII et VIII. obs. 214.

17) Zosteris cum cephalaea nexum pluries observavi. Cfr. *Act. reg. soc. med. Havn.* Vol. III, p. 261.

18) E. G. STANT de cephalaea iliaco-haematica. Hal. 1698.

19) Inter graves cephalaeas arthriticas, quae mihi obve-

D. c. scor-
butica.

8. *Dolor capitis scorbuticus* ²⁰⁾ in aetate senili, sub curriculo aliorum morborum, praecipue in nosocomiis, comparere, carebariae plerumque formam induere, haemorrhagias narium sine conspicuo levamine, ecchymomata aliaque diatheseos scorbuticae signa prae se ferre solet.

D. c. pe-
riodica.

9. *Febris intermittens cephalica larvata* (quantenus morbus acutus probe a chronicis doloribus capitis periodicis distinguenda), reconditis modo encephalitidi ²¹⁾ modo saburrae ²²⁾ adscribenda, typo quotidiano addicta, maxime horis matutinis, dolore frontis lateris sinistri, (oculo in consensum deducto) comparet.

D. a. scro-
phulosa.

10. *Dolor capitis scrophulosus* infantibus et adolescentibus familiaris est. Oritur mox a vitiis systematis vasorum lymphaticorum cerebro ipso vim

nerunt, illa qua comes *Walmoden*, exercitus Austriaci in Insubria supramus Dux, laboravit, aminet. Vir hic, ultra quinquaginta annos natus, haemorrhoidarius, quotannis hyemali tempore catarrho obnoxius erat. Aestate a. 1828, etsi sanus thermas Germaniae scopo prophylactico adivit; sub quarum usu mox capitis dolorem percipit. Dolor ista, redux Mediolanum, maxime incravit ac aegrotum, sociis supra allatis symptomatibus, usque ad proximum var (pactore contra omnino immuni servato) excruciauit.

20) HORSTIUS opp. T. II. p. 337.

21) Cfr. cap. III, §. XVI. — No. 13.

22) Sic ex summa hac in morbo emeticorum utilitate concludo.

vim inferentibus ²³⁾, mox a tumoribus glandularum colli, pulmonum ²⁴⁾ et hepatis, utpote venas jugulares, subclaviam et cavam descendantem comprimendo encephali plethorae ansam porrigentibus. Dignoscitur ex habitu scrophuloso, ex morbis praegressis, imprimis impetiginibus capitis praepostere fugatis. Cave vero ne tumores glandularum, praecipuis parotidum, qui ex vitiis encephali per *consensum* oriuntur, pro scrophularum indicio habeas ²⁵⁾. Praeterea notandum, *rhachitidem*,

23) §. VIII. 6 (77. 103. 115. 116). Dr. BRAUN (HORN'S *Archiv für med. Erfahr.* 1823. Jan. Febr. p. 122) cephalaeam chronicam puellae scrophulosae describit, ubi oculi lucem, aurea sonum respuebant, animi facultates, imprimis memoria, deprimabantur, et vertigo vitae finem imposuit. Necroscopia *tubercula circa tentorium* exhibuit. Similia enarrantur a SALTER (HORN l. c. 1822. p. 375). YELLOLY *medical chirurg. transact.* T. 1. p. 181. KRAUENBERG *Jahrbücher der Klinik zu Halle.* 1823. p. 325. CALOW l. c.

24) Cephalaea et imprimis hemicrania, haud raro phthiseos pulmonalia tuberculosae sive nuntii sive socii esse solent. Occurrunt, saepe cum genae rubore ac stillicidio cruoris e narice, in latere pulmoni infarcto respondente, quod compressioni, sinistrorsum, venae subclaviae, jugularem ejusdem lateris excipientis, dextrorsum cavae descendantis, jugularis dextrae propagationis,tribuendum est. Stabilita jam suppuratione in pulmone aq. larga succedente expectoratione, capitis dolor evanescit. Et volumen auctum lienis vel hepatis, pulmones sursum pellens, capitis dolori aliquando ansam praebet.

25) Cfr. P. III. Vol. I. sect. I. cap. IV. §. XVIII.

tidem, singulis vertebra infensam, illarum primae, cranio, minime parcere. Immo verisimile est, plurima ejus vitia²⁶⁾, et praesertim concretamenta calculosa in cerebro, originem rhachiticam habere.

D. c. carcinomatus.

11. *Dolor capitis carcinomatus* (ad quem et *plicosum* illum revocamus²⁷⁾) homines excruciat aetatis propectae, prius acrophulosos acriusque arthriticos, quorumque familiis cancer additus est, aut qui eo ipso facto laborant²⁸⁾. Dolor iste, ex vitiiis systematis lymphatici encephali²⁹⁾ emergens et cum quadam neuralgiae facialis specie³⁰⁾ similitudinem alens, ferocitate omnem alium antecellit.

D. c. venereus.

12. *Capitis dolor venereus*, plerumque ut cephalaea, rarius ut hemicrania obveniens, sedem ipso in cranio figit. Gravius malum ejus carie, exostosi, topho, comitatur. Loca sic affecta maxime dolent ac attactum respuunt. Dolor circa
horam

26) §. VIII. 6 (53. 54. 55. 57. 100).

27) Cfr. Edit. 2. P. I. Vol. III. sect. II. cap. XXII. §. LXXIII.

28) Summam cephalaeam cum cancro linguae TRINCAVELLA (consil. med. lib. III. obs. III. col. 669) observavit. Pluries cephalaea cum cancro labiorum, mammarum, uteri et praecipue hepatis mihi obvenit.

29) §. VIII. 6 (99. 117)

30) Cfr. P. II. Vol. I. sect. II. cap. VI. §. XXX. 10. ANDRAL junior observationem de cerebri scirrho in cancerum converso refert (MAGENDIE Journ. de physiol. expériment. et de pathologie, T. 2. No. 2. 1822).

horam quartam vespertinam ingruit, ac per totam noctem crudeliter saevit.¹ Diagnosa ex syphilitidis doctrina²¹⁾ eruenda.

13. *Cephalalgias et hemicranias transitorias*, D. c. nervi-
clavum, ovum menstruationis periodum comitan-
tia²²⁾, aut ab animi pathematibus, electricitate,
imbecillitate²³⁾ excitata, secure pro *nervis* sive
spasmodicis declaramus. Graves vero et habitua-
les cephalaeae, saepe sub larva hysterae aut hy-
pochondriasis obvenientes, mala longe pejora ab-
scondunt²⁴⁾.

14. Si

31) P. IV. Vol. II. sect. I.

32) „Dolores capitis ab utero nati verticem ac occiput cum sensu frigoris occupant.“ KLEIN interpr. clinic.

33) Atoniam cerebri posse dolori capitis anam tradere jam FORESTUS (lib. IX. obs. 38) docuit, ac inediae, haemorrhagarum aliarumque evacuationum effectus testantur. Cfr. FR. HOFFMANN diss. de cephalaea cum immoderato haemorrhoidum fluxu saepius repetente. Hal. 1735.

34) Uxor chirurgi Vilmensis *Woyntz*, quadragenaria, obesa et florida, est semper de laesa valetudine querula, ut summe hystérica, lippis et tonsoribus nota, antispasmodicorum ariem, non minus quam medicorum patientiam exhauserat. Conquerebatur de continua capitis gravedine, quae omni secundo sive tertio mense in saevam cephalaeam pulsantem, cum vertigine, anxietate et vomitu transibat. Mala haec nychthemorum unum alterumve perdurabant, ac plerumque erroribus in dieta (gulae enim indulgebat), animi pathematibus (ad iram proclivis erat), aut aliis causis accidentalibus tribuebantur. Aestate an. 1814. curam

D. c. ab
irrita-
mentis
mechani-
cis.

14. Si violentias, quibus corpus sub partu, lapsu, lusu et jocis, nec non punctionibus infantum

illius suscipere coactus fui. Audita patienter longa historia morbi, ex perceptione factoris, ut aiebat, interni, cum deletis ceterum odoratu, suspicionem de latente tænia alui. Displicuit simul *labiorum aegrae livor*, quem nunquam impune conspexi. Exhibitis repetitis vicibus drastice aegra, sine vermium evacuatione, conspicuum percepit levamen; ita ut usque ad mensem Januarii 1815. meliori solita frueretur valetudine. Die 17. hujus mensis aegram fortuito visitando, eam de capitis dolore et vertigine, quae ipsa affectioni catarrhali tribuebat, conquerentem inveni. Die 21. consulto ad miseram vocor, jam delirantem, adstantes quidem cognoscentem, est quaestionibus incohaerenter respondentem, mox surgentem, ac si res suas quaereret, mox iterum decumbentem, seseque cum summa inquietudine in lecto jactantem. Febris vix nulla. Alvus clausa. Dubius in diagnosi, an scilicet coram haberem inflammationem cerebri, aut paroxysmum hystericum, securitatis causa copiosas hirudines capiti admoveri jussi, praescripto clystere, pedilavio et refractis tartari emetici dosibus. Die 21. status idem, Febris nulla. Redeunte tæniae suspicionem, calomel cum jalappa exhibentur. Die 22. alvus ter cum levamine mota. Quiescit. Die 23. mane. *Apoplexiae* sine paralyti insultus. Secatur vena ad libram, ordinata solutione salis amari nec non epispasticis ad suras. Aliquod levamen et sat placidus somnus. Paulo post novus apoplexiae insultus. Die 24. convulsiones epilepticae per totam fere noctem. Pulsus durus. Respiratio sonora, profunda. Repet. venae sectio. Consilio plurimorum medicorum digitalia cum calomel et

fantum saepe subijcitur, si viam, quam insecta
sub

vesicatorio ad nucham proponitur. Die 25. nulla mutatio, decumbit enim aegra ut apoplactica, donec a convulsionibus agitur. Die 26. moritur. *Sectio cadaveris.* Ablatis integumentis cranii ad os parietale dextrum, prope verticem, macula sacrulea, magnitudinis amygdalae obvenit. Videbatur ipsa ab acchy-mosi sub pericranio pandere, at eo ablato, macula remanabat. Cranii pars superior crassa, diploë ac suturis orbata, magna cum difficultate more consueto transversim rescindebatur. Levi porro opera a dura matre separabatur. Quum autem in altum maculae lividae respondentem inquisivissem, illius loco cranium hac in parte admodum tenue, pellucidum invani. Adversus lucem inspecta, cradabam, ma tympani membranam, ossi patroso inclusam, coram habere. Quo tempore autem superficies externa cranii lavigata erat, interna in parte pallida *foveam* exhibebat, magnitudinis maculae supra allatae. Suscipiebat haec *fovea convolutum vatorum sanguiferorum* super duram matrem prominentium, a lympa coagulabili et pseudomembrana circumdatum. Utrum haec vasa *aneurysma* rami cujusdam arteriae meningiae mediae, an varicem venae ejusdem nominis, an aneurysma per anastomosis sisterent, non audeo determinare. *Aneurysma* tamen verisimilius videtur, cum destructio cranii in parte affecta, effectui communi aneurysmatum in vicina ossa respondeat. Tandem super os cribrosum *steatoma magnitudinis castaneae*, nervos olfactorios extenuatos, amplectena inveniatur. Reliqua secundum normam, si excipias plexus choroidaeos, inprimis illum ventriculi tertii, dilatatos. Nullum enim aderat signum sive inflammationis sive extravasati. Quam morbi historiam

sub odoramento incauto florum, aut sub somno in cavitates narium et aurium patulam inveniunt, — si evolutionem vermium in ipsa cerebri substantia³⁵⁾, — si illius herniam, si consuetudinem generalem infantum singulis aperturis corporis humani res peregrinas intrudendi, sique tandem vim, quam morbi dentium in universum caput exercent, perpendamus, origo doloris capitis ex irritamentis mechanicis haud mira videbitur. Praecipue autem notandum, irritamenta hujusmodi saepe inflammationibus ansam praebere, quae imperfecte resolutae, aut chronicae redditae magis, quam levis, quae illis aliquando occasionem dedit causa, accusandae sunt. Eo facilius tunc causa prima morbi nos fugit, ubi inter eam et effectus ejus longum temporis curriculum intercedit. Sequitur inde in cephalaeis, praesertim infantum, aut ex infantia originem petentibus, anamnastica a parentibus, nutricibus et institutoribus petita, atque *examen capitis universi*, nunquam negligenda esse, quod ultimum praeceptum ad cunctos capitis dolores chronicos extendendum esse censemus^{*)}.

15. Nul-

consulto exposui, ut juvenes medici aliquando capitis dolorem epitheto *spasmodici, nervosi, hysterici* praeposere salutantes, cautiore essent.

35) Cephalaea ab hydatide, hemisphaerio cerebri dextro infixa, apoplexiae symptomatibus stipata, ab HOMER (l. c. p. 266) describitur.

*) Cfr. *Journ. der Chirurgie und Augenheilk.* von GRÄFE und WALTHER. B. 13. Heft 1. No. 7.

15. Nullibi doctrina complicationis majoris momenti est, quam in capitis doloribus dijudicandis. Cerebro ipso laborante viscera ex eo nervos desumentia, potissimum cor, pulmones et ventriculus, mox in propriis functionibus perturbantur. Quod si contingat, en circulum sanguinis, processum respirationis et digestionis a norma deflectentes. Cum viscera illa per eandem viam, qua cerebro obediunt, rursus in illud imperium exercent, malo additur malum. Nil hinc frequentius *dolore capitis spasmodico-inflammatorio*, toties obveniente, quoties cor spasmum correptum cruorem caput versus nimis pellit ³⁶⁾. Alias viscera abdominalia obstructa, e. c. hepar, sanguinem ex arteria coeliaca vix admittendo, plethorae capitis, hinc cephalaeae vel hemicraniae *gastrico-inflammatoriae* ansam porrigunt. Generatim, qualiscunque fuerit caussa cerebrum irritans, major sanguinis affluxus ad caput (complicatio inflammatoria) nascitur. *Rheuma* facillime aliis encephali morbis associatur ³⁷⁾. Praeterea violent-

D. e. ex
complicatio-
ne
diathe-
sium.

36) F. M. MARCOLINI *sopra una strana e complicata malattia* (Annali universali di medicina. Novembre 1829).

37) Sic vir conspicuus, urbem Minsk inhabitans, ozaena mulctatus, saepe hemicraniam dextri lateris experiebat, at tolerabilem. Cum vero, aestuante corpore ac denudato capite, refrigerio sese exposuisset, in eundem morbum cum furoris et desperationis notis incidit. Occupabat nunc dolor, antea ad sinum fronta-

violentiae, quondam capiti illatae, saepe efficiunt, ut dein a minima easque adventitia causa capitis dolor provocetur³⁸).

§. XI.

P r o g n o s i s.

Genera-
tim.

1. Cephalaea chronica aut habitualis nunquam flocci pendenda³⁹). Sub vulgari enim nomine capitis doloris herculea interdum latent mala⁴⁰). Hemicrania aliquando annorum curriculo sponte evanescit; aliàs facile in vertiginem transit⁴¹). Effectus generales doloris capitis habituales, seu potius causarum eum excitantium, sunt deformitas, capillorum defluvium, hypochondriasis, jactura memoriae, aliarumque facultatum animi, nec non torpor, formicatio⁴²), contractura, convulsio, paralysis. Praesagit ille interdum maniam.

2. Nisi

lem circumscriptus, regionem temporalem, ac protrahatur usque ad verticem. Tanto malo abscessus ad musculum temporalem, ac cura mercurialis felicem finem imposuerunt.

38) LÖNNER diss. cit. §. 4.

1) STRUVIUS diss. Resolutio aphorismi decimi sectionis sextae Hippocratis, in qua traditur prognosis cephalaeae. Jen. 1676.

2) PORTALIUS levissimum dolorem capitis ex ulcere cerebri, ovum gallinaeum adaequante, descripsit (*Mém. de l'Académie des sciences*. 1780. p. 318).

3) BAUHINUS diss. de hemicrania in vertiginem transiente. Basil. 1677.

4) Ex his, si in latere hemicraniae opposito locum obtineant, ROSTAN (l. c.) ad cerebri molliem concludit. Audax sane conclusio!

2. Nisi salutaris haemorrhagia, praecipue epistaxis, haemorrhoidis *), aut recta medendi methodus, cephalaeae inflammatoriae, quo citius id fieri potest, finem imponat ac, nisi aeger debito regimine morbi regressum impediat, concretiones morbosae, callositates meningum, pseudomembranae, polypi, extravasata serosa, purulenta, cruenta, abscessus cerebri expectanda. Quae singula pro varia malorum sede surditatem, olfactus jacturam, caecitatem, convulsiones, epilepsiam, insaniam, vertiginem, apoplexiam et paralyin producere queunt.

3. *Rheumatismus* meninges et cerebrum detinens, effectus diatheseos inflammatoriae praesertim quoad extravasatum serosum producit. Extus autem facile in abscessum, saepe sub galea aponevrotica latentem, transit.

4. Minoris momenti *cephalaea gastrica*. Intra octo enim, novem, vel quod longissimum est, intra quatuordecim dies sponte solvitur. Ubi tamen crebro redit, hepar magis magisque laeditur.

5. Nisi *dolor capitis arthriticus* per fluxum e naribus †), diarrhoeam, asthma, hypochondria-

M 2

sin †),

*) FABR. HILDANUS obs. cent. I. obs. 9. WEPFER hist. apoplecticor. edit. Amstelod. p. 608.

†) Lego adeo (*Heidelberger klin. Annalen* B. 3. Heft 3. p. 400) hemisphericam evacuatione concrementorum lapideorum e naribus solutam fuisse. In *Ephem. acad. nat. cur. dec. III. p. 396.* existat Dr. CUMMANT observatio.

sin ⁶⁾, tumores capitis ⁷⁾, dolores artuum ⁸⁾, podagram ⁹⁾, calculum renalem solvatur, gravia encephali mala ocyus serius timenda sunt, ut callositates, ossificationes meningum, cerebri et arteriarum, cataracta, amaurosis et apoplexia. Cephalalgia habitualis in adolescentibus futurae in senectute podagrae est indicium.

P. d. e.
scorbuti-
ci.

6. Dolor *capitis scorbuticus* ob ecchymomata in internis capitis partibus, indeque apoplexiam aut paralyisin timendus ⁹⁾.

P. d. e.
periodici.

7. *Cephalaea intermittens*, quamvis febribus *perniciosus* adscripta; attamen, nisi in senibus obveniat, recta adhibita medela, plerumque sanatur.

P. d. e.
scrophu-
losi.

8. Effluxus saniei ex auribus, naso, ulcera cutis, evolutio tineae, phthiseos pulmonalis ¹⁰⁾, abso-

tio de singulari hemieraniae solutione per stillicidium e naribus aquae ad attractum frigidae.

6) TRASOT l. c. p. 135.

7) SCHENK observ. med. rar. lib. VII. Francf. 1665. fol. 13. CH. FR. BÄRACH diss. de capitis tumoribus tumicatis post cephalalgiam exortis, Lipsiae 1765.

7) SCHOBELL l. c. p. 32.

8) „Hemierania libenter in arthritidem plenariam transit.“ KLEIN l. c.

9) Matrona quadraginta annorum, dudum labe scorbutica mulctata, sub quovis inultus cephalaeae (cui crebro subiciebatur) *ecchymomata* instar seminis milii in facie accepit. Tandem inopinate in apoplexiam de qua infra (cap. V. §. XXV. 2) incidit.

10) §. X. 10.

absolutio pubertatis dolores *capitis scrophulosos* (ob dispositionem ad hydrocephalum et maniam, quam denotant, nunquam vilipendendos) fugare solent.

9. *Dolor capitis carcinomaticus*, evoluta quadam in parte scirrho sive cancro, aut accedente paralyti¹¹⁾, aliquando evanescit, alias perseverat, vel increscit. Idem de *cephalalgia plicosa* respectu ad trichoma valet.

P. d. c.
carcinomati-
matici.

10. Nulla luis forma difficilius abigitur ea, quae sub *adpectu capitis doloris*, praecipue inveterati, prodit. Ipsa denique hujus morbi ad nutum succedens sanatio peculiare interdum agnoscit periculum, separationi partis cranii cariosae a sana tribuendum¹²⁾.

P. d. c.
venerei.

11. *Cephalalgia, hemicrania et clavus indolis nerveae*, mala quidem molesta, difficulter radicatus evellenda, ceterum autem nullo pacto periculosa,

P. d. c.
nervei.

11) SCHALLGRUBER (*Aufsätze und Beobachtungen in dem Geblethe der Heilkunde*. Grätz 1816) exemplum refert cephalaeae carcinomaticae, socia paralyti.

12) Curam viri Vilsensis, cephalaea syphilitica (cum topho et suspicionem cariei cranii) laborantis, mercurii ope suscepti. Res optime incedere videbatur. Ast inopinate convulsionem aliaque inter encephalitidem et apoplexiam medium tenentia symptomata apparuere brevi post a morte excepta. Secto cadavere, caries ossis parietalis sinistri, ac lamina ossea inde separata, nunquam durae matri inflammatae incumbens reperiuntur.

riculosa, ac annorum curriculo saepe sponte evanescentia, constituunt.

P. d. c. ab irritamenta mechanica. 12. Prognosis doloris capitis ex irritamentis mechanicis omnino ab indole causae specialis pendet.

P. d. c. complicati. 13. Praecepta prognoseos doloris capitis complicati ex prognosi morbi simplicis componuntur.

§. XII.

C u r a.

Prophylactica. 1. *Prophylaxis dolorum capitis*¹⁾ ex praecipuis generalibus morbis nervorum medendi exque sequentibus deduci possunt.

C. d. c. inflammata. 2. Vigente capitis dolore inflammatorio, in aegro robusto, pulsum plenum, fortem offerente, vena saphaena, aut, si hic difficultates invenirentur, vena brachii cephalica, aut jugularis externa (in hemicraniae e latere dolente²⁾) secunda. Sunt, qui venam frontis, inprimis si pars capitis posterior doleat³⁾, sauciare audeant. A sectione arteriarum temporalium⁴⁾ abhorremus. Praemissa,

1) MERCURIALIS consult. T. I. p. 14. consult. 107.

2) J. RHODIUS (lib. I. obs. 173) exemplum habet, ubi in cephalaea, secia dextri lateris saphaena, sublatus est etiam dextri lateris capitis dolor, eodem deinde effectus secuto, in altero latere cum secaretur.

3) PLATER l. c.

4) GALEN de cur. per sanguin. miss. c. 22. 23. ARRETAEUS curat. chron. lib. I. c. 2. ZACUTUS LUSITANUS Prax. admirab. lib. III. obs. 107. RIVIERUS obs. cent.

missa, aut non indicata, phlebotomiâ *hirudines*, variis pro varia doloris sede, capitis partibus admoventur 7). Medium venae sectionem et hirudines inter *cucurbitulae scarificantes* tenent, occipiti, colli lateribus, scapulis, brachiis, manibus (inter pollicem et indicem 8)), suris, natis, applicandae. Dolor capitis (testantibus pulsatione cordis et carotidum, rubore faciei) dumtaxat a nimio sanguinis caput versus impetu originem trahente, *truncus carotidis* alterutrius aut utriusque *comprimendus* 9). Ne vero id fiat ubi vitia cordis aut arteriarum latent 8). Praeterea *eccoproctica* et *clysters* inserviunt. Fortior autem alvi purgatio nocet 9). Magnum porro levamen a *pediluvii tepidis* (quin tamen verbis Fr. Hoffmanni utamur „nunquam non in hoc affectu utilis“ 10)) obtinetur. *Sinapismi acriores*, *cru- rum*, sive *surarum internae superficiei* admoti, ac
ad

II. No. 59. 89. BALLONIUS T. I. p. 70. *Abhandl. der K. Schwedischen Acad. der Wissenschaft.* 13. B. p. 39.

5) Cap. I. §. VI. 9. b.

6) PLATER l. c.

7) Cap. I. §. VI. 9. c.

8) Subitanea enim mors timenda foret, cum jam a sola compressione carotidum, corde sano, illius palpitatio cum anxietate et dolore brachiorum oritur (PANAY l. c. p. 312).

9) HIPPOCRATES lib. de rat. viet. in morb. acut.

10) l. c. sect. II. §. V. p. 203. Nosco sane homines, qui a balneis pedum tepidis affluxum majorem sanguinis ad caput, caloris augmentum, inquietudinem, insomnia experiuntur.

ad rubedinem usque relictis, extrahunt (sunt verba aegrorum) dolorem cum calore. *Affusiones, fomentationes frigidae* ¹¹⁾, inprimis *glaciales* ¹²⁾, animadvertente jam FR. HOFFMANNO ¹³⁾, circumspecte adhibendae. Tutiori virtute refrigerante pollet *lotio vultus cum cremore lactis*, vel cum *aqua rosarum, aceto*, addito tantillo *albuminis ovi* (ut mador diutius haereat). Quoad *regimen diaeteticum* ¹⁴⁾, praecipue positio erecta capitis commendanda.

C. d. c.
rheumati-
ci.

3. *Doloris capitis rheumatici* curam evacuationibus sanguinis, praesertim localibus, aggredimur. Dein nuchae *vesicatorium*, sive *lene rubefaciens* ¹⁵⁾, apponimus. Interne diapnoica. Dolore integumenta, musculos, aut galeam aponevroticam detinente, ne suppurationem (*cataplasmate*, aut *epithemate* emolliente, promovendam) praetervideas. Aliàs *cucupha ex speciebus* sive *cephalicis* ¹⁶⁾, sive *aromaticis* ¹⁷⁾, sive *pulvere cephalico* ¹⁸⁾

11) E. c. cataplasma ex mica panis, baccis juniperi communis, seminibus cumini et aceto, linteis susceptum.

12) Glacies in vesicam porcinam suscepta, capiti per breve tempus spatium apponitur.

13) l. c. §. VI. 14) Cap. I. §. VI. No. 9.

15) e. c. sic dictum *vesicatorium perpetuum*. R. Emplastri meliloti unciam unam. Pulveris cantharidum a gr. decem ad viginti. Camphorae rasae scrupulum unum. M.

16) R. Herbae origani majoranae, betonicae officinalis, veronicae officinalis, florum lavendulae spicae àa uncias duas. M. f. pulvis grossiusculus,

eo¹⁸⁾ et prae omnibus *mitra e subtilissima tela cerata*¹⁹⁾, capiti imponenda. Simul usui interno inserviunt *urias hydrargyri mitis*, inprimis cum *oxydo stibii hydrosulphurato aurantiaco* et *opio*²⁰⁾. Quibus incassum adhibitis, parti affectae (praemissa tonsura) aut *cremor lactis cum amylo, opio et croco*, aut *oleum expressum hyoscyami nigri*, aut *laudanum saliva subactum*, illiniri, aut cataplasma ex *amygdalarum amarum contusarum* uncia una, *seminum plantaginis psyllii* uncia semis, *seminis hyoscyami nigri* drachma una, *olei rosati* drachmis tribus, *lactis q. s.*, aut *epithema* ex herbis *verbenae* et *betonicae officinalis* cum vino decoctis, applicari queunt. Quodsi et haec auxilia effectum destituerentur, locus dolens *sapone ammoniacali, balsamo opodeldoch, tinctura lyttas vesicatoriae, spiritu formicarum* perfricari posset. *Unguentum stibiatum*, nisi cautissime adhibitum, cruci-

17) Pharm. Borussicae, Ruthenae castrensis.

18) Pulveris seminum coriandri sativi, seminum anethi foeniculi, ligni santali rubri aa drachmam unam et semis, nucis moschatae, caryophyllorum aa drachmam semis. D.

19) *Taffetas de santé*. Mitra sic parata rebelles cephalaeas debellavi. Id praesertim beneficii obtinetur, quod caput inde non calefiat, et nihilominus perpetuo dolore involvatur.

20) R. Calomel. sulphuris aurati antimonii aa grana sex. Opii puri grana duo. Sacchari drachmas duas. m. f. pulvis, divide in duodecim partes aequ. S. pulverem, ad vespere capist.

cruciatu, illos a morbo longe excedentes, excitat. Dolore una tantum in plaga urgente, ei aut herba contusa *ranunculi pratensis* ²¹⁾, aut *vesicatorium* ²²⁾, aut *sinapismus* ²³⁾ imponatur. Talis plaga etiam utiliter scarificatur ²⁴⁾, in crucem inciditur ²⁵⁾, inuritur ²⁶⁾, aut moxa ²⁷⁾, aut ferro candente ²⁸⁾. Utplurimum *fonticulis* ²⁹⁾ (retro aures vel

21) CHENEAU observationum lib. I. cap. I. obs. 3. 4.
FR. HOFFMANN l. c.

22) RIVERIUS obs. cent. I. No. 87. POUTEAU *oeuvres posthumes* III. Vid. *Samml. auserl. Abhandl. für pr. Aerzte*, 12. B. p. 355. MONRO ibid. 5. B. *p. 297.
BANG act. soc. med. Havn. Vol. II. p. 268. *Arzneykundige Beobacht. eines Arztes in Amsterdam*. No. 28.

23) CELSUS lib. IV. c. 2. ARETAEUS curat. chronic. lib. I. c. 2.

24) HIPPOCRATES περί ἰκθύν. p. 516. lib. 48. ARETAEUS l. c. lib. I. c. 2.

25) LABONARDIÈRE in *Journal de médecine, chirurgie et pharmacie*. T. I. 1814. Juillet.

26) HIPPOCRATES, ARETAEUS ll. cc. CELSUS lib. IV.

27) WEPFER obs. p. 81. POUTEAU *oeuvres posthumes*, T. 2. SAUSSY in *Séance publique de la Société de médecine à Lyon*. An. 8. BODSON in *Journal de médecine* 1814. Juin. Plures cephalaeas, non quidem semper rheumaticas, heroico isto auxilio, miraculi instar, debellavi.

28) AULAIGNIER *recherches sur l'emploi du feu dans les maladies réputées incurables*. Paris 1805. IMBERT DE LORRES *considération sur le cautère actuel*. Paris 1812. MOREL *mémoire et observations sur l'application du feu au traitement des maladies*. 1813. VALENTIN *mémoire*

vel ad basin cranii), aut *setaceo* ³⁰⁾ (ad nucham vel circa locum dolentem) standum.

4. Pro vario capitis dolori ansam porrigente *viscerum abdominalium* vitio, varia adhibetur methodus. Libertas alvi ubique, praesertim latente haemorrhoidae, necessaria. Ceterum vermibus — *anthelminthica*; saburris — *ecceprotica*; acidis — *absorbentia*; obstructionibus, potissimum hepatis — *resolventia* opponuntur. Inter haec, praeter *aquas minerales saponaceas* auxilium haud inuenies, connubio *salium mediorum cum cinna-bare* (ut in pulvere antispasmodico rubro *Stahlii*) aequiparandum. Atoniâ laborante ventriculo, *tartratis stibii et potassae* vel *radicis cephaelidis ipecacuanhae* minimae doses, cum remediis amaris, e. c. *radice ari maculati* ³¹⁾, prosunt. Item *baccae albae piperis* integrae stomacho jejuno ingestae ³²⁾, *elixir viscerale Hoffmanni*, ante pastum ad cochlear majus assumptum, *cofea* illico post prandium ³³⁾, et maxime cyathus *aquae frigidae*

C. d. o.
gastrici.

et observations concernant les bons effets du caustère actuel. Nancy 1815. p. 49. 132. 136. 140. 143.

29) Act. nat. cur. Vol. III. obs. 47. Ephem. nat. cur. dec. I. an. 3. obs. 81.

30) RUTSCH obs. 40. FABR. HILDANUS cent. IV. obs. 6. 7. HEISTER *Wahrnehmungen*. No. 42.

31) BEROSI mat. med. p. 723. Exhibetur pulveris scrupulus unus semel aut bis de die.

32) LANGR in tent. de remediis Brunsw. domest. No. 118.

33) BAGLIVI prax. med. de capitis affect. in acutis.

gidae saccharatas horis pomeridianis epotus. Et *thea* hic valde commendata ³⁴⁾. Dolore capitis orto praevia crapula, — praeter rhabarbarina, infusum herbarum *thymi serpilli* ³⁵⁾ et *ocymi basilici* ³⁶⁾, — ac praegressa ebrietate, *herba betonicae officinalis* ³⁷⁾, et *glecomae hederaceae* ³⁸⁾ et nostra suffragia collegerunt. Hic praeterea motus in aëre libero, lotiō capitis ope aquae frigidae, prandium cum modica vini selecti quantitate, et somnus nocturnus proficiunt. *Hemicraniae periodicae gastricae* appropinquantem paroxysmum aliquando *leni emetico* ³⁹⁾ debellavimus, aut saltem infregimus. In doloribus capitis alvi inconsueta tardi-

34) KEMPER diss. cit. §. 24. NEWNHAM *some observations on the medical and dietetic proprieties of green tea and particularly on the controlling influence it exerts over irritation of the brain.* Lond. 1827. Et: *The London physical and med. journal* 1827. Jan. p. 574. Et FRONIER *Notizen aus dem Gebiete der Natur- und Heilk.* B. 18. August.

35) LINNAEUS *flor. suec.* No. 535.

36) FR. HOFFMANN in *obs. phys. med.* p. 19.

37) SCOPOLI *flor. carinth.* Edit. I. p. 460.

38) FEL. PLATER l. c.

39) Aquae menthae crispae uncias quatuor. Tartari emetici grana tria. Syrupi menthae drachmas duas. Cap. omni quartae horae parte cochleare majus ad vomitum usque. Emeticum hic jam commendabatur a CARL. AURELIANO (p. 278). HORSTIO (opp. T. III. p. 18). RIEDLINO (millenarius. No. 532).

tarditate stipatis ad *tincturam cucumeris colocynthidis* confugiendum ⁴⁰⁾.

5. *Doloris capitis arthritici* curandi ratio C. d. c. ^{arthritici.}
quodammodo ex therapia cephalaeae rheumaticae, gastricae et spasmodicae emergit. Inprimis plethorae capitis, alvi obstructioni, imbecillitati ventriculi, secretioni urinae et transpirationis, debilitae extremitatum inferiorum temperaturae, restitutioni evacuationum habitualium suppressarum, studendum. Portentosos effectus a *gummi resina guajaci*, *remediis amaris* et *cinnabari* junctis, nec non a *floribus arnicae montanae* ⁴¹⁾ atque *fonticulis* obtinuimus. Sub paroxysmo potissimum *pediluvia acria* vel ex aqua calida cum *acido nitrico* et *muriatico* conducunt.

6. Methodus antiscorbutica cephalaeis ex *vitio* C. d. c. ^{scorbutici.}
scorbutico pullulantibus opponenda. Summi doloris levamen et hic in usu *opii* invenimus. Profuit et decoctum *ligni guajaci officinalis*.

7. Cura *febris intermittens larvatae cephalicae* vigente paroxysmo *hirudinibus* ad caput, C. febr. ^{febr. interm. larv. cephalicae.}
pedi-

40) Sic a DALBERGIO, Regis Sueciae quondam medico (MURRAY app. medicam. Vol. I. p. 410), didici.

41) R. Extracti aquosi gummi resinae guajaci unciam semis. Subige l. a. adde fellis tauri drachmas duas. Cinnabaris factitiae scrupulum unum. M. f. pilulae granorum trium. Conspergantur pulvere radice ireos florantinae. D. a. Ter de die sex. Superbibatur infusum ex floribus arnicae, herba melissae et seminibus coriandri paratum.

pediluviis et maxime *opio*, — ac sub *apyrexia*, *emetico* si opus sit, *cinchonâ* absolvenda est.

C. d. c.
serophu-
losi.

8. *Doloris capitis ex vitio serophuloso* curam, applicitis ut plurimum *hirudinibus* ad locum affectum, placide inchoamus. Maximum porro levamen a *setaceo* ad nucham, vel a *fonticulis* ad brachia, a remediis leniter alvum et urinae secretionem sollicitantibus, a *pediluviis*, a *semicupiis*, *balneisque maris* expectabis. Respectu curae radicalis, praeter debitum regimen, *sulphuretum antimonii* et *hydrargyri*, *urias calcis* et *iodium* se commendant. Praesente complicatione inflammatoria, praesertim in junioribus, *folia digitalis purpureae* ⁴²⁾.

C. d. c.
carcinoma-
tici.

9. *Capitis dolor carcinomaticus opio* ⁴³⁾ aliisque *narcoticis* ⁴⁴⁾ compescitur. *Arsenicum* ⁴⁵⁾ respuentes, potius ad *flores arnicae montanae*, et *clomatis rectae* ⁴⁶⁾ confugimus. Item ad *ulcera artificialia*.

10. Ad

42) R. Foliorum digitalis purpureae grana sex. Nisi puri, sacchari albi aa drachmam unam. M. f. pulvis dividendus in duodecim partes aequales. S. Bis de die pulverem capiat.

43) Conspicuae ejus requiruntur doses. Sic sensim sensimque usque ad quatuor grana omni tertia hora perveni.

44) Cap. I. §. VI. 40.

45) ROYSTON in HUZELAND'S *Journ. der pr. Heilk.* 1814. Febr. FRORISF *Notizen aus dem Gebiete der Natur- und Heilk.* B. 21. No. 7. p. 112.

46) Drachma una ad infusum librae unius. Pulvis ad

10. Ad *cephalaeam veneream* debellandam, C. d. c. *venerei.*
 methodus antisiphilitica, diu et ad salivationem
 perfectam usque adhibita⁴⁷⁾, requiritur. Primum

mund-

granum dimidium ter de die. Ita extractum (LIXEN
 in STORAX libell. de pulsatilla nigricante. Cas. I.
 II. 17).

47) Quam rebelles hujusmodi capitis dolores sint, praecipue in aegra nosocomii Vindobonensis expertus sum. Exhibita sensim sensimque drachma semis mercurii sublimati corrosivi, illinitaque libra aemia unguentii mercurialis fortioris, quin aut dolor terribilis capitis (unicum certissimae lule veneris erat symptoma), vel tantillum remitteret aut salivationis indicia comparuerint, jam in hydrargyro amplius continuare inconsultum credidi. Quamobrem ad acidum nitricum, ad decoctum lignorum, ad clematem rectam, confugi, at incassum. Solo opio aliquando quid solatii obtinebatur. Aegra interea emaciata periculose decumbebat. Aet ex post tres menses, qui inter ultimam mercurii dosim intercedeant, enormem salivationem, qua finita aegra plane convaluit. Similem fere casum in famulo Principis L. habui. Verum aeger taedio affectus alium adiit medicum, qui adhibitam mercurii dosim reprobat, eum e corpore eliminandum esse, contenderat. Praescripto hunc in finem decocto sarsaparillae aegrotus post tres menses in ptyalismum terribilem incidit, ac illico sanus evasit. Et Vindobae pro cephalaea dira venerea in consilium vocatus sum. Aeger morbum abusui hydrargyri tribuit. Contrariam opinionem defendens mercurium sublimatum corrosivum suasi. Eo inscio aegrotus praescripto, ac diu continuato, tandem salivatio accessit, et cum ea omnia evanuerunt mala, ita ut vir jam tibi proximus sanitati redditus sit.

muriatem superoxygenatum hydrargyri ac dein unguentum oxydi mercurii grisei adhibemus. Reliqua hydrargyri praeparata corpus contaminant, quin tam gravi in malo levamen afferant. Pro tempore ad *opium* conspicua in dosi, ac, ne alvum obstruat, cum extracto aquoso *cucumeris colocynthidis* ⁴⁸⁾, confugitur.

C. d. c.
nervi.

11. *Dolor capitis nervens*, cum magna corporis sensibilitate, jam emulsione ex *seminibus papaveris albi et amygdalis amaris* ⁴⁹⁾ sedari solet. Motu sanguinis simul concitato, ei *aqua laurocerasi* ⁵⁰⁾ additur. Hic et *succus pomorum* ⁵¹⁾, *granatorum* ⁵²⁾, maxime autem *elixir acidum Halleri* ⁵³⁾, conducunt. Praegresso fortiori animi pathemate *pulvis ruber antispasmodicus Stahlii* ⁵⁴⁾. Si facies pallida, pulsus quietus, ac alvus libera, — *extractum*

48) R. Opii puri grana sex. Extracti aquosi colocynthid. scrupulum. M. f. l. art. massa pilularum, quam divide in sex pilulas. Cap. 1—3. ad noctem.

49) R. Seminum papaveris albi. Amygdalarum dulcium decortica aa unciam semis. Amaratum No. octo f. l. n. emulsio ad col. librae unius.

50) Guttiae quinque, octo, decem, secunda quaque hora.

51) PLATEN l. c. DWIGHT in *Medical repository* 1799. Vol. 2. No. 1. Art. 5.

52) VELACHIVS Episagm.

53) Egregios illius effectus et patris mei confirmat experientia.

54) Drachma ejus una, cum aquae cerasorum nigrorum uncis quatuor. Spiritus nitri dulcia guttis quinque, et syrupo papaveris rheados uncia. M.

tractum opii aquosum ⁵⁵⁾ aut pulvis *ipecaeuanae et opii*. Labefactato systemate abdominali *aqua menthae, cinamomi, elixir viscerale Hoffmanni*, et in malo pertinaciori ac chronico infusum *herbarum verbaue et betonicae officinalium*, nec non *seminum coriandri sativi*. Quodsi uteri praesto esset spasmodica affectio, in *castoreo, succinate ammoniacae empyreumaticae, aethere sulphurico* ⁵⁶⁾, *ferula assa foetida, camphora, martialibus* auxilium quaerendum. Utrisque in casibus *clysteres antispasmodici*. Alvo obstructa cum menstruum ex atonia retentione, nobis *extractum myrrhae aquosum* ad drachmas duas, *aloes* ad drachmam semis, *crocus* ad scrupulum unum, pulvis *castorei, acidum succinicum* aa ad scrupulum semina in pilulis granorum trium ter de die quinque conduxit. Laudem quondam sub paroxysmo cephalico pilulis solaribus *Wildegausii* ⁵⁷⁾ tributam, connubio *tincturae opii compositae Sydenhami* cum *extracto hellebori nigri* ⁵⁸⁾ impertimus.

Prae-

55) Cfr. Historia morbi a WYTT (l. c. p. 507) et a RIL (l. c. p. 176) relata.

56) R. Tincturae castorei. Spiritus cornu cervi aa drachmam unam. Aetheris sulphurici drachmam semis. M. gutt. quindecim pro dosi.

57) Ex opio, helleboro nigro, croco (FR. HOFFMANN l. c.).

58) Extracti hellebori nigri drachmam semis subige in drachmis duabus tincturae croci. Adde laudani liquidi

Frank Prax. II. I. 1.

Praeterea externa auxilia non negligenda. Loquimur de *eucuphis* ⁵⁹⁾, de *odoramentis* ⁶⁰⁾, de pharmacis naribus attractis ⁶¹⁾, illinitis ⁶²⁾, appositis ⁶³⁾, de *auriculariis remediis*, praesertim vero de *frictionibus* frontis, verticis, temporum, cum *tinctura opii*, *aethere sulphurico*, *oleo cajeput* ⁶⁴⁾, *balsamo vitae externo Hoffmanni*, aut lavatione cum *aqua lavendulae composita*, *aqua et aceto rosarum*, *aqua Coloniensi* etc. Summo cum fructu temporibus sequens linimentum inungitur: R. *Olei nucis moschatae expressi unciam semis*, *Resinae styracis*, *balsami peruviani* àà drachmam semis. *Olei Rhodii guttas duodecim*. M. — Hic et *unguentum alabastrinum* ⁶⁵⁾, temporibus applicitum,

Sydenhami drachmam unam. Agitato vitro guttas viginti pro dosi.

59) E. c. ex speciebus cephalicis.

60) R. Camphorae drachmam semis. Olei styracis drachmam unam et semis. f. c. s. q. *ladani bolus*, ut odoretur.

61) Suecum herbae *glecomae hederaceae* naribus attractum cephalalgiam vehementem et inveteratam debellasse, RAJUS (Hist. plant. T. I. p. 567) asseruit et SEQUEN (Plant. Veron. T. I. p. 306) confirmat.

62) R. Olei bergamoti unc. unam. Camphorae, opii ana grana sex. S. pro usu externo.

63) In hemieranis memoria deleta atipata VROA *pessulum aromaticum* naribus admovebat (de arte medend. lib. IV. c. 3. p. 506).

64) HUZELAND's Journ. der pr. Heilk. 1825. Sept. p. 65.

65) VOGL L. c. p. 218.

citum, laudari debet. *Euphorbium* ⁶⁶⁾ nunquam adhibuimus. Si facies ardeat pedesque frigeant, *embrocatio* capitis frigida, et *pediluvium tepidum*. Rebelli in malo *electricitas* ⁶⁷⁾, *galvanismus* ⁶⁸⁾, *magnetismus mineralis* ⁶⁹⁾, *animalis* ⁶⁹⁾, a quo tamen ultimo non nisi pro tempore hic obtinuimus levamen. De *regimine dietetico* id solum dicamus, aliquando *itineria* ⁷⁰⁾, *usum lecticae* ⁷¹⁾, *blanda amicorum colloquia* ⁷²⁾, *compressionem capitis* ope manuum aut *fasciae* ⁷³⁾, *pectinationem* ⁷⁴⁾,

N 2

matri-

66) Tanquam specificum laudatur a FREITAO (auro. med. p. 344) et FORASTO (lib. IX. obs. 58).

67) SIGAUD DE LA FOND de l'électricité médicale p. 477.

68) MARCUS Magazin für Therapie und Klinik.

69) BECKER in HUZELAND's Journ. der pr. Heilk. Nov. 1828. p. 70.

69) PEZOLD in REIL's Archiv für Physiologie 2. B. p. 3.

70) Uxor comitis de qua supra (§. VIII. 4 (23)) hemi-
craniam, cui quavis die Mercurii subiciebatur, evita-
bat, die Martis ad vespertas rus petendo ac die Jovis
mane ad urbem revertendo.

71) CAELIUS AURELIANUS in capitis dolore diurnam
gestionem suadet (lib. I. c. 2).

72) HENZ Versuch über den Schwindel. Berlin 1791. p.

11. Jam CAEL. AURELIANUS in dolore capitis vocis
exercitium approbabat (No. I. lib. II. c. 6).

73) PLINIUS jam meminit: „invenio et fascia mulieris
alligato capite dolores minui (lib. XXVIII).“ Populi
Africae eadem medendi ratione uti, itineria LE VAIL-
LANT docent. Communissima quoque est applicatio
fasciarum circa caput aliaque loca dolentia apud vul-
gum Rossiae. Methodum istam, imprimis adversus co-

matrimonia, castitatem et semper extremitatum info-

phalneas, ubi cranti suturae dehiscunt, commendat Boerhaave, ubi ait (L. c. p. 12. 13): „Frequens est in Ilibernia ut capitis ossa a se discedant, ac notabili apertio dehiscant, praecipue in coronali sutura, sed et quandoque in sagittali, idque a coeca ac interna causa, absque ulla externa occasione aut violentia: cui malo promiscue obnoxii sunt viri aequae ac mulieres, nec teneri modo ac delicati sed duri quoque ac robusti, ipsique adeo agrestes, solibus et frigidioribus, et omnigenis aëria injuriis laboribusque in summam corporis firmitatem durati. Comitatur hanc discessionem magnus capitis dolor Hunc dolorem non est tollere vel placare ullis aliis remediis, praeterquam ossium istorum ad naturalem situm reductionem; quae et sponte evenire solet, sed ut plurimum non nisi aliquot diebus prius elapsis. Itaque praestat non expectare naturae conatum, sed eum praevertere Unicum autem hoc est in manibus praesidium, quibus prehensum utrinque caput, a fronte et summo occipite, si coronalis suturae compages laxata est, a lateribus vero, si in sagittali est vitium, sensim ac blandius primo adduci, posteaque validius stringi debet, donec in unum ossa coherunt; quo facto, ne statim secedant rursus, mantili aliquo validisque fasciis caput arcissime ligandum, iteratisque saepe in orbem spiribus fideliter coercendum est, atque ita in duos tresve dies relinquendum: quo toto temporis apertio quiescere debet aeger, atque ab omni corporis exercitio capitisque motu abstinere. Operatio ista satis facilia est, quam tamen paucissimi chirurgi peragere noverunt, quum multae sint passim mulierculae, quae talem ejus vanum sibi comparaverunt, ut prompte admodum ac feliciter eam expediant.“

inferiorum curam 75), fugamque caussarum plus quam singula pharmaca praestare.

12. *Violentis externis*, capitis dolori ansam porrigentibus, si recentes fuerint, *venaesectionem* in plethoricis, alias *hirudines* et *fomentationes frigidas* opponimus. Cum vero affecto capite illico primae viae in consensum trahantur, et alvi libertati quammaxime studendum 76). *Trepanum* non solum in morbis capitis traumaticis acutis, sed et in chronicis, si dolor fixus fuerit et ex vitio cranii aut extravasato sub eo originem trahat, cum aliis 77) proponimus. *Insecta* in cavitatibus nasalibus

C. d. c.
ab irrita-
mentis
localibus.

74) KEMPER (dissert. cit. §. 18) de hemicrania menstruali narrat, per id sanata, quod aegra singula nocte probe pectinata in lectum secederet.

75) Vir fide dignus mihi retulit, feminam Viennensem saevae periodicae cephalaeae hystericae subjectam, opo duorum foliorum chartae aureae (*Goldpapier*), calceamentis immissorum, atque ita compositorum, ut superficies metallicae sese invicem, superficies autem papiraeae pedes et calces tangerent, plane sanata fuisse. In dissertatione *de revulsione* etc. GÖHLER (Hal. 1708. p. 5) lego de rebeli cephalaea, per *pedum inunctionem* sanata.

76) Legatur de hoc argumento egregii АБРАХЕТИ opus: *Surgical observations on the constitutional origin and treatment of local diseases and aneurisms*. 3. edit. 1811. London.

77) LE PAVOT ergo cephalaeae terebra. Paris. 1644. J. CASPARI diss. de exostosi cranii rariose. Argentorati 1730. ΜΟΝΟΔΟΝΤΙ op. c. epist. I. No. 9. SCHMUCKER *chirurgische Wahrnehm.* 1. Th. p. 250.

libus sive in aure nidulantia, errhinis, praecipue *nicotianâ* ejusdemque vel *cinnabaris* aut *antimonii crudi fumo* ⁷⁸⁾ aggredimur. Posset quoque narium cavitas *assa foetida* vitello ovi subacta illiniri, aut *pessarium* ex hac gummi resina nariibus immitti. *Terebrationem* sinuum frontaliū, ob incertitudinem diagnoseos, non auderemus proponere. Quodsi *dens cariosus cephalaeam* induceret, evellendus foret.

C. d. c.
complicati.

13. Raro capitis doloris chronici, qualiscunque demum indolis curam suscipimus, quin *modo praeparatorio* indicationibus variis, praesertim iis plethoram encephali imminuendi, primas vias a saburris liberandi, transpirationi ope balneorum tepidorum prospiciendi etc., non satis fecissemus. Quo pacto specialibus complicationibus medendum sit, quivis ex dictis et seria meditatione historiae morbi sponte intelliget.

CAPUT

78) SCHRADER apud KREIENBERG. f. 46.

CAPUT III.

De encephalitide.

§. XIII.

Definitio. Scriptores.

1. **E**ncephalitis *) dicitur inflammatio ce- Definitio.
 rebri, cerebelli, medullae oblongatae, meningum,
 plerumque febre, saepe hypochondrii dextri tensio-
 ne et vomitu, ac pro re nata capitis dolore, delirio,
 sopore, convulsionibus, tremoribus, insignita.

2. De *encephalitide*, in genere sub nomini- Scripto-
res.
 bus *phrenitidis*, *cephalitidis*, *meningitidis*, *arach-
 noitidis*, (praeter veteres et Arabes **), praeter
 medi-

1) A Gr. κεφαλή, caput. Synon. Phrenitis & φρενίς,
 mens, Phrenismus, Cephalitis, Sphacelismus. GERMAN.
Hirnentzündung. GALL. *Phrénisie.* ANGL. *Inflammation of the brain.* POLON. *Zapalenie głowy.* RUSSIC.
 ВОСПАЛЕНИЕ МОЗГА.

2) HIPPOCRATES περὶ τοῦτων. lib. III. p. 490. περὶ πύθων.
 v. Opp. p. 518. ἐπιδημίων. III. v. Opp. p. 1085. VII.
 p. 1238. CELSUS lib. III. c. 17. Debatur illi distinctio
 encephalitidis ab aliis morbis non febrilibus et delirio
 stipatis (l. c. p. 418). CASSIUS op. c. in cap. nostro
 I. §. 1. No. 2 (20). GALENUS comment. I. in lib. I.
 Protheticon. Hippocrat. CHARTER. T. VIII. p. 694.
 IX. p. 69. de locis affect. lib. V. cap. 4. CHART. T. VII.
 p. 489. lib. IV. cap. 2. CHART. T. VII. p. 454. CAE-
 LIUS AURELIANUS P. 2. 8. 21. AETIUS tetrab. II.

medicinae instauratores ³⁾, praeterque auctores dissertationum ⁴⁾ et compendiorum ⁵⁾) scripserunt:

Serm. II. c. 25. 26. ALEXANDER TRALLIANUS, lib. I. c. 13 (Distinxit delirium inflammationi cerebri proprium a deliriis ex consensu (I. c. p. 45)). ASCLEPIADES apud CAELIUM AURELIANUM p. 2. PAULUS AEGINETA lib. III. c. 7. lib. VI. c. 90. AVICENNA canon. lib. III. Fen I. Tract. 3. cap. 1.

3) PROSPER ALPINUS med. Aegypt. lib. I. c. 13. RIVARIUS praxis medica. lib. I. cap. XI. NICOLAUS PRIO de morbis cognosc et curand. lib. I. c. X. FERRELIUS patholog. lib. V. c. 2. LOMMIUS med. observ. lib. II. p. 66. PETRUS SALIUS de morbis particul. cap. I. STOLL rat. med. T. III.

4) SCHROEDER diss. de phrenitide. Basil. 1584. HAMMINGER diss. de phrenitide. Tubing. 1588. BAESCHIUS diss. de vera phrenitide. Basil. 1601. BLOSSIUS diss. de phrenitide. Tubing. 1602. LUCHTENIUS diss. de phrenitide. Helmst. 1607. VANUS diss. de phrenitide. Jen. 1607. GILLENIUS diss. de phrenitide. Basil. 1609. SCHMITZER diss. de phrenitide. Basil. 1612. OPSPARUS diss. de phrenitide. Heidelb. 1614. SCHALLER diss. de phrenitide. Viteb. 1617. JUNKER diss. de phrenitide. Basil. 1618. FABRITIUS diss. de deliriis et phrenitide. Rostoch. 1619. et: Diss de phrenitide. Basil. 1620. MEINOMIUS diss. de phrenitide. Helmst. 1621. ROLFINK diss. de phrenitide. Jen. 1629. 1632. 1635. 1652 1672. ROEDER diss. de phrenitide. Altd. 1644. CONRING diss. de phrenitide. Helmst. 1645. MOEBIUS diss. de phrenitide. Jen. 1647. MICHAELIS diss. de phrenitide. Lips. 1648. DYLMANN diss. de phrenitide. Lugd. Bat. 1654. DE BRUYN VAN BERENDRECHT

DRECHT

DRECHT diss. de phrenitide. Lugd. Bat. 1657. SCHULZ diss. de phrenitide. Basil. 1657. MOLWYK diss. de phrenitide. Lugd. Bat. 1664. SOHNK diss. de phrenitide. Jen. 1666. SCHNEIDER diss. de phrenitide. Wittemb. 1666. JOHREN diss. de dolore capitis, phrenitide, melancholia etc. Rintel. 1674. VISSCHER diss. de phrenitide. Lugd. Bat. 1676. PECHLINUS diss. de phrenitide. Kil. 1681. BENIER diss. de phrenitide. Lugd. Bat. 1682. E. R. CAMENARIUS diss. de phrenitide. Tübing. 1684. OLTERMANN diss. de phrenitide. Rostoch. 1687. CRAUSSIUS diss. de phrenitide. Jen. 1689. VESTI diss. de phrenitide. Erf. 1692. GANTHIUS diss. de phrenitide. Basil. 1694. PINTO diss. de phrenitide. Lugd. Bat. 1694. ZUICIUS diss. de phrenitide. Basil. 1706. WEDEL diss. de phrenitide ex epitome praxeos clinicae. Jen. 1710. EJSID. diss. de phrenitide. Jen. 1736. JALOT diss. de phrenitide. Lugd. Bat. 1713. VAN WINPERSS diss. de phrenitide. Ultraj. 1713. VATER diss. de delirio febrili phrenitis dicto. Witeb. 1721. STÜVEN diss. de phrenitide et paraphrenitide. Jen. 1724. LUXNER diss. Indoles et cura phrenitidis. Erf. 1733. VAN DINTER diss. de phrenitide vera. Lugd. Bat. 1737. ALBERTI diss. de phrenitide Pannoniae idiopathica. Hal. 1739. HILCHEN diss. de phrenitide. Giess. 1742. JUCH diss. de cognoscenda et curanda phrenitide. Erf. 1742. SCHÄRF diss. de phrenitide. Altd. 1746. HALLER diss. de phrenitide. Götting. 1747. HAUNIUS diss. de phrenitidis theoria et therapia. v. diss. Basil. T. III. DE BERGEN diss. de phrenitide. Fr. ad Viadr. 1756. BRENDL diss. de phrenitide et paraphrenitide. Goett. 1756. Opp. T. III. p. 189. KALTSCHMID diss. de phrenitide. Jen. 1756. PH. G. SCHROEDER diss. de sede et indole phrenitidis et paraphrenitidis. Götting. 1766. BEHR (FALKENSOHN?) diss. sistens

sistens animadversiones quasdam ad illustrandam phrenitidis causam, Hal. 1772. TIMMERMANH diss. de phrenitide idiopathica, Rinteln. 1778. J. H. FISCHER de cerebri ejusque membranarum inflammatione et suppurazione occulta. Goett. 1781. BERRY diss. quaedam de phrenitide vera. Edinb. 1784. VAN DEN BELEN diss. de cerebri, ejusque membranarum inflammatione et suppurazione occulta. Lovan. 1784. GOLDHAGEN diss. quatenus phrenitis proprium sibi vindicet locum in systemate aegritudinis, Hal. 1785. BURNSIDE diss. de phrenitide idiopathica, Edinb. 1786. SIDREN diss. de phrenitide. Upsal. 1788. GINETTI diss. de phrenitide. Bonn. 1788. ARONSSONH diss. de phrenitide symptomatica quasdam observationes. Giess. 1790. OBERKAMP diss. de phrenitide. Herdceb. 1790. SALZFELDER diss. de phrenitide. Altd. 1790. DUBOIS diss. de phrenitide. Edinb. 1793. NOELKEN diss. de cephalitide. Erf. 1798. C. F. CONSTANTIN diss. de encephalitide. Lips. 1800 (BERNA sylloge opusc. Vol. VI. p. 74). HERPIN et LAFERONNE LACOMBE diss. *essai sur la phrénésie*. Paris 1808. THOM diss. de encephalitide. Giess. 1810. BAUERNSTEIN diss. de encephalitide et phrenitide. Erlang. 1812. DUCROT diss. *essai sur la céphalite*. Paris 1812. K. STEFFENS diss. de encephalitis pathologica, Heidelb. 1818. L. F. HELLERHART diss. de phrenitide. Gent. 1823.

- 8) SWIETEN comment. in H. Boerhaave aph. T. II. §. 771. CH. G. LUDWIG institut. med. clinic. P. I. c. 2. sect. I. BURNKRIUS institut. med. pract. T. III. c. VII. J. P. FRANK epit. de cur. homin. morb. T. II. p. 42. S. G. VOGEL *Handb. der pract. Arzneyw.* B. 4. p. 1. CONRAD *Grundr. d. Pathol. u. Therap.* B. 1. §. 213. FR. BOR. A. HILDENBRAND instit. pract. med. T. III. p. 55. HARLESS *Handb. der ärztl. Klinik.* B.

JUNT: FRINGO ⁶⁾, HORNSTEIN ⁷⁾, VIEUSSEUX ⁸⁾,
 CHARDEL ⁹⁾, MARCUS ¹⁰⁾, WEDERKIND ¹¹⁾, TH.
 BIER ¹²⁾, ROMBERG ¹³⁾, M. J. BOUILLAUD ¹⁴⁾,
 MONTFALCON ¹⁵⁾, FALLOT ¹⁶⁾, C. F. BELLINGE-
 RI ¹⁷⁾,

1. p. 371. RAIMANN *Handb. der speciellen Therapie*.
 3. Aufl. B. 1. p. 298. MAISON *Good study of medic.*
Vol. II Class. III, Gen. VII spec. I.

6) *A treatise on frenzy*. Lond. 1746.

7) *Bemerkungen über die Hirnwuth*. Gießen 1791.

8) In *Recueil périodique de la société de médecine de*
Paris 1805.

9) *Mémoire sur la phrénésie* in *Journ. de méd. chir. et*
pharmacie par CORVISANT etc. T. 11. 1806. *Février*
 p. 323. *Mars* p. 403.

10) *Ephemeriden der Heilkunde* 4. B.

11) *Einige Blicke in die Lehre von den Entzündungen*
und von den Fiebern überhaupt, wie in die von den
Gehirnentzündungen und von dem ansteckenden,
faulen Nervenfieber insbesondere. Darmstadt 1814.

12) *Quelques observations sur la phrénésie idio-pathique*.
Paris 1814.

13) *Entzündung des Gehirns* in HORN'S *Archiv für med.*
Erfahrung 1823. *Januar, Febr.* p. 50. *März, April.*
 p. 229.

14) *Traité clinique et phystologique de l'encephalite ou*
inflammation du cerveau et de ses suites, telles que le
ramollissement, la suppuration, les abcès, les tuber-
cules, le squirre, le cancer etc. Paris 1825.

15) *Dictionnaire des sciences médicales*. T. 41. p. 547.

16) *Encéphalite accompagnée de quelques circonstances*
peu communes. In *Journ. complémentaire du dict. des*
scienc. médicales. Cahier 112. p. 313.

RI ¹⁷⁾, G. B. MUGNA ¹⁸⁾ etc. ¹⁹⁾. — Porro de *infantum encephalitide* in specie egerunt J. SCHENCK A GRAFENBERG ²⁰⁾, G. W. WEDEL ²¹⁾, CH. FR. HARLESS ²²⁾, J. SCHAEFFER ²³⁾, FORNEY ²⁴⁾, LOEBENSTEIN LOEBEL ²⁵⁾, GÖLIS ²⁶⁾, J. F. COINDET ²⁷⁾, DUCHATELET et MARTINET ²⁸⁾, BAILLIEU ²⁹⁾,

17) *Storia delle encefalitidi che furono epidemiche in Torino nell' anno 1824.* Torino 1825.

18) *Delle encefalitidi che regnarono nell' estate del 1828.* In OMODEI *annali universali di medicina* 1829. Maggio. p. 248.

19) RICCI, CRISTIN, CARMAGNIOLA in *Repertorio medic. chirurg. di Torino* No. 60. p. 555. No. 61. p. 6. No. 63. p. 107.

20) *Observationum medicarum rariorum libri VII.* Lib. 1. de inflammatione cerebri. p. 58 — 64.

21) *Liber de morbis infantum.* Jenae 1717. p. 45 — 56.

22) *Einige praktische Bemerkungen über innere Entzündungen bei Kindern* p. 23 — 34. Nürnberg 1810.

23) *Von den Entzündungen der innern Eingeweide bey Kindern und deren Behandlung. Als ein Beytrag zu der Beschreibung und Heilart der gewöhnlichen Kinderkrankheiten* (HORN's Archiv. Jahr 1811. July und August p. 129 — 172).

24) *Allgemeine Betrachtungen über die Natur und Behandlung der Kinderkrankh.* Leipz. 1811. p. 1. 24.

25) *Die Erkenntniß und Heilung der Gehirnentzündung, des innern Wasserkopfes und der Krampfkrankheiten im kindlichen Alter.* Leipz. 1813.

26) *Praktische Abhandl. über die vorzüglichsten Kinderkrankh.* B. 1.

27) *Mém. sur l'hydrencephale ou céphalite interne hydrocéphalique.* Paris et Genève. 1817.

LIEU ²⁸⁾, L. SENN ³⁰⁾, DAVIES ³¹⁾, HUSCHKE ³²⁾, TH. GUIBERT ³³⁾ aliique ³⁴⁾.

§. XIV.

Symptomata. Variæ formæ. Necroscopia.

1. Encephalitis annunciari solet ¹⁾: — in Prodro-
adultis potissimum a capitis dolore ²⁾, rigore col-
li ³⁾, artuum cruciatibus, faciei oculorumque ru-
bore, vigiliis, somno turbulento, inconsueta animi
irritabilitate, oblivione rerum, oris ⁴⁾ nariumque
sicci-

28) *Recherches sur l'inflammation de l'arachnoïde cérébrale et spinale.* Paris 1825.

29) *Mémoire sur le traitement de l'inflammation du cer-
veau et de ses annexes chez les enfans.* Paris 1825.

30) *Recherches anatomico-pathologiques sur la ménin-
gite aigue des enfans et ses principales complications.*
Paris 1825.

31) *London med. repository.* January 1825.

32) *Diss. de encephalitida infantum sive (!) de hydro-
cephalo acuto.* Jen. 1825.

33) *Observation d'encéphalite et de ramollissement du
cerveau pour servir à l'histoire des maladies cérébra-
les chez les enfans.* In *Revue médicale*, Mars 1828.
p. 341.

34) GAULTIER in *Journal de médecine continué.* 1811.
Dec. p. 384. HORN's *Archiv für med. Erfahrung* 3. B.
Sept. Decemb. 1812. p. 332. 8. B. 1. Heft. p. 185.

1) In epidemia Taurinensi a. 1824. „il male non era
precedato da ben decisi sintomi prodromi, e proprii
all' encefaliti.“ BELLINGHIERI l. c. p. 14.

2) COSC. prænot. No. 120. ibid. p. 858. 3) FALLOT l. c.

4) Aridam linguam pro signo phrenitidis habuit HIPPO-
CRATES in *Prognost. sentent.* 3. CHART. VIII. p. 698.

siccitate, alvo stricta, urina pauca et ignea, vel multa et decolori, cum suspensio nigro ⁵⁾, aliquando ulcerum antiquorum exsiccatione; suppressione sudorum habitualium; — *in recens natis* a vigilia aut somnolentia inconsueta, pavoribus in somno, alvo obstructa, inquietudine, motus rudioris aversione, suspiriis, oris siccitate, supercilliorum corrugatione ⁶⁾ capitisque ardore, nec non a voracitate ⁷⁾.

Invasio.

2. Morbus ipse omni fere in aetate horripilationibus, frigore, subsequente calore continuo, vix remissiones concedente, inprimis ad caput, pulsu frequenti, contracto, duro ⁸⁾, carotidum et temporalium pulsatione, siti, lingua rubra, anxietate, inquietudine, musculorum contractione, doloribus surarum ⁹⁾, sensu plenitudinis praecipue extremitatum inferiorum ¹⁰⁾, hypochondrii dextri

5) Prognost. CHARTER. T. VIII. p. 634. SWINTEN l. c. §. 772.

6) DAVIS l. c.

7) Generatim infantum voracitas, inprimis effrenum carnes comedendi desiderium, dispositionem ad morbos cerebri ostendit.

8) GALENUS (in libello de pulsibus ad tyrones. Cap. 12. CHART. T. VIII. p. 11) pulsum phreneticum vocat durum et nervosum.

9) „Et dolores circa suram, in his mentis emotionem faciunt. Si innatarit quid in urina, dolore circa femur dissipato, mentis emotionem portendit.“ HIPPOCRATES praedict. lib. I.

10) „I'ì fu che accensò un senso di pienezza e di turgore

dextri attactum respuentis tensione ¹¹⁾, frequenti niau urinam deponendi, abdominis doloribus ¹²⁾, alvi obstructione ¹³⁾, aliquando faecibus albis ¹⁴⁾, ingruit ac, praevisis plerumque nausea, vomitu ¹⁵⁾, in aliis affectus, infra declarandos, transit. Porro, pro re nata, summa cephalaea, delirium, sopor, convulsiones, vel tremores morbo peculiariter formam impertiunt, cui formarum diversitati divisio nostra, jam longe ante ASERCROMBIE ¹⁶⁾ operis apparitionem stabilita ¹⁷⁾, encephalitiidis

universale, e specialmente delle estremità inferiori, che gli ammalati dicevano sembrargli voluminose come il tronco." BALLINGERI l. c. p. 20.

11) Huic phænomeno, ab HIPPOCRATE jam notato (Epidemic. 8. segrot. 13), medici serius debitam attentionem non praebeuerunt.

12) „Quasi tutti gli ammalati sino dei primi giorni accusavano dolori al basso ventre, non però molto intensi; questi dolori esacerbavansi alquanto sotto il tatto; la sede di detti dolori era di preferenza verso la regione ombilicale.“ BALLINGERI l. c. p. 18.

13) „Le evacuazioni alvine erano tarde e difficili.“ Idem l. c. p. 19.

14) Hoc symptoma jam ab HIPPOCRATE animadversum (in prognost. CHART. T. VIII. p. 829) et a SYRIANO defectui bilis adscriptum (l. c. p. 889), medicos citius ad scenam, quam hepar in encephalitiide ludit, attentos reddere debuisset.

15) „In uno il male principiò repentinamente con vomiti.“ BALLINGERI l. c. p. 14.

16) *Patholog. and practical researches of the brain etc.*

litudinis in *cephalalgicam*, *phreneticam*, *lethargicam*, *convulsivam* et *tremefacientem* innititur.

E. cephal-
algica.

3. *Encephalitis cephalalgica*¹⁸⁾, praeter symptomata generalia, saevam acutamque cephalaeam, nunc universum caput, nunc tantum partem illius, maxime frontem, verticem, occiput, detinentem, agnoscit. Dolet aliquando et nucha. Aeger desperabundus aurium susurrum, tinnitum, auditum acutissimum, lucis intolerantiam aut illius in iridis colores resolutionem, anxietatem, vertiginem accusat, ac praeterea pupillam contractam, oculos rubros, defixos, prominentes, vel motu convulsivo agitados, cum deleta aut aucta lacrymarum secretionem, praesente aliquando, ut vidimus, palpebrarum contractionem, prae se fert. Saeviente morbo per unum alterumve nycthemerum sub continuis vigiliis, plerumque sine delirii indicibus¹⁹⁾,
sub-

17) In prima editione a. 1818. edita, p. 216.

18) Haec est, ni fallor, ea morbi forma, quam antiquitas morbum solstitialem, HIPPOCRATES sphacelismum cerebri, — PLINIUS ardorem capitis, — AVICENNA erysipelas, — RAZE sehakilos, vocaverunt, quique doctissimis inquisitionibus MERCURIALIS (Var. lect. lib. V. cap. III), SAUVAGESII (Nosol. method. class. III. ord. 3. gen. 18), SAOARI (System. morbor. sympt. cl. X. ord. I. gen. 13. secusum vero Vicunae 1776. cl. XI. ord. III. gen. 12), CARRERI (*Malad. inflammatoire*, P. 3. sect. I. chap. 3) et BURSERII (l. c. cap. VI. §. 168—170) occasionem praebuit.

19) „In altri l'affezione del capo consisteva nel solo dolore acuto o gravativo della testa . . . senza essere

subultus tendinum apparent, sensuum officium deletur, vox deficit, aut sub copiosissimis plerumque sudoribus anaesthesiae, soporis vel paralyseos alterutrius lateris signa occurrunt. *Recens nati* praeter febrem acutissimam ac vix descriptum oculorum statum, capitis summum ardorem exhibent, diu noctuque vagitus edunt, corpusculum undique volutant, caput sustinere nequeunt, saepe reclinant, continuo sugunt, papillas nutrum male tractant, nares oculosque perfricant, indumenta dilacerant, alvo obstructa, hypochondrio dextro tenso bilem aeruginosam cum impetu vomunt, ac postremo in convulsiones aut soporem incidunt. Infantes loquela vix praediti, repetitis jam vicibus de capitis conqueruntur dolore.

4. *Encephalitis phrenetica* praeviis plerumque symptomatibus encephalitidis cephalalgicae ingruit. Jam ideae rapide sibi invicem succedunt, ac circa objecta brevi ante morbum mentem occupantia versari incipiunt ²⁰). Aeger, etsi prius mansuetus, interrogationibus cum ferocia respondet, novaque vocabula creat ²¹). Facies tumidula, iracundi

E. phre-
netica.

accompagnata da delirio, o sopore, che anzi erano molestati dalla veglia." BELLINGERI l. c. p. 17.

20) Legatur LUCIANUS (T. I in capitulo: quomodo historia sit conscribenda p. 657), de Abderitarum tragico delirio.

21) Aegra in clinico C. universitatis Vilsensis inflammatione cerebelli peremta, verbum ad nullum notum idioma spectantia proferebat, ut *cota, teda, bera*,

Frank Prax. II, 1. 1.

O

iracundi hominis, oculi prominentes, truces, scintillantes, frequens et indecora salivae spumosa, saepe in adstantes, excreatio. Sub brevi licet somno en dentium stridor, floccorum venatio, concussionones, jactationes, donec iterum vigilia vaniloquium inducat. Est autem delirium plerumque continuum, furiosum, ita ut aeger difficulter coërceri queat, ac facile sibimet ipsi vel adstantibus, quos nihilominus saepe agnoscit, vim inferat. Vidimus adspectum coloris rubri vaniloquium auxisse, illudque, ideis obscenis stipatum, priapismum et pollutiones comites habuisse. Quibus omnibus, sub ardentissima febre ac copiosissimis sudoribus, tremores, convulsiones, sopor accedunt, donec crisis aut bona aut mala morboq finem imponat. Nunquam hanc encephalitidis formam sub octavo aetatis anno observavimus. Infantes enim rarissime encephalitidi phreneticae subjiciuntur. Delirant tamen pluries tacite ²²).

E. lethargica. 5. *Encephalitis lethargica*, infantibus, senibus ²³), et unicuique, post commotiones cerebri ²⁴),

alla, ahaa, tatataa, bababaa etc. Notanda hic literarum vocalium, linguae Polonicae certe haud familiaris, abundantia.

22) Infans octodecim mensium, summo loco natus, de quo J. P. FRANK narrat (L. c. p. 185), quasi res amissas quaerere videbatur, ac nomine incognito, nec unquam antehac pronunciato (*Bóg*) res denominabat.

23) *Dissertatio* majoris momenti de affectionibus senum soporosis conscribi posset. Plurimi hic morbi consi-

bri ²⁴⁾, ac sub certis epidemiis ²⁵⁾ familiaris, respiratione magna ²⁶⁾; voce profunda, rauca, et cephalaea annunciari solet. Perstantibus sub acutissima febre hisce symptomatibus, elapsoque uno alterove nychthemero, aeger profundo sopore sepultus jacet, mussitat, masticare videtur ²⁷⁾. Rhonchos aliquando ducit, floccos capit, stragula coarctat, manus capiti admovet, vel cum una alteram pertractat, et subsultus tendinum exhibet. Oculi plerumque rubri, dentes nigro muco obtecti. Infantes praeviis symptomatibus encephalitidis cephalalgicae, in soporem incidunt, ac seriem symptomatum prae se ferunt, quam, ne doctrinam hydrocephali hic subintrantis anticipemus, silentio praeterimus.

6. *Encephalitis convulsiva*, morbus plerum- E. convulsiva.
que

O 2

derandi forent, ut *encephalitis* (de qua agitur), *febris intermittens lethargica*, *febris continua gastrica* (cujus indolem patefecerunt LE ROY in *Mélange de physique et de médecine*, Prem. mémoire sur les fièvres aiguës, p. 171. second mémoire p. 232 et 266. et BUNSENIVUS op. c. Vol. I. §. 442—450) atque *apoplexia*.

24) E. HOME l. c. p. 258.

25) „Nel maggior numero degli ammalati eravi... stupidità e molta tendenza al sonno.“ BELLINGERI l. c. p. 15.

26) In prognost. text. 24. CHARTER. T. VIII. p. 607.

27) Symptoma hoc in judaeo Polonico, viginti circiter annorum, encephalitide prius phrenetica, dein lethargica laborante, vidi.

que infantilis ²⁸⁾, saepe vomitu herboraceo, musculorum contractione (ablato videlicet aequilibrio inter extensores et flexores ²⁹⁾) et interdum ipsis convulsionibus, alterutrius plerumque lateris, ingruit. Nec rara sunt, provectioni praesertim in morbo, symptomata plus minus hemiplegiam designantia ³⁰⁾. Tandem convulsiones, sub profusis sudoribus, lethargo locum concedunt.

F. tremefaciens.

7. *Encephalitis tremefaciens* ³¹⁾ anorexia, taedio, cephalaea, calore febrili, pulsu variabili et inconstanti, aliquando vomitu ingruit. Morbo vigente, sub pulsu plus minus valido, aeger valde agitatus, continuo corporis situm mutat, libentissime sedet, manibusque tremit ³²⁾. Magna occurrit

28) VAN DERKERE *observations sur les convulsions des enfans* in *Journal complémentaire du dictionn. des scienc. méd.* 1827. Avril.

29) „Zuwellen in so hohem Grade, dass die Hand gegen die Schulterknochen, die Verse nach den nates gezogen wird.“ ROMBERG l. c. p. 232.

30) ABERCROMBIE (l. c.) forma secunda encephalitidis.

31) HIPPOCRATES jam ait (COCOE. No. 68): *tremulae, obscurae desipientiae et ubi aeger continuo quasi attritendo aliquid palpat, valde phreneticae.* — Monstrum nosologicum, aevi nostri progeniem, quod *delirium tremens* vocant, ac de quo cap. XXIV. ex professo quaestio erit, partim huc spectat.

32) In epidemia anni 1828, provinciae Vincentinae „gli ammalati lagnavano di grave abbattimento, ritti sui piedi bracciavano, ed erano colti dalla vertigine, le loro mani e braccia in preda a continuo

rit idearum exaltatio, confusio ac incohaerentia. Ceterum aegroti nec sibi ipsis nec aliis vim inferunt. Ad tertium quartumve nycthemerum perducto morbo, subsultus tendinum et tremores, pulsuum explorationem impediētes apparent. Praeterea manus vicissim extrorsum et introrsum trahuntur. Cutis tunc calore febrili interdum spoliatur, quin immo subfriget, ac viscido foetidoque sudore obducitur. Oculi ex rubro flavi. Hypochondrium dextrum valde tensum. Urina pauca, profunde tincta. Sphincterum officium deletum. Aliquando singultus.

8. Praegressae encephalitides in cadaveribus ^{Neuroscopia.} relinquant: *pericranii* ruborem³³⁾. — *durae matris* cohaesiones morbosae cum cranio³⁴⁾ et cum reliquis membranis³⁵⁾, vasa sanguinea turgida, arte quasi injecta³⁶⁾, cruorem extravasatum³⁷⁾, superficiem

tremore, talchè appena potevamo servirsiene per mettere in bocca il cibo e la bevanda. MUONA l. c. p. 249.

33) EVERARD HOME l. c. (*Pericranii inflammationem a phlogosi durae matris derivat*).

34) Cohaesione morbosam durae matris cum cranio, non rarius quam cohaesiones pulmonia cum pleura, et quidem in aegria, ex morbis aliis quam capitis et pectoris defunctis, inveni. Vide HANENSTREIT et SPRINGFELD de partium coalescentia morbo. Lips. 1738. In HALLERI coll. cit. Vol. VI. p. 377.

35) Rariores auct. (BAILLIE p. 245. et SOEMMERRING *Anmerk.* 515).

36) Frequenter obveniunt, ac si revera arte injiciantur,

ficiem duræ matris lymphæ coagulabili obductam³⁸⁾, atque pseudomembranis³⁹⁾, polypis⁴⁰⁾ insignitam, ipsius duræ matris crassitiem morbosam⁴¹⁾, tumores scirrhosos⁴²⁾, excrescentias varias⁴³⁾, suppurationem⁴⁴⁾, gangrænam⁴⁵⁾, —

sinus

microscopii ope, pulcherrimum rete vasculare exhibent (SOEEMMERRING ad BAILLIE op. c. nota 513 et HOOVER op. c. Tab. I).

37) HORNS *Archiv* 1815. 2. *Heft* p. 304. HOOVER l. c. Tab. X.

38) Lympham hanc coagulabilem nunc lacti coagulato (SOEEMMERRING ad BAILLIE p. 245, nota 514. HOOVER l. c. Tab. II), nunc gelatinæ similem, præcipue in iis, qui derepente ex encephalitiâ moriuntur, reperi. Pertinet ea tamen magis ad arachnoideam.

39) SOEEMMERRING l. c. et WRISSBERG in notis ad HALLEI *Grundriss der Physiologie*, übersetzt von SOEEMMERRING. p. 164.

40) Polypos duræ matri adhaerentes, de quibus mentionem injecit FR. HOFFMANN (Op. c. T. II. P. IV. p. 280), nil aliud nisi pseudomembranas fuisse cum VOIGTEL (op. c. 2. Th. p. 14) existimo.

41) Pluries observationes MORGAGNI (epist. lib. I. 3. epist. lib. II. 6. 19) confirmatas vidi.

42) BONETI sepulc. l. c. sect. I. obs. 57. BORRHAAVE de morb. nervor. p. 26. SCHELER de epilepsia et dolore capitis et humore duræ matris scirrhoso in *Advera. med. pract.* Vol. II. P. III. p. 493.

43) BAILLIE p. 246.

44) Lympham coagulabilem, aliquando inter ipsas duræ matris lamellas (ad BAILLIE SOEEMMERRING l. c. not. 516), aut inter duram matrem et reliquas membranas (MORGAGNI epist. LI. 2) aut, uti vidi, inter duram

sinus falciiformis extravasatum puriforme ⁴⁵⁾ vel hydatides ⁴⁷⁾, — *arachnoides* ruborem ⁴⁾ et incrassationem ⁴⁸⁾, illius veluti exanthema miliaris ⁴⁹⁾; — *piae matris* ruborem inflammatorium ⁴⁹⁾,

venas

matrem et pseudomembranas haerentem, saepissime pro pure ex abscessu habitam fuisse non dubito. Hujus vero praesentiam tunc tantum admittendam esse censeo, ubi ipsa dura mater *erosa* est, sicuti RUMLER (BONATI sepulcr. anat. lib. I. sect. XII. obs. IV. T. I. p. 280), MORGAGNI (l. c. 5) descripserunt, ac ipse bis in nosocomio Vindobonensi universali observavi.

⁴⁵⁾ BAILLIE l. c. Non nisi post laesiones externas vidi.

⁴⁶⁾ FR. HOFFMANN l. c. p. 280. MORGAGNI ep. VI. 12.

TONNELÉ *mémoire sur les maladies du sinus veineux de la dure-mère*. Paris 1829.

⁴⁷⁾ BOERHAAVE l. c. p. 541.

⁴⁸⁾ CHUVEILHIER *anatom. patholog. du corps humain*, 6. Livraison.

⁴⁸⁾ ROMBERG l. c. A. B. HENTEL diss. de cerebri et meningum tumoribus. Basil, 1814.

⁴⁹⁾ PACKENSTECHE merkwürdige Gehirnkrankheit, mit der Leichenöffnung in HARLESS *neue Jahrbuch. der deutschen Medic. and Chirurgie* B. 12. St. 3. p. 1. Similia inveniuntur apud MECHEL *Handbuch der menschl. Anatomie* B. 3. p. 160. et ejusd. *Handb. der pathol. Anatom.* B. 2. p. 328. item apud MARTINET *klinische Beobacht. A. d. Fr. übersetzt* p. 120. 138.

⁴⁹⁾ WERRAN hist. apoplect. XIV. p. 414. MORGAGNI epist. VI. 8. epist. VII. No. 13. epist. LI. 42. 59. HOOPER l. c. Tab. III. IV. A. L. J. BAYLE *revue médicale* 1827. Juin p. 357. Ruborem normalem piae matris ntpote vascularis probe a statu inflammatorio distinguendum esse, rite monet BAILLIE (l. c. p. 249).

venas varicosas ⁵⁰), pseudomembranas ⁵¹), polypos ⁵²), pus ⁵³), crassitiem abnormem ⁵⁴), excrementias ⁵⁵), — *cerebelli* saccum, parietibus crassiss, serum includentem ⁵⁶), et abscessum ⁵⁷), — *cerebri* intumesceniam ⁵⁸), excrescentiam fungosam ⁵⁹),

50) Haec venarum conditio, docente *ophthalmide varicosa*, non ita a processu inflammatorio aliena est, ut VOIGTEL (l. c. p. 29) autumat.

51) Rariss hic, quam ad duram matrem locum habere VOIGTEL (l. c.) observat.

52) MORGAONI lib. I. epist. VI. §. 15.

53) Nisi cum erosionem obveniat, uti apud MORGAONI (lib. I. epist. V. §. 11) tale pus pro lymphâ tantum coagulabili declaro.

54) MORGAONI epist. LI. 30. SANDIFORT exercitat. academ. lib. II. p. 82.

55) GÜNZ prolusio II. de cerebro. Lips. 1744.

56) NASSA *Leichenöffnungen zur Diagnostik und pathologischen Anatomie*. Bonn 1821.

57) G. BIANCHI *storia medica d'un apostema nel lobo destro del cervello*. Rimini 1751. et *Raccolta d'opuscoli scientifici*. T. 46. p. 169. STOLL l. c. DE LAMARKE in *Journ. de médecine par ROUX* 1770.

58) Hoc phaenomenon, a LIEUTAUDIO (op. c. lib. III. sect. II. obs. 68. 70. T. II. p. 329) descriptum, mihi aliquoties obvenit. Ablata medietate cranii sectione transversa, cerebrum vasis turgidis instructum, quasi prosliebat, ac volumine cavitati, in qua prius continebatur, et nunc apposita iterum theca ossea ablata, amplius contineri nequibat, nequaquam respondere videbatur. Atque sic absente omni extravasato. Cfr. ROMBERG l. c. p. 239.

sam⁵⁹), consistentiam inconsuetam⁶⁰), molliorem⁶¹), ruborem praecipue substantiae medullaris⁶²), suppurationem⁶³), aaepe pus viridescens largi-

59) SWERTEN comment. Vol. I. §. 268. HOOPER l. c. Tab. VI. VII. BOUILLAUD l. c. chap. 4. *Tissus accidentels*.

60) Quamvis post encephalitides aliquando substantiam cerebri et normalem et molliorem invenerim, plerumque tamen eam firmiorem, nisi in toto, saltem in parte, detexi. In genere consistentia cerebri potius in morbis encephali chronicis a sana conditione aberrare videtur (VOIGTEL op. c. I. Th. p. 590 sq.).

61) De cerebri mollitie, quatenus pro morbo sui generis venditata, tumultum iniecit ABERCROMBIE, ROSTAN, LALLEMAND, BOUILLAUD, CRUVEILHIER aliique, ceteri. Illam pro effectu habeo diversarum ossium cerebri non minus quam reliqua corporis humani partes attingentium (C. G. HASSE *über die Erweichung der Gewebe und Organe des menschlichen Körpers*. Leipzig, 1827): quae inter colloco peculiarem cadaverum nonnullorum flacciditatem, putredinem ingruentem, inflammationem, tum cerebri, tum arachnoidaeas (L. MARTINET in *Revue médicale* 1829. Janvier. p. 62) ad suppurationem tendentem (BOUILLAUD l. c. chap. 2) nec non collectionem morbosam seri (RUST *Magazin der gesammten Heilk.* B. 20. Heft 1. p. 160). Nec seri istam collectionem, nec phlogosin consistentem cum cerebri mollitie nexum habere jure itaque monent CRUVEILHIER (in *médecine pratique éclairée par l'anatomie et la physiologie pathologique* 1. Cahier. p. 11—29) et B. FUCHS (Heidelberger klinische Annalen B. 3. Heft 4. p. 530).

62) Dum inflammatio, quod rarius est, cerebrum ipsum

largientem, et quidem in lobo dextro ⁶⁴), corpore striato

attingit, plerumque superficiem illius *roseo* sive *erythrelaceo rubore* ac infinitis vasculis sanguinea obductam vidi. Conveniunt sic propriae observationes cum iis WILLISII (Ephem. nat. cur. cent. VI. obs. 22), STÖRMII (an. med. I. p. 101), J. P. FRANKII (epitome de cur. hom. morb. Vol. II. p. 49). — Aliam inflammationis cerebri formam in substantia medullari conspexi, quae scilicet transcissa innumerable puncta ex rubro obscura exhibebat, quod et BAILLIE (l. c.) testatur. In substantia corticali, etiamsi maxime vasculari, mihi saepe frequenter inflammationis indicia conspexi. Conspexerunt SALIVS DIVERSUS (SPRENGEL *Versuch einer pragm. Geschichte der Heilkunde* 3. Th. p. 179), HOOPER (l. c. Tab. VIII), BOUILLAUD (l. c. chap. 1), ROMBERG (l. c. p. 245).

- 63) Cavendum, ne *lympham coagulabilem*, inter cerebri gyros collectam, aut universam visceris superficiem obducentem, aut portunculæ cerebri in materiam pul-taceam, subduram, griseam conversionem, quam plurius inveni, illico pro *pure* ex abscessu pullulante declarem. Abscessus enim cerebri necessario jacturam substantiæ secum fert. Quæ si desit, etiamsi materia in cystide a pseudomembrana efformata contenta sit (PROCHASKA annotationes academicae. Prag. 1784. Fasc. II. sect. 2. cap. 2. HOOPER l. c. Tab. IX. BOUILLAUD l. c. chap. 3. *abcès enkyste*), de genuino nihilominus adhuc dubito abscessu. Hic etenim, quocumque in morbo obveniat, semper de praegressa encephalitis testatur. Non ita praesentis lymphæ coagulabilis, aliquando *metastaticæ originis*, uti aliquoties in phthisi pulmonali, suppressa sputis et illico oborto delirio, spatio trium dierum letali, observavi.

striato perforato ⁶⁵), destructo ⁶⁶), dilacerato ventriculo quarto ⁶⁷), sub osse frontis ⁶⁸), sub sutura lambdoidea ⁶⁹), aliquando cum consumptione maxime cerebri partis ⁷⁰), saepeque cum cranii carie ⁷¹).

64) BAUHIN in BONETI sepulcr. anat. lib. I. sect. XV. obs. 18. — PORTAL *mém. de l'acad. des sciences* 1780. p. 315. JONES in *London medical and surgical journal*. Januar. 1828. Vol. I. p. 543.

65) MORAGNI ep. V. 2.

66) L. CALDANI in *Saggi scientifici, e letter. dell' acad. di Padova* 1786. T. I. p. 1.

67) MONRENNHEIMS *Beobachtungen verschiedener chirurgischer Vorfälle* 2. B. p. 73.

68) MORAGNI lib. I. epist. LI. 19. STÖRK *ann. med.* II. p. 250.

69) *Ibid.* §. 80.

70) FORESTI *obs. med.* lib. X. obs. 40. ARN. BOOTH *obs. med. de affect. med. omis.* Helms. 1664. cap. III. HILDANUS L. c. obs. LXXI. TH. WILLISII *patholog. cerebri et nervor. gener.* Oxon. 1677. cap. VI. VII. VIII. BARTHOLINI *hist. anat. cent.* II. *hist.* XXXIV. T. I. p. 226. SCHNEIDER *de catarrho* lib. IV. cap. III. p. 57. BONETI *sepulcr. anat. lib. I. sect. I. obs.* 50. 51. 54. p. 30. obs. 55. p. 33. obs. 68. p. 37. obs. 78. p. 44. obs. 86. p. 51. obs. 102. p. 62. WEPFER *histor. apopl.* Amst. 1681. p. 393. 433. MORAGNI *epist.* LI. 44. n. 45. *Comment. de reb. in scient. natur. et med. gest.* Vol. III. p. 651. Vol. XII. p. 615. Vol. XVI. p. 714. *Miscell. nat. cur. dec.* II. an. V. obs. 62. *Histoir. de l'acad. des scienc. de Paris* 1700. 1741. p. 202. 212. et 1784. p. 94. *Journal de medec.* Vol. XXVII. p. 257. *Mémoir. de l'acad. de chirurg.* Vol. I. p. 318. 321. 333. MECKEL in *Mémoir. de*

rie ⁷¹⁾. *Gangraenam cerebri, cum ecchymomate non confundendam, minime vidimus, viderunt alii ⁷²⁾, praesertim post encephalitidem traumaticam,*

Pacad. des scienc. de Berlin. 1761. T. XVII. p. 59. P. AMMANN praxis vulnerum lethalium. Francf. 1761. dec. IV. obs. 3. J. F. ZITTMANN medic. forens. Frf. 1706. cent. IV. cas. 21. cent. V. cas. 4. CAMERARIUS diss. de vomica cerebri. Tubing. 1711. M. ALBERTI jurispr. medic. T. I. cas. 27. J. G. HASANEST act. phys. med. for. coll. med. Onold. Part. III. cas. 36. BOEHMER observ. anat. rar. Fascio. II. praefat. p. 5. obs. III. KAAU BOERHAAVE in Comment. Petropol. nov. Vol. I. an. 1747 et 1748. p. 353. LIEUTAUD I. c. lib. III. sect. II. obs. 105—14. T. II. p. 341 sq. PYL's Aufsätze und Beobacht. aus der gerichtl. Arzneygel. B. 2. No. 2. MARK in BLUMENBACH's medic. Biblioth. II. B. S. 552. LENTIN ebendas. B. III. S. 526. NEBEL Progr. de abscessibus cerebri a causa externa. Heidelb. 1790. FORDYCE diss. de hemierania. §. 24. Quibus plurima in xenodochio universali Viennensi observata exempla addere possum.

71) Diuturnas suppurationes cerebri raro sine cranii carie inveni, quae sibi plerumque in durissimo ossium, petroso scilicet, sedem elegerat: unde aliquando communicatio cum aure, inter alios a STOLL (l. c. p. 254), BRODIE (*transactions of a society for the improvement of medical and surgical knowledge. Vol. III. No. 11*), ITARD, BOWELL, PARKINSON etc. descripta. Cfr. J. H. SLEVOGTIUS diss. cariem cranii memorabili exemplo. Jenae 1695.

72) RIVERIUS praxis med. lib. I. cap. 12. PETRUS SALIUS de morbis particular. cap. 1. BONATUS sepulchr. anatom. lib. I. sect. I. obs. 76. 77. 78. 79. PRINGLE

cam. Nil autem frequentius observatur extravasato 73). Saepissime *hepar* vel notae inflammationis, vel saltem inconsuetam plethoram exhibens, invenimus. Alii de crebra gastro-enteritide loquuntur 74).

§. XV.

C a u s s a e.

1. *Recens nati* progeniei scrophulosae soboles, vel etiam a parentibus sanis sub rerum positionibus necdum satis intellectis orti 1), sudoribus capitis, tumoribus parotidum et testiculorum 2),

Praedis-
ponentes.

agrypni-

diseases of an army. Edit. VI. p. 302. BUNSELIUS

l. c. §. 172. SOEMMERRING in not. 532. ad BAILLIE.

73) Cap. 1Y.

74) SENN l. c. — Tributum mori diei quoque confert vir amicus BELLINGERI, ubi, quin cadavera secandi occasionem habuerit, tamen ait (l. c. p. 68): „nella epidemica costituzione delle encefaliti da me osservata, considerando la sola descrizione del male, ben si vede, che l'infiammazione cerebrale era associata alla gastroenteritide.“ Sic et MUONA sine ambagibus declarat (l. c. p. 250): „la sensazione di dolore più o meno grave, che in siffatti casi faceva risentire l'epigastrio sotto alla compressione davano a conoscere l'esservi associata la gastro-enteritide.“

1) Parentes sanissimos nosco, quorum singuli infantes, nunc mores, nunc puellae, nunc utriusque sexus, ex encephalitide, hydropi cerebri acuto aniam porrigente, obierunt.

2) HENRICUS EARLE in *Medico-chirurgical transactions published by the medical and surgical society of London*. Vol. 3. 1812.

agrypniiis ³⁾ obnoxii, dentesque mature aut tarde nimis exhibentes, — *infantes* ingenii praecocis, repentinis animi mutationibus, epistaxi, kyphosi ⁴⁾ subjecti, — *juvenes* literis et meditationibus intenti, — *viri* ⁵⁾ fortes, potui liquorum fermentatorum dediti, — *menstruantes*, *gravidae* et *puerperae*, tandem *senes* haemorrhoidarii, ad encephalitidem praedispositi sunt. Praeterea pro hoc morbo omne id, quod circulo libero sanguinis obstat, ac igitur capitis, inprimis magni, plethoram gignit, opportunum reddit.

Excitan-
tes.

2. Excitatur encephalitis in *recens natis*, — a violentiis capiti sub partu illatis, ab incauta purificatione partis illius capillatae, a concussionem cerebri per cunarum vehementem motum ⁶⁾, a pharmacis somni conciliandi aut aliorum morborum ⁷⁾ gratia exhibitis, a lapsu, a neglecta meconii evacuatione, a dentitione laboriosa, a tussi

con-

3) Vid. cap. VII. §. XXXIV. 3.

4) Puerum septem annorum, a primis vitae temporibus kyphosi ad dorsum vertebrae primas laborante, ab encephalitis subsequente hydrocephalo acuto demortuum vidi.

5) „*Fra diciotto encefaliti di da me osservate, quindici furono maschi e tre femine.*“ BELLINGHIERI l. c. p. 25.

6) Sic pluries inter judaeos Lithuanos accidit.

7) GÖLLIS (l. c.) et *atropam belladonnam*, contra tussim convulsionum porrectam, huc revocat. EWERARD HOME (l. c.) suspicatur, usum continuatum *mercurii* ad inflammationem durae matris partialem disponere posse.

convulsiva; in *infantibus et juvenibus*, — a cranium resectione, a morbis cutaneis, tinea praecipue capitis, non solum praepostere sanatis, sed etiam ab illorum impedita evolutione⁸⁾, a levini-
 nimis vestiendi ratione⁹⁾, a praematura mentis applicatione, a punctionibus et lusionibus capiti infensis, ab epistaxi suppressa, a crapula, cibis nimis aromatibus conditis, liquoribus fermentatis; in *adultis et senibus*, — a meditationibus protractis, ab animi pathematibus, praecipue ira, spe delusa, terrore¹⁰⁾, zelotypia, a curis domesticis, imprimis ei ad eas profligandas vinum aut alcohol

8) Vere Hinz (*welche Ursachen veranlassen die jetzt häufiger als sonst vorkommenden Hirnleiden bei Kindern?* in HUFZLAND's Journ. der pr. Heilk. 1826. August p. 106): „Im selteneren Vorkommen der Kopfschläge (achor, favus, tinea capitis) seit den verfloßenen zwanzig bis dreißig Jahren, finde ich ein hauptsächliches Causalmoment, warum Gehirnkrankheiten bei Kindern häufiger als vormal, zur ärztlichen Behandlung kommen.“

9) „Blosser Kopf, frey herabhängendes Haar, enblöster Hals, unbedeckte Füße, äusserst leichte Bekleidung des Körpers, wobei weder auf das Clima noch auf die Organisation der Kinder Rücksicht genommen wird.“ HINZ l. c. Cfr. J. CLARKE commentaries on some of the most important diseases of children. London 1815.

10) Judaeam, habituali cephalaeae subjectam, a manica illi obviente admodum terrefactam, in lethalem encephalitidem incidisse vidi.

alcohol in usum ducantur, ab ebrietate¹¹⁾, a suppressione menstruorum, lochiorum, haemorrhoidum, diarrhoeae (praecipue per narcotica), ac quacunque in aetate, — ab accidentalibus contusionibus, vulneribus, concussionibus, commotionibus capitis, a peculiari annua constitutione¹²⁾, a refrigerio, aestuante corpore suscepto, maxime a siccitate atmosphaerae¹³⁾, a calore¹⁴⁾, ab insolatione¹⁵⁾, a morbis variis, ut febris intermit-

tens,

11) Cap. XXIV.

12) „Il numero di diciotto encefaliti nel decorso di tre mesi è ragguardevole Imperciocchè simili malattie primarie fortunatamente sono piuttosto rare.“ BELLINGHESI l. c. p. 13.

13) „Il nostro bel Piemonte negli altri anni viene nell'estate frequentemente inaffiato e rinfrescato da molte piogge temporalesche, che moderano alquanto il calore . . . Nello scorso anno negli indicati mesi (Luglio e Agosto) non cadde per così dire una sola goccia d'acqua, l'atmosfera non presentò variazioni notabili, e per la sua aridità, ed elevata temperatura parmi aver cagionato le descritte encefaliti ed altre malattie, che di preferenza affettavano il capo.“ BELLINGHESI l. c. p. 80.

14) „Ed in tali mesi la temperatura si mantenne eccessivamente elevata, poichè il termometro di Réaumur all'ombra per più giorni oltrepassò il 29° grado.“ BELLINGHESI l. c. p. 79.

15) Jam in sacris paginis (lib. Judith cap. VIII. v. 2 et 3) legitur: „Et vir ejus fuit Manasses, qui mortuus est in diebus messis hordaeae: instabat enim super alligantes manipulos in campo, et venit aestus super

tens, typhodes, rheumatica, erysipelas, scarlatina, morbilli, variolae, arthritis, vermes, saburrae, otitis, coryza, ophthalmitis, caries cranii et ipsa denique apoplexia ¹⁶).

§. XVI.

D i a g n o s i s.

1. Encephalitis pro varia forma ac aegrorum Facilis confusio. aetate cum variis quoque morbis confundi potest ¹⁾, in adultis nempe cum *febre nervosa*, *typho*, *cephalaea*, *apoplexia*, *delirio tremente apyrectico*, *mania*, in infantibus cum *febre verminosa*, *stadio invasionis variolarum* et *dentitione laboriosa*.

2. Quoniam *febris nervosa* et *typhus* saepe E. a febre nervosa et typho distinctus. summo capitis dolore, delirio et sopore insigniuntur, difficile ab encephalitide cephalalgica, phrenetica et lethargica distinguuntur, et vice versa ²⁾.

Quae

caput ejus, et mortuus est in Bethulia civitate sua.“ — Meliora de hoc argumento haud invenies ac apud MITCHELL in *The Edinburg med and surgic journ.* No. XCIV. Jan. 1828. et *Samml. auserless. Abhandl. zum Gebrauche für pr. Aerzte.* B. 36. p. 546.

16) Cfr. cap. V. §. XXVIII. No. 3.

1) PAYVA epicrisis de morbis cerebri et mentis, qui extra cerebrum originem ducunt. Romae 1751. BOERHAVE diss. de morbis quibusdam inflammationes simulantibus aut dissimulantibus. Hal. 1769. p. 5. HARTMANN diss. de encephalitis diagnosi. Abo 1802.

2) J. L. SCHROEPER diss. de encephalitide typhum torpidum simulante commentatio, observationibus illustrata. 1814. Ad *febres nervosas* (nisi ad verminosas,

Frank Prax. II. I. 1.

P

Quae difficultas eo major evadit, quod febris nervosa et typhus, sicuti cum aliis inflammationibus, ita cum encephalitide societatem inire possunt³⁾. Error inde typhum pro specie encephalidis

ut casus similis Edit. secundae P. II. Vol. II. sect. II. cap. II. §. V. No. 1. docet) casus sequens difficultatem diagnoscere encephalitis magis magisque patefaciens, spectare videtur. „Cattarina Bossi d'anni diciotto, gravida di mesi quattro, in seguito all' aborto, cagionato dalla suppressione d'un abituale epistassi e di alcuni violenti patemi d'animo, viene assalita da delirio furioso, febbre gagliarda, dolor di capo intenso, deglutizione impossibile, stridore dei denti, accessi di rabbia, poichè gli assistenti doveano ben bene guardarsi per non essere morsi, quantunque qualcheduno non siati potuto per due volte liberarsi, essendo dalla medesima stato morsi in una mano. Un metodo antiflogistico più che mai attivo s' adoperò da valenti medici quale fu da noi pur continuato con un qualche leggiero vantaggio: non esitando di pronunciare essere la suddetta inferma travagliata da grave infiammazione del cervello. Tredici giorni dopo il suo ingresso morì. Aperto il cadavere nessuna traccia ci lasciò scorgere d'infiammazione.“ (V. CRISTIN prospetto dei risultamenti ottenuti nella clinica della R. università di Torino, nel corso dell' anno scolastico 1824—1825 dal professore CHIESA. In Repertorio di med. chir. e farmaz. Gennaio 1826. p. 3.)

- 3) MILL's the morbid anatomy of the brain in typhus or brain-fevers. Lond. 1820. 2. edit. ROMBERG l. c. p. 56. Cfr. Edit. secundae. P. I. Vol. II. sect. II. cap. I. §. V. No. 5.

litidis declarandi originem duxit 4). Distinguuntur enim hi morbi *separatim obvenientes* sequentibus notis generalibus simul perpensis.

Typhus.

a. Morbus contagiosus, saepissime epidemicus.

b. Infantibus parcere solet.

c. Exanthematibus stipatur.

d. Ingruit ac evoluitur segnitè.

e. Symptomatum exhibet contradictionem.

Encephalitis.

a. Morbus non contagiosus, plerumque sporadicus.

b. Infantes praecipue aggreditur.

c. Exanthemata nulla.

d. Ingruit et evoluitur rapide.

e. Symptomata concordia.

P 2

f. Sum-

4) MARCUS *Ephemeriden* I. B. I. Heft. Contagium typhi, utpote systemati nervorum, et praecipue cerebro infensum, hujus visceris inflammationem aliquando gignere, non negaverim. Ast sicuti nemo scarlatinam et morbillos ob id quod inflammatione faucium et pulmonum stipari solent, ad cynanchen vel peripneumoniam revocat; ita typhus nequaquam pro encephalitis habendus erit. Interea ex ipso MARCI commisso errore, scientia ob id lucrum accipit, quod major nunc typhi cum encephalitis complicati ratio habetur. Ceterum vel ante MARCUM, WHITT hydrocephalum scutum, quatenus encephalitis effectum, cum febribus nervosis comparavit, atque MACRAE pro specie harum febrium habuit. Similia apud WILLIS, PRINCE et HOFFENBACH occurunt.

f. Summa virium jactura vel a morbi initio.

g. Dolor capitis obtusus vix unquam summas querelas excitat.

h. Delirium solum sub decursu morbi, plerumque tacitum, exacerbationibus alligatum.

i. Idem de sopore et tremoribus valet.

k. Symptomata paralytica non nisi versus agonem.

f. Virium jactura nisi sub fine.

g. (In *cephalgica*) dolor capitis acutus et aeger saepe desperabundus.

h. (In *phrenetica*) delirium jam ab initio morbi, saepissime furiosum⁵⁾, continuum observatur.

i. (In *lethargica* et *tremefaciente*) sopor et tremores morbi initium comitantur.

k. Musculorum contractiones⁶⁾ primum, dein mox symptomata paralytica.

E. a cephalaea.

3. Quam arcte *cephalaeae*, praesertim inflammatoriae, rheumaticae et artbriticae, *encephalitidi* alligatae sint, monuimus⁷⁾. Possint immo plurimae earum sat secure pro *inflammatione* sive *habituali*, sive *chronica cerebri* aut *meningum* declarari.

5) SWERTEN l. c. §. 774.

6) „Eins der unterscheidendsten Kennzeichen der Cephalitis von andern Krankheiten ist die Contraction der Muskel.“ ROMBERG l. c. p. 232.

7) Cap. II. §. X. 3.

clarari. Interea ne imperium *encephalitidis occultae* (quatenus a lenta insolatione pendet perbelle descriptae *) ultra quam par est extendamus, dolores capitis, febre (etsi infido hic signo **) aliisque phlogoseos certioribus indiciis or-

batos,

8) *Encephalitis chronica* a lenta insolatione, ait MICHALL (l. c.), dolore capitis cum sensu distensionis ordiuntur. Facies tumida, vicissim rubra et pallida evadit. Accedit rubor albugineae oculorum. Pulsus tangitur celer. Lingua in medio muco densae oblecta est; ad latera vero rubra cernitur atque sicea. Alvus clausa, urinae pauca et turbida. Aeger loquax, inquietus, diu noctuque occupatus, cibos respuens, aut veluti inconscie absque masticatione deglutiens, suspiciosus et irascibilis, verba joci gratia prolata pro offensis agnoscit, minimamque contradictionem repugnat. Ceterum judicio aliisque facultatibus illaesis gaudet. Vires corporis suctae. Morbus sic per plures protrahitur hebdomadae.

9) „I progressi fatti dalla fisiologia ci insegnano, che il sistema nervoso e specialmente l'encefalo (e sotto questo nome comprendesi anche la coda del midollo allungato) ha una marcata influenza sulla temperatura animale, nella respirazione, sopra l'ematosi, e sulla circolazione, e principalmente per mezzo del nervo paio-vago, e dell'intercostale, i quali presiedono alle funzioni del cuore e del polmone. Se adunque proprio è della pressione fatta sulla sostanza cerebrale, e sui tronchi nervosi di produrre più o meno sintomi di paralisi, e di deficiente azione nervosa, ne avviene necessariamente, che nel progresso delle encefaliti le forze muscolari si abbattano, si diminuisce la temperatura, la respirazione si fa più lenta, il

batos, potius nomine *cephalaeae*, quam *encephalitidis*, designabimus.

Desiderium.

4. Quoniam autem febres variae indolis obveniunt, quarum potissimum symptoma in *cephalaeae* aut *delirio* consistit, quin reliqua encephalitidis signa praesto sint, quaeque circiter ita ad inflammationem cerebri se habent, uti febres catarrhales ad peripneumoniam; optamus, ut, veterum ¹⁰⁾ ac FR. HOFFMANNI ¹¹⁾ more, tales febres sub nomine *cephalicarum* aut *phreneticarum*, aut *phrenulae* ¹²⁾ retineantur. Indolis plerumque sunt inflammatoriae aut rheumaticae, saepe cum symptomatibus catarrhalibus complicantur, ac plerumque alvum obstructam exhibent. Subjiciuntur illis infantes, praecipue autem juvenes haemorrhoidarii et puerperae, vigiliarum, studiorum, crapularum, ebrietatis, suppressionis lochiorum culpa. Medici minus experti tales febres pro nervosis

sangue perfino non presenta la cotenna, ne altre sue qualità fisiche come nelle infiammazioni che hanno la sua sede in altri visceri, rendesi anche più languida l'azione del cuore, onde il polso sentesi tardo, picciolo e debole." BELLINGERI l. c. p. 54.

10) TRALLIANUS lib. I. cap. XIII. CAELIUS AURELIANUS lib. I. cap. II.

11) Opp. Vol. I. sect. II, cap. V.

12) RUSH med. Verhandl. des Colleg. der Aerzte in Philadelphia. 1. Th. 1. St. BOYLE medical and surgical journal. 8. Vol.

vosia declarant *). Demortuo tunc sub calefaciente regimine aegro, in cadavere nil nisi turgor vasorum sanguiferorum encephali atque, testantibus jam BLANCARDO ¹³⁾ et SCHENCKIO ¹⁴⁾, copiosum extravasatum serosum invenitur.

5. *Febris verminosa* non tanta inquietudine et anxietate ingruit, quam *encephalitis*. Caput hic, ibi venter infantum prae ceteris partibus aestuant. Porro in encephalitide vomitus crebrior, aeruginosus ¹⁵⁾ cum peculiari impetu absolvitur, et alvus est pertinaciter clausa. Tandem anamnesticis morbi sedem determinandam adjuvant.

E. a febre verminosa.

6. Quum *variolae* cum febre, capitis dolore, vomitu et convulsionibus invadere ac quarto solum die efflorescere soleant; medici nostro aevo hoc exanthema, praesertim in adultis, rarius expectantes, saepe ingruente morbo encephalitidem arguunt. Erroris periculi memores immunes erunt.

E. a stadio invasionis variolarum.

7. *Encephalitidem* diviserunt in inflammationem *meningum* et *cerebri*; illi cephalaeam, delirium

E. divisione.

*) Laude itaque dignus TONNET (*observation sur la fièvre cérébrale qui a semblé revêtir les formes d'une fièvre typhoïde - pernicieuse* etc. In *Bulletin des sciences médicales*. Mars 1839. p. 368) utpote talem errorem evitaverit.

13) Anatom. pract. obs. 3.

14) Lib. I. fol. 64. et N. C. dec. II, an. V. obs. 62.

15) „Vomitus in capitis doloribus aeruginosi, cum surditate et vigiliis, cito insaniam affore denuntiant.“ HIPPOCRATES praedict. lib. I.

rium et convulsiones, — huic torporem, soporem et paralyzin tribuendo ¹⁶). *Meningitidem* subdiviserunt in inflammationem *durae matris*, *arachnoideae* et *piae matris*, juxta aevi hypotheses momentum modo unius, modo alterius membranae extollendo ¹⁷). Inflammatio *cerebri* in *totam* et *partialem* divisa est, e *phlogosi cerebelli* tremorem ¹⁸), pollutiones et prispismum ¹⁹), temere ²⁰)

16) LALLEMAND I. G. PARENT-DU CHATELET et MARTINET I. G. p. 105. TOMMASSINI dell' *infiammazione e della febbre continua* p. 132 — 136.

17) Testantibus BAGLIVIO (de fibra motrice), MAZINIO (mechanica morborum) et REGA (de sympathia) quondam *dura mater* primam in explicandis symptomatibus encephalitis causam ludebat. Doctrina a BROUSSAIS, PARENT et MARTINET, sique GENDRIN (*Annales du cercle médical* 1823. Juillet) tradita, docet, ordinem nunc *arachnoideam* tangere. Immo jam praesens est A. L. J. BAYLE (*observations d'inflammations aiguës des méninges* in *Revue médicale* 1827. Juin. p. 361) *piae matris* vindex. De nugis ejusmodi BROUSSAIIUM pulchre alloquitur FODERÉ (*Journ. complémentaire du dictionnaire des sciences médicales* 1825. cahier 81. p. 8): „il doit savoir qu'un semblable empire (de l'arachnoïde) a été accordé très-longtemps à la dure mère, et qu'elle a un droit légitime d'ancienneté.“

18) „Nell' encefalite tremefacente sembra che l'infiammazione occupi principalmente il cervello, e le parti inferiori del cervello, cioè i corpi striati, i talami ottici, e le gambe del cervello; poichè queste parti dell' encefalo sembrano principalmente destinate ai movimenti, giusta l'esperienza dei citati ROLANDO

re ²⁰) repetendo, atque unicuique cerebri inflammati loco peculiaria symptomata adsignando ²¹). Praeterea statuerunt encephalitidem *phlegmonosam*, *erysipelaceam*, *echymomaticam*, *serosam* et *occultam*. Tandem nec *divisioni encephalitidis* juxta ejus *periodos* pepercerunt ²²). Nos, aliorum ad exemplum ²³), persuasi, alia haud dari quam *conjecturalia plane signa ad sedem et gradum encephalitidis*

e FLOURENS relativamente al cervelletto, di MAGENDIE, di FOVILLE, e PINEL GRAND-CHAMP quanto ai corpi striati, e talami ottici." BALLINORRI l. c. p. 36.

19) *SERRAS recherches sur les affections organiques du cerveau.*

20) *"Le lobe du cervelet étoit le siège d'une altération pathologique très-profonde, et jamais dans le cours de la maladie on n'a observé d'érections, circonstance sur la quelle la douleur cervicale appelloit particulièrement l'attention."* FALLOT l. c. p. 318.

21) *JUXTA BOVILLAUD (l. c.) pendent: a laesione loborum anteriorum cerebri — affectiones organorum loquelae; ab ea corporis striati — illae extremitatum inferiorum; ab ea thalamorum opticorum — illae extremitatum superiorum; ab ea substantiae cerebri cinereae — illae sensus; atque ab ea substantiae albae — illae motus.*

22) *BOVILLAUD l. c. Partie seconde (Periodus 1. cerebri rubor, tumor et quaedam durities. P. 2. mollities. P. 3. abscessus. P. 4. Productiones accidentales).*

23) *SAHMEN l. c. Kap. 2. CHARDREL l. c. ("les symptômes qui caractérisent l'inflammation des méninges et du cerveau se confondent ensemble").*

encephalitidis determinanda; ejus morbi divisionem potius *ex indole* desumendam esse credidimus. Stabilimus itaque *encephalitidem traumaticam, inflammatoriam, rheumaticam, catarrhalem, gastricam, arthriticam, periodicam, nervream et secundariam.*

E. traumatica.

8. Partus difficilis, instrumentis aut rudiori manu peractus, motus insanus cunarum, saepe *encephalitidem traumaticam* recens natorum gi-
gnunt. Idem morbus quacunq[ue] in aetate, a violentiis externis, praecipue a capitis vulneribus, a cranii concussionibus, a cerebri compressione (secundum chirurgiae leges²⁴) dijudicandis), inducitur.

24) HIPPOCRATES *περὶ τῶν ἐν κεφαλῇ τραυμάτων*. Edit. Geneva. 1657. p. 895. P. JULIANUS de curatione vulnerum capitis libellus. Venet. 1549. A. PARÉ *méthode curative des playes et fractures de la tête humains*. Paris 1564. MARTINUS Gallus in Hippocratem de vulneribus capitis. Paris. 1578. NIC. VINCENTIUS ad dicta Martini in Hippocratem de vulneribus capitis. Colon. 1578. FR. VERTURIANUS liber Hippocratis de vulneribus capitis commentariis illustratus. Lutet. 1578. HARDOUIN DE ST. JACQUES ergo inter capitis *τραύματα βεβήματα* periculosa. Paris. 1581. ANDR. ALCASARIS liber de vulneribus capitis. Salams. 1582. J. B. CARCANUS LEO liber de vulneribus capitis. Mediolani 1583. P. M. TRONC de ulceribus et vulneribus capitis. Ticini 1584. DOERRER *dis. περὶ τῶν ἐν κεφαλῇ τραυμάτων*. Basil. 1589. FALLOPIUS comm. in Hippocr. de vulneribus capitis. Opp. T. II. PALMIER ergo a capitis *τραύματι* oppositae partis convulsio. Paris. 1597.

ducitur. Forma plerumque *lethargica*. Sedes pro re nata meninges aut cerebrum.

9. Hæ-

PROCIPIUS diss. de fracturis cranii. Basil. 1609. J. BRABI liber de vulneribus capitis. Coimbr. 1610. PASCHATI decas de gravissimis capitis affectibus. Lubec. 1618. HEURNIUS diss. de vulneribus capitis. Lugd. Bat. 1623. J. BERENDOARIUS tractatus de cranii fractura. Lugd. 1629. CORTESIUS tractatus de vulneribus capitis. Messana 1632. J. C. ARANTIUS commentarius in Hippocratis librum de vulneribus capitis. Lugd. 1641. SCULTETUS diss. de fractura cranii. Lugd. Bat. 1642. C. V. SCHNEIDER de natura ossis frontis et ejus vulneribus ac vitia. Vitab. 1650. Ejusd. de osse occipitis etc. Vitab. 1653. Ejusd. de vulneribus syncipitis. Vitab. 1653. P. PAAW succenturiatus anatomicus; seu de vulneribus capitis in Hippocratem. Lugd. Bat. 1656. L. CLUYRAT tractatus de vulneribus capitis. Tolos. 1667. FR. DISSAUDEAU *commentaire sur Hippocrate des plaies de tête*. Rouen 1658. B. FALCINELLI *commentario al libro delle ferite del capo*. Firenze 1658. BAUMGAERTNER diss. de vulneribus capitis. Basil. 1660. L. BOTALLUS discursus de vulneribus capitis. Lugd. 1665. LE CLERC diss. de fractura cranii. Lugd. Bat. 1670. HOFFMANN diss. de fracturis cranii. Vitab. 1671. SCHNEIDER diss. de fracturis cranii. Wittenb. 1673. MEINOM diss. de cranii lacionibus a causa externa violenta. Helmst. 1674. STAFFART diss. de fractura cranii. Lugd. Bat. 1676. A. BOIREL *traité des playes de tête*. Alençon 1677. J. YOUNG *wound of the brain proved curable*. London 1678. WEDEL diss. aeger vulnere capitis laborans. Jen. 1684. VERN diss. de vulnere capitis illustrissimæ personæ casus fatalis. Francf. 1689. W.

E. in-
flamma-
toria.

9. Haemorrhagiae suppressae, potus liquo-
rum fermentatorum, animi pathemata, insolatio,
ence-

SCHOUTEN *het gewonde Hoofd, of korte Verhandel-
linge van de Opperhoofds wonden. Amst. 1694.* ZINN
diss. de vulneribus capitis. Basil. 1695. W. SCHULZ
verletster Kopf. Leipz. 1695. NANTER diss. de vul-
neribus capitis. Argent. 1709. J. M. MÜLLER *casus
medico-chirurgicus de fractura cranii. App. ed ob-
serv. et curationes medico-chirurg. decad. II. No-
rimb. 1714.* A. KOKLFIN de capitis laesionibus me-
temata med. chirurgica. Hafn. 1717. SALZMANN diss.
*miracranii fractura in homine XL annos superavite,
Argent. 1718.* H. WALTHER *glücklicher Feldscherer,
oder gründlicher Unterricht von den Kopfwunden. Lpz.
1718.* SCHACHT diss. de vulneribus capitis exterius.
Giess. 1719. Ejusd. diss. de vulneribus capitis interio-
ribus. Giess. 1721. P. S. ROUHAULT *traité des playes
de tête. Turin 1720.* KISNER, GLASBACH and JONAS
von einer besondern Hauptwunde. Francf. 1724. L. F.
MANN *observation de chirurgie au sujet d'une playe
à la tête. Avignon 1729.* DE L'ESPINE *questio chi-
rurgica: an post gravem capitis contusionem etiam
mediocriter suspecta cranii fracturâ vel fissurâ, cutis
una cum pericranio ad os usque incidenda? Affirma-
tive. Paris. 1734.* HILCHEN diss. de vulneribus cranii.
Giess. 1748. C. TACCONI de nonnullis cranii ossium-
que fracturis etc. Bonon. 1751. SCHMID diss. de vulne-
ribus capitis. Harderovici 1752. HEISTER *med. chir.
anat. Wahrnehmungen. Rost. 1753. No. 641.* DE
MATTEOS diss. de cranii fractura. Lugd. Bat. 1753. J.
F. CANTHEUVER diss. *sistens tractationem compen-
diariam morborum capitis externi. Fr. ad Viadr. 1756.*
A. FIER de morbis capitis externis. Genevae 1757. J.

encephalitidem inflammatoriam, cerebro et sinibus

BATTINO *chirurgicall facts relating to wounds and contusions on the head.* Oxford 1761. BUSNEL diss. de fractura cranii. Paris. 1766. PAPILLON diss. de fractura cranii. Paris. 1766. J. WILLIAMS *some histories of wounds of the head.* Lond. 1766. PERCIVALL POTT *observations on the nature and consequences of those injuries, to which the head is liable from extern violence.* Lond. 1768. ALEFELD diss. *in contrahitura in cranio infantis aequae ac adulti generari quae?* Giess. 1769. FRISAC *thèses de chirurgie sur les blessures de la tête.* Toulouse 1769. RESS diss. de laesionibus capitis. Argent. 1770. J. U. BILOUER *medic.-chirurg. Fragen, welche die Verletzung der Hirnschale betreffen.* Berlin 1771. R. DE HAUTESIERCK *recueil d'observ. de méd.* Paris 1772. Vol. 2. p. 533. MARIÉ DE LA TOUCHE *traité des lésions de la tête par contre-coup.* Meaux 1772. BAUER *zwo chirurgische Wahrnehmungen von einer Kopfwunde.* Leipzig, 1773. *Traité nouveau des contre-coups à la tête.* Paris 1774. W. DEASE *observations on the wounds of the head.* Lond. 1776. SWIETEN comment. in H. Boerhaave. Csp. de vulneribus capitis. EGGERS diss. de laesionibus capitis. Witteb. 1776. POML *progr. de fractura ossis bregmaticae cum fissura per os temporum penetrante.* Lips. 1776. TRILLER diss. de laesionibus capitis. Viteb. 1776. SCHMUCKER *vermischte chirurgische Schriften* B. 1. p. 311. 318. B. 2. p. 71. 137. 161. 314. B. 3. p. 45. 136. 261. 266. THEDEN *neue Bemerkungen und Erfahrungen.* B. 1. p. 73. B. 3. p. 64. F. MARTINI *Betrachtungen in der Lehre von den Hauptwunden.* Hamb. 1769. RICHTER *Progr. de fracturis cranii.* Goett. 1769. M. G. BRAUER *Hippocrates von den Kopfwunden.*

bus maximè infensam, a nulla forma alienam, excitant.

10. En-

1785. DESAULT *ausert. chirurg. Wahrnehm.* passim. Ejusd. *Nachlass. B. 2. Th. 3. p. 3.* LOMBARD *remarques sur les lésions de la tête. Strasb.* 1796. ASKHAM *diss. de capitis injuriis. Edinb.* 1801. W. FLOUQUET *diss. sistens capitis laesionum letalium historias duas. Tub.* 1801. P. A. MARIN *considérations médico-chirurgicales sur les plaies de tête avec fractures de crâne. Strasb.* 1803. FR. A. TÜRK *diss. commotionis cerebri pathologiam sistens. Lips.* 1810. C. VINALL *diss. de morbis capite sociato ortis. Edinb.* 1820. BECK *animadversiones de capitis vulneribus practicae, annexis aliquot insigniorum laesionum narrationibus. Friburg.* 1826. V. KERN *Abhandlung über die Verletzung am Kopfe und die Durchbohrung der Hirnschale. Wien* 1829. Inter opera, quae universam chirurgiam amplectuntur, respectu laesionum capitis excellit C. BELL: *System der operativen Chirurg. A. d. E. Berlin* 1815. Singulas observationes huc spectantes continent: *Act. Erudit. Lips.* 1683. p. 321. 1686. p. 615. 1693. p. 182. 341. 512. 1712. p. 418. 1715. p. 465. 1723. p. 138. 1725. p. 83. *Commerc. liter. Norimb.* 1731. p. 166. 1741. p. 94. 1743. p. 55. 1745. p. 126. *Ephem. nat. cur. dec. I. ann. 1. obs. 119. ann. 3. obs. 278. dec. II. ann. 1. obs. 29. ann. 3. obs. 52. ann. 5. obs. 206. ann. 8. obs. 139. ann. 9. obs. 161. dec. III. ann. 3. obs. 168. ann. 4. obs. 51. cent. III. obs. 95. cent. X. obs. 2.* *Histoire de l'acad. des sciences de Paris.* 1742. p. 126. *Mémoires de l'acad. de chirurgie T. I. No. 3. Journ. de médecine T. 1. p. 449. T. 21. p. 165. T. 25. p. 38. 177. 275. 435. T. 26. p. 455. T. 29. p. 74. 171. T. 33. p. 117. T. 38.*

10. *Encephalitis rheumatica*, ut plurimum *E. rheumatica et catarrhal.* in meningum, durae praecipue matris, textu locata, ad exsudationes prona²⁵⁾, sub forma *cephalalgica* et *phrenetica*, ad *lethargicam* proclivi, obveniens, atque facile cum *otitide* societatem iniens, juxta praecepta, in doctrina februm rheumaticarum tradita, dijudicanda est. *Encephalitis catarrhalis* ex neglecta coryza ortum ducit, ac interdum convulsiones socias agnoscit²⁶⁾.

11. Quam-

p. 549. T. 39. p. 469. T. 41. p. 504. T. 48. p. 224. T. 50. p. 348. T. 55. p. 251. T. 59. p. 433. T. 61. p. 498. T. 65. p. 68. T. 76. p. 89. 65-68. T. 77. p. 83. *Journ. de médecine continué* T. 16. p. 470. *DUCAN'S Annal. Vol. 2. Lustr. 2. sect. 2. No. 6. Medical and physical journal, Vol. 12. p. 15. Medico-chirurgical transactions Vol. 14. LODER'S Journal für Chirurg. B. 1. p. 388. B. 2. p. 49. MURKIN'S neues Journ. für Chirurg. St. 3. p. 267. HUYELAND'S Journ. der pr. Heilk. B. 5. p. 425. B. 9. HARLESS rheinisch-westphälische Jahrbücher für Med. und Chirurg. B. 11. St. 1. p. 64. *Heidelberger klinische Annalen. B. 3 Heft 3. HAHN über die Kopfverletzungen. ibid. B. 6. Heft 3. p. 412. FRICKE Annalen der chirurg. Abtheil. des allgem. Krankenhauses in Hamburg. B. 1. p. 19. OMODEI annali universali di medicina 1828. Novemb. Osservatore medico. Napoli 1829. Grave ferite di cervello. J. P. GAMA traité des plaies de la tête et de l'encéphalite, principalement de celle qui leur est consécutive. Paris 1830.**

25) *Serosa* hinc dicitur a WEDEKIND (l. c.), qui vero potius *febrem cephalicam rheumaticam* per *encephalitidem serosam* designat.

26) *Puer Vilnensis doctoris Bernard filius*, inopinatus

E. gastrica.

11. Quamvis in febribus gastricis cephalaea, delirium et sopor, quin ideo encephalum phlogosi laboret, obvenire possint; attamen *encephalitidem gastricam* stabilire cogimur²¹⁾, ab erysipelate faciei ejusdem indolis in eo solum diversam, quod ibi encephali interiora, hic exteriora inflammatione superficiali laborant. Cave quidem ne encephalitis naturam gastricam, ob vomitum, utpote plerumque consensualem, admittas; sed cave etiam ne collectionem bilis, omni fere morbo cerebri addictam, in nostro de quo agitur morbo, inprimis si is, praevis ira in strenuis potatoribus ac tempore ubi annua constitutio morbis gastricis favet, abortus fuerit, praetervideas.

E. arthritica.

12. *Encephalitis arthritica* (chronice ut *cephalaea* et *mania* obveniens) senibus, podagra, haemorrhoidibus et vitiis viarum urinalium laborantibus, addicta est. Evolvitur (sub forma praesertim *lethargi*) praevis refrigerio, animi pathemate, crapula, vel post cohibitam per opium diarrhoeas salutes, fugatumque praepostere herpetem.

13. Ob-

convulsionibus corripitur. Accersitus audio aegrotum ooryza laborasse, cujus adhuc vigeant symptomata una cum febre. Concludo affectionem membranae Schneiderianae per cavitates narium ad cerebrum pervenisse, ibique *encephalitidem convulsivam catarrhalem* excitasse, ac capiti hirudines ut admoveantur, curo. Quorum effectus diagnosin plane confirmavit.

21) GROTIUM diss. de phrenitide varia semper biliosa. Jen. 1794.

13. Observationibus nonnullis innixi²⁸⁾, me-
 dicos quondam²⁹⁾ hortati sumus, ut inquirant, E. perio-
dica.
 num febres intermittentes, capitis dolore, delirio,
 sopore, feroci insignitae quaeque vulgo *ceph-
 alicae, maniacae, lethargicae* audiuntur, potius *en-
 cephaliticae* dicendae forent. Objectioni affectio-
 nem encephali istis in febribus quatenus sub par-
 oxysmo tantum obvenientem atque cum apyrexia
 declinantem, non posse *inflammationis* esse effe-
 ctum;

28) Cl. MIANOWSKI, historiam febris intermittens per
 hydrocephalum in viro aetate propecto, terminatae,
 coram Caes. societate medica Vilnensi enarrans, atten-
 tionem meam ad affectionem capitis in intermittentibus
 magis magisque traxit. Ad mentem simul revocavi
 observationes SYDENHAMI de mania aliorumque de
 gravibus morbis nervosis post intermittentes. Inter
 a. 1812. mense Martio, ad mercatorem judaeum, tri-
 ginta circiter annos numerantem, febre intermittente
 tertiana, cujus paroxysmi terribili capitis dolore in-
 signiti erant, laborantem, vocatus fui. Praemissis re-
 solventibus et purgante quarto paroxysmo cinchona
 obviam ire decrevi. At incassum: nam paroxysmus
 majori quam unquam vi reversus est, converso capitis
 dolore in delirium furiosum cum stridore dentium,
 oculis trucibus, et motibus convulsivis brachiorum.
 Febre ex hoc subcontinua reddita, de latente enceph-
 alitide minime dubitans, illico ad multitudinem hiru-
 dinum ad caput, ad pediluvia aëria, ad calomel, ad
 vesicatorium confugi, quibus singulis aegrum per tri-
 duum in summo discrimine versantem, ab orci fauci-
 bus eripui.

29) In prima hujus operis editione. p. 236.

Frank PRAX. II. I. 1.

Q

ctum; ad *ophthalmias* et *peripneumonias periodicas* provocando, obviam ivimus. Hodiedum autem ubi existentia *encephalitidis periodicae* jam extra omnem dubitationis aleam posita est³⁰⁾; monitum potius, ne quaecumque febris intermittens graviore capitis affectu stipata, mox pro inflammationis meningum aut cerebri progenie, auxiliis antiphlogisticis profligandâ, habeatur, inculcandum esse existimamus.

E. maligna.

14. Exstant sane *encephalitides* (inprimis neglectae, male curatae, aut in valetudinariis evolutae), quae, quatenus virium summa dejectione, evacuationibus colliquativis, ecchymomatibus, resolutione sphincterum, decubitu gangraenoso, pulsuque debili diffuente, ingruentes³¹⁾, notionibus nostris de genuina phlogosi, utpote methodum antiphlogisticam poscente, adversantur, quas epitheto *malignarum* designare licebit. Differunt ab affectibus serotinis *compressionis cerebri* in reliquis *encephalitidis speciebus*, quod cum allatis symptomatibus *ingraunt*.

E. secundaria.

15. Vitia chronica encephali, — erysipelas capitis, phlegmone oculi, otitis, scarlatina, — parotitis, hepatitis, nephritis, epididymitis, — pleuritis, febris puerperalis, cystitis, — peripneumonia,

30) ITARD in *Revue médicale* 1823. T. 12. p. 121. PUC-
CINOTTI *storia delle febbri intermittenti di Roma*,
Urbino 1824.

31) *Sammlung medicin. Wahrnehmungen* B. 8. p. 203.

monia, phthisis pulmonalis, — typhus, morbilli, variolae, — rheumatismus acutus, — aliquando *encephalitidem* excitant, ut verisimile est, nunc per irritationem localem, nunc per propagationem inflammationis a partibus vicinis ad encephalum, nunc per affinitatem peculiarem glandularum discernentium cum cerebro, nunc per consensum membranarum serosarum pectoris, abdominis cum dura matre, nunc per obstaculum, quod redditus sanguinis per venam cavam descendentem in pulmone experitur, nunc per metastasin.

16. Quemadmodum oculorum vitio chronico obnoxii, ad ophthalmitides acutas contrahendas maxime idonei sunt; ita quoque encephalilabe diuturna laborantes, ad encephalitides. Ex tali morbi chronici cum acuto complicatione, haud praevidenda emergit symptomatum caterva; dumtaxat a medico morbos invicem distinguere gnaro, quatenus in homines aut sanos aut valetudinariorum incidunt, enucleanda.

E. accessoria.

§. XVII.

P r o g n o s i s.

1. Encephalitidem inter tertium¹⁾ et septimum diem saepe letalem esse, ac fugatam licet

Periculum.

Q 2

gra-

1) „In tutti gli ammalati costantemente vidi al terzo od al quarto giorno della malattia superati i sintomi più rimarchevoli, così che poteva in questo tempo francamente pronunciare sopra un esito felice.“ BELLINGHAMI, c. p. 21.

gravissimis reliquiis ansam praebere, hinc morbum periculo plenum constituere, non est, cur moneamus. Veruntamen adhaesiones abnormes cranii cum dura matre hujusque callositates, aliquando in cadaveribus hominum ex morbis vix cum capite nexum habentibus demortuorum obviae, et praeterea felix aegritudinis sub recta methodo medendi, dummodo mature adhibita ²⁾, eventus, prognoseos rigorem quodammodo infringunt. In genere mali ominis habentur: inane sanguinis e naribus stillicidium, sudores copiosi, virium jactura, venatus floccorum volitantium et praecipue signa transitum morbi in hydrocephalum acutum indicantia ³⁾. Ceterum prognosis ex indole, gradu et sede encephalitidis desumenda.

E. traumatica.

2. *Encephalitis traumatica* a minimis licet injuriis orta aliquando effectus serotinos terribiles agnoscit ⁴⁾. Levis enim atque chronica pericranii phlogosis sensim sensimque cranium aggredi potest. En inde cariem, temporis tractu per diploen ad meninges proserpentem. Iis ab ichore acri jam erosio ac inflammatio, cerebri ipsius affectio inevitabilis. Quod cum accidit, praesertim stabilito

2) „Nisi morbus illico gravissimus sit, sique apta medendi methodus mox in principio ejus adhibetur, tunc curationem admittit, magis tamen praecavetur, quam curatur.“ LUDWIG institut. med. clinic. p. 129.

3) Cap. IV. §. XXII. No. 4.

4) J. CHR. POMERIUS Progr. de periculo contusionum capitis. Lips. 1774.

bilito suppurationis processu, cohibitoque aliquando effluxu puris ad exteriora per fistulas 4), malorum varii generis 5), vix aliter quam in morte, expectandus est finis 6).

3. Nisi *encephalitis inflammatoria* epistaxi, E.inflam-
matoria, haemorrhoidibus, menstuis, lochiis, narium, aurium effluxu, diarrhoea, sudore, urina sedimentosa ac praecipue somno *resolvatur*, — cuncta mala a haemorrhagia interna, ab extravato seroso, puriformi, a partium morbosa adhaesione, callositate 7), tumore, excrescentiis, abscessu 8), a deleto influxu nervoso, pullulantia, — apoplexia videlicet, hydrocephalus, fatuitas, amnesia, mania, paralyse, coecitas, surditas, olfactus deletus, convulsiones, phthisis encephalica, decubitus

4) EVERARD HOME in *Transactions of a society for the improvement of medical and surgical knowledge*. Vol. 3. No. 10.

5) J. ANNISON *Fall einer Kopfverletzung, nach welcher Geruch und Geschmack verloren gegangen*. *Médec. chir. Zeitung*. Inspr. 1825. Octob. p. 20.

6) Legi meretur casus J. L. PETIT, a LALLEMAND (l. c. lettre 3) enarratus; quo de casu etiam in *Journ. complémentaire du dictionnaire des scienc. médic.* T. 11. p. 256. quaestio est. Item BOYER *traité des maladies chirurgicales*. Paris 1816. T. 5. p. 11. HOUTE *onderzoek aangaande de meest voorkomende oorzaak en de behandeling van de onsteking der hersenvliezen, welke men somwyl, ook na schynbaar geringe Hoofdwonden waarneemt*. Utrecht 1820.

7) ROMBERG l. c. p. 250. 8) §. sq. 10. De phthisi encephalica.

bitus gangraenosus, stertor, mors denique ipsa expectanda sunt.

E. rheu-
matica.

4. *Encephalitis rheumatica*, utpote sedem plerumque in meningibus figens, minus periculosa foret, nisi maxime ad extravasata, fertilissimum morborum succedentium fontem, prona esset. Bonum, si cessantibus encephalitidis indicibus vel erysipelas ad caput⁹⁾, vel dolor pectoris occurrant. Ceterum morbi solutio uti in encephalitis inflammatoria.

E. gastri-
ca.

5. Specialem de *encephalitis gastrica* prognosin stabilire non audemus.

E. arthri-
tica.

6. *Encephalitis arthritica* prognosin encephalitis inflammatoriae et rheumaticae agnoscit. Cum autem morbus ille in aetatem proveciorem incidere, ac alias aegritudines socias habere soleat; periculum adhuc majus. Solutio morbi nonnunquam per apparitionem podagrae ad extremitates inferiores, per diarrhoeam, fluxum haemorrhoidalem, reditum herpetis, contingit.

E. perio-
dica.

7. *Diagnosis encephalitidis periodicae* necdum satis firma est, ut illi jam prognosis superstrui possit.

E. mali-
gna.

8. Nulla certe *encephalitis* magis in praecipiti est *maligna*, unde HIPPOCRATES¹⁰⁾: „quibus cerebrum sphacelatum est in tribus diebus pereunt; si vero hos evaserint, sani fiunt“¹¹⁾.

9. AC-

9) Edit. secundae P. I. Vol. I. sect. II. §. LXIII. No. 4.

10) l. c.

11) Pulchre BUNSENUS (l. c.): „Verba sane Hippocratis

9. Accedit *encephalitis secundaria*, quae E. secun-
daria. cum originem ex vitiis antiquis encephali e. c. a callositate, tumore, abscessu, carie traxerit, mors inevitabilis. Nullam saltem, quae cephalaeae et vertigini chronicae, vel maniae, et epilepsiae supervenerat, encephalitidem sanatam vidimus. Caveamus igitur, ne tales *morbos acutos ex chronicis evolutos* cum iis, quae sanis alioquin in hominibus occurrunt, ac plerumque ab auctoribus uti per se existentes ab omni complicatione alieni describuntur (unde saepe morbi in natura ab eorum descriptione in libris tam diversi), confundamus. Nec melioris saepe ominis encephalitis ex aliis morbis, e. c. ex febre puerperali, peripneumonia, phthisi pulmonali, originem ducens, utpote complicata et corpus jam labefactatum inveniens, observatur.

§. XVIII.

C u r a.

1. In encephalitide phrenetica securitati aegri Genera-
tim. ut in febre nervosa cum delirio studendum ¹⁾. Generatim, quae liberum sanguinis circulum impediunt, abigenda, caput denudandum, et in graviore malo, si delirans id concedat, radendum ²⁾.

Cor-

sano modo accipienda sunt, quis autem cerebro corrupto et vere sphacelato sanari possit? ³⁾

1) Edit. secunda. P. I. Vol. I. sect. II. §. XXXI. No. 23.

2) CARLIUS AURELIANUS auctor. morbor. lib. I. cap. 10.

p. 30. CELSUS lib. III. cap. 18. p. 30. SYDENHAM

Corpus erectum tenendum 3). Tandem modica obscuritas, summum silentium, paucorum non loquacium adstantium numerus, requiruntur.

C. e. traumaticae.

2. Cura *encephalitidis traumaticae* ex chirurgiae regulis desumitur. Venae sectiones modicae 4), hirudines, fomentationes frigidae ad caput 5), lenia alvum evacuantia, diacta severa, balnea pedis, praeter curam vulneris, praesertim si fractura, aut, quod longe pejus, fissura calvariae adesset, potiora curationis momenta sistunt.

C. e. inflammatoriae.

3. *Encephalitidis inflammatoriae* curam non quidem arteriotomiâ 6), sed *ampla* saltem *venae sectione* ordimur 7). *Ampla* inprimis requiritur phle-

in schedula monitoria de novae febris ingressu. p. 660.
SWIETEN op. c. §. 781.

3) STDENHAM l. c. p. 659.

4) Omni sane jure BRONIE (l. c.) asserit, multa symptomata, quae laesioni capitis adscribi solent, ex sanguinis dumtaxat jactura pendere, cujus jacturae effectus Dr. MARSHALL HALL perbelle enucleavit (*Medico-chirurgical transactions Vol. 13*).

5) SCHMUCKER l. c. B. 1. p. 86. MASSALIER de usu epithematum frigidorum in capitis laesionibus magno, per novam experientiam probavit. Viteb. 1805.

6) AKAKIA ergo phrenitidi arteriotomia. Paris 1630.

7) „Sino dai primi sviluppi della malattia praticava il salasso, dal braccio di libbra abbondante; e se i sintomi non si calmavano, che anzi si aumentavano pel proprio andamento del male, faceva ripetere la cacciata di sangue nello stesso giorno alla medesima, od in più picciola dose. Nei casi più intensi ho ripetuto

phlebotomia in encephalitide phrenetica et tremefaciente, quippe delirium et tremores, quominus haec operatio facile repeti possit, impediunt. Idem impedimentum etiam selectum venae aperiendae adtingere solet. In E. lethargica jugularis externa secunda⁶⁾, praecipue praegressa phlebotomia in pede aut brachio, quae ultima, utpote cruorem majori impetu largiens, optime succedit. In E. cephalalgica tamen sanguinem potius e pede educimus. Peracta venae sectione, concedente id delirio, ad *hirudines* confugiendum, quarum in adultis triginta (minorem numerum infantibus), temporibus, processibus mastoideis, collo, naribus internis⁷⁾ et secundum suturam sagittalem

il salasso nelle prime ventiquattro ore sino alla quarta od alla quinta volta, e così nel detto spazio di tempo ho fatto estrarre tre a quattro libbre di sangue; e fù in questi casi che vidi il più pronto e felice successo, e contenersi, e quasi sciogliersi la malattia al secondo, o terzo giorno con non grave dispendio delle forze degli ammalati, poichè al sesto o settimo giorno discendevano dal letto, ed era pronto il loro ristabilimento. BELLINGHESI l. c. p. 92.

8) NAUMEIMER de sectione venarum jugularium in quam plurimis morbis capitis praeceteris phlebotomiis salutari. Mogunt. 1776.

9) „Hirudines applicabantur internis naribus, et hirudinibus delapsis sanguinem in sufficienti quantitate fluere sinemas; quo remedio plures phreneticos delirio intra horum unam aut alteram liberatos incantamenti instar non semel vidimus.“ RYNERIUS prax. med. lib. II. cap. 14.

lem admoveamus. Sequuntur in illis viginti quatuor *cucurbitulae scarificantes*, vix vertici¹⁰⁾ aut occipiti¹¹⁾, sed potius utrique spinæ vertebralis lateri applicandae. Si neget haemorrhoidarius aut puerpera, hirudines ad unum. Quo tempore undique cruor (corio interdum destitutus¹²⁾) cum moderatione tamen¹³⁾ detrahitur, alvus *clysteribus antiphlogisticis ac escoproticis* vel ipse denique

10) ARETAEUS CURAT. ACUT. lib. I. c. 1.

11) CELSUS lib. III. c. 18. PH. L. HANNIKENIUS diss. de scarificatione occipitis plurimorum capitis morborum auxilio. Lips. 1741.

12) „La mia osservazione mi ha dimostrato costantemente, e nella descritta costituzione epidemica, ed in presso che tutti gli altri casi di encefalite traumatica, o sporadica, che il sangue estratto non presenta quasi mai la coerenza, come per lo più suole accadere nelle gravi infiammazioni degli altri visceri.“ BELLINGHAMI l. c. p. 49.

13) Audiatis! — „Der junge und unerfahrene Praktiker glaubt, wenn er eine Entzündung des Gehirns oder eines andern Eingeweidcs zu behandeln hat, niemals zu schaden, wenn er so lange Blut weglässt, bis der Schmerz und alle übrigen Kennzeichen der Entzündung verschwunden sind. Aber wie viele sind durch ein solches Verfahren ins Grab gestürzt worden! . . . Denn es ist erstaunend, welcher Schaden eine weggelassene unschickliche Blutmenge, nachdem der hitzige Zustand gehoben worden ist, veranlasst. Bei der Hirnentzündung z. B. bringt sie eine Ergießung zwischen die Hirnhäute und die Hirnhöhlen.“ MITCHELL l. c. p. 566.

que purgantibus, ut radice convolvuli jalappae cum muriate hydrargyri miti, sollicitanda¹⁴⁾, non neglecto nitrato potassae. Prosunt simul maniluvia, pediluvia tepida. Affusio capitis ope aquae frigidae cum aceto omni secunda, tertia hora per momentulum instituta, infantibus praesertim miraculose prodest¹⁵⁾. Eam continuatae applicationi frigoris, sub forma glaciei aut cataplasmatum, serotinos effectus hujus methodi timentes, anteponimus¹⁶⁾. Contra ea largis sinapismis ad crurum aut surarum superficiem, praecipue hora vespertina adhibitis, summopere favemus. Nil enim potentius calorem febrilem infringit ac capitis turbas compescit.

4. Cura encephalitidis rheumaticae illi inflammatoriae similis, ea cum exceptione, quod
C.e. rheumaticae.
frigori

14) INOMASSIAS utrum in phrenitide exsolvens medicamentum, an leniens dumtaxat congruens sit? PANOSM, 1545. DU PORT ergo phrenitidi confest purgatio et venae sectio. Paris, 1589.

15) Consentit, sed laude excedit, S. VOGL: von dem Nutzen der kalten Fomentationen des Kopfes in Gehirnentzündungen durch acht Beobachtungen erläutert u. erwiesen. In HUFELAND's Journ. der pr. Heilk. 1826. August. p. 3. SPEYER Bemerkung. Ab. die Gehirnentzündung. ibid. Suppl. 1829. p. 188.

16) AL. BOMFARD considérations sur quelques maladies de l'encéphale et des ses dépendances, sur le traitement et notamment sur les dangers de l'emploi de la glace. Paris 1827. Versio Germ. auctore HARMANN, Osnabr. 1830.

frigori locum esse non credamus. Porro senescente morbo, exhaustoque regimine antiphlogistico, ast, enixe rogamus, non prius, *vesicatorium*, in gravi malo ac in adultis capitis universi superficiei rasse imponendum. Sic in encephalitide tum phrenetica, tum lethargica ex orci faucibus licuit eripere segros. Leviori in malo, aut apud infantes, satius est vesicatorium *nuchae* admove. Interea lenia diaphoretica, ac si vomitus non obstat, parvae *tartratis stibii et potassae doses* vesicatoriorum actionem sustinent.

C. e. gastricae.

5. In *encephalitide gastrica*, praemissis securitatis causa *evacuationibus cruoris localibus* ad caput, ac dein *cucurbitulis scarificantibus* ad hepar, *resolventia* prius, dein pro re nata sive *emeticum* sive *catharticum* praescribitur. In E. phrenetica, quo minor utilitas aut majus damnum¹⁷⁾ evacuationis sanguinis praemissae, quoque major hinc probabilitas, delirium ex consensu cerebri cum abdomine originem trahere, eo securius ad *emetikum* confugitur; vidimusque pluries, paucis bilis rejectis uncis, aegrum placidum evasisse. *Tartras stibii et potassae* ad vomitum ciendum maxime hic idoneus, ad dosin solito duplicem vel tripli-

17) WOLLENHAUPT diss. de venesectione intempestiva in phrenitide. Viteb. 1706. WOLF diss. Hippocratis cautela exemplo Halicarnassensis super venesectione intempestiva in phrenitide et delirio febrili. Hal. 1776.

triplicem porrigendus¹⁸⁾. Scopo purgante, imprimis si vermium habeatur suspicio et *muriatē hydrargyri mitem*, in adultis ad grana duodecim pro unica vix repetenda dosi, exhibere solemus. Peractis necessaria evacuationibus, imprimis si erysipelatis reconditi auspicio haberetur, regimen diapnoicum uti supra.

6. *Encephalitis arthritica*, praemisso usu C. e. arthriticae.
venaesectionis et evacuationum localium sanguinis, pro re nata ad caput, spinam, hypochondrium dextrum, vasa haemorrhoidalia et crurum internam superficiem suscipiendarum, — habitaque summa ratione alvinae excretionis, maximum in *balneis pedum calidis et acerbis*, nec non in *sina- pismis et vesicatoriis*, extremitatibus inferioribus adhibendis, invenit auxilium. Praeterea ad libertatem transpirationis et urinae respiciendum, unde nunc *infusa diapnoica*, nunc *decocta diuretica*, ex radice praesertim *ononidis spinosae*, in usum ducuntur.

7. In cura *februm intermittentium perniciosarum cephalicarum, maniacarum et lethargicarum*, suspicionis latentis encephalitidis memores, quo magis haec a constitutione aegri et a symptomatibus morbi confirmari videretur, eo magis virgente paroxysmo sanguis saltem *hirudinum* ope C. e. periodicae.
detra-

18) Quid de LALLEMAND (l. c.) cogitandum emetico hinc contra seculorum experientiam viluperante? BROUSSAIS ei oculorum aciem praestrinxisse.

detrahendus, atque accedente pyrexia, priusquam ad cinchonam deveniatur, perpendendum, utrum illi alvum evacuantia nisi praemittenda, saltem jungenda sint.

E. mali-
gna.

8. *Encephalitis maligna* antevertitur, inflammationes meningum, cerebri et cerebelli, juxta earum indolem, mature minimoque virium vitalium dispendio, curando. Evoluta jam morbo, quid praeter *vesicatorium* ad caput, *flores arnicae montanae*, et *camphora*¹⁹⁾ valeant, tentandum.

Monitum. 9. Ne in curanda encephalide tumultuarie incedamus! Phlogoseos nimirum primo sedato impetu, etiam concedendum ut febris, (dumtaxat in encephalide traumatica pro secundaria habenda) crisin absolvat. Ipsa denique encephali phlogosis flatu abigi nequit. Erisne interea superfluous spectator? Nunquam! Continuatio enim remediorum sive antiphlogisticorum, sive alvum ducentium, sive diaphoreticorum, medicum exposcit, cujus praeterea est, encephali phlogosis quorsum tendit, maxime num ad *exsudationem*, num vero ad *suppurationem*, prope observare. Primo in casu, ut infra docebitur²⁰⁾, vasa lymphatica ad absorptionem pellenda, vigente adhuc satis stadio inflammatorio — *sals ammoniac*²¹⁾ et *digitali*

19) BANG in Actis societ. R. med. Havn. Vol. I. p. 8.

20) Casp. IV. §. XXII. 13.

21) R. Murias ammoniacae, succi radices liquiritiae inspissati aa drachmam unam. Solve in s. q. aquae fontis fervidae. Colatura librae unius detur (Pro adulto).

gitali purpureâ ²²⁾, aliâs radice *polygalae senegae* ²³⁾ et *mercurio* ²⁴⁾. Cujus virtutem *vesicatoria*, vel alii stimuli ²⁵⁾, circa locum affectum, sustinent.

10. *Suppuratio meningum cerebri, cerebelli*, *Phthisis cephalica*.
phthisin constituit *cephalicam*, quondam affectibus omissis adscriptam ²⁶⁾, dein observationibus plurimis dilucidatam ²⁷⁾ aevoque nostro propius per-

22) R. Foliorum digitalis purpureae scrupulum unum. Infunde c. s. q. aquae fontis fervidae per quartam horas partem. Colaturae librae unius adde nitri puri drachmam semis. Syrupi simplicis unciam unam (Dimidium pro puero nychthemeri spatio dosis tota, vel duplicata, pro adulto).

23) R. Radicis polygalae senegae drachmas duas. Coque c. s. q. aquae per quadrantem horae. Colat. librae unius adde oxymellis simplicis unciam unam (Pro adulto).

24) Sub forma calomel vel unguenti grisset ut capite sequenti docebitur.

25) De icibus, *mallet calidi* ope, capiti inflictis miracula narrat MAYOR in HUFELAND's *Journal der pr. Heilk.* 1829. *Julius* p. 104: *Neue und glückliche Anwendung der örtlichen Hitze und der Quecksilbersalbe.*

26) BOOTIUS observationes medicae de affectibus omissis, secundum editae cum praefatione H. MEIBOMII. Helmst. 1664. cap. I. De abscessu hypocranil. cap. II. De vomica hypocranil. et cap. III. De vomica cerebri.

27) Ab auctoribus passim §. XIV. No. 8. citatis et J. H. FISCHER de cerebri ejusque membranarum inflammatione et suppuratione occulta. Goetting 1781.

perpensam²⁸⁾. *Diagnosis* maxime habitâ ratione curriculum encephalitis instituitur; denegatâ nimirum ejus plenaria solutione²⁹⁾. Quae diagnosis eo certior est quo magis continuatio febriculae, (aliquando hecticarum instar, periodos servantis³⁰⁾), perpetua cephalaea, vomitus creber, oedema

28) AL. DENMARK in *Medico-chirurgical transactions published by the medical and chirurgical society of Lond. Vol. 5. 1814.* et scriptores recentiores de morbis cerebri in genere.

29) Anno 1821. mense Maio Carolus filium decennem praesidis Zawitza Vilnae ab encephalitis sociis jam indicibus hydrocephali, sanitati quidem restitui; ast sine evidenti crisi et quin physionomiae pristina rediret forma. Ceterum quadam excepta crurum imbecillitate, sanus videbatur. Vere ann. 1822. ingruente, vomitus hinc inde in conspectum veniebat. Basil cranii utrimque fonticuli admovebantur, idque cum levamine, Adolescens sani instar munera solvebat. Mense Julio ejusdem anni, vomitus crebrior redditus est. Quod quum perpenderim, habitâ simul ratione peculiaris oculorum verbis haud describendae conditionis, pulsusque solito lentioris matrem periculi quo filius versabatur serio admonui, rogans ut aliorum quoque medicorum consilium audiretur. Inter ea aeger inopinate mortuus. Sectioni cadaveris locus haud fuit. Vix dubitarem abscissum encephali latuisse.

30) Spectaretque huc: *Observation d'une céphalalgie intermittente survenue à la suite d'une plaie de tête, par Mr. ETIENNE DE COLLEVILLE in Journal complémentaire du dictionnaire des sciences médicales 1826. Cahier 101. p. 51.?*

ma faciei, sudores caput circa diluculum irrorantes, crinium lapsus, laesionesque sensuum, facultatum animi et motus, observantur. Quoad *prognosin*, casus quidem materiae per nares, oculos et aures felici eventu evacustae, minime desiderantur³¹⁾; ast ipsos non verum *pus*, sed *serum*, vel *lympham coagulabilem*, respicere putamus. Jam diu enim constat: „omnes qui ex casu per aures saniosam materiam reddiderunt, de medio sublato fuisse“³²⁾. Ceterum et hic spes miraculosae sanationis, quam natura aliquando contra omnem expectationem in cranii superficie tam externa³³⁾ quam interna molitur, nisi regimen, aut ars³⁴⁾ obstant, restat. Quae quum ita sint, praescriptis ex *fonte diastetico* victu blando, nutriente et aqua selterana; ex *fonte chirurgico* fonticulis utrinque ad basin cranii, et ex *fonte pharmaceutico* sero lactis dulci, aegros aliis conaminibus

31) Cfr. cap. IV. §. XXII. No. 11.

32) PACHEQUUS apud LAZ. RIVERNUM observat. Paris. 1646. obs. 18.

33) G. PH. ZWINGER diss. historia pericranii sua sponte regenerati. Altdorf. 1756.

34) „Quodsi serius ad aegrotum accesserit medicus aut omnibus rite administratis nihil profecerit, nec suppurationem impedire poterit, sciat de coesero totum negotium naturae committendum, adhibitâ tantum diligentia, ne quidquam ab aegro fiat, unde in opere suo inieurbetur; id quod sollicite observetur, solet ipsa toto negotio rite defungi, aegrumque tandem in integrum restituere.“ BOORUS l. c. p. 4.

bus therapeuticis minime excruciamus. Excipimus solum phthisin cephalicam ex encephalitide traumatica. Hic etenim quum sedes abscessus propius argui possit, *terebrationem* cranii ³⁵⁾ vel *puncturam* meningum et cerebri, ut pus effluat, in aegro ceterum adhuc sat valido, non proscribimus, etsi parum vel nihil boni inde expectemus ³⁶⁾.

Sensibilitas mor-
bosa par-
tium, a
prævia
inflam-
matione
relicta.

11. Magnae autem aegrorum et medicorum consolationi esto, vigilias, cephalaeam, vertiginem, jacturam memoriae aliaque symptomata post encephalitidem relicta, haud admodum raro, non ex vitiis organicis meningum et cerebri, sed ex sola *sensibilitate morbosa et imbecillitate* partium recenter a phlogosi liberatarum proficisci. Hic denique est, ubi praeceuntibus SYDENHAMO, BOERHAAVIO et SWIETENIO ad *narcotica* ³⁷⁾ deveniendum, dummodo febris et alvus clausa non obstant. *Massam pilularum de cynoglossa* ³⁸⁾ omni alio tunc anteponimus narcotico.

CAPUT

35) Felix exemplum refert GAY in *Recueil périod. etc.*

36) „On ne doit pas mettre en doute la nécessité de recourir à ce moyen extrême, mais on doit fort peu compter sur le succès, lors même qu'on atteint le foyer.“ LALLEMAND l. c.

37) BURGEOIS ergo phrenitidi narcotica. Paris. 1653.

38) Adulto a granis tribus ad quinque hora somni perfecta.

CAPUT IV.

De hydrocephalo.

§. XIX.

Definitio. Divisio.

1. **C**ollectio morbose seri in cavitate cranii, *Definitio.* congenita, chronica, acuta, accessoria, spasmis, anaesthesiis, paralysisibus, pedetentim ansam porrigens, *hydrocephalus* *) dicitur.

2. Qua ex definitione *divisio* hydrocephali *Divisio.* in *congenitum, chronicum, acutum et accessorium* sponte elucet.

§. XX.

De hydrocephalo congenito.

1. *Hydrocephalus* cum cranii cavitate mon- *Definitio.* strose aucta, in foetu per abortum, partum, vivo, demortuo excluso, nuncupatur *congenitus*.

2. Exempli talis hydrocephali, nobis pluries *Scriptores.* *visa* *), retulerunt: PECHLINUS *), BONETUS *),

R 2 SCHEN-

*) Ab ὕδωρ, aqua et κεφαλή, caput. GERM. Hirnwassersucht, Wasserkopf. GALL. Hydropisie du cerveau. ANGL. Dropsy of the brain. ROSSIC. Головная водяная болѣзнь. POLON. Woda w głowie.

1) Praecipue in museis pathologicis Italiae, Germaniae, Galliae, Angliae et Rossiae.

2) Observationes phys. medicae. Hamb. 1691. lib. I. obs. 61.

SCHENKIUS ⁴⁾, STALPARTUS VAN DER WIEL ⁵⁾,
 FABRICIUS HILDANUS ⁶⁾, RUYSCH ⁷⁾, GAUDELIUS ⁸⁾,
 HALLER ⁹⁾, MORGAGNI ¹⁰⁾, LIEUTAUD ¹¹⁾, ROR-
 DERER ¹²⁾, HEEENSTREIT ¹³⁾, KLINKOSCH ¹⁴⁾, MOH-
 RENHEIM ¹⁵⁾, BÜTTNER ¹⁶⁾, BORDENAVE ¹⁷⁾, MUR-
 RAY ¹⁸⁾, WRISBERG ¹⁹⁾, OSIANDER ²⁰⁾, VOIGTEL ²¹⁾,

ME-

- 3) Sepulchr. anatom. lib. I. sect. XVI. app. 5.
- 4) Obs. lib. I. obs. XXX. p. 28.
- 5) Obs. med. chir. varior. Cent. II. obs. XIV. Tab. 2.
- 6) Obs. cent. IV. obs. 10. 7) Thesaur. anat. II. obs. 52.
- 8) Diss. de hydrocephalo. Goett. 1763.
- 9) Disputat. anatom. T. VI. p. 320.
- 10) De sed. et caus. morbor. epist. XII.
- 11) Hist. anat. med. lib. III. sect. V.
- 12) De monstro foemineo cum hydrocephalo insignis
 magnitudinis. In Comment. soc. R. Goett. T. IV.
 p. 136.
- 13) Diss. de capitonibus. Lips. 1751.
- 14) Progr. quo hydrocephalum foetus rariorem ejusque
 causam proponit. Prag. 1773. In WALK N. Ausg.
 2. B.
- 15) Beobachtungen verschied. chir. Vorfälle. 2. B. p. 202.
- 16) Beschreibung des innern Wasserkopfs und des Bein-
 körpers einer von ihrer Geburt an bis in das 31ste Jahr
 krank gewesenen Person. Königsb. 1773.
- 17) Mémoires présent. à l'acad. des scienc. T. 4.
- 18) Foetus hydroceph. intern. corrept. descript. Upsal.
 1797.
- 19) De hydrocephalis. Vid. Gött. gelehrt. Anz. 1804.
 No. 204.
- 20) Annalen der Entbindungslehranstalt zu Gött. 1. B.
 2. St.
- 21) Fragment. semiolog. obstetr. p. 65.

MECKEL ²²⁾, CRUVEILHIER ²³⁾, DUNCAN junior ²⁴⁾, FLAMM ²⁵⁾, HORNER ²⁶⁾, ANDRY ²⁷⁾ aliique ²⁸⁾.

3. Foetus hydrocephalicus formam capitis irregularem, ampliorem quam par est, interdum obliquam ²⁹⁾, exhibet. Cranii enormis magnitudo nequaquam reliquo corpori, inprimis faciei, exiguae ac triangulari, respondet ³⁰⁾. Ita et pondus ³¹⁾.

Descriptio.

22) Op. c. I Th. p. 280.

23) *Médecine pratique éclairée par l'anatomie et la physiologie*, 1. cahier. Paris 1821. p. 11 — 29. Et *Sammlung auserles. Abhandlungen für pr. Aerzte* B. 30. St. 2. p. 274.

24) In *Transactions of the medico-chirurgical society of Edinburgh*. Vol. 1. 1824. No. 8. Cfr. *Gerson Magazin der ausländ. Liter. der gesamt. Heilk.* B. 10. p. 288.

25) *Geschichte eines mit enormer Verletzung einzelner Schädelknochen todtgeborenen reifen wasserköpfigen Kindes*. *Rust Magazin für die gesamt. Heilk.* B. 29. Heft 1. p. 184.

26) Ex *American journal of medical sciences* 1829. May. In *HECKER's lit. Annalen der gesamt. Heilk.* 1829. August. p. 506.

27) *Mémoire sur les maladies du fœtus et de ses annexes*. *Journal du progrès des sciences et institutions médicales*. T. 1. 1830.

28) *Breslauer Samml.* 1721. I. B. p. 541. *Commerc. litter.* Norimberg. 1732. p. 195. — 1731. p. 134. — 1736. p. 364.

29) MECKEL l. c. p. 283.

30) *Wrisberg Salz. med. chirurg. Zeitung* 1805. 3. B. p. 92. Longitudo foetus erat 23. pollicum, ea capitis

10). Ossa parietalia, frontis et occipitis, quandoque dimidiata ³¹⁾, in centro prominent ac dura sunt. Quo magis autem ad peripheriam perveniunt, eo minor ossificationis invenitur ratio, ita ut haec ossa, valde tenuia ³²⁾, hinc inde membranacea ³³⁾, punctis solum osseis iisque radiatis vel locis cartilagineis ³⁴⁾ notata, obveniant. Praeterea suturae plane desiderantur. Spatia, nonnullorum aliquando pollicum ³⁵⁾, inde relicta, membranarum, saepe puncta ossificata referentium, ope, cooperiuntur. Hisce spatiis potissimum amplitudo enormis capitia tribuenda. Eorum maximum ad fontanellam, ut dicunt, anteriorem cernitur. Laminae orbitales, propter nimiam extensionem, angulos, quos alias cum osse frontis agnoscere solent, amittunt. Orbitalium hinc cavitatibus deletis, atque ex concavis convexia redditis, oculi foras et deorsum ita propelluntur, ut palpebrae inferiores pupillas ad centrum usque cooperiant. Et meatus auditorii externi complanantur,

10. Eadem fere conspiciebatur latitudo. MECKEL l. c. p. 278.

30) WASSERHOFF in exemplo universi infantis pondus 19. libras 7, uncias adaequabat. Capitis pondus, eductis jam 7. libris aquae, adhuc libr. 6. unc. 4. erat.

31) MECKEL l. c. p. 282.

32) BÜTTNER l. c. p. 17. WASSERHOFF l. c. p. 92. MECKEL l. c. p. 285.

33) BÜTTNER, BORDENAVE ll. cc.

34) MECKEL l. c. p. 286. 35) MECKEL l. c. p. 291.

nantur, ac latitudine altitudinem excedunt ³⁶⁾. Crines saepe praeter modum longi. De copia et sede aquarum infra ³⁷⁾. Haud raro inter ossa cranii tumores conspiciuntur ³⁸⁾, serum ³⁹⁾ aliquando et cerebrum ⁴⁰⁾ includentes. Spina vertebralis ⁴¹⁾ et cerebrum ⁴²⁾ interdum fissa. Vidimus hydrocephalum congenitum cum hydrope ascite ⁴³⁾. Frequentissime vero obveniunt foetus hydrocephalici labio leporino ⁴⁴⁾ aliisque deformitatibus stipati, ut oculorum ⁴⁵⁾ et renum defectu, renibus succenturiatis maximis ⁴⁶⁾, fissura abdominis brevita-

36) MECKEL l. c. p. 289. 37) §. XXI. No. 4.

38) E. c. ad radicem nasi (ALEX. MONRO *sämmtliche prakt. Werke*. RICHTER *chirurg. Bibliothek* 6. B. p. 664), ad frontem (TAXE in *Act. acad. Suecicae* 1778), ad occiput (WEFFER *obs. med. pract. de affect. capit.* N. 23. p. 46. GALLMANN *Ephem. nat. cur. cent. VII.* obs. 92), a fontanella magna usque ad occiput (VOIOTEL *op. c.* 2. B. p. 9).

39) BONET *op. c.* obs. 1. GOOCH *cases and practical remarks in surgery. Vol. 2.* p. 39. *Hydrocephalus meningo-cysticus*. J. P. FRANK *epitome. lib. VI.* P. I. p. 163.

40) *Hydroencephalocyste* J. P. FRANK l. c.

41) LANCISIUS *de morte subitan.* lib. I. cap. 4. §. 738. MOHRENNHEIM l. c. GREEVE in *Samml. auserl. Abh. für pr. Aerzte* 8. B. 3. St. p. 584. RICHELMI in *Nouvelles annales cliniques de Montpellier. Vol. 3.* p. 329.

42) DUNCAN l. c. 43) In casu infra recensendo.

44) MECKEL l. c. p. 261.

45) NERI *istituzioni di chirurgia T. I.* §. 561.

46) MURRAY l. c.

vitaeque extremitatum inferiorum⁴⁷⁾, ossibus, exceptis vertebris, cartilagineis⁴⁸⁾, renibus in massam deformem commutatis, deficiente ano⁴⁹⁾ etc.

Caussae.

4. Hydrocephali congeniti *caussae*, ab eadem fere caligine, quae ortum monstrorum circumdat, involvuntur. Hoc solum compertum est, vitium, de quo agitur, secundo jam graviditatis mense⁵⁰⁾, nec non quocunque alio posteriori evolvi posse. Forte hic vicissim incusare liceret, aut ipsum, cui vita humana originem debere videtur, processum inflammatorium⁵¹⁾, si limites excedat, aut inflammationem encephali embryonis, excitatam a venere nimia tempore graviditatis⁵²⁾, a violentiis externis, foetu in utero delitescenti minime parcentibus⁵³⁾, ab animi pathematibus⁵⁴⁾, aut vitium nisus formativi, scrophulae, rhachitidi parentum, aut caussis adhuc magis reconditis⁵⁵⁾tribuendum.

Prae-

47) BURCHARD Eph. nat. cur. dec. I. a. 3. obs. 13. p. 17.

48) BORDENAVE l. c. p. 545.

49) DESLANDES in *Journal de médecine de Mr. ROUX* T. XXVI. p. 74—79.

50) OSIANDER l. c. p. 58.

51) SPRENGEL Institut. physiolog. V. II. §. 530.

52) KLINCKOSCH l. c.

53) REICHARD uterus gravidus una cum foetu vulneratus. Lips. 1735. FLOUQUET de laesionibus mechanicis simulacrisque laesionum, foetui in utero contento accidentibus ad illustrandas causas infanticidii. Tubing. 1794. LODER's *Journal* 2. B. p. 782.

54) GREEVE l. c.

55) c. c. defectus evolutionis partium singularium cerebri (BRIECHAT in *Revue médicale*. Octobre 1822).

Praeterea in caussis hydrocephali indagandis etiam ad hydatides placentae ⁵⁶⁾, funiculi umbilicalis ⁵⁷⁾, ad alios foetuum hydropes ⁵⁸⁾, nec non ad urinae secretionem in matre respiciendum est ⁵⁹⁾.

5. Foetu

56) BLANCARD anat. pract. var. cent. I. obs. 89. BID-
LOO exercitationes anat. chirurg. II. p. 18. ELSNER
Misc. nat. cur. dec. I. an. 1. obs. 39. HALLER elem.
physiol. T. VIII. p. 228. *Beobachtungen der K. K.
med. chir. Josephinischen Academie* I. B. p. 89. WRI-
BERG Nov. comment. soc. Goett. T. IV. p. 73. BUR-
DACH de laesione partium, foetus nutritioni inservien-
tium, abortus causa. Lips. 1768.

57) RUYSEN opp. Vol. I. obs. 24. p. 15. SANDIFORT
museum anatom. Vol. I. sect. 5. No. 65. p. 273. No.
66—80.

58) BLANCARD l. c. obs. 93. cent. II. obs. 15. SEGER
Misc. nat. curios. dec. I. ann. I. obs. 42. DORSTEN
ibid. dec. II. an. III. obs. 153. SOCIIN dissert. de foetu
hydropico. Basil. 1751. GEMLER diss. de partu diffi-
cili ex hydropa foetus. Lips. 1762. J. P. FRANK de
partu difficili ob hydropam intestinorum. In Com-
ment. R. societ. scient. T. VII.

59) Matrona judaea propriam ad ma duxit filiam, enar-
rando, eam jam sexies, manse graviditatis septimo in-
fantes monstrosos peperisse, quorum descriptio de hy-
drocephalo nullum reliquit dubium. Quum tertio nunc
iterum manse gravida esset, auxilium ad habituale
infortunium praepediendum exposcebat. Instituto exa-
mine naque in conjugibus, neque in eorum familiis,
naque in curriculo graviditatis causam tanti mali de-
tegere potui. Solum interrogata gravida circa *urinae*
copiam, fassa est, se ntero gerendo vix tertiam lotii
consueti reddere quantitatem. Venae sectiones sub

Partus.

5. Foetu hydrocephalico maturitatem attingente, capitis volumen partum adeo difficilem reddere solet, ut uterus inde rumpi possit ⁶⁰), utque terebratio cranii aut saltem instrumentorum applicatio requiratur. Vitae conservandae tunc quaedam hinc inde spes ⁶¹).

6. Ca-

praegressis graviditatibus nunc institutae, nunc amissae fuere. Praeterea varia ignota sibi pharmaca adhibuerat. Statui aegram, ac si ipsa hydrocephalo laboraret, pertractare. Quare (prohibito simul coitu) *digitalem purpuream* cum *calomel*, nec non *species diureticas* exhibui. Illico inde mirum in modum augebatur urinarum copia, ac gravida se leviolem quam unquam persentire asseruit. Debito tempore (quod et antea contigerat) foetus motum persensit. Cessavit autem, uti pridem, iste motus, septimo graviditatis ingruente mense, ac brevi post, more solito, partum infantis, mortui quidem, at omnino formosi, enixa est. Tota nunc familia triumphans exclamavit: si ~~unus~~ Universitatis Vilmensis professor tantum operari potuit miraculum, quid ab omnibus professoribus medicis simul sumtis expectandum erit! Convocato binc brevi post solemnii consilio decretum fuit, laugentem jam jam ac semiexhaustam foeminam martialibus aliisque tonicis refocillandam esse. Qua sub methodo cum iterum concepisset, cumque ullis tum urinae excretionis ratio esset habita, septimo accedente mense non solum infantem cum hydrocephalo, sed et cum ascite in lucem edidit. Desperabunda familia tunc Dei auxilium Jerusalem implorare decrevit, quo sub itinere, ut fertur, singula ejusdem individua, a peste correpta, interiire.

60) *Fränkische Samml.* 3. B. p. 431. 61) Vid. §. seq. No. 7.

6. Cavendum est, ne monstra *acephalica* ⁶²⁾, *Diagno-*
acrania ⁶³⁾, *microcephala* ⁶⁴⁾, *thlipsencephala* ⁶⁵⁾,
no

- 62) MAPPUS de acephal. Argent. 1687. GOURAIGNE
Mém. de l'acad. des scienc. 1741. p. 665. WINSLOW
ibid. 1740. p. 811. SUR *physiolog. Untersuchung, über*
die Vitalität. A. d. Fr. übers. von HARLESS 1796. p. 9.
MAGNUS *Beitr. zur menschl. und vergleichend. Anato-*
mie. 2. St. p. 136, 143, 145. et l. c. MONRO *transact.*
of Edinb. T. 3. St. 1. p. 246. MERY *Mém. de l'acad.*
des scienc. 1720. p. 10, 13. GILBERT *advers. med.*
pract. p. 122. KLEIN *specim. inaug. sistens monstr.*
descript. Stuttg. 1795. LIEBERMANN *Beitr. zur Zer-*
gliederungsk. 2. B. 2. Heft. p. 281. CLARKE *Philos.*
trans. Vol. 65. HENNEL *neue Bemerkungen. I. Samml.*
p. 60. SUPERVILLE *Philos. trans. No.* 456. p. 304.
LE CAT *ibid. Vol.* 57. P. I. p. 5. OPHELIUS *Neue*
Schwedische Abhandl. 1785. p. 172—78. ZAGORSKY
N. A. Petropol. T. XV. 1806. p. 45. COOPER *Philos.*
transact. Vol. 65. p. 3. BÜTTNER *anat. Wahrneh-*
mungen. p. 190, 195, 196. CUZZIUS de monstro huma-
no. Lugd. Bat. 1762. FRIED. TIEDEMANN's *Anatomie*
der kopflosen Missgeburten. Landshut 1813. KILCH
Beitr. zur pathol. Anat. Berl. 1813. BÉCLAED in *Journ.*
de médecine, chirurg. et pharmac. par LEROUX. Paris
1815. Dec. et 1816. Janv. *Mémoires de la société*
médicale de Paris. Vol. I. 1817. GEOFFROY-SAINT-
HILAIRE *philosophie anatomique des monstruosités*
humaines. Paris 1822. J. V. KROMBOLZ *anatom. Be-*
schreib. o. sehr merkwürd. Anencephalus. Prag 1830.
63) HALLER de foetu humano septim. sine cerebro edit.
in opp. anat. Goett. 1751. p. 281. SANDIFORT *anat.*
infantis cerebro destituti. Lugd. Bat. 1781. SOEM-
MERRING *Abh. und Beschreib. einiger Missgeburten.*

ne defectum calvariae cum prolapsu meningum
et

Cassel 1791. p. 9. MECKEL op. c. 4. Abschn. VAN
DOVEREN obs. acad. cap. 2. 1791. LINCK Act. nat.
cur. I. p. 128. ROBIN DE KYAVALLE *Joarn. de méd.*
T. 33. p. 151. PENADA saggio d'osservazioni e me-
morie sopra alcuni casi memorabili riscontrati nell' eser-
cizio della medicina. Padov. 1795. T. I. No. 4. BUS-
SIERE *Philos. trans.* No. 251. HARDER *Eph. nat. cur.*
dec. I. ann. 3. p. 324. ROSSI *Mém. de Turin.* Tom.
VI. 1800. p. 18. MONTON *Journ. des savans.* Août.
1722. p. 186. MORGAGNI op. c. epist. 48. STALP. v.
D. WIEL cent. obs. post. obs. 2. PROCHASKA ann.
acad. f. 3. CALDANI *memorie.* Padova 1804. p. 67.
DOLIGNON *Joarn. de méd.* 1786. Janv. p. 91. ROM-
BERO *Eph. nat. cur.* dec. III. an. 9. p. 197. RAYGER
ibid. dec. II. an. 8. p. 107. ZWINGER ibid. cent. VII.
obs. 73. MARRIGUES *Journ. de méd.* T. 34. p. 57.
FENCHIENATI *Mém. de Turin.* T. 4. p. 118. HULL
Mem. of the societ. of Manchester. Vol. 5. 1802. p. 495.
TYSON *Philos. trans.* No. 228. MALACARNE *Mem.*
della società Italiana. T. 12. p. 164. FEILER *Paedia-*
trik, oder Anleitung zur Erkennung und Heilung der
Kinderkrankh. Salzburg 1814. Kap. vom angeborenen
Hirnbruch. LAWRENCE in *Medico-chirurgical trans-*
actions. Vol. V. 1814. London. Historia brevis mon-
stri cerebro destituti, cum adjuncta hujus descriptione
anatomica. In *Novis actis physico-mediceis* T. X.
Recentiores inter acephalos et acranios, *hemicephaliam*,
ut vitium medium quasi tenens, ponunt. Cfr. *Deut-*
sches Archiv für die Physiologie, herausgegeben von J.
F. MECKEL. 1. B. 1. Hest. p. 1—109. *Medical and*
physical journal, by S. FOTHERGILL and J. WART.
Lond. 1815. August. *Revue médicale.* Mars 1830.
p. 433.

et cerebri herniis⁶⁶), nisi forte hydrocephalo junctis⁶⁷), —

64) HOHL in *Zeitschrift für die Geburtshülfe and praktische Medizin* von W. H. NIEMEYER B. 1. St. 1. Halle 1828.

65) „Soas le nom de *Thiïpsencéphale* (cerveau écrasé) GÉOVRROY - SAINT - HILAIRE décrit une nouvelle monstruosité, qu'il a observée dans un enfant, dont le développement étoit empêché par une cause mécanique“ (*Mémoires de la société médicale d'émulation, Paris* T. 9).

66) RESLIUS de cerebello extra cranium sito. In Ephem. acad. nat. curios. dec. II. ann. 2. obs. 115. LE DRAAN observations de chirurgie avec des réflexions. Paris 1739. TREW in *Commerc. literar.* 1738. hebdom. 52. No. 3. p. 412. CORVINUS de hernia cerebri. Argent. 1749. in HALLERI collect. disputat. chir. T. II. diss. 46. HEBENSTREIT I. C. PENADA I. C. oss. I. *Ernta del cervello e cervelletto prodotta in un feto della praternaturale deficienza della parti ossee posteriori della testa.* Et infra p. 15 — 33. *Idrocefalo con appendice singularissima.* SIEBOLD coll. obs. med. chir. Fasc. I. 1769. Art. I. VAN DER LAAN obs. chir. obstetr. anat. med. Lugd. Bat. 1794. No. 3. COOMBE in *The London medic. and physio. journ.* Vol. 36. 1816. E. REALEY in *Medico-chirurgical transactions.* Vol. 8. Lond. 1817. p. 12. W. W. STEWART in *The Philadelphia journal of medical and physical sciences.* Vol. 3. No. 6. 1826. Memorabile est, prolapsus meningum herniasque cerebri plerumque ad lineam mediam occipitis atque ad prominentiam hujus ossis contingere, uti elucet ex observationibus GANDNERI (*Medical comment. Lond.* Vol. 5. p. 306). TACHILII (*Mém. de Turin.* T. V. p. 187) et LECHLII (*Eph. nat. cur.* dec. II. an. 2. p. 363). Interca eadem vitia quoque

ctis⁶⁷⁾, — et ne tumores capitis lardaceos⁶⁸⁾, sanguineos⁶⁸⁾ (ossi bregmatis maxime addictos), saepe

visa sunt ad fontanellam majorem (HELD diss. de hernia cerebri Giesae 1777), inter os temporale dextrum et occipitale (MÄCKEL l. c. p. 341), ad nasi regionem (SAXTORPH coll. Hafn. T. II. p. 280. Tab. V), deficiente osse bregmatis dextri (SCHAEFFER in HUFELAND's Journ. der pr. Heilk. 1815. Junius. p. 32—33). Hernia cerebri oculus serius praevis convolutionibus morte terminatur. Casus felices a LE DRAN et TREW descripti, de diagnosi dubium relinquunt.

67) BRÉCHET notice sur deux enfans nés hydrocéphales et manquant de cerveau. In Journ. complémentaire du dictionnaire des sciences médicales T. 13. cah. 51. p. 202. H. EARLE cases of hernia of the dura mater connected with hydrocephalus internus. In Medico-chirurgical transactions Vol. 7. P. 2. Lond. 1816.

*) The Edinburgh med. and surgic. journ. new series. No. 26. April 1830.

68) NÄGELE über den angeborenen Hirnbruch und die Kopfblutgeschwulst. Neugeborenen in HUFELAND's Journ. für die pr. Heilk. 1822. Mat. G. FN. HÖRZ diss. de tumore cranii recens natorum sanguineo et externo et interno. Berol. 1824. A. H. HALLER diss. de tumore capitis sanguineo neonatorum. Dorpat. 1824. J. LIPSCHITZ diss. encephalocèles acquises cum abscessu cerebri observatio. Regiomont. 1828. HENSCHEL in SIEBOLD's Journ. für die Geburtshülfe B. 5. St. 2. B. 8. St. 1. L. W. SCHWARZ ibid. B. 7. St. 1. p. 108. St. 2. p. 440. HÜTER in Gemeinsame deutsche Zeitschrift für Geburtshunde B. 4. Heft 2. p. 223. BROUSSAUX-LÉON in Revue médicale, Décembre 1828. p. 463.

saepe a violentiis sub partu excitatos ⁶⁹⁾ et a cerebri herniis probe distinguendos ⁷⁰⁾, cum hydrocephalo congenito, qui ceterum monstris illis pluries ansam praebere videtur ⁷¹⁾, confundamus.

§. XXI.

De hydrocephalo chronico.

1. *Hydrocephalus* praevia dispositione con- Definitio.
genita plus minusve evidente, primis a nativitate temporibus, capite simul volumine aucto, evolutus, nobis est *chronicus*.

2. De hoc hydrocephalo egerunt: CELSUS ¹⁾, Scriptores.
AETIUS ²⁾, PAULUS AEGINETA ³⁾, STALPARTUS
VAN DER WIEL ⁴⁾, TULPIUS ⁵⁾, RIEDLINUS ⁶⁾,

RUY-

69) SWISTEN comment. Vol. IV. §. 1217.

70) Docente NÄGELÉ (l. c.) in cerebri hernia, rarissimo morbo, ad fontanellae suturae obveniente, margo osseus in peripheria basis tumoris percipitur.

71) Jactatam de origine monstrorum acephalorum litteram, cujus acta egregia MECKEL pulcherrime exposuit (l. c. p. 244—260), ita dirimendam esse censo, ut variae, pro re nata, explicationes admittantur. Quas inter explicatio ex praevio hydrocephalo saepissime locum habere videtur: 1. quoniam ossa cranii ut plurimum extrorsum, eaque faciei deorsum, quasi a vi interna sese extus expandente, divertunt; — 2. quoniam idem phaenomenon ad vertebrae, saepe serum includentes, observatur, et 3. quoniam medulla spinalis atque nervi acephalorum, illis hydrocephalicorum similes sunt.

1) De medicina lib. IV. cap. 2. 2) Lib. IV. cap. I. p. 99.

3) De medica materia lib. VI. cap. 3.

4) Observ. rarior. T. II. p. 123.

RUYSCHIIUS 7), PISO 8), TYLKOWSKI 9), LIT-
RE 10), WEPFER 11), PITSCHER 12), BETBEDER 13),
AURIVILLIUS 14), POHLIUS 15), SWAGERMANNUS 16),
KLINKOSCH 17), BÜTTNER 18), CAMPER 19), ALEX.
MONRO 20), MORGAGNI 21), WRISBERG 22), MUR-
RAY 23),

5) *Observ. medic. lib. I.*

6) *Eph. nat. cur. cent. I. c. 2. obs. 29.*

7) *Observ. anatom. chirurg. No. 52.* 8) *Op. c.*

9) *Disquisitio physica duorum puerorum, quorum alter capite gigantis Vilnae est spectatus. 1874.*

10) *Mémoire, de l'acad. des sciences. année 1705.*

11) *Histor. apoplect. p. 64—370. Obs. med. pract. de affect. capitis. No. 23.*

12) *Epistola ad Culmum de hydrocephalo. Lips. 1744. et HALLER collect. diss. P. I. No. 12. p. 190.*

13) *Sur un hydrocéphale accompagné de la transparence et de l'amollissement des os du crâne. Journ. de méd. 1755. T. 3.*

14) *Diss. hydrocephalum internum annorum 45 exhib. Upsal. 1763. Rec. in SANDIFORT thes. dissert. Vol. 2. p. 330.*

15) *Diss. de effusis in cerebro aquis. Lips. 1768. Diss. de hydrocephalo infantis recens nati. Lips. 1777.*

16) *Tractatio anatomico-chirurgica de hydrocephalo, spina bifida variisque spinæ vitiis, quæ Amstelodami a. 1767. Belgice prodiit, ejusque excerpta leguntur in Commentariis de rebus in scient. natur. et medic. ge- stis. dec. II. Supplement. p. 316 sq.*

17) *Op. c.* 18) *Op. c.*

19) *De hydropum variorum indole, causis et medicina. Opp. T. II.*

20) *On the brain, the eye and ear. Edinb. 1797. Et Samml. auserl. Abhandl. für pr. Aerzte. 17. B. p. 394.*

RAY ²³⁾, BAILLIE ²⁴⁾, SOEEMERRING ²⁵⁾, HOFFEN-
GAERTNER ²⁶⁾, WENZELII ²⁷⁾, J. P. FRANK ²⁸⁾,
MECKEL ²⁹⁾, G. COOKE ³⁰⁾, F. DERSZKOFF ³¹⁾, J.
J. KIENNS ³²⁾, GOEBEL ³³⁾, MILLER ³⁴⁾, HINLY ³⁵⁾
et KRAUSS *).

3. Infantes cum hydrocephalo nati, ac vitam Sympto-
nihilominus protrahentes, symptomata, hydroce- mata.
phalo chronico communia, exhibent. Qui solum
cum dispositione ad hunc morbum in lucem editi
fuere, hi caput pro aetate majus et ponderosius,
oculos prominentes, arcus superciliarea elevatos,

carun-

21) l. c. 22) l. c. 23) l. c.

24) *A series of engravings etc. Fasc. 10. Tab. 8.*

25) Adnot. ad opus BAILLIE vers. germ.

26) *Untersuchungen über die Natur und Behandlung der
verschiedenen Arten der Gehirnwassersucht. Stuttg. 1802.*

27) *Bemerkungen über die Hirnwassersucht. Tübing. 1806.*

28) Epitome l. c. 176. 29) l. c.

30) *Medico-chirurgical transactions Vol. 2.*

31) *Diss. de hydrocephalo chronico, binis observatio-
nes medico-practicas continens. Vilnae 1819.*

32) *Diss. de hydrocephalo chronico. Rigae 1824.*

33) *Beschreibung nebst Abbildung eines äusserst grossen
chronischen Wasserkopfs. In HARLESS rheinisch-west-
phälischen Jahrbüchern für Medic. und Chirurgie B. 9.
St. 8. p. 128.*

34) *Transactions of the medico-chirurgical society of
Edinburgh. 1821. Vol. 2. No. 16.*

35) *Göttingische gelehrten Anzeigen vom Jahr 1827.
Et: Med. chir. Zeitung 1828. B. 1. p. 143.*

*) *Neue Breslauer Samml. aus dem Gebiete der Heilk.
B. 1. p. 143.*

Frank PRAX. II. l. 1.

S

carunculas lacrymales reconditas, venas frontis, temporum diametro auctas, fontanellas, ut dicunt, diu apertas, tarditatem ingenii, loquelae et incensus, spinam incurvatam^{35b)}, somnolentiam, segnitiam et lassitudinem prae se ferre solent. Etiam aetate proveciores gressus tamen aegre instituunt, facile cadunt, ac crura circulum describendo elevant. Sunt, qui sub erecta corporis positione tussim et respirandi difficultatem experiantur³⁶⁾. Crescente sive evoluta morbo, caput, aliquando ex uno tantum latere³⁷⁾, volumine enormiter incrementum³⁸⁾, quod et de spatiis inter ossa illius valet³⁹⁾.

In

35b) CAMPER L. c. p. 405.

36) ZWINGER (Acta Helvet. Vol. 1. p. 1) ad hanc FALLOPII observationem provocat, ex observationibus quoque FR. MICHINI apud SCHENKIIUM obs. XXX, p. 30.

37) *Hydrops encéphalodes dimidiatus* LUDWIGII et FRANKII (l. c. p. 165). Vid. TULPIUM L. c. cap. XXV, et WEPFER hist. apopl. p. 68.

38) Apud DIXON (DUNCAN Med. comm. dec. I. Vol. X. p. 313), WILLAN (ibid. dec. I. Vol. VIII. p. 322). FREIND (Phil. transact. No. 256). MALACARNE (*Idrocephalo Salazzese*) et BÜRTNER aegrotantes 3. 20 mensium, 2. 15. 31 annorum, capitis ambitum ad 18 pollices, ad pedem cum dimidio, ad 26. 25 et 30 pollices exhibebant. Similia inveniuntur apud PITSCHELIIUM, CAMPERUM et MICHAELIS (*Medical communication. Vol. 1. No. 25*), qui in viro 29 annorum capitis ambitum ad 32 pollices vidit. Capitis circumferentia erat pollicum $31\frac{1}{2}$ in puero sexenni (GÖRTEL (l. c.) — pollicum 31 in juvene quindecim annorum (MILLER l. c.) — pollicum $33\frac{1}{2}$ in viro viginti annos nato (*the lan-*

In rarissimo exemplo cranium pellucidum erat ac percussum fluctuationem exhibebat ⁴⁰⁾. Et sinus translucebant ⁴¹⁾. Forma tum cranii, tum vultus, ut supra descripsimus ⁴²⁾. . . Paucis concessis exceptionibus ⁴³⁾, evolutio reliqui corporis, inprimis extremitatum inferiorum ⁴⁴⁾, aliquando deformium ⁴⁵⁾, laesa cernitur. Et praecox visa est ⁴⁶⁾.

S 2

Prae-

et Vol. 2. p. 19) — et pollicum 35 in puero annos duodecim numerante (HINLEY l. c.). In maximo, quem consexi (in museo CAUVESMANNI) hydrocephalo, octavo a nativitate mense evoluta, demortuo infante mense decimo sexto, capitis ambitus 52 erat pollicum (J. FRANK *Reise nach Paris, London etc.* 2. Th. p. 73). Memoratu dignam computationem inter caput hydrocephalicum et sanum infantem sex mensium YEATS tradit. V. et *Salzburger medicinisch-chirurgische Zeitung* 1816. No. 90. p. 181.

39) Apud PITSCHEK in infante anni unius cum dimidio, spatium inter frontis et bregmaticae ossa relictum trium erat pollicum, spatium vero suturae sagittalis intermedium novem adaequabat pollices. Similia exempla a MECKELIO recensentur. l. c. p. 292.

40) BETSEDER l. c.

41) LUDWIG l. c. et in exemplo a me mox enarrando.

42) §. XX. No. 3.

43) CAMPER pueri hydrocephalici proceri meminit. l. c. p. 405. Et infans, ejus skeleton museo pathologico Vilmensi commissi, cum mediocri hydrocephalo, reliquum corpus optime constitutum exhibuit.

44) MICHAELIS l. c.

45) WATSENGO l. c.

46) W. COOKE (l. c.) quadricennis puella jam erines ad pudenda exhibuit.

Praeterea sensus unius alteriusve officium deletur. Enimvero, quamvis hydrocephali chronici exempla, perstantibus visu ⁴⁷), auditu ⁴⁸), gustu ⁴⁹), reliquisque sensibus ⁵⁰), nec non loquela ⁵¹) et gressu ⁵²) obvenerint, plerumque tamen coecitas ⁵³), surditas ⁵⁴), deletio odoratus ⁵⁵), gustus, sermonis et motus ⁵⁶) praesto sunt. Admirabile autem est, atque a fautoribus materialismi probe considerandum, quod animi facultates ⁵⁷), potissimum memoria ⁵⁸), iudicium ⁵⁹), conscientia ⁶⁰) et imaginatio ⁶¹), cerebro licet undique ab aquis obruto,

47) SCHNEIDER l. c.

48) MICHAELIS l. c. immo auditus acutior fuit.

49) E. HOME l. c. p. 51.

50) AURIVILLIUS l. c. HORNER l. c.

51) DUNCAN enormis hydrocephali meminit. aegro loquaci (*Medical cases and observations*, p. 239).

52) DONALDUS MONRO de infante fere octenni refert, cujus caput ambitum duorum pedum quatuorque pollicum exhibebat, quique gressus sat firmos facere incipiebat.

53) Constantissimum ea symptoma sistit.

54) LITTAE l. c. deerat simul gustus.

55) CUSTET in *Journal de médecine*. T. IV. a. 1756. Janvier p. 89.

56) BÜTTNER l. c. CAMPER l. c. p. 405.

57) REED in *The Edinb. medical and surgical journal*. Octob. 1815.

58) MICHAELIS. MONRO ll. cc. 59) GALL l. c.

60) SCHNEIDER. FITSCHAL. CAMPER ll. cc.

61) Poesi delectabatur rex HOMER (l. c. p. 52).

obruo, haud raro perstant ⁶²). Aliquando solum compresso cranio sopor et convulsiones, cessante compressione iterum evanescentes, obveniunt ⁶³). Variant etiam symptomata, prout aeger stat, vel decumbit ⁶⁴). Ceterum ad constantiora hydrocephali chronici symptomata creber vomitus, pertinax alvi obstructio, convulsiones periodicae, urina pauca spectant. Menstruatio ⁶⁵) et veneris desiderium ⁶⁶), sub tanto morbo, observata sunt.

4. Necroscopiae hic patefecerunt: musculos ^{Necroscopia.} faciei extenuatos ⁶⁷), ossa cranii cartilaginea ⁶⁸), normalia ⁶⁹), crassiora ⁷⁰), parietalia transversim bipartita ⁷¹), suturas in adultis coalescentes ⁷²),
dele-

62) Jam WERFFER monuit: aquam inter ventriculos cerebri copiosissime etiam collectam, nullam sensuum abolitionem, nullam paralysin, nullum tremorem, nec epilepsiam, multo minus coma aut apoplexiam produxisset (l. c. p. 57). Addam cum E. HOMER (l. c. p. 250) conditionem: dum ossificatio cranii necdum absoluta est; aliis enim paucae seri unciae ad aensibilitatem delendam sufficiunt (ibid. p. 254).

63) SAUVAGES tract. de morbis puerorum. p. 20.

64) E. HOMER l. c. p. 51.

65) BÜTTNER, AURIVILLIUS ll. cc.

66) SCHNEIDER, MICHAELIS ll. cc.

67) WEISBERG l. c.

68) BORDENAVE.

69) AURIVILLIUS l. c. p. 331.

70) RIEDLINUS l. c. SCHNEIDER Beschreibung eines Wasserkopfs in den Annalen der Wetterauischen Gesellschaft. I. B. p. 262. J. P. FRANK l. c. p. 174.

71) MURRAY l. c.

deletas⁷²⁾, ossa sesamoidea⁷⁴⁾, inprimis ad suturam lambdoideam⁷³⁾, ejusque angulum⁷⁶⁾, interdum ad fontanellam⁷⁷⁾, membranam arachnoideam firmam, uti aliàs circa medullam spinalem esse solet⁷⁸⁾, piam matrem cum vasis cruore turgidis⁷⁹⁾, cerebri loco vesicam, libras quinquaginta aquae includentem⁸⁰⁾, — cerebrum parvum⁸¹⁾, in membranam resolutum⁸²⁾, in spatium arctum compressum⁸³⁾ (hemisphaeriis ex convexa planis redditis), consistentiae normalia⁸⁴⁾, mollioris⁸⁵⁾,
durio-

72) AURIWILLIUS l. c. HARTELL *Salzb. med. chir. Zeitung*. 1805. I. B.

73) HILDANUS obs. chirurg. cent. III. obs. 49. MALACARNE, SANDIFORT, MECKEL l. c. p. 293. 332.

74) Haec ossa cum hydrocephalo nexum alere SANDIFORT (*Museum anat.* lib. II. cap. I), BLUMENBACH (*Geschichte der Knochen*. p. 180) et MECKEL (l. c. p. 293) suspicantur.

75) BLUMENBACH l. c. p. 175. SOEMMERRING *Knochenlehre*. p. 230.

76) MECKEL l. c. p. 318. 77) SANDIFORT l. c. Tab. 7.

78) WRISBERG l. c. 79) MALACARNE l. c.

80) LECHSEL apud MECKEL l. c. et HALLER ex SPÖRLINO in opusc. anat. not. 8.

81) BILLOT *Zodiacus gallicus medic.* an. I. mens. decem, obs. 3. BÜTTNER l. c.

82) GALL l. c. NEYONFELD *Beobachtung eines innern Wasserkopfs mit deutlicher Entfaltung des Hirns in HUFELAND's Journ. der pr. Heilkund.* 24. B. 1. St. p. 152. RASONI *Giornale della Società medica di Parma*. 2. Vol. No. 4.

83) VELSE diss. de mutuo intestinorum ingressu.

84) BÜTTNER l. c. 85) MORRO l. c. p. 37.

durioris ⁸⁶⁾, tuberculis refertum ⁸⁷⁾, leve ⁸⁸⁾, cum membranis ventriculos anteriores obducentibus, tamen crassioribus solito ⁸⁹⁾, gyris et sulcis saepe deletis ⁹⁰⁾ et parietibus tenuibus ⁹¹⁾, — rarissime tamen ita, ut distinctio inter substantiam corticalem et medullarem deleatur, quo in casu universum cerebrum sub forma massae albae comparuit ⁹²⁾, corpus callosum ad cranium usque elevatum, deleta fere falce durae matris ⁹³⁾, corpora striata depressa ⁹⁴⁾, thalamos nervorum opticorum fere invisibiles ⁹⁵⁾, ventriculos cerebri laterales dilatatos ⁹⁶⁾, septum lucidum perforatum ⁹⁷⁾, glandulam pinealem et pituitariam volumine auctam duram-

86) WRISSBERG l. c.

87) JADELOT et MONTORNOT teste LAENNEC (l. in §. sequente citando. p. 206).

88) WRISSBERG l. c. p. 90. MONRO l. c. cum membranis unciam cum dimidia solum ponderabat.

89) WILLAN, MALACARNE, MECHER l. c. p. 272. et HOME (l. c. p. 52). Haec crassities membranae demonstrare videtur, cerebrum ab aquis non solvi.

90) WILLAN apud DUNCAN op. cit. Vol. 3. p. 322. MALACARNE l. c. GILG diss. de spina bifida. Continetur in WASSERBERGII fascio. T. III. opp. med. §. XVI. HOME l. c.

91) MALACARNE, — ad lineam solum AURIVILLIUS.

92) WRISSBERG l. c. p. 90. 93) HOME l. c. p. 253.

94) AURIVILLIUS l. c. p. 330.

95) BÜTTNER l. c. p. 12. 96) FRIEND l. c.

97) HOME ibid. VINGTAIEN in *Revue médicale*. Juillet 1822.

duramque ⁹⁸⁾, complanatam ⁹⁹⁾, cerebellum, paucis concessis exceptionibus ¹⁰⁰⁾, normale, nervos veluti cavos ¹⁰¹⁾, olfactorios minimos ¹⁰²⁾, opticos maximos ¹⁰³⁾, pulpa medullari orbatos ¹⁰⁴⁾, vasa sanguinea, exceptis iis piaë matris, cruore parum et potius sero repleta ¹⁰⁵⁾, carotides et vertebrales solito tenuiores, debiliores ¹⁰⁶⁾, arterias duplicatas venis simplicibus ¹⁰⁷⁾, vasaque lymphatica ampliora ¹⁰⁸⁾. Ad sedem seri, enormis aliquando ponderis ¹⁰⁹⁾, quod spectat, detectum est inter cranium

98) WRISBERO l. c. p. 91. *Svenska Läkare — Sällskapets Handlingar. Del. I. 1812 — 1813.*

99) HOME ibidem.

100) DIXON l. c. WARNER *observat. in surgery. Lond.* 1784 p. 137.

101) OSIANDER et MECKEL l. c. p. 274. Facile hujusmodi nervi injectionem ope mercurii admittunt.

102) FRIEND l. c. HOME l. c. 103) HARTELL l. c.

104) HOME l. c. p. 253. 105) WRISBERO l. c.

106) BÜTTNER l. c. 107) FRIEND l. c.

108) WRISBERO l. c.

109) Ad libras 7. DIXON. — Ad libras novem cum uncis duabus et semis, HARTELL, ad libras 18. 20. AURIVILLIUS et BÜTTNER. Hydrocephalus musci CRUIKSHANKII, de quo supra (not. 56), circiter 27 libr. seri continebat. Serum in ventriculis solum ortum ducere, ac dum pondus quinque librarum excedit, per fissuras sibi viam alias ad partes parare, opinio est MONROI (l. c. p. 38), ab observationibus FREINDII (*Philos. transact. No. 256*), AURIVILLII et BÜTTNERI (l. c. p. 10) abunde refutata.

cranium et duram matrem¹¹⁰), inter duplicaturam durae matriæ¹¹¹), inter istam et piam matrem¹¹²), inter hanc et cerebrum¹¹³), in ventriculis cerebri¹¹⁴), in cavitatibus abnormibus¹¹⁵) et in hydatidibus¹¹⁶). Et hepatis detectus est abscessus¹¹⁷).

5. Caus-

110) BOWEN (Sepulchr. T. I. lib. I. sect. 2. c. 45. p. 111) ad libras 5. seri. TREW in Act. phys. med. nat. cur. Vol. IV. obs. 135. KLINKOSCH l. c. LIEUTAUD hist. anat. med. T. II. p. 229. LUDWIG l. c. — Jure hinc miratur VOIGTEL (Op. c. 2. B. p. 4), BAILLIE hanc hydropis speciem pro rarissima habere, ac SOEMMERINGIUM (in notis ad BAILLIE No. 554) eam pro impossibili declarare.

111) ZACUTUS LUSITANUS prax. admirab. lib. I. obs. 5.

112) In foetu septimestri libras duas aquae inter duram et piam matrem, praeter vesicam 30 libras seri continentem extitisse monet BLANCARDUS opp. Vol. II. p. 135. Immerito hinc collectionem seri inter meninges negarunt MONAGONI (l. c. §. 13 et 94) et CAMPER (l. c. opp. p. 403).

113) KALTSCHMIDT l. c.

114) Librae 9. in puella bienni VESALIUS (anat. lib. I. c. 5). Librae 18, cum cerebro in saccum resolutum, FABR. HILDANUS (obs. et curat. chir. cent. obs. 10). Librae circiter 8. in infante sex mensium D. MONRO (on the dropsy. p. 154). Mensurae 5. HORNER (l. c.).

115) METZGER in MONAGONI diss. exhibente observationum anatomico pathologicarum bigam cum epicrisi. Regiom. 1792. 4. SQUARIO in Raccolta d'opuscotti scientifici e filologici. Vol. 4. p. 1230.

116) In cerebri ipsius substantia BERGIIUS (HALLER disputat. anat. Vol. II) ad plexus choroideos (Medical essays, Vol. 3. art. 23), in substantia corticali LAN-

Causae.

5. Causae hydrocephali congeniti, chronico ut praedisponentes inserviunt. Ita ut excitantes, causae hydrocephali acuti mitius et lentius agentes ¹¹⁸). Generatim vitium scrophulosum et rha-

cisi (De mort. subit. lib. I. c. 2) et ZWINGER (Act. Helvet. T. I. c. 1). SQUARIO *raccolta d'opuscoli scientifici e filologici. Vol. 4.* Cfr. RENDTORFF diss. de hydatidibus in corpore humano praesertim in cerebro repertis. Berol. 1822.

117) O. COOK L. c.

118) Die 26. Aprilis 1818. parentes rustici puerum trium annorum capite praesigno deformem ad clinicum institutum Vilmense apportarunt. Ipsi non solum prospera valetudine gaudebant, sed alios etiam liberos prorsus sanos procrearunt. Mater quinto graviditatis mense tum utero hunc de quo agitur infantem gerabat, hominis irati adpectu vehementer terrefacta et praecipitia fugae labore defatigata, multum sitiit multumque aquae frigidae epotavit, ita ut animi deliquio et summo corporis languore corripatur, mox tamen insensatis animi corporisque viribus, pristinam valetudinem recuperavit, itaque tempore congruo partum naturalem nec valde difficilem absolvit. Infantis recens nati caput justo haud majus fuisse, sed brachia aliam modo extensa, thoraci sposita et quasi paralytica motu destituta esse ferebantur; crescente autem toto corpusculo, maxime tertio ab ortu mense, volumen capitis augebatur, nulla tamen functionum animalium aberratione. Quinto mense forte infantulus in caput humi impune procubuisse videbatur, donec sexto exacto matris iratae et perterritae lacte rapide exsucto convulsionibus oppressus per aliquot dies admodum aegrotaret. Serius vero paulatim valetudo tentari,

alvus-

alvusque saepe segnia fieri coepit; interea caput jam in volumen justo longa majus creverat atque dentes primi spatio tertii decimi et quinti decimi mansis prorumpere. Secundo anno eruptio quaedam cutanea, in capillito visa, haud longo temporis spatio interjecto sponte evanuit; ac tertio ineunte liquidi quid aquae simili ex aure sinistra effluerat. Quo quidam tempora pariter atque per extremum morbi decursum urinarum parva ac perrara dejectio erat, ac alvus adeo tarda, ut aliquando vix semel per hebdomadam deponeretur. Hoc igitur statu aegrotulum lectulo affixum accepimus. Caput exhibuit primam dimensionem transversam seu parvam, ab una protuberantia ossis parietalis ad alteram lateris oppositi septem pollicum et dimidii; secundam perpendicularem a vertice capitis ad basin cranii primae aequalem; tertiam magnam seu mediam, a glabella ad fontanelam parvam, novem pollicum; ultimam maximam, a medio mento ad angulum usque superiorem ossis occipitis, undecim pollicum; circumferentiam vero a tuberculo occipitali magno per tubera frontalia tractam ulnae ac duorum pollicum: porro frontem magnopere prominentem, arcus ciliares alavatos, carunculas lacrymales invisibiles, occiput prolapsum super nucham pendulum, tegumenta extenuata capillis fulvis, longis, rarisque, venis frontis ac temporum turgidis, facile visu persequendis praedita; ossa cranii sat dura, longa a se invicem distita, omnesque fontanelles apertas, adeoque extensas, ut quicquid eas cum naturalibus comparas, minorem illum, id est posteriorem, pro anteriore seu majore, lateralem autem pro minore facile haberi posse existimaverit. Ex tanta magnitudinis capitis delineatione, si insuper incessus et motus vel in cubante aegrotato impotentiam spernueris, pondus illius facili computari potest. Frontem triangularis axigua facies excolebat,

piebat, nasusque pandtus apice sursum attollebatur. Palpebras superiores extenuatae orbitam supernam ex utroque latere foras propulsam cooperiantes, reticulo vasculoso insignitae, sursum cum extensis tegumentis cranii tractae veram imaginem lagophthalmi referebant. Inferiores rugosae pupillam attingebant; ipsi oculi nec sursum elati nec deorsum projecti, ad utrumque angulum ea ratione movebantur, ut oculo uno ad angulum externum spectante alter ad internum vergeret et vicissim. Pupilla a luce et per somnum contrahatur; in tenebria et erecto aegroti corpore, summo opere dilatatur. Visu autem puerum prorsum privatum fuisse tum multa variis e locis, varioque in corporis situ aegrotanti porrecta, tum admoti oculis magis hoc ipso lacrymantibus, digiti, dubitare nos non sinunt. Aures deorsum mirum in modum detrusae, angulis maxillae inferioris situ pares, meatu auditorio externo nimis angustato praeditae, ad vehementes vociferationes at campanulas sonum prorsus surdae erant; ospita autem erecto aliquid percipere videbantur. Oloratus vero praesentiam nihil comprobabat. Contra vero de gustu et tactu statuendum; etenim priorem illum avidus ciborum et potus usus, rarum acrium amararumque, v. o. pulveris radiceis amomi zingiberis, infusi radiceis rhei palmati, solutionis sulphatis magnesia ex ore rejectio; posteriorem autem lavatio frigida et levi acu punctio, ajulatum ac gesticulationes trae vel mocroris testes excitantes, abunde confirmabant. Quid autem in aegrotulo loquela orbato de mentis facultatibus existimandum sit, incertus haereo. Corpusculum pro aetate aegroti satis crassum, longitudine duos pedes et sex pollices non superabat. Extremitates tum superiores tum inferiores ad se invicem et ad abdomen adductae ne adhibito quidem conatu facile removebantur; manus et pedes quamvis optime stragulis

stragulis coopertae, semper frigescebant, digitorum alii erant flexi alii extenti. Spinam vertebralem normalem, pectus bene conformatum, os in triangulum compositum, continuo aemiapertum, omnibus dentibus, caninis exceptis instructum, oscitationem frequentem, respirationem tamen illaesam, abdomen semper tensum, sub contractionibus periodice invadentibus in duas tresve partes, nunc recta linea, nunc obliqua corrugatum, alvum tardam vix eum nisu convulsivo grumorum instar dejectam, urinam turbidam, tres quatuorve uncias toto nycthemero adaequantem animadvertimus. Ceterum misellus infans elinguis dolores aures solo ejulatu lacrymisque prodere ac significare poterat. Maxime lugubres ejulatus edebat, quoties genus contracta vatri imponebat, alvum segnam et urinam parcam habere solitus est; tunc leves clysteres, syrupus mannae et radices ononidis apinoxae adhibiti mala haec mitigabant. Dum vero somno perturbato ac pertinaci agrypnia vexabatur, syrupus diascodii prudenter administratus desideratam quietem saltem in tempus conciliabat. Aliments facili digestionis propinabantur selecta et maxime munditiei corporis studebatur. Paracentesin cranii, ne aegrum, quem servare haud potuimus, trucidemus, non adhibuimus. Interea volumen capitis indies increvit; jam die 26. Junii illius dimensio transversa seu parva aequabat octo pollices, perpendicularis pollices octo et dimidium, magna seu media pollices novem et dimidium, ultima maxima pollices undecim et dimidium. Circumferentia vero a tuberculo occipitali magno per tubera frontalia traducta duos pedes et tres pollices. Longitudo vero corporis minima aucta. Praeterea totum caput lumini admotum undique ita pellucebat, ut carabii omnes sinus temporumque vasa sanguifera subtiliter distingui ac conspici possent. Superveniente de-

chiti-

chiticum ¹¹⁹⁾ nec non violentiae externae ¹²⁰⁾ accusandae videntur.

num feriarum aestivalium sollemnium tempore clauso clinico, aegrotus hospitio infantum traditus est. Possimo hoc in instituto blepharophthalmia, ibi endemica, illum invasit. Ex neglectu munditici et mutationis situs, et sphacelus tandem in utroque capitis latere ad bregmata superaccessit; sicque praevii convulsionibus die 4. Augusti e vita decessit. Cadaver dumtaxat quinto post mortem die prosectori redditum est. Quum jam corruptum fuerit, necroscopia minime locum obtinere potuerat. Elaborabatur solum sceletum; quod a vertice usque ad calces novem et viginti aequat pollices. Verum dimensiones cranii par exsiccationem multo minores sunt quam in vivo reperiiebantur. Illius cavum liquore mensuratum aquae sedecim libris vix plane expletur. Sutura frontalis haud tota ossa invenitur, ideoque in anteriore illius parte substantia compacta communis deficit. Loco suturae coronalis extenditur membrana, quae residuum fontanelle anterioris seu maioris constituit. In sagittali quoque nonnulla loca membranacea circa sinistram os parietale supersunt. Lambdoidea et mammillaris utraque evidenter dentata multa ossa triquetra acn Vormiana excipit. Fontanella minor seu parva non omnino concreta. Ossi parietali dextro inest erosio non adeo profunda, ad magnitudinem nummi florenti dicti, a decubito illo gangraenoso illata.

119) PERCIVAL in *Medical facts and observations*. Vol. I. p. 646.

120) Violentias externas et in adultis hydrocephalo chronico ansam porrigere posse, casus memorabilis a THUNBERG recensitus debet (*Notizen in Afrika und Asien*;

Asien; übersetzt in dem Magazin von merkwürdigen neuen Reisebeschreibungen. Berlin 1792. 4. B. p. 250).

Via caussarum traumaticarum et ex sequenti casu prodit. Die 9. Maii 1819. agricolae parentes ex pago Pickieliszki filium octo menses natum et caput multo grandius quam per naturae leges fas est habentem, in institutum clinicum Vilmense attulerunt consilium praetereundo expectantes. Ipsi semper prospera valetudine usi erant, neque mater secundum tum gravida, quum infantem hunc in utero gestaret, quidquid morbi passa erat, neo ullum ei malum hoc per tempus acciderat (nequa infans natu major defunctus hoc morbo laboraverat) partumque hunc debito tempore naturalem non adeo difficilem absolviit; pusillus vero, de quo agitur, bene conformatus, et capite normali praeditus nullaque functione vel vitali vel naturali destitutus erat, nec caput ejus paulo serius quidpiamangebatur, immo de bona ejus valetudine a partu usque ad mensem quintum parentes gavisii sunt: tum vero nocte ille decumbens prope matrem dormientem, ex alitudine tribus pedibus majoré humi in occiput lapsus est, ejulatuque a somno parentes excitavit, qui mox eum prostratum elevarunt, ac investigantes occiput, tumorem magnitudinis ovi ascerini rubicundum ac dolentem in suprema ejus parte detexerunt, quique in eodem statu totam per hebdomadam mansit, dein sensim sensimque imminuebatur, ejusque loco primum fontanella anterior protrudi deinde gradatim caput augeri coepit. Sequentie die post lapsum multum caluit vomitusque, sub meridiem autem omne corpus convulsionibus correptum fuit, quas sex per hebdomadas die noctuque perpetuo miserum cruciabant. Deinceps vero usque in hunc diem aliquando solae corporis extremitates motu convulsivo feriebantur, vel eo absente superiores thoraci adhaerebant, inferiores vero sibi invicem

adeo

sdeo arcte admotae erant, ut vix summa vi adhibita diduci possent. Praeterea dentes primi sexto jam mense prorupere, toto in decursu hujus morbi crebro vomitus urgebat, alvusque semper liquida quater vel plus per nycthemerum rejecta, urina parva quidem copis sed crebro reddita. Hujusmodi in statu aegrotus nobis observantibus haec memoratu digna suppeditavit. Caput subglobosum, mole auctum, mensuratum pelvimetro *Bandelosquii*, diametrum transversum seu parvum septem pollicum et novem linearum, diametrum perpendicularem septem pollicum, diametrum magnum seu medium octo pollicum et trium linearum, diametrum maximum novem pollicum praebuit. Circumferentiam vero a tuberculo occipitali magno per tubera frontalia tractam duo et viginti pollicum, frontem aliquantum prominentem, arcus superciliares elevatos, carunculas lacrymales reconditas, occiput paulo depressum, tegumenta capitis multum extenuata, capillis fulvis, longis, multisque, venis frontis et temporum nec non totius partis capillatae turgidis, praedita. Ossa cranii duriuscula procul a se invicem dissita, occipitis illud quasi bipartitum, omnesque fontanellae apertae multumque hiantes, nullaeque suturae, imprimis loco sagittalis spatium inter ossa latius pollice transverso aderat, unde caput magis ad latera expansum pondus ejus tam excedens vim musculorum suffulcientium, ut neque his moveri, neque una alterave positione retineri posset, hinc sub quovis positu corporis aliorum volutaretur. In fronte tubera magna apparebant, facies speciem triangularem referebat, nasus sursum sublatus erat. Palpebrae superiores extenuatae orbitam supernam foras ex utroque latere propulsam cooperientes, et reticulo vasculoso insignitae sursum cum extensis tegumentis cranii tractae lagophthalmum referebant. Inferiores tensae pupillam attingebant.

6. Cavendum, ne ex sola capitis infantilis magnitudine abnormi ¹²¹⁾, aut ex serotina fontanel-
lae ossificatione ad certam pro hydrocephalo dis-
positionem concludamus. Utrumque enim phae-
nome-

Diagno-
sis.

Oculorum motus omnino habitum strabismi exhibebat. Pupilla luci admota et in somno contrahebatur, in tenebris autem et corpore erecto summopere dilatabatur. Ceterum quoad visum, oculorum auriumque situm, auditumque, odoratum, gustum atque tactum prorsus eadem in hoc aegroto animadvertebantur, quae in priore supra exposita sunt; nisi quod vehementi sonitu campanae majoris e somno excitabatur, vigilans vero nil audire videbatur. Corpusculum ejus bene consuturum et pro hae aetate satis crassum longitudine quatuor et viginii pollices non superabat. Extremitates corporis superiores thoracis, inferiores autem sibi invicem et abdomini proxime admotae ne adhibito quidem conatu facile removebantur, digitorum manus alii flexi erant, alii extensi. Praeterea invenimus spinam vertebralem normalem, pectus bene conformatum et satis amplum, os trianguli speciem referens saepe saliva spumante repletum, aliquantum apertum et sex dentibus instructum, porro oscitationem frequentem, respirationem tamen liberam, abdomen molle nec nisi sub ejulatu et convulsionibus extremis-
tum tensum; denique alvum liquidam normalem, urinam copiosam. Proposuimus fonticulos ad cranii basin, et usum protractum foliorum digitalis purpureae, addito calomel ad lenem salivationem usque, idque magis pro parentum consolatione, quam pro aegri salute.

121) BIND'S *Abhandlung über die relativen Maasverhältnisse des menschlichen Körpers*. In *NASSA Zeitschrift für Anthropologie*. B. 1. p. 342.

nomenon nulla subsequente serosa in cranio collectione visum est ¹²²). Ceterum hydrocephali chronici diagnosis vix ardua. Excipi tamen meretur casus, ubi *cerebrum praegrande* ¹²³), aut *collectio adipis* in encephalo ¹²⁴), aut *fungus medullaris* ¹²⁵), illius morbi symptomata exhibebant ¹²⁶). Ut caput hydrocephali congeniti aut chronici ab eo *gigantis* distinguere liceat ¹²⁷), ad proportionem inter cranium et faciem illis in morbis, ut diximus, deletam respiciendum est ¹²⁸). Tamen et in hydrocephalo ossa faciei maxima obven-

runt ¹²⁹).

122) Ad octavum annum fontanella aperta mansit apud SWIFTENIUM l. c. §. 1217.

123) BONETI sepulchr. anat. lib. I. sect. 8. obs. 2. WIL-
LISII anatom. cerebri in opp. Amst. 1732. p. 14. fig. V.
HALLERI de corporis humani fabrica. T. VIII. p. 15.
DANCE cas d'hypertrophie du cerveau. *Revue médicale*
Novembre 1828. p. 306. Hypertrophiam seu phryaco-
niam cerebri, hydrocephalum simulantem jam in pri-
ma operis mei editione a. 1818. edita indicatam, ut
NOVENI exposuit HUSELAND (*Journ. für die pr. Heilk.*
May 1824. p. 414) 1

124) CHAPMAN in *The London medical, surgical and*
pharmaceutical journal. 1814. November.

125) ESQUIROL in *Archives générales de médecine*. Dé-
cembre 1823. WALTHER *Journ. für die Chirurgie und*
Augenheilk. B. 1. Heft 1. RUST *Magazin für die ge-
samnte Heilk.* B. 19. H. 2. p. 222.

126) NOLDE apud MECKEL l. c. p. 298.

127) MOMENTE SANDIFORT (exerc. acad. lib. I. c. 4).
MOLINEUX (*Phil. trans.* No. 68. p. 880) ossa hydro-
cephalicorum pro giganteis habuit.

128) SOEMMERRING *Knochenlehre*. §. 255.

runt¹²⁹⁾. *Divisionem* hydrocephali in *externum* et *internum*¹³⁰⁾ non admittimus. Ille nempe ad *capitis oedema* spectat¹³¹⁾, aliis *hydrocephalus subcutaneus*, seu *hydrocephalus integumentorum*. Potest interea utrumque malum complicari¹³²⁾. Quam ad complicationem tamen, *procidetiam* durae matris sub forma sacci sero repleti per vacuum in cranii ossibus ad verticem relictum¹³³⁾, aliquando hydrocephali sociam, minime revocandam esse censemus.

7. Aegri hydrocephali rarissime provectam attingunt aetatem. Viri tamen sunt annorum^{Prognosis.} septemdecim¹³⁴⁾, viginti duo¹³⁵⁾, viginis quatuor¹³⁶⁾, triginta¹³⁷⁾, triginta unius¹³⁸⁾, triginta quinque¹³⁹⁾, quadraginta trium¹³⁹⁾, quadraginta

T 2

quin-

129) HARTELL l. c. p. 95.

130) FERARIUS de arte medica infantum. Lips. 1605.

131) Edit. secundae. P. I. Vol. III. sect. II. cap. XXVI. §. LXXXVIII. No. 2.

132) J. CH. POHLIUS Progr. de hydrocephalo infantis recens nesti interno et externo. Lips. 1777. WREISBERG Salz. med. chirurg. Zeitung. 1805. 1. B. p. 89.

133) LOSTIE med. observ. and inquir. Vol. II. No. 13. p. 124.

134) MALACARNE. HARTELL l. c.

135) LODER in adnot. ad ROSENSTEINI opus: *Kinderkrankh.* p. 616.

136) Talem aegrum, a SCHMIDT descriptum (*Salzb. med. chir. Zeit.* 1800. No. 90), Viennae vidi.

137) MICHAELIS l. c.

138) BÜTTNER l. c.

139) BRAUN in *Jahrbücher d. philosoph. med. Gesellschaft zu Würzburg.* B. 1. Heft 3. p. 165.

quinque ¹⁴⁰⁾, quadraginta octo ¹⁴¹⁾ et quinquaginta quatuor ¹⁴²⁾. Ex tumorum serum continentium, varisque ad cranii loca obvenientium ¹⁴³⁾, sive ruptura, sive apertura, extemplo mors sequi solet. Item a lapsu in caput ¹⁴⁴⁾. Spes sanationis, si hydropis natura vaga sit ¹⁴⁵⁾, si hydrocephalus in hydrorrhachiam transeat ¹⁴⁶⁾ sique anasarca, quod hydrocephalum chronicum praecedebat, eo praesente profligatum, iterum nunc redcat ¹⁴⁷⁾. Et scrophularum externa evolutio aliquando hydrocephalum chronicum profligavit ¹⁴⁸⁾. Mors a sopore, convulsionibus, respiratione difficili, paralyti praecedi solet.

Cura.

8. *Hydrocephalum congenitum et chronicum* sanare neminem docebimus. Ad morbum in dispositis praepediendum, aut eo jam evoluti ad vitam protrahendam ¹⁴⁹⁾, studendum est: 1. ut urinam

139) SCHNEIDER l. c.

140) AURIVILLIUS l. c.

141) SCHOMBERT de hydrope ventriculorum cerebri.

142) GALL *Anat. und Physiolog. des Nervensystems. Paris 1800.*

143) §. XX. 8.

144) HORNER l. c.

145) Memorabilis hic legi maretur morbi historia filii Principis D. in Epitom. J. P. FRANKII l. c. p. 178 et 179. enarrata.

146) MORCAGNI l. c.

147) ODIER l. c. p. 105. 114.

148) CHÉZYNE in op. citando vers. Germ. p. 29.

149) CAMPER „ne misellorum sortem pejorem vel vitam brevioram reddamus“ curam radicalem perficiendam nequaquam tentat; — sic et ego, subintelligitur in hydrocephalo congenito et chronico.

nam vicissim foliis *digitalis purpureae* ¹⁵⁰⁾, radicibus *scillae marinae* ¹⁵¹⁾, *ononidis spinosae*, *asparagi officinalis* et *apii petroselinii* promoveamus, 2. ut alvum radicibus *rhei palmati*, *convolvuli jalappae* et *muriate hydrargyri* apertam teneamus, 3. ut hoc ipso medicamine resorptionem liquoris extravasati obtineamus ¹⁵²⁾, salivaeque majorem secretionem eliciamus, 4. ut transpirationis opus et sternutationem ¹⁵³⁾ excitemus, 5. ut vires debito regimine dietetico et *decocto glandum quercus roboris tostorum* ¹⁵⁴⁾, infusione frigida corticis *cinchonae officinalis* ¹⁵⁵⁾, vino ¹⁵⁶⁾, leni-

150) Potissimum in hydrocephalo acuto commendata est, sed et in chronico laudabile evadit diureticum.

151) E. c. Acetum scilliticum q. s. ut saturetur scrupulus subcarbonatis potassae, additis tribus unciiis aquae apii petroselinii, guttis nonnullis aetheris nitrici alcoholisati ac uncia una syrupi radicia ononidis spinosae. M. cap. cochlear majus quater de die, si infans fuerit trium et ultra annorum.

152) DONSON (*Edinb. med. Comment. Vol. 6*). PARCIVAL (ibid. et *Vol. 5*). AL. MONRO l. c. Adhibetur osalomet interne et unguentum mercuriale forte ad crura ad salivationem usque. Loco mercurii nuper *hepar sulphuris* commendatum est (SENFF *über die Wirkung der Schwefelleber* n. s. w. Halle 1816).

153) HEISTER instit. chirurg. p. 498. FORESTUS obs. chir. lib. III. ad obs. 6. MALACMI-FOOT in HUKELAND'S *Journ. der pr. Heilk.* 1809. Oct. p. 97.

154) J. P. FRANK l. c.

155) HOFFENGAERTNER l. c. p. 98.

156) ODIER l. c. p. 194.

lenibusque martialibus sustineamus, 6. ut simul vitio scrophuloso et rhachitico *muriate baryte*¹⁵⁷⁾, *muriate calcis* et praecipue *radice rubiae tinctorum* occurramus, 7. ut *vesicatoriis*¹⁵⁸⁾, *setaceis*, *fonticulis*¹⁵⁹⁾, *ustione*¹⁶⁰⁾, secretionem artificialem in superficie cranii producamus, cui scopo et frictiones¹⁶¹⁾ et balnea vaporis¹⁶²⁾, adhibita fuer, 8. ut majorem affluxum sanguinis ad caput, ope hirudinum ad collum, pediluvii, erecta corporis positione avertamus, et 9. ut cranium ab injuriis externis tueamur. *Fasciis*¹⁶³⁾, *cucuphis*¹⁶⁴⁾, *fomentationibus*¹⁶⁵⁾, *unctionibus*¹⁶⁶⁾,
empla-

157) AUSENIUS diss. observationes veritatem methodi revulsoriae speciantes. Tubing. 1802.

158) SWIETEN l. c. 159) HAEISTER instit. chirurg. p. 496.

160) Auctores citati in §. XII. 3. 161) SWIETEN l. c.

162) Dr. HUNTER in *London medical journal* 1781. p. 428.

163) RIVIERUS (observationes communicatae obs. 6. p. m. 571). Hydrocephalum in recenter nato, sola fascia *Guldonis*, in formam cucuphae concinnata, qua totum caput obvolvebatur, viginti dierum spatio sanasse contendit. Fueritne oedema capitis? Caterum et SWIETEN pileolum ex corio suadet, sic ut firmentur potius partes, quam constringantur: ast in recenti aulomalo. Et nostris temporibus fasciae ad curam hydrocephali chronici propositae et adhibitae fuere a Sir GILBERT BLAKE (*The London medical and physical journal* Octobr. 1821) aliisque (l. vix citato *March* 1822. et *HUFELAND's Journ. für die pr. Heilkunde*. 1822. Septembr. p. 113),

164) DE CABBALLIS phaenomena medica,

emplastris ¹⁶⁷⁾, vix aut ne vix quidem favemus. An *capitis paracentesis* aut *perforatio* locum obtinere possit nec ne? ardua est quæstio. HIPPOCRATES quidem hanc operationem commendavit ¹⁶⁸⁾, at verisimiliter non in infantibus valetudinariis, sed in *adultis, secus sanis*. AETIUS ¹⁶⁹⁾ et CELSUS ¹⁷⁰⁾ quoque dissectioni et scalpello favebant. Item SORBAIT ¹⁷¹⁾, JUNCKER ¹⁷²⁾ et OSTERDYN SCHACHT ¹⁷³⁾. Consilio priorum innixi LE CAT ¹⁷⁴⁾,

REM-

165) Ex calce viva et sale tosto in sacculis MONDSCHUIN (*von der Wassersucht*. p. 88), ex solutione salina, aqua calcis FARNICIUS *ab Aquapendente* (opera chirurgica. Patav. 1647. p. 179), species cephalicæ SWIETEN l. c. §. 1218.

166) Cum oleo hyperici et pulvere myrtilli BURNET (thes. med. pract. II. p. 84), cum oleo rosato myrrhino FALLOPIUS (Vol. II. p. 299).

167) Ex pistis limacibus — HARTMANN (officina sanitatis. p. 944), a labdano, meliloto — SWIETEN (l. c.), ex mercurio — FALK (*vom Quecksilber*. p. 34), ex emplastro adhaesivo — GIRDLESTONE apud BLANE (l. c.) et J. F. BERNARD (in *London medical repository* 1823. Octobr. No. 18).

168) De morbis. lib. II. cap. 61 „Deinde postquam cibus cum refeceris, demum secto juxta synciput capite, ad cerebrum usque perforato, et veluti sectionem per terebram curato.“

169) Tetrabibl. II. serm. 4. cap. I.

170) De medicina. lib. IV. cap. 2.

171) Prax. med. Vienn. 1701.

172) Conspect. chirurgiae. Hal. 1731. p. 175.

173) Institut. med. pract. Tract. ad Rhem. 1764. p. 101.

REMMET¹⁷⁷⁾, MONRO¹⁷⁵⁾ paracentesin tricuspidis vel lanceolae ope instituerunt vel institui curarunt, at infelici cum successu. Idem apud TULFIUM¹⁷⁷⁾, FABRICIUM HILDANUM¹⁷⁸⁾, DE LA MOTTE¹⁷⁹⁾, PETITUM¹⁸⁰⁾, WEPFERUM¹⁸¹⁾, EF. FERDINANDUM¹⁸²⁾, G. FABRICIUM¹⁸³⁾, D. PANAROLIUM¹⁸⁴⁾ accidit. Ac re quidem vera, incertitudo diagnosticos quoad sedem extravasati, periculum accessus aëris, laesionis cerebri et sinuum, subitaneae depletionis et regerminationis seri, tot argumenta contra operationem, semper vitae terminum anticipantem, sistunt. Neque illi indistincte subscripsit

174) *Philosoph. transact. Vol. 47. p. 267. vid. LASKER auserl. Abh. 4. B. p. 73* (Operatio die 23. Octobris 1749. peracta; mora inter diem 27 et 28. ejusdem mensis).

175) *Medical commentaries. Vol. VI. Pars 4. Lond. 1779* (Quinque paracenteses, quarum ope uncias octoginta seri eductae; mors quarta circiter post ultimam operationem hebdomade ex marasmo).

176) l. c. 177) *Lib. I. obs. 26. 178) Cent. III. obs. 47.*

179) *Traité complet de chirurgie. T. 2. p. 131.*

180) *Acad. des sciences l'an. 17.*

181) *Obs. med. pract. de cap. affect. obs. 49, hydrocephalus in puella 5 annorum infeliciter sectus.*

182) *Hist. 1611. hydrocephalum infantis incidit funesto eventu.*

183) *Art. 3. obs. 6. Ab hydrocephalo inciso aperto bregmate mors.*

184) *Iatrologia. In hydrocephalo a perforatione cerebri mors.*

scripsit antiquitas, teste PAULO ARGINETA ¹⁸⁵). Rejicitur etiam a MORGAGNIO ¹⁸⁶), MONROO ¹⁸⁷), CAMPERO ¹⁸⁸) et a potissimis chirurgis ¹⁸⁹). Nil enim eam sustinet, quam analogia ex arte veterinaria ¹⁹⁰) deprompta. Nihilominus rursus pluries tentata

185) De medica materia. lib. VI. cap. III. p. m. 235.

186) Op. c. epist. XII. art. 13.

187) l. c. p. 416.

188) l. c. p. 57.

189) HEISTER (institut. chirurg. Pars 2. sect. 1. c. 40) ait:

„Simulacque enim deaperto ferrumentis capite lymphæ prolicitur, ipsa statim vita simul effugit, prout quidem diuturnus rerum usus medicorum filios edocuit.“

RICHTER (*Anfangsgründe der Wundarzneyk.* B. 2. p. 220) monet; „In jedem Falle, wo die Krankheit schon einen hohen Grad erreicht hat . . . findet die Heilung nicht statt.“ BOYER (*chirurg.* Vol. 5. p. 216)

fatetur: „On a quelquefois tenté la guérison de l'hydrocéphale en pratiquant la ponction avec un trois-quarts dans un des points membraneux du crâne où l'on n'a point à craindre de piquer un sinus. Cette opération a toujours hâtée la mort . . . C'est donc avec raison qu'on a blâmé la ponction comme une opération téméraire.“ DELPECH (*précis élémentaire des maladies réputées chirurgicales*) contendit: „Il est évident que tout procédé chirurgical est inadmissible.“

ZARE (*Darstellung blutiger heilkünstlicher Operationen* B. 2. 3. Aufl. p. 68) „ich stelle, inquit, diese Operation nur einmal an, und am sechsten Tag starb das Kind an Convulsionen.“

190) BLOCH *Beitrag zur Naturgeschichte der Blasenwürmer in den Schriften der Berliner Gesellschaft naturforsch. Freunde.* I. EV. HOME *On muscular motion in Philos. transact.* 1795. K. ASM. RUDOLPHI *über die*

tentata est, idque, paucissimis nobisque dubiis casibus exceptis ¹⁹¹⁾, solito infelici successu ¹⁹²⁾.

§. XXII.

- Hydatiden thierischer Körper*, in *den anatom. physiol. Abhandl.* Berlin 1802. *Ejusdem Entozoorum s. vermium intestinalium hist. nat.* Amstelod. 1808. SANDERS *Beobachtungen von den Blasenwürmern des Rindviehes*, in BECKMANN's *Beyträgen*. T. V. J. G. LESKE *vom Drehen der Schaafe und dem Blasenbandwurm im Gehirn derselben, als Ursache dieser Krankheit*, Leipz. 1780. RIEMISCH-REUTERISCHE *ausführliche Praktik des Veterinär-Troikarirens irrgehender Drehschaafe*. *Dresd. und Leipzig* 1791. MOORCHOFF in *Medical facts and obs.* Vol. III. 1792 (De hydatide trepanationis ope e cranio vaccae educta). GERICKER *Anweisung, wie man die schädliche Drehekrankheit oder das Segeln der Schaafe heilen kann*. Berlin 1803. VALOIS *mémoires et observations sur le tournis des moutons*. à Paris 1809. J. HOOO in *Farmer's Magazin*. Cfr. *Bibl. britan.* 1813. No. 422 (De temulentis ovium a taenia hydatigena proveniente ejusque curs). H. WATSON in *The London medical repository*. 4. Vol. Novembr. 191) J. VOSE *medical and surgical transactions published by the medical and chirurgical society of London*. Vol. 9. P. 2. p. 354. Vide *Medicinisch-chirurg. Zeitung* 1819. No. 96. p. 276. H. GREATWOOD the *Lancet* 1829. T. 2. p. 238. CONQUEST *ibid.* 1830. April. 192) J. GLOVER *New-York medical repository*, Vol. 4. 1818. *new series*. p. 405 (Octo punctiones, eductae ultra novem mensurae seri, mors superveniente febre); FENKELTON *Edinburgh medical and surgical journal*. April 1821 (Operatio peracta die 19 Septembris 1820, mors die 9. Novembris vigentibus convulsionibus); LIEARS *ibid.* (Punctio die 10. Decembr. 1820. facta,

§. XXII.

De hydrocephalo acuto.

1. *Hydrocephalus*, encephalitis primariae Defini-
 aut febrium affinium effectus, citissime curriculum^{tio.}
 suum absolvens, *acutus* dicitur.

2. Hunc

mors die 15. Junii 1821. sub spasmis); HOOP *ibid.*
Octob. 1821 (Operatio die 9. Aprilis 1821. mors
 post biduum); WITMER *American recorder July*
 1821 (Spatio octo dierum, quindecim punitiones, edu-
 ctæ unciae centum sexdecim seri, mors die nona post
 operationem comparentibus convulsionibus); CALLA-
 WAY *ibid.* p. 452 (Mors quinta hebdomada post ulti-
 mam operationem); J. SYME *Edinburgh med. and sur-
 gical journal. Octob.* 1825. p. 295 (Spatio mensium
 trium, quinque sectiones, eductæ unciae triginta sex
 seri, mors die decima quarta post ultimam operatio-
 nem); MONKEY *London medical and physical journal.*
Decembr. 1824 (Infans decem mensium, spatio decem
 hebdomadum undecim punitiones, inde unciae qua-
 draginta seri eductæ. In cadavere cerebrum resolu-
 tum, remanente veluti bursa vacua ex membranis);
 R. BROWN *ibid.* 1824. *Vol.* 51. p. 162 (Operatio die
 17. Septembris 1823, sex punitiones, eductæ unciae
 triginta quinque seri, mors die 21. Octobr.); R. GRAY
ibid. 1825. *Vol.* 54. p. 204 (Mors die decima post ope-
 rationem); J. HALBROOCH *London medical reposi-
 tory and review* 1825. *New series Vol.* 1. p. 315 (Pun-
 etio 26. Junii 1825, exitus ignotus); F. W. ORYEN-
 HEIM in *Rust's Magazin für die gesammte Heilk.*
B. 24. *Heft* 1. p. 88 (Exitus solitus); CH. A. LEE
The New York med. and phys. journ. 1828 (Infans
 trium mensium, operatio die 5. Septembris peracta,
 mors die 28. Octobris); et ex *Salisbury journal. Se-*

Scripto-
res.

2. Hunc morbum jam HIPPOCRATES pulchre descripsit ¹⁾. Interea illius notio exacta SCHENKIO A GRAFFENBERG ²⁾, VESALIO ³⁾ et MERCURIALI ⁴⁾; exactior PETITO ⁵⁾ et exactissima PAYSLEY ⁶⁾, ROBERTO WHYTT ⁷⁾ tribuenda est. Cum laude secuti sunt: LUDWIG ⁸⁾, WILMER ⁹⁾, SEXTORPH ¹⁰⁾, WARREN ¹¹⁾, AEREY ¹²⁾, MIER ¹³⁾, WATSON ¹⁴⁾,

ptembr. 1823. in *FRONTIER Notizen aus dem Gebiete der Natur- und Heilk.* B. 5. Octobr. 1823. No. 102. p. 224 (Spes sensationis!).

- 1) De morbis lib. VII. sect. V. („Aqua si in cerebro suborta fuerit, dolor acutus sinciput et tempora, interdumque alias capitis partes detinet, subindeque rigor et febris, oculorum regiones dolor occupat, iique caligant; pupilla seinditur et ex uno dno sibi homines cernere videntur, et si quis surrexit, tenebrae ipsumprehendunt neque ventum neque solem sustinent, aures tinnunt, salivam et pituitam vomitione refundit“).
- 2) Observationum medicarum. lib. I. casus 9.
- 3) Lib. I. de humani corporis fabrica. cap. 5. p. 17.
- 4) Opp. liber de morbis puerorum.
- 5) *Mémoires de l'acad. des sciences pour l'an*, 1718. p. 118.
- 6) *Essays of Edinburgh*. Vol. III.
- 7) *Observations on the dropsy in the brain*. Edinburgh 1768. Vid. *Works*.
- 8) De hydropse cerebri puerorum. Lips. 1777. vid. BALDINGER sylloge opusc. Vol. V.
- 9) *Ex Cases and remarks*. Lond. 1779. p. 52, in *Samml. auserles. Abhandl. für pr. Aerzte*. B. 5. p. 569.
- 10) Diss. de febre hydrocephalica. Hafn. 1786.
- 11) *Winke über den innern Wasserkopf*, in *Sammlung*

SON ¹⁴⁾, LETTSOM ¹⁵⁾, QUIN ¹⁶⁾, ZWINGER ¹⁷⁾,
 ODIER ¹⁸⁾, WICHMANN ¹⁹⁾, BUCHHOLZ ²⁰⁾, DE
 CARRO ²¹⁾, BADER ²²⁾, FOTHERGILL ²³⁾, KREY-
 SIG ²⁴⁾, HOOPER ²⁵⁾, G. F. HENNIG ²⁶⁾, P. WEA-
 VER ²⁷⁾, MATHY ²⁸⁾, LAENNEC ²⁹⁾, DUCASSE ³⁰⁾,

HOFFEN-

*der neuesten Beobachtungen Engl. Aerzte, für das
 Jahr 1788. von FOART SIMMONS.*

- 12) *London medical journal* 1781. Juno. p. 424. *Samml. ausertl. Abhandl. für pr. Aerzte.* 7. B. p. 196.
- 13) *Lond. medical journal*, Vol. 4. p. 393. *Samml. ausertl. Abhandl. für pr. Aerzte.* 10. B. p. 224.
- 14) *London medical observations and inquiries*. T. 4.
- 15) *Memoirs of the medical society of London*. Vol. 1. p. 173.
- 16) *Treatise on the dropsy of the brain*, Lond. 1790. Vers. Germ. Leipz. 1792.
- 17) *Act. Helvet.* Vol. II.
- 18) *Mémotr. de la soc. royale de médec. an.* 1779. p. 204.
- 19) *Ideen zur Diagnostik.* 3. Th. p. 48.
- 20) In BALDINGEN's *neuem Magazin f. Aerzte.* 1. B. 6. St.
- 21) *Dissertatio de hydrocephalo.* Edinb. 1793.
- 22) *Geschichte der Wassertucht der Gehirnhöhlen, oder des Schlagflusses der Kinder.* Frankf. 1794.
- 23) *Medical observations and inquiries*. Vol. 4. p. 40. *Works.* edit. Lond. 1784. p. m. 269. Versio gallica auctore BIDAULT DE VILLIERS cum notis. Parisiis 1813. edita, habetur.
- 24) *Diss. de hydrocephali inflammatorii pathologia.* Vitenb. 1800.
- 25) *Memoirs of the medical society of London.* I. Vol.
- 26) *Diss. de hydrocephalo interno.* Vitenb. 1806.
- 27) *Ex medical and physical journal* Vol. 15. in *Samml. ausertl. Abhandl. für pr. Aerzte.* B. 23. p. 584.

HOPFENGAERTNER ³¹⁾, FORMEY ³²⁾, CHEYNE ³³⁾, J. P. FRANK ³⁴⁾, PORTENSCHLAG ³⁵⁾, J. C. SMYTH ³⁶⁾, MILMAN COLEY ³⁷⁾, YEATS ³⁸⁾, GÖLIS ³⁹⁾, RICHELIEU ⁴⁰⁾, TRAFVENFELT ⁴¹⁾, HENNE ⁴²⁾, J. F.

COIN-

- 28) *Journal de médecine de CORVISANT* 1806. Juin. p. 651. *Samml. auserl. Abhandl. für pr. Aerzte.* 24. B. p. 180.
- 29) *Ibid.* 30) *Journal général de médecine.* 1809. Août.
- 31) *Op. c.*
- 32) *Von der Wassersucht der Gehirnhöhlen.* Berlin 1810.
- 33) *Essay on the hydrocephalus acutus.* Edinb. 1809. Edit. nova exstat, cujus epitome continetur in HARLESS *Rheinische Jahrbücher für Med. und Chirurgie.* B. 6. St. 2. p. 38.
- 34) *I. c.* p. 180.
- 35) *Vom Wasserkopf, ein Beytrag zur Monographie dieser Krankheit.* Wien 1812.
- 36) *Treatise on Hydrecephalus.* Lond. 1813.
- 37) *A practical treatise on the remittent fever of infants with remarks on hydrocephalus internus.* Lond. 1814.
- 38) *On the early symptoms which lead to water in the brain.* Lond. 1815.
- 39) *Praktische Abhandlungen über die vorzüglichsten Krankheiten des kindlichen Alters. I. B. von der hitzigen Gehirnhölen - Wassersucht.* Wien 1815.
- 40) *Dissertation sur l'hydropisie atgue des ventricules du cerveau.* Paris 1814.
- 41) *Svenska Läkare — Sällskapets Handlingar.* 2. B. 2. 3. H. Stockholm 1815.
- 42) *Ein Beytrag zur acuten Gehirnwassersucht in HUSELAND'S und HARLESS Journal der pr. Heilkunde.* 1816. Junius. p. 61.

COINDET ⁴³), C. G. F. WINKLER ⁴⁴), J. S. BRACHET ⁴⁵),
 V. VELDE ⁴⁶), P. A. PIORRY ⁴⁷), G. MAXWELL ⁴⁸),
 C. G. BAUMGAERTEL ⁴⁹), KRUCKENBERG ⁵⁰), L.
 CHR. H. HUSCHKY ⁵¹), H. HANBERG ⁵²), E. W.
 OTTO ⁵³), N. CHAPMAN ⁵⁴), F. M. LEVRAT ⁵⁴),

J. BRE-

43) *Mémoire sur Phydrencéphale ou céphalite interne hydrencéphalique. Genève et Paris 1817.*

44) *Diss. de hydrocephalo acuto. Lips. 1817.*

45) *Essai sur l'hydrocéphalite, ou l'hydroptisie aigue des ventricules du cerveau, Paris 1818.*

46) *Diss. de hydrocephalo acuto primario. Gand. 1823.*

47) *De l'irritation encéphalique chez les enfans, ou considérations sur les causes, les symptômes et le traitement, de la maladie désignée successivement sous les noms de convulsion interne, hydrocéphale aigue, d'arachnoïde etc. Paris 1823.*

48) *Observations on hydrocephalus internus with cases. In The Edinburgh medical and surgical journal. July 1824. p. 11.*

49) *Diss. de hydrocephalo acuto interno. Lips. 1824.*

50) *Jahrbücher der ambulatorischen Klinik zu Halle. B. 2. 1824.*

51) *De encephalitis infantum, sive (?) hydrocephalo acuto. Jen. 1825.*

52) *Diss. de hydrocephalo acuto. Berol. 1826.*

53) *Diss. de hydrope cerebri acuto. Lips. 1827.*

*) *The Philadelphia journ. of medic. and physic. sciences. Vol. 4. No. 8. 1827. art. 6.*

54) *Aperçu théorique et pratique sur les causes, la nature et le traitement de l'hydrocéphale aigu. Paris 1828.*

J. BAEVIS ⁵⁵⁾, TH. MILLS ⁵⁶⁾, SIBERGUNDI ^{*)},
ALBERT ^{**)}.

Doctri-
nae diffi-
cultas.

3. Quum hydrocephalus acutus aliorum morborum sit effectus, eorumque nunc acmen, nunc finem comitetur, temporis punctum, a quo descriptio illius inchoanda est, difficulter determinatur. Hoc solum constat, horum morborum initia ad hydrocephalum nequaquam pertinere. Patet hinc auctores, qui hydrocephalum acutum in tria ⁵⁷⁾, vel quatuor ⁵⁸⁾ stadia dividunt, ac sub primo eorum encephalitiidem describunt, eundem errorem committere, quem committeremus, si disserendo de hydrothorace acuto, pleuritidem, sub cujus curriculo extravasatum in pectore contingere

55) Diss. de hydropse ventricularum cerebri acuto. Berol. 1828.

56) Eine pathologische Untersuchung über die Natur des Hydrocephalus auf genaue Beobachtung der Krankheitserscheinungen und der Erscheinungen, welche die Leichenöffnungen darboten, gegründet. Ex Transactions of the association of Fellows and Licentiates of the King and Queen College of physicians in Ireland. Vol. 5. p. 254. in Samml. auserl. Abhandl. für pr. Aerzte. B. 36. St. 3. p. 397.

*) Ueber den Hydrocephalus acutus in diagnostischer, aetiologischer und therapeutischer Hinsicht. HUFELAND'S Journ. der pr. Heilk. 1829. Sept. 40. Octobr. p. 61.

***) HUFELAND'S Journ. 1830. Aug. p. 35.

57) WHYTT. J. P. FRANK. CMEYNE aliique multi.

58) GÖLIS l. c.

tingere solet, pro primo hydrothoracis stadio declarare vellemus. Qui de prodromis adeo hydrocephali acuti loquuntur ⁵⁹⁾, hi nil nisi symptomata morbos febriles in genere annunciantia afferunt. Haec quum ita sint, sufficiat meminisse: ad summum perducta encephalitis vel aliis morbis acutis (apoplexia non excepta ⁶⁰⁾) et quidem non semper evidenter febrilibus ⁶¹⁾, sed encephalo peculiariter infensis, extravasatum acrius, certe, ut constabit ⁶²⁾, non in solis ventriculis anterioribus cerebri ⁶³⁾ gigni, quo facto signa generalia hydrocephali ⁶⁴⁾, modo mox describendo, evolvi solent.

4. Inguentem hydrocephalum acutum sub ^{Symptomata.} encephalitis vel februm cephalicarum curriculo arguimus: si, secundo, quarto, septimo, decimo morbi die, perducto ad acmen malo, aeger, cum facie,

59) Miror WICHMANNUM asseruisse (l. c. p. 60) hydrocephalum acutum annunciari per id, quod infantes pedes post se trahant, ac facile humum cadant!

60) Cap. V. §. XXVIII. 2.

61) Ex dolore capitis rheumatico vix febrili, hydrocephalus aliquando evolvitur, uti memorabilia morbi historia in HUFELANDII diario medico (15. Vol. p. 133) docet.

62) Vid. necroscopiam.

63) Distinctionem a SMYTH (l. c.) stabilitam, in hydropem cerebri sive *hydroencephalum* et in hydropem cavitatis cranii sive *hydrocephalum*, ut omni practica utilitate destitutam, rejicio.

64) §. XIX. 1.

Frank Prae. II. I. 1.

U

facie, inprimis oculis, a statu sano admodum aberrantibus, sub magna licet inquietudine, immo aucta extremitatum jactatione, minus sive querulus, sive delirans evadit, — si tunc sopor accedit, aut praesens augetur, — si praevio vomitu ⁶⁵⁾, febris, aut saltem pulsuum frequentia remittit, vel arteriarum ictus creberrimi, inconstantes ac irregulares obveniunt, — si inanis isque torrens sudor praecipue ad caput ⁶⁶⁾ in conspectum venit, — sique brachia torpent vel motu convulsivo agitantur. Hydrocephalo jam omnibus numeris absoluto, plura ex sequentibus signis, citius tardius, sine tanto ordine, ut morbus necessario in stadia dividendus foret, animadvertuntur: pulsus nunc lentus irregularis ⁶⁷⁾, nunc innumerabilis, — corpus vel immobile, vel automaticum, vel, uno

prae-

65) Vomitus defuisse viderunt MACBRIDE et LUDWIG, ego nunquam. Teste ODIER aliquando hoc symptoma solum occurrit, dum corpus erigitur, vel contra tunc cessat.

66) Nonne ex simili interno sudore hydrocephali acuti origo explicanda?

67) WHYTT secundum morbi stadium a pulsu lento irregulari desumit, quod symptoma cum WICHMANN pro certissimo hydrocephali acuti teste habeo. Ad 42 tantum pulsationes in sexagesima horae parte hic numeravi. Inter ea idem morbus cum pulsu celerrimo mihi obvenit, unde WITHERING (an account on fox-glove) jure WHYTTIO objicit, pulsum lentorem non esse symptoma tam certum hydrocephali acuti, uti iste docuerat.

praecipue in latere ⁶⁸), convulsum ⁶⁹), vel supine commodissimam positionem inveniens ⁷⁰), vertiginosum, — caput rigidum, reclinatum ⁷¹), pendulum, agitaturn, ex uno in aliud latus contortum ⁷²) ac, si fontanella adhuc aperta fuerit, versus finem vergente morbo, aliquando volumine auctum ⁷³), alias cum fontanella collapsa ⁷⁴). —

U 2

facies

68) CHEYNE monet, convulsiones, quae ex hydrocephalo oriuntur, ob id, quod unum tantum latus occupare soleant, ab aliis convulsionibus distingui. Inter ea plura vice simplici in hydrocephalo universum corpus, et aliis in morbis unum tantum latus convulsum vidi.

69) Excepto ni fallor solo WICHMANN (l. c. p. 63) omnes convulsiones pro symptomata secundi vel tertii hydrocephali acuti stadii declarant. Cum eas vero mature et cum febre ingruentes vidissem, ad ipsa encephalitidis signa revocaui (Cap. III. § XIV. 3).

70) FOTHERGILL l. c. THOMPSON in *Medical consultations*.

71) Aegroti occiput pulvinari intrudunt, rite advertentibus SCHLEIERL (*Materialien zur Staats-Arztney- und pr. Heilk.* 4. Samml. No. 3) et PORTENACHLAG (l. c. p. 2).

72) WATSON l. c.

73) Parum fidei observationibus de volumine capitis aucto tribui, donec hoc phaenomenon nuper in infante anni unius ipse viderim.

74) Ad infantem circiter unius anni vocatus sum, in agone constitutum. Medicus, qui eum pertractaverat, morbum pro hydrocephalo acuto declaravit. Dubito quodammodo de diagnosi, sed mirum in modum fon-

facies ita-composita, ac si aeger placidissimo somno frueretur, aliàs motibus abnormibus risum nonnunquam simulantibus agitata ⁷⁵⁾, mox pallescens, imprimis ad latera nasi et circa os, nunc, praesertim ad genas, rubore suffusa ⁷⁶⁾, saepe tumidula; — palpebrae nictitantes, spasmodice contractae, semiclausae, paralyticae ⁷⁷⁾; — supercilia corrugata ⁷⁸⁾; — oculi in orbitam retracti ⁷⁹⁾, fixi, oscillantes, strabi ⁸⁰⁾, truces, subrubri, collapsi ⁸¹⁾, turgi-

tanella collapsa, ita ut digitorum apices sat profunde in spatium inter ossa cranii relictum introducere potuerim, conspiciebatur. Infans paullulum ante unciam syrupi diacodii acceperat, qui in quibusdam pharmacopoeis cum opii grano uno paratur. Quare forte *cerebri collapsus* solo narcotico tribuendus. Sectionem cadaveris obtinere haud potui.

75) Acta mea clinica. Vol. III. p. 49.

76) Vultus a sanguine suffusio a VERALIO (l. c.) adnotata invenitur.

77) Inde oculus oculo saepe minor.

78) Hoc quidem symptoma tanti non est momenti ac asseritur (*London medical repository*, July 1828), ac interdum tamen obvenit.

79) GÖLLIS l. c.

80) Strabismus aliquando in uno tantum latere observatur. Quocunque in casu oculi frequentius intus, sursum et deorsum, quam extrosum convertuntur.

81) Camerae anteriores oculi nuper in puella judaea, quae ex lapsu et terrora hydrocephalum acutum acquisivit, ita collapsae vidi, sicuti educta sub cataractae operatione aqua conspici solent.

turgidi⁸²⁾, lymphæ coagulabili conspurcati, crystallini, lacrymis, ac si fletus immineret, innatantes⁸³⁾, interdum super genas defluentibus⁸⁴⁾, — pupilla sæpissime dilatata⁸⁵⁾, vix contractilis⁸⁶⁾, rarius angustior, aliquando cum motu tremulo iridis⁸⁷⁾; — visus duplex⁸⁸⁾, amaurosis⁸⁹⁾, lucis

into-

82) Oculos ita turgidos vidi, ut cornea prominuerit; an ab aucta humoris aquei in cavitatibus oculi copia?

83) Et hoc symptoma a VESALIO animadversum est. Vidi id evidentissime binis vicibus, semel in filio Gubernatoris Vilmensis, semel in clinico nostro. Præcedebat lacrymas rubor faciem suffundens.

84) Actæ mea clinica. l. c. p. 47.

85) De inconstantia hujus symptomatis omni jure præter ARMSTRONG, et UNDERWOOD (*traité des maladies des enfants*. p. 240) loquitur.

86) Pupillas, quamvis serum in ventriculis anterioribus cerebri lasitaverit, se nihilominus contraxisse cum MATHEW vidi. Interex salmadvertente et HOOPER (l. c. p. 166) plerumque tamen contrarium accidit. Memorabilis PORTENACHLAGH est observatio, utpote ostendens pupillam aliquando se admota candela dilatare (l. c. p. 3).

87) Hoc symptoma, quod in adultis hydrocephalo acuto correptis aliquoties observavi, et inter infantes a cl. ONISA exclusive pro morbo, de quo agitur, proprio declaratur.

88) HIPPOCRATIS verba ad memoriam revocanda: „et ex uno duo sibi cernere videntur.“ Et femina Vilmensis ab hydrocephalo acuto necata, referente amico et collega Sniadecki, de visu duplici conquererebatur. Pro uxore centurionis militum quadraginta annorum in consilium vocatus sum, quæ prævia febre cum

intolerantia⁹⁰⁾; — auditus acutus, rarius surditas; — narium siccitas; — dentium stridor, morsus labiorum, desiderium adstantes mordendi⁹¹⁾, efflu-

enimo capitis dolore, primum de *memoriae imbecillitate*, dein de *visa duplici* conquerebatur, ac tandem cum plurimis hydrocephali acuti signis demortuus est, quin cadaver aperire licuisset.

80) Quamvis hoc symptoma versus finem morbi, rite inopente WHYTT, plerumque observetur, occurrit tamen et citius, teste LUDWIG. Immo in infante gemello, octo mensium, morbus primum per amaurosin se exhibuit.

90) Symptoma istud in encephalitis tam commune, in hydrocephalo defuisse, saepius cum BUCHHOLZIO vidi.

91) Tale phaenomenon anno 1814, in puero octo annorum, conditoris filio, quem cum auditore quondam meo Dr. Rzykowski ab hydrocephalo acuto, ex orci faucibus traximus, conspexi. Morbus instar febris verminosae inceperat. Dein peritonitidis formam induit. Octavo morbi die capitis dolor maxime urgebat, ac irritis hirudinibus alisque auxiliis, secunda morbi hebdomade praecipua hydrocephali symptomata conspiciebantur. Aeger praeviis iactationibus statuas instar reclinato capite jacebat. Elevato trunco caput pendulum observabatur. Suscitatus aeger, ut linguam ostenderet, oculos truces, sublucos aperiebat, adstantes propriasque manus mordens. Dentibus terribiliter atridebat. Pupilla erat dilatata. Manus saepe capiti admovebantur. Urina pauca involuntaria secedebat. Ita et faeces. Pulsus 150. Sudores copiosi ad caput. Vifum salomel, digitali et praecipue amplo vesicatorio, universo capiti deterso appposito, debet. Convalescentia post mensem tantum sequebatur. Adhuc sa-

effluxus liquidi diaphani ex ore ⁹²), scretio valida ⁹³); — trismus aut maxilla depressa; — lingua immobilis, obliqua, normalis, rubedine aphthosa notata ⁹⁴); — vox acuta, profunda, rauca, deficiens; — ejulationes frequentes ⁹⁵), mens vix compos, ac suscitatus seger ⁹⁶), aut nil aut verba intersecta, incongrua, defectum aliquando memoriae indicantia profert; — deglutitio saepe impedita, impossibilis, respiratio placida, lenta ⁹⁷) interrupta, difficilis, anhelans ⁹⁸), cum suspiriis, oscitatione ⁹⁹) et halitu, ut ferunt ¹⁰⁰), specificè foetente, nonnunquam tussicula; — hypochondrium dextrum tensum, cum doloris, sub tactu

radiori,
nam ducabat vitam puer anno 1818. Quid serius accidit, ignoro.

92) Rimcais in HORN's *Archiv für med. Erfahr.* 1815.

2. Heft. p. 331. Exanthema proprium in oris angulis aliisque corporis partibus, quod teste FORMAY (l. c. p. 9) in hydrocephali periode tertia prodiit, non vidi.

93) Acta mea clinica. Vol. III. p. 48. 94) WHITT l. c.

95) Aegri, praesertim adulti, sub ejulatu vocem A in longum trahunt.

96) Optimus aegrum suscitandi ac illius attentionem capessendi modus, jam animadvertente FORMAGILL, est, si corporis positio mutetur.

97) Ad viginti in sexagesima horae parte numeravi.

98) Ad 28. 36. Vidi acta mea clinica l. c.

99) Hoc symptoma continuo in infante octo mensium, hydrocephalo acuto defuncto, vidi.

100) GÖLLA l. c. Non recorder me hoc symptoma observasse, nisi apud infantes, quibus ex usu mercurii salivatio imminabat.

rudiori, indicis; — singultus ¹⁰¹), meteorismus, aliàs abdomen collapsum ¹⁰²); — faecum viridescentium involuntaria depositio, vel pertinax alvi obstructio; — vesicae urinae parèsis, mox incontinentiam, mox retentionem ¹⁰³) lotii; mox connubium horum malorum generans; — urina acris, odoris specifici, cum sedimento albo, innatantibus interdum punctis crystallinis ad superficiem ¹⁰⁴); — crura inverecunde divaricata, saepe retracta, devoluto ad pedes corpore, brachium alterutrum arcte thoraci admotum ¹⁰⁵), aliàs vi elevatum proprio pondere cadens; — manus in narium, aurium, oculorum perfricatione occupatae, saepe prius intrusae, ut plurimum circa genitalia locatae ¹⁰⁶), tremulae, cum tendinum subsultibus; — paralysis, hemiplegia, opisthotonus, ac tandem,

prac-

101) Acta mea clinica I. c.

102) Valde erravit GÖLLIS (l. c. p. 31) abdomen collapsum pro pathognomico hydropis cerebri acuti symptomate venditando.

103) Ad tertium stadium hoc symptoma a LUDWIGIO revocatur (l. c. p. 141).

104) Observatio ONIERI (l. c.), « VIEUSSEUX' (*de la saignée. Paris 1815*) et a COINDET (l. c.) confirmata: „Des particelles micacées ressemblantes à la cristallisation de l'acide boracique.“

105) SAUVAGESIUS istud sat constans symptoma primus, ni fallor, descripsit.

106) Tale symptoma, cunctis fere morbis cerebri commune, vel in infante unius anni observavi.

præviis audoribus viacidis, miliaribus¹⁰⁷⁾, extremitatum livore, frigore, pulsū frequentissimo¹⁰⁸⁾ et apparente rerum in melius conversione¹⁰⁹⁾ septimo, decimo quarto, vigesimo primo, a quo signa extravasati comparuerunt¹¹⁰⁾, die, paucis casibus exceptis, mors.

5. *Cadavera* ex hydrocephalo acuto defunctorum exhibere solent: maculas caeruleas, livores ad caput, dorsum, pectus et brachia¹¹¹⁾, — suturas coarctatas¹¹²⁾, — integumenta capitis incisa plus solito cruore manantia, — copiosum saepe serum mox adaperto cranio prosiliens¹¹³⁾, — tale extra-

Necroscopia.

107) WICHMANN l. c. p. 677. PORTENSCHLÄG l. c. p. 103.

108) Enimvero pulsus prius lentus fuerit, huc perducto morbo frequentissimus evadit: ad 280 numeravit WHITT.

109) GÖLLIS l. c. CRUVEILHIER l. c. Interea fateor, me praesenti in morbo rarius quam in aliis malis, tale temporarium ac fallax levamen observasse.

110) Curriculum hydrocephali acuti statuerunt sex hebdomadam WHITT, quatuordecim autem dierum FOTHERGILL et LUDWIG. Cum encephalitidem simul calculo includant, terminus medius videtur ad tres hebdomadas statuendus. Inter 13 et 17. numerat GÖLLIS l. c.

111) LUDWIG l. c. p. 142. accidentales videntur.

112) GÖLLIS l. c.

113) Infans comit. Ch., quem ex febre maligne demortuum dicebant medici P. . ., cum pollingi debuisset, adaperto cranio, conspicuum prosilientium aquarum copiam largiebatur, veram morbi indolem medicorumque ignorantiam patefacientem.

extravasatum sub arachnoidea*), circa tentorium et foramen occipitale, quin etiam ad ipsum columnae vertebralis initium, — plam matrem cum vasis sanguiferis ac si arte injecta essent ¹¹⁴⁾, — nonnunquam meninges crassiores ¹¹⁵⁾, inter se cohaerentes, cum lympa coagulabili ¹¹⁶⁾ aliisque praegressae inflammationis notis, aliàs, praeter vasorum sanguiferorum turgorem, ac extravasatum, nil quod de praevio processu inflammatorio testaretur ¹¹⁷⁾, — cerebri substantiam mollem ¹¹⁸⁾, flaviusculam, punctis rubris insignitam, — sinus plerumque vacuos, — ventriculos cerebri anteriores, saepe volumine quammaxime auctos, sero ad plures uncias repletos, — aliquando serum in alterutro solum horum ventriculorum, — rarius in ventriculo tertio et quarto ¹¹⁹⁾, — plexus choroideos pallidos, granosos, extenuatos, turgidos ¹²⁰⁾, saepe cum hydatidibus; — serum columnam verte-

*) Serum etiam in sacco e tunica arachnoidea formato repertum est (E. EHRENBERG diss. exhibens hydropis cerebri casum rarissimum. Berol. 1826).

114) MILLS l. c.

115) CRUVEILHIER l. c.

116) In 180 cadaveribus GÖLLIS cerebrum lympa coagulabili obductum vidit (l. c.).

117) Sic et PITSCHAST animadvertit in HUSELAND'S *Journ. der pr. Heilk.* 1823. April. p. 18.

118) CHOTAK, CRUVEILHIER, MILLS ll. cc.

119) WENZEL. Reperimus tamen ODIER (l. c. p. 203) et ego.

120) MILLS l. c.

tebralem adtingens¹²¹); — pulmonem dextrum ab hepate volumine sucto in angustum spatium pulsum¹²²), — hocce viscus coloris rosei, tuberculis albidis refertum¹²³), intestina aliquando sub-inflammata, intricata¹²⁴), atque mesenterii glandulas volumine suctas, in massam caseosam degeneratas¹²⁵). Ad humorem in cranio extravasatum quod spectat, eum indole a sero aliis in hydropibus collecto differre, mox asseritur¹²⁶), mox negatur¹²⁷). Exactissimam illius analysin MARCETO¹²⁸) et BERZELIO¹²⁹) debemus¹³⁰).

6. Caus-

121) COCHET (l. c.) inde plurima symptomata, quae aliis difficulter ex sero dumtaxat in cranio collecto explicari possent, derivat. Accedit MILLI l. c. Vide infra not. 143.

122) Observatio Dr. HENBERSKI, et MILLI l. c.

123) Affectio hepatis in hydrocephalo acuto, primum a cl. CHEYNE (op. c.) observata est.

124) CHEYNE ibid. 125) CHEYNE, MILLI l. c.

126) HALDAT in *Bulletin de la Faculté de médecine de Paris*, 1814. Juin.

127) BAILLIE *Anatom. des kranken Baues*, p. 257. — SOMMERRING ibid.

128) *Medico-surgical transactions*, 2. Vol. 1813. Continent: aquae 990, 80, — materiae animalis, 1, 12, — muriatis sodae, 6, 64, — carbonatis sodae, 1, 24, — phosphatis calcis, magnesia et ferri, 0, 20.

129) Secundum illius experimenta humor ex ventriculis cerebri post hydrocephalum acutum collectus, quasi purum sanguinis serum considerari potest, quod maxima albuminis sui parte, nempe $\frac{3}{4}$ ad $\frac{1}{4}$ privatum sit, ut vix fortissimo igne massa quaedam coagulata

CAUSAE. 6. Causae hydrocephali acuti sunt eae encephalitidis et febrium cephalicarum imprimis indolis rheumaticae ¹³¹). Morbi istiusmodi praeprimis ad extravasatum proclives cernuntur, ob dispositionem haereditariam ¹³²), congenitam ¹³³), sine sexus discrimine ¹³⁴), — ob scrophulas ¹³⁵), — obque pravam

ex illo sensim separetur. Reliquum fluidum evaporando absidunt crystalli salis culinaris, inter quas colligitur materies brunea extractiva, quae ex soda pura, lactate sodae et peculiari principio animali extractivo, sal istud per omnes humores animales constanter comitante componitur (SCHWEIGER *neues Journ. für Chemie und Physik. Nürnberg* 1814. 10. B. 4. Heft. p. 503. 12. B. 3. Heft. p. 337).

130) Cfr. H. HENCKENROTH diss. anatom. physiol. de liquore cerebrum ac medullam spinalem irrigante. Berol. 1828.

131) Cap. III. §. XV.

132) Familias nosco duas, quarum una sex, altera quatuor infantes, annum vix superantes, ex hydrocephalo acuto amiserunt. Idem confirmant J. C. SMYTH l. c. p. 71. YEATS l. c. p. 3. not. TH. ROLPH in *The London medical repository* et maxime SACHSE in *HUFELAND's Journ. der pr. Heilk.* 1825. Mai. p. 75.

133) Licet quaevis corporis constitutio hydrocephalo acuto subjecta sit (WICHMANN l. c. p. 60. PORTENSIHLAO l. c. p. 68) et infantes tardi ingenit et debiles in hunc morbum inciderint (LUDWIG l. c. p. 134), attamen maxime illi obnoxii sunt, qui ingenio acuto ac corpore forti, colloque brevi instruuntur.

134) LUDWIG l. c. Mirum est REGNAULT (*Journal universel des sciences médicales* T. 29) asserere, se hydrocephalum acutum dumtaxat in pueris observasse.

pravam aut neglectam medendi methodum ¹³⁶⁾. Vitae tempus quaecunque supra quartum mensem ¹³⁷⁾ hydrocephalo acuto obnoxium, ideoque pubertas ¹³⁸⁾, aetas media ¹³⁹⁾ et senium ¹⁴⁰⁾.

7. Sym-

135) Inflammationes viscerum semper in scrophulosis ad extravasata magis prone sunt. Hinc non mirum est, idem relate ad encephalitidem contingere. „*Boy 22 an Hydrocephalus verstorbenen Kindern, deren Leichen ich untersuchte, fand ich Spuren eines vorhandenen Scrophuloidens.*“ MILLS l. c.

136) In familia, in qua sex proles aliorum sub cura ex hydrocephalo acuto perierat, septimam, omnia signa encephalitidis incipientis jam prae se ferentem salvare potui.

137) Nisi causae locales praegressae sint, raro infantes sub quinto mense in hydrocephalum acutum incidunt. Sic et WICHMANN (l. c. p. 38) contendit. FORMERGILL se sub tertio anno hunc morbum non vidisse asserit, quod miror.

138) LUDWIG l. c. („post decimum annum ingruens, plerumque puellas affligit“).

139) Hydrocephalum acutum etiam adultorum esse morbum, WATSONII, LETTSOMII, FORMERGILLII, ODIERII (*Neue Samml. der auserlesenen und neuesten Abhandlungen für Wundärzte* St. 7. p. 188), WETTER (*Harless Rheinische Jahrbücher* B. 10. St. 3. p. 65) et meae observationes docent. Interes cavendum est, ne hydrocephalum accessorium, de quo mox infra, eam acuto, de quo nunc sermo est, confundamus.

140) E. MOULIN *traité de l'apoplexie ou hémorrhagie cérébrale; considérations nouvelles sur les hydrocéphales; description d'une hydropisie cérébrale particulière aux vieillards.* Paris 1820.

Diagnosis. 7. Symptomata hydrocephali nil aliud quam irritationem sive compressionem encephali, praeter serum, a quacunque alia causa, indagationem anatomicam interdum fugiente¹⁴¹⁾, productas, indicant; unde, nisi ex anamnesticis et ex urinae imminuta copia lux affulgeat, diagnosis perardua evadit. Accedit multiplicitas horum symptomatum, a diverso encephali affecto loco repetenda. Verum ex altera parte, haec ipsa symptomatum multiplicitas medico facultatem saepe impertit iis in casibus, ubi hydrocephali acuti praesentiam divinare licuerit, et *sedem peculiarem extravasati* in diversis encephali locis sat tuto determinandi¹⁴²⁾. Docent nempe observationes nostrae: quod ubi hydrocephalus profundissimo lethargo et brachiorum

141) MATHET (l. c. p. 193) puellae quinque annorum meminit, quae omnibus hydrocephali acuti symptomatibus affecta erat, cum tamen cadaver encephalon plane normale exhibuerit. PORTENACHLAG (l. c. p. 131) binas similes refert observationes. Jam BALLONIUS (Opp. Venet. 1734—36. T. 3. consil. 71) adixerat: „Saepe capita hominum morbo capitis defunctorum aperta sunt, in quibus nil memorabile inventum est quod mortem intentasset, et cum alioquin aut abscessum aut simile quid repertum iri pronunciavisset spes augurantium, ipsa inspecto eam sefellit et eorum fiducia et exspectatio in stuporem se vertit ac si cum ipsa anima mortis occasio evolasset.“

142) HARTWRO diss. Experimenta quaedam de affectibus laesionum in partibus encephali singularibus et de verosimili harum partium functione. Berolini 1826.

rum ad thoracem adductione stipatus est, serum copiosum inter cranii partem superiorem cerebrique superficiem externam invenitur; — quod obvenientibus prius vomitu, singultu, pupillae dilatatione, strabismo, palpebrarum spasmis et paralyti, ventriculi dein anteriores cerebri extravasatum exhibent; — quod ubi haec ipsa palpebrarum et oculorum vitia in uno tantum latere prodeunt, ibi extravasatum oppositum cerebri ventriculum detinet; — quod praegressis stridore dentium, motu convulsivo musculorum faciei et colli, serosa colluvies circa cerebellum sedem figit; — quod observatis aponia, deglutitione impedita, paralyti brachiorum, liquor extravasatus medullam oblongatam amplectitur; — quodque praeviis convulsionibus universi corporis, hic liquor specum vertebralem attingit ¹⁴³⁾. Observat praeterea illustris E. HOME ¹⁴⁴⁾, quod circumscripta sede extravasati, e. c. in cellulis, ad cornua anteriora et posteriora ventriculorum lateralium, aeger alvi tarditatem et dolores imi ventris accusat; — quod sero, exclusive ventriculum tertium detinente, intensam cephalaeam et aphoniam, patitur; — quod accumulato seroso latice in ventriculis cerebri et sub

143) Hanc observationem jam CUSTET (l. c.) relate ad hydrocephalum chronicum instituit.

144) *Philosophical transactions*, quae continent EVERARDI HOME: *observations on the functions of brain*. Read the 26. Mai 1814. p. 255—257.

sub tuberculo annulari, dolor ventriculi, intesti-
norum et crurum obvenit; — quod illo locum ob-
tinente inter arachnoideam et piam matrem nec
non super tubercula quadrigemina, dolor occipitis
et delirium occurrunt; — quod extravasato simul
et duram matrem attingente, melancholica imbe-
cillitas, apoplexia et hemiplegia praesto sunt; —
quod dum hydrops ventriculorum cerebri, dilata-
tionem systematis vasorum sanguiferorum durae
matris sociam habet, proclivitas ad suicidium ob-
servatur; — quodque collectio seri inter menin-
ges, melancholiam et amentiam generant. Cum
vero serum hydrocephalum constituens, pro varia
positione, in qua cadaver manserat, varias sibi eli-
gere et parare possit vias¹⁴⁵⁾, cumque portio quae-
dam seri forte ultimis tantum vitae momentis ex-
sudaverit¹⁴⁶⁾, comparatio symptomatum cum phae-
nomenis in cadaveribus eo cautior esse oportet,
quam plurima illorum cum hoc, sed non propter
hoc existere possint.

Continua-
tio.

8. Cum *hydrocephalo acuto* confundi possunt:
febris

145) In ipso adeo aegro ex varia corporis positione, va-
ria symptomata oriri videmus, sic ut aliquando varios
ita partium motus ad libitum excitare liceat.

146) Serum in cranii cavitate extravasatum, quod copiam
excedit, quae a condensatione vaporis cavitates cerebri
in vivente homine lubricantis expectari potest, pro-
ductum morbi esse ex MARSHALLI experimentis elucere
videtur (*The morbid anatomy of the brain in mania
et hydrophobia. Lond. 1815*). Cfr. HENCKENROTH l. c.

febris intermittens lethargica, febris verminosa, apoplexia, hydrocephalus acutus, dentitio difficilis, peripneumonia ¹⁴⁷⁾, *inanitio* ^{*}) et *convulsiones*.

9. Apyrexiae, quibus *febris intermittens lethargica* insignitur, pulsumque sub paroxysmo frequentia, eam ab *hydrocephalo acuto*, vix lucida intervalla ac pulsum saepe lentum habente, distinguunt ¹⁴⁸⁾, ne de aliis intermittens notis dicamus.

10. Concedimus quidem *vermes intestinales* posse turbas *transitorias cerebri* excitare, attamen nunquam talem seriem symptomatum *constantium*, qualem descripsimus ¹⁴⁹⁾. Nec vermes, fortuito sub ipso hydrocephali acuti curriculo evacuati, diagno-

Distin-
ctio a fe-
bre le-
thargica.

Distin-
ctio a fe-
bre ver-
minosa.

147) Ne haec confusio mira videatur, proprio eam confirmabo errore. Pro infante anni unius in consilium a Dr. Herberski, postea medico assistente clinici nostri instituti, vocatus, aegrotulum cum febre ardente, tussi, respiratione laboriosa, a decubitu in latus dextrum aucta, absentibus in recenti adhuc morbo signis hydrocephali acuti, inveni, unde aegritudinem pro *peripneumonia* declaravi. Cum autem infans post hebdomadem mortuus esset, pulmo omnino sanus, ac ut dixi (§. XXII. 5) dextro in latere ab hepate mole solummodo aucto in angustum spatium compressus, nec non conspicuum extravasatum in ventriculis anterioribus cerebri detegebatur.

^{*}) MARSHALL HALL *on a morbid affection of infancy arising from circumstances of exhaustion, but resembling hydrocephalus*. London 1829.

148) HOPFENGAEHTNER l. c. p. VII. et 169. 149) §. IV. Frank Prax. II. I. 1.

diagnosin subvertunt ¹⁵⁰⁾. Quae singula si comparaveris cum observationibus nostris de encephalitis et febris verminosae diagnosi ¹⁵¹⁾, atque cum doctrina, quam hoc de argumento tradiderunt WICHMANN ¹⁵²⁾ et HOOPER ¹⁵³⁾, vix in praxi difficultates hac in re tibi obvenient.

Prognosis. 11. Nisi transitum encephalitis aliorumque morborum affinium in hydrocephalum impedire licuerit, eo minor spes sanationis affulget, — quo celerior iste transitus, quo magis praecepta signorum extravasatum indicantium evolutio ¹⁵⁴⁾, quo junior aeger, quo provecior morbus, quo major probabilitas extravasati in ventriculis anterioribus cerebri vel circa medullam oblongatam latitantis, quo evidentius facies et inprimis oculi a statu normali aberrant, quo fortiora signa anaesthesiae et paralysis quoque segniores evacuationes lotii, cum punctis crystallinis super illud natantibus ¹⁵⁵⁾, alvi et

150) Pluries mihi accidit medicos immerito, morbos a vermibus intestinalibus repetentes, triumphasse, dum unus alterve eorum in conspectum venerat, verum breve semper fuit illorum gaudium, confirmataque mea sive de *hydrocephalo*, sive de *mesenteritide* diagnosi.

151) Cap. III. §. XVI. 5.

152) l. c. p. 87. 88.

153) *Memoirs of the medical society of London. Vol. I.* p. 166.

154) Cerebrum compressionem a sero extravasato eo facilius ferre, quo lentius id evolvitur, rite animadvertente DUCASSON (l. c.), hydrocephali chronici historia docet.

155) VIRSSEUX l. c.

et transpirationis. Interea et hic natura aliquando praeter omnem expectationem miracula operatur; ad quae potissimum revocamus eliminationem seri per nares ¹⁵⁶), oculos ¹⁵⁷) et aures ¹⁵⁸).

X 2

12. Pro-

156) RHODIUS cent. I. obs. 42. THOMAS de admirandis convulsivis motibus. Lib. I. Retulit mihi chirurgiae quondam professor Nizkowski, se infantem omnia symptomata hydrocephali exhibentem curasse, cui inopinate enormia copia seri e naribus effluxit, quo facto aeger perfectae sanitati restitutus est. Similis effluxus, infans tamen eum eventum, describitur in *Transactions of the medico-chirurg. society of Edinburgh. Vol. 2. 1826.*

157) Adolescens 17 annorum anno 1815. in clinico meo decubuit, qui postquam grave pondus capiti imposuisset, a summo dolore ad regionem ossis parietalis *sinistri*, cum febre et vomitu correptus est. His cessantibus cruciatibus perstabat, ac pulsus in sexagesima horae parte solum 40 ictus exhibebat. Accessit eodem in latere tumor insignis palpebrarum ac albugineae, quae super corneam elevata eam fere omnino cooperiebat. Morbum pro effectu extravasati a praevia encephalitide habens, praeter hirudines, calomel, polygalam, digitalem purpuream et vesicatoria, — *scarificationes conjunctivae affectae* institui jussi, quarum ope *larga seri cruenti copia effluxit*, subsidente partium affectarum tumore, evanescente capitis dolore, pulsu ad normam redeunte, verbo aegro perfectae sanitati restituito. Cfr. casus quodammodo similis a BURSERIO (l. c. §. IX. in nota) enarratur. Item a F. L. MEISSNERO in *Gemeinsame deutsche Zeitschrift für Geburtshunde. B. 4. Heft 3. VII. 5.*

158) Femina viginti duos annos nata, constitutionis cor-

Prophylaxis.

12. *Prophylactica hydrocephali acuti in eo con-*

poris mediocris; postquam, ob mortem alieni licet infantis (quam veluti mater per plures hebdomadas diu nocturne curavit), a gravi moerore detenta fuerat; mense Martio anni 1816, sub continuo fletu, in diram cephalaeam, cum febre, vomitu, dolore hypochondrii dextri, pupillis dilatatis, visus imbecillitate, incidit. Subaequitur delirium, sub quo nunc velociter gressus faciens cantat, nunc moesta sedens, umbram defuncti alloquitur. Fugit hominum consortium, respuit nutrimentum, ac quaestionibus cum ferocia respondet, asserens se plane sanam esse. Medicus advocatus morbum per sex dies neglectum pro encephalitis declarat, ac congruam adhibet medelam. Remittitur inde febris, vomitus, aliaeque symptomata, excepto delirio. Die 20. *Aprilis*, in clinicum suscepta aegra, exhibet: lucis intolerantiam, pupillas admodum dilatatas, palpebras aemicladas, faciem alternatim rubentem, pallescentem, linguam aridam, tremulam, labia nigrescentia sanguinem fundentia, halitum foetidissimum, dentes muco atro obductos, nasum acuminatum, deglutitionem impeditam cum sono ac si potus in dolum vacuum caderet, respirationem anhelantem, ad 100. in sexagesima horae parte, tussim sonoram, quin immo latrantem, sive potius singultantem, ad tertium usque cubiculum perceptibilem; extremitates lividas, frigore marmoreo detentas, manus saepe capiti admotas, pulsum inter 120 et 130. filiformem, myurum, irregularem, alvum clausam, pervigilium, jactationem, impotentiam pedibus insistendi, delirium, desperationem et iracundiam exprimens. Aversabatur cubitum, ac vestibus et ornatu sese spoliari haud concedebat. Dilutis dubiis de praesentia typhi, vel febris nervosae

consistit, ut causae encephalitidis, morborumque affi-

lentae, morbum pro encephalitis chronica forte socio extravasato ancephali aut suppuratione cerebri declaravi. Prognosi fere lethali instituta, quid adhuc praestare possent vesicatorium ad nucham, calomel, assa foetida, arnica, alcali volatile, moschus et similia, sensim sensimque experiri proposui. Hisce remediis alternatim spatium decem dierum exhibitis, saltem aegra inter vivos servabatur. Die 30. Aprilis an somnum aliquot horarum, quo absoluto delirare cessavit, si excepias, quod an bene valere contenderit, cum tamen graves querelae de capitis dolore praecipue ad os parietale sinistrum ageret. Praeterea singultus formalis spatium nyctihemeri ter quaterve per horam et ultra saeviens in conspectum venit, cui flores zinci frenum iniecerunt. Die 4. Maii improvisa pneumonorrhagiam patiebatur, respiratione mox abdominali reddita, ac corpore odorem cadaverosum spirante. Aegrotae jam jam in agone constitutae simplex porrigitur emulsio. Die 25. Maii. Magna mutatio in melius. Aegra omnino conscia de malis suis, ita, uti homines sub somno magnetico constituti facere solent, rationem reddidit. Accusat potissimum insurrum auris sinistrae, expeditque balneum tepidum, quod irrita virium summa jactura conceditur et quidem cum emolumento. Die 28. Maii, mane, aegra refert se percipere sensum fluidi ex latere sinistro cranii ad aurem depluentis, auditu graviore reddito, capitis autem dolore admodum sublevato. Examined aures aliquot seri guttas inde emanare conspeximus. Vespera ejusdem diei, praevia obnubilatione, qua vigente objecta flavo colore tincta cernebantur, integra drachma sari ex aedem aures prorupit. Maximum subsequitur levamen, enim-

affinium evitentur. Inter has affluxus major sanguinis ad caput, transpiratio suppressa, retropulsio morborum cutaneorum, praepostera sanatio alvi profluvii, ulcerum, pharmaca narcotica, prima occupant loca, unde capitis debita cura, positio illius altior, custodia a violentiis externis, cunarum motus prohibitus, fuga rerum suaveolentium, fumi

vero physiognomia, inprimis oculi, ad statum sanum redeunt, pulsusque normalis evadit simul cum calore cutis. Ipsa respiratio, saltem decumbente aegra, sine difficultate absolvitur. Die 1. *Junii* aegra serum aquae ad aurem dextram depluentis percipit, ac effluxum illius, sicuti in altera aura, praedicat. Eventus confirmat praesagium, *drachmā unā et semis seri cruenti illico effluente*, ac supposito vasculo collecta. Est autem serum istud sine odore et sapore. Ab alcohol non coagulatur, et succum vegetabilem caeruleum rubro colore tingit. Die 13. *Junii*. Res quotidie in melius procedit, ac menstrua pro prima vice in morbo apparent. Die 14. *Junii*. Sub narium violentia emunctione aegra derepente summum capitis dolorem experitur: mox bulbi oculorum sursum trahuntur, respiratio anhelans fit, ac terribiles superveniunt totius corporis convulsiones. Praescribitur assa foetida, quo facto convulsiones quidem cessant, at aegra cadaveri similis per tres dies relinquitur. Die 17. *Junii* nova affulget spes, immo ab ea die omnia sensim sensimque in melius mutantur. Mense Septembri praeter iussim et pectoris dolorem, nec non debilitatem aegra de nihilo conqueritur. Mense Decembri ad aspectu saltem sana, rus petit, rediitque valetudinaria adhuc mense Maio a. 1817.

fumi carbonum et nicotianae in cubiculis infantum, temperatura eorum modica et constans, lucis ibi moderamen, aversio radiorum solarium, sobrietas nutricia, alvi libertas, pedum custodia, repetita tempore dentitionis sub faciei rubore capitisque calore retro aures sine mora hirudinum applicatio, non neglectis sinapiamis ad suras, balnea non nimis calida, cauta morborum cutaneorum aut evacuationum plerumque salubrium medela, abstinentia a pharmacis narcoticis, nisi absolute necessariis, potiora prophylacticae sistunt momenta. Ubi hydrocephalus acutus familiae cujusdam flagellum sistit, infantibus circa tempus suspectum *corticem daphnes mezerei* brachiis ad lenem exulcerationem usque repetitis vicibus apponimus ¹⁵⁹⁾, vel partibus istis aut basi cranii *fonticulos* ¹⁶⁰⁾, vel *unguentum cum tartritide stibii et potassae* illinimus, ac urinam, si parcius solito fluat, infuso herbae et radicum *apii petroselini* vel foliorum *violae tricoloris* promovemus. Plurimi consilium infantes vix natos mox nutricibus ruri degentibus committendi, conduxit.

13. *Methodus medendi* cum spe eventus ad- Cura.
versus hydrocephalum acutum commendanda, potius encephalitidem et morbos affines respicit. Interea et sub ingressione, ut videbatur, extravasati,
nisi

159) Sciât SACHS me hoc concilium jam in prima editione a. 1818. edita p. 303. dedisse.

160) C. SMITH, SACHS ll. cc.

nisi a *venaesectione* ¹⁶¹⁾, saltem ab *hirudinibus* retro ad aures, ad nares ¹⁶²⁾, tempora et collum, nec non ab *effusione frigida capitis*, a *sinapismis* ¹⁶³⁾ ad crura et a *tartaro emetico* ¹⁶⁴⁾ nec non a *muriate hydrargyri dulci* ¹⁶⁵⁾ tale saltem obtinuimus levamen, ut parentes fateri adacti fuerint, quod methodus ista citius adhibita vitam prolium salvare potuisset. *Folia digitalis purpureae* ¹⁶⁶⁾, in infantibus parum, plus autem in provectoribus aetate praestant. Si, quod raro et vix unquam cum detrimento ¹⁶⁷⁾ contingit, usus internus

161) Ex jugulari MAXVELL l. c.

162) CRUVEILHIER (l. c.) illis maxime favet, et hirudinum defectui instrumento scarificante (*phlébotome de la phtuitaire*) supplet.

163) CRUVEILHIER semiclenpia cum *sinape* landat. Illis nequitquam faveo, nam si debilia, effectum destituuntur; si fortia, partes genitales, utpote tenui epidermide instructas, inflammant.

164) Jure commendat MILLS.

165) Nychthemeri spatium haud raro infantibus anni unius alteriusve a scrupulo usque ad drachmam dimidiam exhibui.

166) A drachma una ad colaturam infusionis unciarum sex omni hora cochlear majus pro adultis. Minor in junioribus requiritur dosis. Inservit mihi digitalis infusum pro vehiculo ad pulveres ex calomel porrigendos. Bis jam pulsam lentum, hydrocephalo acuto proprium, sub usu hujus remedii, accedente copioso urinarum effluxu, frequentiore evasisse conspexi.

167) CHAYNE summo jure monet, fomitem morbi nostri saepe in abdomine latere. Quamobrem, si calo-

ternus mercurii alvum nimis moveret, absente, vix unquam a nobis hic conspecta, fortiori salivatione, et *unguentum hydrargyri griseum* ¹⁶⁸⁾ collo, pectori, cruribus inungi potest. Libenter illi pulverem *foliorum digitalis purpureae* jungimus ¹⁶⁹⁾. Decrescentibus jam jam viribus *infusum florum arnicae* haud spernendum sistit pharmacum ¹⁷⁰⁾. Quibus remediis incassum tentatis, nil superest, quam ut derasis capillis universa cranii superficies, *vesicatorio* cooperiatur. Enormem inde seri copiam mirabili cum effectu depluisse vidimus. Sunt qui *moxam* vertici admovendam esse doceant ¹⁷¹⁾. Conclamato morbo, *moschus*, *subsuccinas ammoniac* *empyreumaticae* ¹⁷²⁾ et *clysteres* cum *gummi resina*

mel per se alvum non satis movet, ei libenter aliquot radicis *Jalappae grana* addo.

168) Ad drachmas duas, ad unciam semis spatium nychthemeri. Praesenti enim in morbo neque a natura, nec a modica pharmacorum dosi quidquam expectandum.

169) E. c. ad drachmas duas unguenti mercurialis drachmam unam pulveris digitalis.

170) Illi quammaxime cura a L. A. STAUPE peracta (*Rust Magazin für die gesammte Heilk. B. 20. p. 335*) deberi videtur, quam ceterum nemini ut exemplar designarem. Quis enim prudens infanti paucarum hebdomadum (*viertelhalbjährig!*) drachmam unam et semis nitri exhiberet? quisque hirudinibus vesicatoria, vesicatoria fotui glaciali, fotum glaciale castoreo et camphorae jungeret?

171) TRUVEY in *Journal général de médec. chir. et pharmacie. Octobr. 1814.*

172) Spiritus cornu cervi succinatius,

sina assae foetidae vitae extinctionem procrastinant. Contrariam effectum ab *opio* expectabilis ¹⁷³⁾. *Balnea tepida* in toto morbi curriculo vix locum inveniunt ¹⁷⁴⁾.

§. XXIII.

De hydrocephalo accessorio.

Definitio. 1. *Hydrocephalus*, encephalitidis secundariae aut morborum chronicorum effectus, nunc celeriter, nunc lente decurrens, nobis est *accessorius*.

Scriptores. 2. Apud singulos fere de hydrocephalo scriptores facta ad *accessorium* spectantia obveniunt, maxime autem apud HOFFENGAERTNER ¹⁾, YEATS ²⁾, CRUVEILHIER et MILLS ³⁾.

Symptomata. 3. *Hydrocephalus*, *encephalitidis secundariae* effectus, indicatis in morbis ⁴⁾ evolvi potest. Pro varia aegritudinis primariae natura variam induit formam. Generatim sub illius curriculo, praeviis saepe urina pauca cum sedimento lateritio, ac alvo obstructa, capitis dolor accedit, aut praesens augeatur, physiognomia aegri derepente in pejus ruit, somnus hand reficiens pro tempore levamen afferre videtur, ast en brevi post vomitum, a sopore secutum, cui profusus sudor, cum symptomatum remis-

¹⁷³⁾ Sic ex ipsis observationibus a MILLS relatis elucet.

¹⁷⁴⁾ MILLS illis multum favere, haud intelligo.

1) Op. c. p. 135 sq.

2) *A statement of the early symptoms which lead to the disease termed water in the brain etc.* London 1814.

3) ll. cc.

4) Cap. III, §. XVI. 15.

remissione, ac si malum intermittentem induere vellet naturam, pro tempore finem imponit, donec lethargus, cum frequenti ejulatu, pulsu lento, irregulari aut frequenti, sphincterumque officium deletum, proximum annuncient interitum. Alias hydrocephalus *chronico* magis *modo* ingruit; post graves scilicet haemorrhagias, vel repentem eorum suppressionem, vigente oedemate pedum, vel alio hydrope praesertim cavitatis pectoris, post dysenterias, diarrhoeas diuturnas, Coqueluche⁵⁾, phthisin pulmonalem⁶⁾ etc. Somnolentia, oblitio rerum, imbecillitas sensuum motuumque, cephalaea et vomitus, hostem adventantem annunciant, ac respiratio inaequalis, lenta et suspiriosa, nec non convulsionones, anaesthesiae et paralyses de illius testantur praesentia.

4. Causae encephalitidis secundariae et de Causae. hydrocephalo subsequente rationem reddunt. Qui chronice evolvitur, dispositioni universali ad hydropes, constitutioni potissimum scrophulosae, morbisque praeviis encephali⁷⁾ originem debet.

5. Ut doctrina, cujus rudimenta hic exponimus, Necroscopia.

5) Mills l. c. („Bey scrophulösen zu dem Hydrocephalus Anlage habenden Individuen wird das Blut durch den Husten im Kopfe ungehäuft, es entsteht eine Congestion in den Hirngefäßen und Anschwellungen“).

6) P. III. Vol. II, sect. I. cap. X. §. LII. 7.

7) E. c. tumoris in cerebro. v. ZETTERSTRÖM in Svenska Läkare - Sällskapets Handlingar. 2. B. 2. 3. H. Stockholm 1815.

mus, perficiatur, post singulos morbos, qui gravi capitis eaque lethali affectione stipati fuere, cranii sectio instituenda est.

Diagnosis. 6. Absit interea, ut omne extravasatum, saepe mortis magis quam morbi productum, definitionis generalis⁸⁾ immemores, pro *hydrocephalo accessorio* declaremus.

Prognosis et therapia. 7. Hydrocephalus accessorius acute evolutus, nisi per rectam encephalitiidis secundariae curam anteverti possit, prognosin adhuc pejorem, quam ille, qui chronice ingruit, et cui interdum *diuretica*, *purgantia*, simul cum *tonicis* et *ulceribus artificialibus* ad caput medentur, agnoscit.

CAPUT V.

D e a p o p l e x i a .

§. XXIV.

Definitio. Scriptores.

Definitio. 1. **R**epentina sensuum, facultatum animi motuumque voluntariorum imminutio, interruptio, abolitio, vigentibus plerumque respiratione et cordis actione, *apoplexia*¹⁾ dicitur.

2. Do-

8) §. XIX. 1.

1) Ab ἀποπληξω, percussio. *Aphonia Hippocratis*, qui sub nomine apoplexiae saepe paralysin designaverat (vide aphor. 40. sect. VII. CHARTER. T. IX. p. 312.

2. Doctrina apoplexiæ jam HIPPOCRATI ²⁾, Scripto-
CELSE ³⁾, CAELIO AURELIANO ⁴⁾, ARETAE ⁵⁾, ^{res.}
GALENO ⁶⁾, AETIO ⁷⁾, AEGINETAE ⁸⁾ nota, ma-
gis magisque inclaruit operâ DODONAEI ⁹⁾, PISO-
NIS ¹⁰⁾, WEFFERI ¹¹⁾, SENNERTI ¹²⁾, PREHLINI ¹³⁾,
BAYLEI ¹⁴⁾, BONETI ¹⁵⁾, MITSCHELII ¹⁶⁾, BAGLI-
VII ¹⁷⁾,

Prothetico. lib. H. cap. X. CHARTER. T. VIII. p.
819. Coacar, praenotion. No. 359. ibid. p. 872. et No.
477. ibid. p. 879). *Nervorum resolutio* Celsi. Quem
enim iste auctor ut speciem apoplexiæ descripserat
(Medicin. lib. III. c. XXVI) *morbum attonitum*, hunc
ad catalepsi revoco. *Morbis attonitus* LOMMIS (obs.
med. lib. II. p. 81). *Sideratio, percussio* MOLINA-
RII (de apoplexia, sect. I. §. I). GERM. *Schlagfluss*.
GALL. *Apoplexia*. ANGEL. *Apoplexy*. ITAL. *Acci-
dente, colpo, gocciola*. POLON. *Apoplexya*. ROSS.
Πομπήλαβ.

- 2) l. citandis. 3) l. citandis.
- 4) Acut. morb. lib. III. cap. V.
- 5) De causis et signis morbor. diuturnorum. lib. I.
cap. VII.
- 6) Definit. medicin. No. 244. CHART. T. II. p. 261. De
locis affect. cap. X.
- 7) Tetrab. II. serm. 2. c. 27. 8) Lib. III. cap. XVIII.
- 9) Prax. med. Amstel. 1516. lib. II. cap. XV.
- 10) De morbis e colluvie serosa. sect. II. Part. II. cap. 5.
- 11) Observat. anatom. ex cadaveribus eorum, quos apo-
plexia sustulit. Scapulus. 1658.
- 12) Diss. de apoplexia. Wittemb. 1611. 1654.
- 13) Diss. de apoplexia. Lugd. Bat. 1667. v. HALLERI
disp. med. T. I. No. 1.
- 14) Tractatus de apoplexia. Tolos. 1677.
- 15) Sepulchr. anat. lib. I. sect. 2.

VII¹⁷⁾, LANCISII¹⁸⁾, FRACASSATI¹⁹⁾, DE LA MOTTEI²⁰⁾, VALLISNERII²¹⁾, FR. HOFFMANNI²²⁾, WEITERECHTII²³⁾, CARDANI²⁴⁾, SWIETENII²⁵⁾, HEISTERI²⁶⁾, BÜCHNERI²⁷⁾, MORGAGNII²⁸⁾, LIEUTAUDII²⁹⁾, MARQUETI³⁰⁾, PONSARTI³¹⁾, WALTERI³²⁾, QUARINI³³⁾, STOLLII³⁴⁾, TISSOTI³⁵⁾,

BUR-

16) *Trattato dell' apoplessia*, Roma 1709.

17) *Prax. medic.* cap. IX.

18) *De subitaneis mortibus*. Opp. Genev. 1718.

19) *Historia apoplecticorum*. Amstel. 1724.

20) *Traité complet de chirurgie*, T. I.

21) *Dell' uso ed abuso delle bevande, e bagnature calde e fredde*. Moden. 1725.

22) *Med. rat. syst.* Pars II. cap. VII. De haemorrhagia cerebri. Pars IV. cap. I. De nervorum resolutionibus. — *Diss. de apoplexia*. Hal. 1728.

23) *Commerc. liter.* a 1734. Hebd. 9. No. 2.

24) De apoplexia, v. HALLER biblioth. med. P. II. p. 24.

25) *Comment.* T. III. §. 1007 sq.

26) De apoplexia mag. chirurg. quam medicamentis curanda. Helmst. 1752.

27) *Diss. de causis quibusdam specialibus apoplexiæ, observationibus anatomicis rarioribus confirmatis*. Hal. 1764.

28) De sed. et caus. morb. epist. II. III. IV et V.

29) *Précis de médecine*, L. I. Des maladies de la tête. p. 181. — *Historia anatomica med.* T. II. lib. 3.

30) *Traité de l'apoplexie*. Paris 1770.

31) *Traité de l'apoplexie et de ses différentes espèces*. Paris 1782.

32) De morb. peritonæi et apoplexia. *Mémoires de l'ac. R. de Berlin*. 1782. p. 76.

33) *Animadversiones pract.* in divers. morb.

BURSERII³⁶⁾, ZULIANI³⁷⁾, KIRKLANDI³⁸⁾, GAYI³⁹⁾,
FODEREI⁴⁰⁾, G. BLANII⁴¹⁾, MONTAINI⁴²⁾, POR-
TALII⁴³⁾, E. HOMII⁴⁴⁾, RICHELMEI⁴⁵⁾, CHEY-
NII⁴⁶⁾, ROCHOUXI⁴⁷⁾, RIOBEI⁴⁸⁾, ABERCROMBII⁴⁹⁾
aliorumque⁵⁰⁾.

34) Praelectiones. p. 346.

35) Epist. de variolis, apoplexia etc. op. T. VI.

36) Institut. med. pract. Vol. III. cap. 4.

37) De apoplexia praesertim nerves commentarius. Brixiae
1789.

38) *Commentary on apoplectic and paralytic affections.*
Lond. 1792.

39) *Vues sur le caractère et le traitement de l'apoplexie.*
Paris 1807.

40) De apoplexia disquisitio theoretico-pract. Aven.
1808.

41) *Transactions of a society for the improvement of me-
dical and surgical knowledge. Vol. II. p. 192. v. Samml.
auserl. Abhandl. für pr. Aerzte. 20. B. p. 572.*

42) *Traité de l'apoplexie.* Paris 1811.

43) In *Mémoires de l'académie R. des sciences, Paris 1774.*
*Observations sur la nature et le traitement de l'apo-
plexie et sur les moyens de la prévenir. Paris 1811.*
Et: *Mémoire sur la nature et le traitement de plu-
sieurs maladies. Vol. 2. p. 246.*

44) L. c. cap. I.

45) *Essay sur l'apoplexie.* Paris 1812.

46) *Cases of apoplexy and lethargy with observations
upon the comatose diseases.* Lond. 1812.

47) *Recherches sur l'apoplexie.* Paris.

48) *Observations propres à résoudre cette question: l'apo-
plexie, dans la quelle il se fait un épanchement dans
le cerveau, est-elle susceptible de guérison.* Paris 1814.

49) Op.

49) Op. c. cap. 4.

- 50) J. PECHRY *treatise on apoplexia and convulsions*. Lond. 1708. D. MISTICHELLI *trattato dell' apoplessia*. Roma 1709. MOLINARIUS *specimen apoplexiae*. Vienn. 1753. J. B. CAMPIANI *ragionamenti sopra dell' apoplessia*. Genova 1759. *Abhandlung über die Kenntniss und Heilung der Schlagflüsse*. Langensalza 1775. B. CHANDLER *an inquiry into the various theories and methods of cure in apoplexies and palsies*. Canterbury 1785. Versiones duae germanicae exstant, altera cum notis Stendal 1787, altera Lipsiae 1787. C. CHR. BATHKE *über Schlagflüsse und Lähmungen*. Leips. 1797. J. L. OTTENSEN *von der Erkenntniss und Heilung des Schlagflusses und der Lähmung*. Berl. 1805. K. FR. BURDACH *die Lehre vom Schlagflusse*. Leipz. 1806. MOULIN *traité de l'apoplexie, ou hé-morrhagie cérébrale etc*. Paris 1820. MIQUEL *Untersuchungen über den Schlagfluss* (PIERRE's *allgemeine medic. Annalen* 1823. März. p. 290). M. J. G. VITRY *essai sur l'apoplexie*. Paris 1823. J. E. GRANIER DE ST. PONT *traité sur l'apoplexie*. Paris 1826. *Accedunt dissertationes inaugurales*: HAMBERGER diss. de morbo attonito. Tubing. 1580. METZSONERIUS (MODER?) diss. de apoplexia. Basil. 1582. SCHENK diss. de apoplexia. Jen. 1582. GITLER diss. de apoplexia. Lips. 1584. BOCKEL diss. de apoplexia. Helmst. 1586. MINDER diss. de sideratione seu apoplexia. Basil. 1586. JOEL diss. de apoplexia. Basil. 1589. HORST diss. de apoplexia. Helmst. 1592. HASENBAND (MULDENER?) diss. de apoplexia. Basil. 1593. MOEOLIN diss. de apoplexia, seu morbo attonito. Tub. 1594. J. PH. LONNERUS *ἑστιαὶς ἱατρικῇ μεθοδικῇ apoplexiae*. Lips. 1596. BRUNNER diss. de apoplexia. Basil. 1599. PANCOVIVS diss. de apoplexia. Helmst. 1600. MOELLER diss. de apoplexia. Fr. ad Viadr. 1602. ESTHIUS diss. de apoplexia.

plexia. Heidelberg. 1604. PLATER diss. de apoplexia. Basil. 1604. LIDDEL diss. de apoplexia. Helmst. 1605. STUFANUS de morbo subitaneo, quem apoplexiam vocant. Basil. 1606. HILTEBRAND diss. de apoplexia. Basil. 1607. LUCHTENIUS diss. de apoplexia. Helmst. 1607. OLTERMANN diss. de apoplexia. Rost. 1607. AN EGO diss. de apoplexiæ diagnosi et therapia. Basil. 1609. VARUS diss. περί ἀποπληξίας. Jen. 1610. GEMFF diss. de apoplexia. Basil. 1611. LUCIUS diss. de apoplexia. Lips. 1611. SENNERTUS diss. de apoplexia. Witteb. 1611. 1654. BACHMEISTER diss. de apoplexia. 1612. 1641. CONNADI diss. de apoplexia. Basil. 1613. GRYN diss. de apoplexia. Basil. 1614. BRENDLIUS diss. de apoplexia. Jen. 1614. AENISÆUS diss. de apoplexia cognoscenda et curanda. Helmst. 1614. GRUBENIUS diss. de apoplexia. Basil. 1615. GRAMANNUS diss. de apoplexia. Marp. 1616. OPSOFOREUS diss. de apoplexia. Heidelberg. 1616. SCHALLER diss. de apoplexia. Viteb. 1618. ZEUTSCHNER diss. de apoplexia. Basil. 1618. SCHILLING diss. de apoplexiæ essentia. Lips. 1620. NYMANN diss. de apoplexia. Witteb. 1629. OMONIUS diss. de apoplexia. Fr. ad Viadr. 1629. NOESLER diss. de apoplexia. Altd. 1630. WOLFF diss. de apoplexia. Helmst. 1630. ZEIDLER diss. de apoplexia. Lips. 1630. OFFERMANS (VONSTIUS?) diss. de apoplexia. Lugd. Bat. 1632. PAULI diss. de apoplexia. Rostoch. 1635. LOTICH diss. de apoplexia. Rintel. 1635. SCHARLACHIUS diss. de apoplexia. Fr. ad Viadr. 1635. SEY. HOFFMANN disquisitio de apoplexia. Basil. 1636. KIRSCHENUS diss. de apoplexia. Altd. 1636. KIRSCHNEIM diss. de apoplexia. Argent. 1636. SCHLAKMOVIUS diss. de apoplexia. Marp. 1638. CONNINGIUS diss. de apoplexiæ natura. Helmst. 1640. STOCKMANN diss. de apoplexia. Rost. 1641. MASIUS diss. de apoplexia. Regiom. 1642. HOFER (HOSERUS?) diss. de apoplexia. Frank PRAX. II. I. 1. Y apople-

apoplexia. Basil. 1644. HELD diss. de apoplexia. Tub. 1647. SCHULTATUS diss. de apoplexia. Rostoch. 1650. RAM diss. de apoplexia. Argent. 1651. PALLAMENT diss. de apoplexia. Leid. 1654. HOLSTEIN apoplexias histor. Leid. 1657. MARCHIUS diss. de apoplexia. Rostoch. 1658. VENTASCHA exercitatio de apoplexia et paralyti. Bas. 1658. TINCTORIUS diss. de apoplexia. Regiom. 1659. MICHAELIS diss. de apoplexia. Lips. 1660. HUGO diss. de apoplexia. Leid. 1661. ROLFINCIUS diss. de apoplexia. Jen. 1661. WESTERFELD diss. de apoplexia. Leid. 1661. SCHNEIDER diss. de apoplexia. Witteb. 1662. PADRUVOON diss. de apoplexia. Leid. 1663. TAPPIUS diss. de apoplexia. Helmsl. 1663. ROUFF diss. de apoplexia. Argentor. 1664. STRASSBURG diss. casus apoplexiæ laborantis ejusque curatio. Regiom. 1665. PECHLIN diss. de apoplexia. Lugd. Bat. 1667. V. HALLER disp. med. Vol. I. No. 1. FARNICIUS diss. de apoplexia. Giess. 1668. FRIDERICI diss. de apoplexia. Jen. 1668. FORBENOER theses de apoplexia. Prag. 1672. JOHANNIUS diss. de apoplexia. Giess. 1672. MARTINI diss. casus apoplexia terminatus. Basil. 1672. URSINUS diss. de apoplexia. Francf. 1672. DONNER diss. de apoplexia. Argent. 1673. DRSLINCOURT diss. de apoplexia. Lund. 1673. PARENT (SPENGLER?) diss. de apoplexia. Lugd. Bat. 1675. FRANCUS DE FRANKENAU diss. de apoplexia. Heidelb. 1676. CRAAEN diss. de apoplexia. Lugd. Bat. 1677. CHUNO diss. de apoplexia. Marb. 1677. NYANHOV diss. de apoplexia. Ultraj. 1677. PNEUSMANN diss. de apoplexia. Lugd. Bat. 1677. VAN BREST diss. de apoplexia. Ultraj. 1679. DOW diss. de apoplexia. Leid. 1682. SALA diss. de apoplexia. Oenipont. 1682. TILINO diss. de apoplexia. Rintel. 1682. SAND diss. de apoplexia. Regiom. 1683. SAILER theses de apoplexia. Francf. 1684. LAYNOR diss. de apoplexia. Leid. 1685.

VAN

VAN DER SYCK diss. de apoplexia. Ultraj. 1685.
 HELWIGIUS diss. de apoplexia. Gryphaw. 1686. BRON-
 CHORST diss. de apoplexia. Leid. 1687. CRAUSIUS
 diss. de apoplexia. Jen. 1689. ALBINUS diss. de apo-
 plexia. Fr. ad Viadr. 1690. ДУЖИЯ diss. de apoplexia.
 Leid. 1690. ЛЕЩИНА diss. de apoplexia. Erf. 1690.
 DUCLAUX diss. de apoplexia. Leid. 1693. ВЮОСН
 diss. de apoplexia. Lugd. Bat. 1694. CARMICHAEL
 diss. de apoplexia. Leid. 1694. HELWIG diss. de apo-
 plexia. Altd. 1695. RAUS diss. de apoplexia. Lugd.
 Bat. 1698. VLEET diss. de apoplexia. Erf. 1698. CUF-
 FEN diss. de apoplexia. Leid. 1699. ЕМАТОИ diss. de
 apoplexia. Leid. 1699. HUGONIUS diss. de apoplexia.
 Basil. 1704. RINNIUS diss. de apoplexia. Harderov.
 1706. WINKEL diss. de apoplexia. 1707. WINTNER
 diss. de apoplexia. Rintel. 1707. RIVINUS diss. de
 apoplexia in collect. Lipsianai. 1710. LEITERSPERGER
 diss. de morbo apopleitico. Argent. 1712. DANZ diss. de
 apoplexia. Harderov. 1713. BERGER diss. de apoplexia.
 Witamb. 1717. CAMERARIUS diss. de apoplexia cum
 febre. Tub. 1717. WUCHNER diss. de apoplexia. Erf.
 1718. HUYER (SCHAAF?) diss. de apoplexia. Lugd. Bat.
 1721. LUDOLPH diss. de apoplexia. Erf. 1722. VAN
 BORONUM diss. de apoplexia. Lugd. Bat. 1723. MEI-
 NEMUS diss. de apoplexia ejusque generosioribus re-
 mediis. Helmat. 1723. FERRON diss. de apoplexia. Lugd.
 Bat. 1726. FR. HOFFMANN diss. de apoplexia. Hal.
 1728. opp. suppl. II. 2. ТРИШМЕТЕН diss. de apo-
 plexia. Jen. 1728. GORLICK diss. de apoplexia. Fr.
 ad Viadr. 1729. J. STAHL diss. de apoplexia. Erf.
 1729. BONELLUS diss. de apoplexia. Marb. 1730.
 GROEN diss. de apoplexia. Lugd. Bat. 1730. GOTTS-
 CHEN diss. de apoplexia. Regiom. 1730. LUTHER
 diss. de apoplexia. Erf. 1732. HILSCHER diss. de apo-
 plexia. Jen. 1739. СОВЕРЕННИЙ diss. casus insultus

apoplectici levioris feliciter curati. Hal. 1742. BONGAERTA diss. de apoplexia. Lugd. Bat. 1743. EDWARDI diss. de apoplexia. Harderov. 1745. HAEN diss. de apoplexia. Leid. 1745. SCHREITER diss. de apoplexia. Marb. 1748. JUCH diss. aegrotus apoplexia correptus et sanatus. Erf. 1749. STOCKIUS diss. de apoplexia. Lugd. Bat. 1751. HOMER diss. de apoplexia. Lugd. Bat. 1753. HAMBERGER diss. de apoplexia. Jen. 1754. KANNKIESER diss. de apoplexia. Kilon. 1756. MENN diss. de apoplexia. 1763. ANTONOPULI diss. de apoplexia. Lugd. Bat. 1764. BÜCHNER diss. de causis quibusdam specialibus apoplexiae observationibus anatomicis rarioribus confirmatis. Hal. 1764. MONETA diss. de apoplexia. Regiomont. 1764. NICOLAI diss. de quibusdam ad apoplexiam spectantibus. Jen. 1771. Ejusdem diss. de apoplexia. ibid. 1781. NIEMANN diss. de apoplexiae pathologia et therapia. Hal. 1772. STEVANT diss. de apoplexia. Edinb. 1777. LAMO diss. de apoplexia. Friburg. 1781. OMER diss. de apoplexia. Hafn. 1781. CLARK (FRANKLYN?) diss. de apoplexia sanguinea et serosa. Edinb. 1785. HERMUS diss. de apoplexia in genere 1786. GIESLER diss. de apoplexia. Viennae 1788. LYCHTENVELT diss. de apoplexia in genere. Lugd. Bat. 1789. NÜRNBERGER programmata de apoplexia, causarum morbificarum criteria illustrante et confirmante. Wittenb. 1790. Ejusdem De vulgari aetiology apoplexiae valde ambigua et fallaci. Wittenb. 1794. ALEXANDER diss. de apoplexia. Lugd. Bat. 1791. ANDREWS *dissertation on the apoplexy*. Philadelphia. 1793. INGENHOUZ diss. de apoplexia ejusque variis speciebus. Leid. 1793. ALSTERS diss. de apoplexia. Duisb. 1794. SCARLETT diss. de apoplexia. Edinb. 1795. ROCHER diss. de apoplexia. Duisb. 1797. HECKER diss. Brownii sententiae de apoplexia examen. Erford. 1800. LACHEL diss. de apoplexia. Francf. 1800.

§. XXV.

Symptomata. Necroscopiae.

1. Apoplexia variis signis (*molimina apoplectica*), in dispositis hunc ad morbum ¹⁾ haud ambiguis, respectu prophylaxeos admodum memorabilibus ²⁾, HIPPOCRATI ³⁾ minime ignotis, annuciari solet. Huc spectant somnus solito major horis inconsuetis, cum respiratione profunda, stertore, stridore dentium, incubo, concussionibus; vigiliae; venae capitis, praecipue frontis, turgidae; nisus ad epistaxin ⁴⁾, rubor, livor faciei, a statu sano alienae, pinnis narium collapsis ⁵⁾;
memo-

BRAMMER diss. de apoplexia. Edinb. 1803. KÜHN diss. de apoplexia. Lips. 1803. STALIUS diss. de apoplexia. Gent. 1823. CORNEN diss. de causis, sede et natura apoplexiae. Lugd. Bat. 1828. H. P. HAARWOOD diss. de pathologia apoplexiae. Edinb. 1828. H. SCOUTETAN thesis de apoplexia. Argent. 1829.

- 1) §. XXVI. No. 1. 2) BURSERIUS l. c. §. 98.
- 3) Aphor. 31. sect. III. CHARTER. T. IX. p. 128.
- 4) Homines aetate proveci, nisi epistaxin vitii scorbutici aut morbi cordis culpa patiantur, certissime per illam proclivitatem ad apoplexiam patefaciunt, quod PORTALIUM minime latuit. Vid. *Samml. auserl. Abhandl.* 20. B. p. 82.
- 5) SWIETEN l. c. §. 1020. Physiognomia apoplexiam praesagiens conditioni musculorum faciei, paralysi affini, debetur. Ex hac physiognomia SWIETEN quondam apoplexiam imminentem in homine, ut videbatur, sano, jure praedixit.

memoriae imminutio ⁶⁾, animi irritabilitas aut serenitas inconsueta ⁷⁾; valetudo optima post longam adversam ⁸⁾; dispositio ad fletum ⁹⁾; albuginea sanguine suffusa, maculae muscarum instar, aut scintillae, aut splendor subinde noctu ante oculos ¹⁰⁾; aberratio a linea inter legendum, visus duplex ¹¹⁾, acutior solito ¹²⁾, amaurosis ¹³⁾, aurium tinnitus, susurrus, bombus, auditus gravis, perceptio foetoris ¹⁴⁾, vel etiam odoris suavis ¹⁵⁾; sic-
citas

6) THOMAZ observ. p. 81. et consilior. p. 224. SWIZZAN L. c. §. 1010.

7) Saepe consanguineos eorum, qui ab apoplexia fulminati sunt, exclamare audivi: „et tam bene se habebat! — nunquam serenior, nunquam lepidior erat hodierna die.“

8) MORGAONI L. c. epist. III. art. 17.

9) Senem aliàs crudelem novi, qui parum ante apoplexiae insultum, minima porrecta occasione, crocodili lacrymas fundebat.

10) LANCISI L. c. p. 69.

11) Ex hoc symptomate apoplexiam, brevi post subsecutam, praedixit quondam collega A. SNIADHECKI in parocho quodam.

12) Sine conspiciilli auxilio, brevi ante apoplexiae levioris accessum, legere potuerat vir nobilis Vilmensis, cui a decem jam annis absque optico illo adminiculo literas discernere non licuerat.

13) MORGAONI L. c. epist. III. art. 8. ex RAMAZZINIO. In magistro aeternum venerando, SCOPOLI, subitanea amaurosis subsequentem apoplexiam annunciabat.

14) Cap. II. §. X (34).

15) Dr. SABBIA medicus *Varose* praxin cum laude exer-

citās narium, sternutatio effrenis¹⁵⁾, saltus labiorum¹⁷⁾, oscitationes crebrae¹⁸⁾, singultus¹⁹⁾, lingua balbutiens, responsa implicita, verbum unum pro altero prolatum, deglutiendi difficultas, aut sub deglutione tussis; salivatio²⁰⁾, nausea, vomitus²¹⁾; animi deliquia, manus minus prompta scribendo, torpor, fornicatio²²⁾, cram-
pus digitorum, anaesthesia cutis²³⁾; motus ab-

normes

cens, mihi die 17. Octobris 1827. retulit, se ad virum, adspectu sanum vocatum fuisse, qui illi dixerat: „nescio quid hodie mecum agitur; undique odores suavissimos percipio, ac inconsueta fruer beatitudine.“ Quum hic vir alioquin habitum apoplecticum exhiberit, laudatus medicus, imminentem apoplexiae insultum suspicatus est, ac ideo venaesectionem instituit. *Sub ipsa hac operatione* morbus una cum hemiplegia prorupit.

15) Ut causa saepe habita. Vide infra §. XXVI. No. 2.

17) CARL. AURELIANI de acut. morb. lib. III. c. 5.

18) Oscitationes, post grave animi pathema quavis nocte redeuntes, apoplexiam cum hemiplegia, in vidua quadragenaria Vilnensi praecedebant, eamque continuo dein comitabantur. A tam terribili morbo omnino liberata, ab oscitationibus nocturnis quoque immunis evasit. Pluries idem symptoma apud recens natos apoplexiam annunciasse vidi.

19) Ipsa, de qua vix locutus sum, vidua praeter oscitationes et frequentem experiebat singultum.

20) MOROAGNI I. c. epist. II. art. 19.

21) RHOA de sympathia. p. 92.

22) WEFER observ. med. pract. de affectib. capitis. Obs. 78. obs. 136. FORESTUS obs. lib. X. c. 71.

23) Legatur memorabilis morbi historia in secund. edit.

normes extremitatum ²⁴⁾, convulsiones ²⁵⁾; pruritus totius corporis ²⁶⁾, speciatim verticis ²⁷⁾, coloris cutis mutatio ²⁸⁾, dolores articularum, brachii ²⁹⁾, cita defatigatio, incessus vacillans, ac si pedes rependo traherentur et difficultates urinae ³⁰⁾, saepe sedimentosae ³¹⁾.

2. Prac-

Part. I. Vol. III. sect. II. cap. XXIV. §. LXXXII.
No. 5. allata.

- 24) Infantem octo mensium, judaeum, spatio nycthemeri ab apoplexia e medico ablatum vidi, qui, praeter excepta, optima gaudere videbatur sanitate, praeterquam quod saepe *modum peculiarem rotatorium* cum brachio dextro perficiebat, a parentibus pro effectu pruriginis ab impetigine, a me pro indicio latentis gravioris morbi, habitum. Judaens sexaginta annorum inter molimina varia apoplectica, ut vertigine, lingua balbutiente etc., *subsultus pollicis* et *digiti indicis*, qui admodum elebantur, exhibuit. Prius nicotiana illi aponte e digitis cadebat. Secuta est letalis hemiplegia lateris dextri.
- 25) STOLL rat. med. T. IV. p. 101. BANG diarium nosoc. Hafn. T. II. p. 21.
- 26) Pruritus senilem saltem apoplexiam praecessisse observavi.
- 27) UNZER *der Arzt*. B. 6. p. 285.
- 28) Manus candidas viri nobilis, paucos ante apoplexiae insultum dies, risticorum instar, brancas redditas, vidi.
- 29) Eph. nat. cur. dec. III. an. III. obs. 157.
- 30) Nimis eas extollit BRAUNER in HORN's *Archiv für med. Erfahrung*. 1823. Jan. Febr. p. 128.
- 31) MONTANUS in nonnum librum RHASIS ad MANSOR. c. 4.

2. Praeviis istis prodromis, vel etiam extem-
 plo, apoplexia, pro vario gradu ³²⁾ variaque sede, S. consti-
 diversis aggreditur symptomatibus. Nunc enim tutiva.
 homo derepente cum spuma circa os, facie livida,
 faecum urinarumque depositione mortuus proster-
 nitur, aut saltem praegressis rhonchis nonnullis,
 respiratione et pulsu interceptis, facie cadaverica,
 sudore frigido, extremitatibus lividis, resolutis,
 gelidis, post pauca momenta vitam cum morte
 commutat (*apoplexia fulminans*); — nunc aegro-
 tans profundo sopore detentus, oculis clausis, aper-
 tis, defixis, ore alterutram in partem retracto,
 cum respiratione tarda, profunda, sonora, pulsu
 lento, pleno, duro, aliquando irregulari, para-
 plegia, hemiplegia, saepissime paralysi vesicae
 urinae, pro re nata ischuriam, enuresin, vel
 eorum complicationem generante, brachiis parti-
 bus genitalibus vel thoraci arcte admotis decumbit
 (*apoplexia exquisita*); — nunc aeger prius verti-
 gine caduca, lipothymia, vigiliis, lethargo ³³⁾,
 sensu

32) A GALENO (comment. in conc. praenot. text. 476)
 usque ad nos, *varii apoplexiae gradus* stabiliti sunt.
 Quod non sine controversiis accidisse ex MORGAGNIO
 (l. c. epist. II. 13. 14) et BURKHIO (l. c. §. 97) elu-
 cet. Evitari tamen illae potuissent, si magis *loci*
affecti ratio habita fuisset. Ab isto enim potius quam
 a gradu varium morbi aspectum derivandum esse,
 existimo.

33) Praefectus militum Polonus, a novitatibus politicis,
 quas bono patriae adversas crediderat, mense Aprili

sensu flammae coram oculis, saepe cum nausea et vomitu prehenditur ac dein, illaesis fere functionibus universi corporis, aut uno tantum sensu, aut facultate quadam animi, aut instrumento aliquo motus orbatur (*apoplexia imperfecta, par-apoplexia* ³⁴⁾). — Frequentissime inde laedi solent visus et auditus ³⁵⁾, memoria, tum rerum ³⁶⁾,
tum

1813. adeo perculsus fuit, ut in *lethargum septem nycthemerorum* incideret, a quo expergefactus, plane imbecillis evasit. Vultu sereno ac lepidi, depluente saliva ex ore, pauca eaque incongrua verba proferebat, esse continuo, ac si aliquid amissum quaereret, circumagendo. Solam a conspectu rerum militarium animus quodammodo colligebatur.

34) Huc revocamus et transitoriam aequae ac imperfectam apoplexiam, quae a Gallis *coup de sang* nuncupatur, quamque Rochoux immerito ex genere apoplexiae plane expellit l. c.

35) Patet inde amaurosin et surditatem, improvise contingentes, ut lubet, vel pro moliminibus apoplecticis, vel pro apoplexia imperfecta, haberi posse. Observante E. Homæ apoplexia aliquando facultatem objecta propinqua videndi delet, concesso visu ad distantiam decem pedum (*The journal of science and the arts. London 1816*).

36) In mercatore judaeo Vilmensi Simson, quinquaginta et ultra annos nato, mense Novembri 1815, per lapsum ab apoplexia correpto, memoriae imbecillitatem relictam observavi, quae non verba, ab aegro cum eloquentia adeo electa, sed ideas, quarum filum sub ipso sermonis curriculo solebat amittere, respiciebat. Uxor mercatoris Vilmensis Florentini post apoplexiam

tum verborum ³⁷⁾ (quorum aegri saepe unum alteri, aliquando ex idiomate minus noto ³⁸⁾, substituant ³⁹⁾, aut ex interrogatione veluti echo desumunt ⁴⁰⁾),

illico *praecognitionum* oblita est, ceterum autem bona fruebatur memoria.

- 37) Collega quondam, *Briotet*, senex, praevia cephalalgia et sensu ac ei derepente a flamma circumdaretur, memoriam verborum illico ita amisit, ut ceterum mentis sat compos nec proprii quidem nominis recordaretur. Pancis iisque incongruis verbis in infinitivo, c. c. *occasionner, faire*, singulas designare solebat res. Aeger de quo (*Nouvelle Bibliothèque médicale. Avril 1828*) narratur, omnia verba vocabulis *sonnez* at *six-cinq* denotabat. Apoplecticam in nosocomio Vindobonensi curavi, quae mente omnino compos, quaestionibus semper *Joseph* respondebat, ac aliud verbum pronunciare haud poterat. Simile exemplum apud *BAILLIE* lego (*Medical transact. published by the college of physicians in London. Vol. IV. 1813. No. 2*). In *Revue médicale. Avril 1825*, et *FRORIER Notizen aus dem Gebiete der Natur- und Heilk. B. 10. No. 22*. legitur de viro quinquaginta quatuor annorum, qui scribebat „*je ne souffre pas de la tête*,“ et dicebat autem „*les douleurs ordonnent un avantage*.“ Scribebat quoque „*tambour*,“ et legebat „*fromage*.“ *

- 38) Idem *Briotet* primis morbi mensibus linguam suam gallicam cum idiomate polonico, vix illi noto, commutavit.

- 39) Ornatissima femina Vilnae degens, *Sokulka*, praevius capitis summo dolore ac apoplexia, perstantibus omnibus animi facultatibus, invite sibi ipsi irridens incongruis saepe utebatur verbis. Sic amicae gra-

munt ⁴⁰⁾), nec non vox et deglutitio ⁴¹⁾). Qualiscunque fuerit vis apoplexiae, *convalescens* imbecillitatem functionum mentalium, cum proclivitate ad fletum et aliquando cum inconsueta et effrena propensione ad interrogationes ⁴²⁾ retinere solet.

3. Ca-

tias agendo edixit: *jaka durna*, (quam stupida), loco *jaka dobra* (quam bona)! Alia occasione loco *bonjour*, obscenum germanicum verbum *H..f..t*, erubescens, prodidit. Ceterum germanico sermone horis matutinis, gallico vespertinis et polonico indiscriminatum usa est. Literam *S* ut *T* pronunciavit: e. c. *la toupe* loco *la soupe*. Omnia scribere potuit, excepto famulae addictissimae nomine, cuius plane recordari nequivit.

40) In monacho Vilnensi, imperfecta apoplexia mulcato, sequentem respondendi modum observavi: e. c. quomodo valet? Valeo. Quid tibi dolet? dolet etc.

41) Nobilissima femina Gubernii *Minsk*, a. 1812. ab aspectu domus suae combustae, humum inconscia ceciderat. Paulo post surgens, nil nisi quandam difficultatem in verbis articulandis et in deglutitione absolvenda experta est. Sequenti anno, novo occidente animi pathemate, completa accessit dysphagia. Paucae jam aquae guttae ad fauces perductae, suffocationis periculum minabantur. Hoc excepto aegra, instar sanae, vestita et ornata desambulebat. Evacuationibus sanguinis et alvi, calomel, vesicatoriis, antispasmodicis etc. tractata, post triduum obiit. Cadaveris sectionem affines nullo pacto permiserunt. Cfr. *Ephemer. nat. cur.* dec. I. an. VI. VII. obs. 40. et dec. III. an. VII. VIII. append. p. 129. *Bulletin de la faculté de méd.* in *Journ. de méd. chir. et pharm.* T. 32. 1815. *Février* p. 260. et *Honn* l. c. p. 267.

3. Cadavera hominum apoplexia peremptorum exhibere solent: *sanguinem* et *serum* aliquando per viginti quatuor et longius horas *e naribus manantia* ⁴²⁾, *sugillationes* in cellulosa subcutanea capitis ⁴³⁾, — *cranium angustum* ⁴⁴⁾, suturis orbatum ⁴⁵⁾, exostosi ⁴⁶⁾, carie ⁴⁷⁾, vel ad ipsos sinus frontales ⁴⁸⁾, detentum, — humorem purulentum sub

Necroscopiac.

42) Comitissa W. . . . nobilis alumna coenobii equestris Vindobonensis, apoplexia perpassa ab interrogandi propensione ita excruciabatur, ut nocturno etsi tempore famulam ad comitissam Dietrichstein, coenobii praefectum, miserit, rogatu respondendi quaestioni: quisno fuerit institutor (Aja) Imperatoris Josephi II. ? — Abbas Bondi, poeta aulae Archiducis Beatricis addictus, sub curriculo paralyseos perpassae apoplexiae effectus, omnes, ipsa Principe non excepta, quaestionibus defatigabar, quod ante morbum nunquam contigerat.

43) FR. HOFFMANN op. c. P. II. sect. I. c. VII. obs. I.

44) Atque ita non solum in apoplexia traumatica, sed et in aliis apoplexiis ex causis internis, praecipue, ut plurima vidi, ad locum, cui vesicatorium admotum erat, accidit. Legatur de hoc argumento, in medicina forensi magni momenti, PLOUCQUET commentatio med. in processu criminali super homicidio, infanticidio et embryoctonia. p. 22.

45) STOLL rat. med. P. VII. p. 175.

46) AREND diss. de cephalalgia. Lugd. Bat. 1675.

47) Ephem. nat. euy. dec. III. ann. IX. X. obs. 253.

HUFELAND's Journ. der pr. Heilk. 18. B. 1. St. p. 116.

48) Act. nat. cur. Vol. VIII. obs. 33. LEVEQUE LASOUCHE in Journ. de méd. continué. 1810. Juin. p. 419.

49) RICHTER obs. chirurg. lib. I.

sub cranio ⁵⁰⁾, cruentum inter os occipitis et duram matrem ⁵¹⁾ effusum, — dilatationem vasorum sanguiferorum *durae matris* ⁵²⁾, illius callositatem ⁵³⁾, cum cranio adhaesionem morbosam ⁵⁴⁾, concrementa ossea in ea ⁵⁵⁾, in falce magna ⁵⁶⁾, — *piae matris*, venas sanguine coccineo refertas ⁵⁷⁾, tumorem ⁵⁸⁾, inflammationem ⁵⁹⁾, crassitiam ⁶⁰⁾, —
sangu-

50) WEPFER l. c. p. 438.

51) BANG in Act. Reg. soc. med. Hafn. Vol. I. p. 118. 251. Bis ipse vidi.

52) Ut calami scriptorii adaequarent magnitudinem, nunquam vidi, quod referunt BALLONIUS (consilior. med. lib. III. Paris, 1630), BONET (l. c. sect. I. obs. I) et MORAGNI (l. c. epist. I. 17).

53) BANG l. c. p. 1. 54) CHEYNE l. c. WENZEL op. c.

55) GOHL in Act. med. Berolin. dec. I. Vol. IX. p. 56. CONRADI Handb. der pathol. Anatom. p. 532.

56) MORAGNI l. c. epist. III. 20. BADER obs. 26. Die 12. Martii a. 1825. gubernator urbis Tyrolensis Botzen, Lib. Ber. ab Hauser apoplexia oblit. Inter laminas sinus falciformis reperiabatur os utrimque acuminatum, longitudinis duorum fere pollicum et latitudinis dimidii pollicis, quod os cerebri vestigia ad tres lineas excavata exhibuit. In vicinis tria adhuc ossicula formae lentium reperiabantur. Similia ossicula quoque inter recti intestini, admodum extensi, membranas, magnas plicas efformantes obvenerunt (Ex morbi historia mihi a familia defuncti communicata).

57) CHEYNE l. c.

58) CHAMBERLAIN DE MONTAUX obs. clin. cur. morbor. pericul. et rar. sut phaenom. ipsor. in cadav. indagat. referentes, Paris. 1789.

59) CHEYNE l. c. Inveni aliquoties.

sanguinem ⁶¹), ulcus ⁶²) inter meninges, earum degenerationem ⁶³), opacitatem ⁶⁴), saniem ⁶⁵), serum ⁶⁶), cruorem ⁶⁷) in superficie cerebri, — cerebrum ⁶⁸), normale ⁶⁹), molle ⁷⁰), induratum ⁷¹), fere callosum ⁷²), lacerum ⁷³), corruptum ⁷⁴),

60) Pluries mihi obvenit.

61) MORAGNI epist. III. 20. Haec rarum phaenomenon.

62) VIEUSSEUX *histoires des maladies internes*.

63) Eph. nat. cur. dec. III. an. IX. X. obs. 253.

64) CHEYNE l. c.

65) MORAGNI ep. V. 11.

66) Idem. Epist. XIV. 35. Serum in cavitate encephali contentum, caloris ope non coagulari, sed nullo relicto residuo evaporari, praeter HUNTERUM (*A treatise on the blood*), ODIER affirm. v. *Bibliothèque univers.* 1816. Juin. ex *Medical-chir. transact.* Vol. 7. 1816. Cfr. cap. IV. §. XXII. 5.

67) Plurima cum cruoris, tum seri, tum utriusque humoris simul super cerebrum effusi, numero exempla. Universam cerebri superficiem, praesertim inferiorem, a sanguine, veluti a glutine, circumdatam inveni, in cadavera magistri artis delineatoriae gymnasii Vindobensis, qui apoplexia fulminante, sub actu alvum deponendi, perierat.

68) Notandum est, vitia cerebri apoplectica aequali circiser ratione in hemisphaerio alterutro, longe autem rarius in ambobus simul locum habere, de quo argumento legatur ROCHOUX l. c.

69) VALLISNIERI l. c. p. 57. VIEUSSEUX l. c. CHEYNE testimonio TYFFI innixus.

70) LANCISIUS l. c. p. 120. ROCHOUX l. c. ROSTAN l. c.

71) *Hist. de la soc. de Montpellier. T. I. p. 334. ISENFLAMM prakt. Anmerk. üb. die Nerven. p. 536. CHEYNE l. c.*

ptum ⁷⁴⁾, ad latus thalami sinistri permolle, liquidum, humore cruento permixtum ⁷⁵⁾, sphacelatum ⁷⁶⁾, cum substantia medullari rubra ⁷⁷⁾, abscessu ⁷⁸⁾, exulceratione ⁷⁹⁾, tuberculis in corpore striato ⁸⁰⁾, — *cavitates morbosas* in substantia medullari hemisphaeriorum, serum ⁸¹⁾, sanguinem ⁸²⁾

conti-

72) RUDOLPHI *Resultat d. Obduction eines, am Schlagfluss verstorb. Epileptischen.* in HORN'S Archiv.

73) STOLL l. c. p. 202.

74) BONET l. c. lib. II. sect. II. obs. 30. REIL memorab. clinica. Fasc. IV. No. 4.

75) MORGAONI epist. V. 6. L. F. BRAVAIS sur l'hémorrhagie de la couche corticale du cerveau. *Revue médicale, Mars* 1827. p. 402.

76) LYSER de aphacelo cerebri. Lips. 1656.

77) AUTHENRIETH *Physiologie.* §. 1048. CHEYNE l. c. *Conditio ista inflammatoria cerebri saepe in cadaveribus s. me reperta est.*

78) WEPFER l. c. p. 398. LAUBE Eph. nat. cur. cent. II. obs. 39. NABEL program. de apoplexia et abscessu cerebri letali. Heidelberg. 1791. Cavendum, ne cavitates morbosas cerebri (de quibus mox infra), s. sanguine in substantiam hujus visceris irruente productas, pro abscessu habemus.

79) MORGAONI epist. XI. 2. CALDANI *Saggi scientif. di Padova.* 1786. BANG l. c. et Vol. II. p. 92. Cfr. KÜHN und WEICHEL'S *ital. med. chir. Bibl. I. St.* p. 172.

80) MORGAONI epist. XI. 2. ROCHOUX l. c.

81) BAILLIE *neue Bemerk. über die Anatomie des kranken Baues* in *Samml. auserles. Abh. für pr. Aerzte* 20. B. p. 470.

82) MORGAONI epist. III. 6. 8. epist. IX. 20. CHEYNE l. c. ROCHOUX l. c. RIBES *considérations physiolo-*

continentes, interdum vicinos cerebri ventriculos comprimentes, angustantes ⁸¹⁾, — ipsos *cerebri ventriculos* materia puriformi ⁸⁴⁾, lactea ⁸⁵⁾, sero ⁸⁶⁾, aut cruore ⁸⁷⁾ repletos, laceratos ⁸⁸⁾, — *plexus choroideos* profunde rubros, veluti inflammatos, sanguine turgescentes, varicosos ⁸⁹⁾, erosos ⁹⁰⁾, ruptos ⁹¹⁾, cum concretionibus pisiformibus ⁹²⁾,

giques sur un kyste contenant du sang coagulé et placé entre l'hémisphère gauche du cerveau et la dure mère. Revue médicale. Janvier 1822. p. 34—57.

83) STOLL *Heilungsmethode*. 8. B. p. 179.

84) MORGAGNI *epist.* V. 4. KÜHN et WEIGEL *l. c.* 2. St. p. 173.

85) VAN ROYEN *dis.* de apoplexia lactea. Lugd. Bat. 1771. PUZOS in *Samml. auserl. Abhandl.* 1. B. p. 85. LEVRET *Part des accouchements*. §. 874.

86) MORGAGNI *epist.* LX. 8. LIEUTAUD *lib.* III. obs. 156. BANG *l. c.* BELL de apoplexia hydrocephalica. Edimb. 1796. *Observationes meae quodammodo eae AUTENRIETHI confirmant, serum potius in ventriculo cerebri sinistro, cruorem in dextro reperi.*

87) *Act. nat. cur.* Vol. III. obs. 7. LIEUTAUD *lib.* I. obs. 1242. *lib.* III. obs. 234. 294. 296. PORTAL *Mémoires de Paris*. 1781.

88) WEFER *l. c.* p. 7. MORGAGNI *epist.* III. 2. 4. 6. 9. 11. 16. 18. *epist.* LX. 2. 4. 6. *epist.* LXVII. 14. STOLL *rat. med.* P. VII. p. 202. CHETRE *l. c.*

89) MORGAGNI *epist.* II. 19. *epist.* III. 14.

90) *Ibid.* *epist.* II. 15. 16.

91) HUZELAND's *Journ. der pr. Heilk.* 18. B. 1. St. p. 116. *Plurima exempla rupturae plexus choroidei mihi obvenērunt.*

Frank *Prax.* II. I. 1.

Z

bus⁹²), hydatide⁹³), — ad corpus callosum praecipue⁹⁴), aliisque cerebri in locis ossa⁹⁵), calcu-
los⁹⁶), pilos⁹⁷), tumores⁹⁸), excrescentias⁹⁹),
steatomata¹⁰⁰), hydatides¹⁰¹), — cerebellum liqua-
tum¹⁰²),

92) R. WADE in *London medical and physical journal*.
Marsh. 1816. p. 190.

93) In viro quadragenario die 17. Novembris an. 1821.
in clinico instituto Vilmensi demortuo. Jam adaptato
cranio hemisphaeria cerebri oedematosa comparuere.
Ventriculi laterales seri pellucidi drachmas duas conti-
nebant. Prope medullam oblongatam illius seri uncia
reperiebatur. Hydatis plexui choroideo dextro adhae-
rens amygdalae magnitudinem adaequabat.

94) *Samml. auserl. Wahrnehmung. aus der Arzneywiss.*
A. d. Französa. Frankf. 1757. 1. B. 5. St. p. 343.

95) SCHEID diss. de duob. ossiculis in cerebro mulieris
apoplexia extinctae repertis. Argent. 1687. In HAL-
LERT coll. disp. pract. Vol. I. No. 14.

96) MECKEL vid. ADAMI l. c. et *Histoire de l'académie*
des sciences de Berlin. 1754.

97) J. VERATTI obs. pilos in cerebro mulieris apoplexia
mortuae in Comment. Bononiens. T. II. P. I. C. p. 164.

98) BLANE l. c.

99) Act. med. Berolin. dec. I. Vol. I. p. 40. SANDI-
FORT exercitat. academ. lib. II. c. 3.

100) BONET lib. I. sect. II. obs. 53. STOLL rat. med.
P. VII. p. 163. EHOEL in SCHMUCKER's *vermischten*
Schriften, 1. B. p. 274. SCHAEFFER in HUFELAND's
und HIMLY's Journ. der pr. Heilk. 1809. Decemb. p.
114. Cap. nostr. II. §. X. 12 (34).

101) BONET l. c. obs. 51. LANCISI l. c. p. 36. MOR-
GAONI epist. III. 18. epist. IV. 2. 11. 19. 21. epist. V.

tum ¹⁰²), a cruore in illud effuso ¹⁰³), ab abcessu ¹⁰⁴) detentum, — turgorem *arteriae* et *venae*, quae ramos nervorum paris octavi, glossopharyngeum scilicet, a vago separant, vel extravasatum cruentum hoc in loco *medullam oblongatam* circumdans ¹⁰⁵), — *glandulam pinealem* ad magnitudinem nucis juglandis, compactam ¹⁰⁶), purulentam ¹⁰⁷), — *carotidum* obstructionem ¹⁰⁸), ossificationem ¹⁰⁹), aneurysma ¹¹⁰), vasorum cerebri in-

Z 2

nitio-

6. epist. XI. 6. epist. LX. 8. MONTGOMIA fasc. patholog.

102) DELAMARE in *Journ. de médecine*. T. 82. v. *Samml. auserl. Abh. für pr. Aerzte*. 1. B. 3. St. p. 127.

103) MORGAGNI epist. II. 20. 22. epist. III. 24.

104) STOLL rat. med. P. I.

105) Saepe hoc phaenomenon in cadaveribus praecipue eorum, qui ab apoplexia fulminante perierunt, inveni, atque me id inventurum fore praedixi. Videtur mora tam repentina a paralyai pulmonum, compresso pari vago, oriri. A compressione hujus nervi et colorem lividum faciei extremitatumque apoplecticorum explicare liceret cum cl. DUPUYTREN (*Nouveau bulletin des sciences méd. T. L. No. 2. p. 28*).

106) LIEUTAUD lib. III. sect. II. obs. 177.

107) Ibid. 108) GAURIONUS consil. No. 452.

109) BONET L. c. lib. I. sect. II. add. obs. 8.

110) Quum arteriae cerebri, membrana externa cellulosa reliquis arteriis (excepta aorta ad suam originem) communi, destitutae sint, anevrismata encephali valdopere ab anevrismatibus plurimarum aliarum partium differre debent, ac revera differunt. Sistunt enim meras *dilatationes arteriarum*, quarum ad caroti-

nitionem¹¹²), aërem in iis¹¹³), eorum rupturam¹¹³), lithiasin¹¹⁴), — sinus per conglutatum sanguinem obstructos¹¹⁵), — *vertebras colli modo sex*¹¹⁶), sanguinem extravasatum in *cavo spinæ*¹¹⁷), — vitia *aortæ*¹¹⁸), *venam cavam* a tumoribus in pectore compressam¹¹⁹), — *morbos cordis*¹²⁰), pulmo-

des internas descriptionem exposuerunt BLANK (*Samml. auserl. Abh. für pr. Aerzte.* 20. B. p. 563) et BAILLIE (*ibid.* p. 451). Fit inde, ut arteriis istis, dilatatis, ruptis, cror derepente ita in cerebrum irrumpat, uti, lacerata aorta ad suam originem, sanguis in pericardium depluit. (HODGSON: *A treatise on the diseases of arter. and veins.* Lond. 1815). Cfr. FR. EEDMANN SCHILBACH diss. sistens casum anevrismatis in capite virginis sexagenariæ rariorem. Jen. 1825.

111) PEZOLD diss. de inanitione vasorum cerebri. Goett. 1783.

112) MORGAONI epist. V. 17. 19. epist. XIV. p. 35.

113) LANCISI l. c. p. 20. FARRO med. ephemer. p. 126. Miror rupturam vasorum majorum cerebri in dubium vocari ab egregio CHEYRE (l. c.). Cfr. SERRES *observations sur la rupture des artères du cerveau.* *Journal de physiologie.* T. 6. Janv. 1826. p. 82.

114) Omnes cerebri arteriæ in ossa plus minus mutata fuere apud Ducem supremum exercitus austriaci Principem a Schwarzenberg (CLARUS in HUFELAND's *Journal der pr. Heilk.* 1820. Octobr. p. 114).

115) MORGAONI epist. IV. 23. 116) SWIETEN l. c. §. 1010.

117) PECHLINUS l. c. MORGAONI epist. III. 2. 3. epist. LX. 4. Cfr. observationem meam §. seq.

118) Act. nat. cur. Vol. II. obs. 109.

119) DE LA MOTTE l. c. p. 186.

120) BONET l. c. lib. I. sect. II. obs. 37. add. obs. 10.

pulmonum ¹²¹), hepatis ¹²²) et renum ¹²³). Interdum vero apoplecticorum cadavera nihil plane morborum exhibent ¹²⁴).

§. XXVI.

C a u s s a e.

1. Ad *causas praedisponentes* apoplexiae C. praedispon.
spectant: vitium hereditarium ¹), sexus masculi-
nus ²),

BAADER obs. I. B. M. SCHROEDER diss. de apoplexia ex praecordiorum vitia origine. Goetting. 1767. Imperium morborum cordis in cerebrum alio loco (P. II. Vol. II) illustratur: interea conferatur opus el. KREYSIG (*die Krankh. des Herzens, systemat. bearbeit.* 1. Th. p. 348), qui et antecessorum suorum, CONVISARTI scilicet, TESTAR aliorumque observationes sagaciter collegit. Et historia morbi, quo nostro aevo Princeps Augustenburg. periit, memorabilis est. (ROSSI in HORN's *Arch.* 1812. 2. B. p. 27). Item casus a Dr. CAYREL in *Journ. de Toulouse. Mai 1826.* relatus (FRORIEP *Notizen aus dem Gebiete der Natur- und Heilk.* B. 18. No. 8. p. 124).

121) BONET l. c. obs. 57. Cfr. cap. II. §. X. 9 (40), ex quo imperium vasorum pulmonis in cerebrum abunde elucet.

122) Cfr. §. XXVI. No. 1 (14).

123) BONET l. c. obs. 61. LITRE in *Histoire de l'Acad. Roy. des sciences à Paris*, 1702. p. 34. MORGAGNI epist. III. 18. Cfr. §. seq.

124) WILLIS de anima brutorum. Part. II. cap. 8. vel WEPFER hist. apoplect. p. 621. KIRKLAND l. c. („Without any derangement in the evident structure of brain“) et ANERCROMBY on apoplexia in *The Edinburgh med. and surgical journ.* Novembr. 1818. No. 57.

1) Apoplexiae hereditariae luculentissimum exemplum

nus ²⁾, cessatio menstruorum antea copiose fluentium ³⁾, corpus robustum, torosum, plethoricum, obesum, capite praemagno colloque brevi instructum ⁴⁾, nec exceptis tamen aliis corporis constitutionibus ⁵⁾, aetas infantilis ⁶⁾, annis quadraginta

BLANK (l. c.) refert. Alia exstant apud R. A. VOGEL de cognosc. et cur. morbis. §. 569. MORGAONI l. c. epist. IV. art. 2. Et in me ipso exemplum futurum praedico, nisi Deo crudele magis morbi genus mihi imponere placeat.

- 2) Ex FALRET *tableau général des apoplexies qui ont eu lieu dans Paris depuis le 1. Janvier 1794. jusqu'au 31. Décembre 1823* (*Revue médicale Juin 1829.* p. 539) elucet inter 2,297 apoplecticos fuisse 1,670 viros, et 627 feminas.
- 3) FR. HOFFMANN l. c. obs. II. in epicrisi.
- 4) БОРНАГАВЕ (institut. med. §. 774) asserit, hominum apoplecticorum collum saepe ex sex tantum vertebrae esse exstructum, quam structuram constantem per plures generationes manere expertus est. Interea capitia et colli vitia congenita, ut apoplexiae causas, potius ex vitio rhachitico, circulo sanguinis alioquin plurima obstacula ponente, quam ex propinquitate majori capitis cum corde (SWIETEN l. c. §. 1010) repeterem.
- 5) ROCHAUX (l. c.) rite monet, apoplexiam in quavis corporis constitutione nidulari posse, atque adducto calculo aegrorum 63 confirmat. Attamen cl. vir non demonstrat, homines corpore robusto, obeso, capite magno, collo brevi instructos alia morte quam apoplectica perire solitos esse: unde *constitutio ista apoplectica* semper admittenda erit.
- 6) BAADER. GÖLLI l. cc. in capite nostro praecedenda §. XXII. 2. citat. N. L. HACHMANN *Bemerkungen*

ginta et sexaginta intermedia ⁷⁾, nec non senilis ⁸⁾, victus lautus, aulicus, potus liquorum fermentatorum, vita sedentaria, studia ⁹⁾, curae, moeror, inprimis spes delusa, infarctus abdominales ¹⁰⁾, haemorrhagiae consuetae, suppressae, ut epistaxis ¹¹⁾, haemorrhoides ¹²⁾, menstrua ¹³⁾, venae sectio habitualis omissa, morbi alii capitis, hepatis ¹⁴⁾ et renum ¹⁵⁾, constitutio endemica ¹⁶⁾, annua ¹⁷⁾,

über apoplexia venosa bei Kindern (HACKER'S liter. Annalen der gesamm. Heilk. 1830. Mai).

7) SWIETEN l. c.

8) HIPPOCRATES Aphor. 34. sect. III. CHARTEN. T. IX. p. 128. Inter 63 segros solum 17 annorum erant 40—60; — 35 autem annorum 60—80. ROCHOUX l. c.

9) ALBARTI diss. de majori frequentia apoplexiae in eruditia. Hal. 1755.

10) J. KÄMPF de infarctu vasorum ventriculi. Basil. 1751.

11) Commere. liter. Norimb. Vol. I. 1732. p. 324. Ephemer. nat. cur. dec. III. ann. V. VI. obs. 248. FABR. HILDANUS cent. III. obs. 11. MORGAGNI epist. III. 30.

12) BAGLIVI opp. p. 339. H. SCHULZE diss. sistens virum apoplexia extinctum ab haemorrhoidibus suppressis. Altdorf. 1728. Maxima pars apoplecticorum in Lithuania haemorrhoidarii sunt.

13) FABRICIUS HILDANUS cent. III. obs. 12. In vetulis, quibus menstrua valedicant, apoplexiam aliquoties a temere cohibitis haemorrhagiis uteri tunc temporis solitis observavi. Cfr. §. III. 10.

14) Cfr. §. XXV. 3 (122). Veteres atram bilem ut causam praedisponentem ad apoplexias accusantes (De melancholia liber ex GALENO, RUFO etc. esp. I. CHART. X. p. 496. WESTPHAL de apoplexia atrabiliari. Gryphis-

annus ¹⁷), atmosphaerae pressio imminuta ¹⁸),
tempus pluviosum frigidum ¹⁹), aequinoctium ²⁰),
calo-

wald. 1767), imperium hepatis hunc in morbum minime ignorarunt. Plus tamen quam par est illi tribuit BOJILLIER (*observations sur la présence des calculs biliaires dans les canaux biliaires, considérés comme cause de l'apoplexie*, In: *Journal général des sciences méd.* Novembr. 1824).

15) Homines calculo renali et ischnria inde laborantes pluries apoplexia demortuos vidi.

16) PAJOLA mihi retulit, apoplexias Venetiis morbum communissimum consistere.

17) LÉPÉCQUE DE LA CLOTURE *Anleitung die epidemische Krankheiten nach Hippocratischen Grundsätzen zu beobachten*, A. d. Fr. Leipz. 1776. MISTICHELLI l. c. FORMEY *Ephemeriden von Berlin*. 1. B. 2. Heft. p. 16. SCHAEFFER *Versuche*. 2. B. p. 159. TRAUTMANN diss. de apoplexia epidem. Goett. 1791.

18) J. G. KRAMER commerc. lit. Noric. 1732. p. 346. REZIVIA *météorologie appliquée à la médecine*. WIDMANN in HUFELAND's Journ. der pr. Heilkunde. 1809. Pressionem quidem atmosphaerae auctam ut causam apoplexiae accusant PISO (l. c.) et HORN (*Archiv für med. Erfahr.* 1813. Decemb. p. 387), at plane id meis adversatur observationibus. Nec morbos, qui memorabili anno 1812. Berolini contigerunt, ubi tot animi pathemata cives agebant, indiscriminatim a barometri statu repetere consultum est.

19) HIPPOCRATES sect. III. aphor. 23. RAMAZZINI constit. epidem. 1691. sect. 3. p. 97. LANCISIUS l. c. p. 69. 90. MOROSONI epist. II. 3.

20) Sic uno ore fatentur medici et ego cum illis.

calores aestivi summi²¹⁾, maxime repentinæ temperiei mutationes²²⁾.

2. Causae excitantes apoplexiae sunt: violentiae externae, ut mora diuturna foetus in ima pelvi, rudis applicatio forcipum, lapsus²³⁾, contusio²⁴⁾, alapae²⁵⁾, aliaeque ludimagistrorum punitiones²⁶⁾, visus-fortis qualiscunque²⁷⁾, praesertim sub coitu²⁸⁾, partu²⁹⁾, alvi depositione³⁰⁾ et vomitu³¹⁾, mala corporis positio, praecipue inclinato capite, vestes arctae, potissimum colli constrictio³²⁾,
C. excitantes.

21) Frequenter apoplexiam in regionibus septentrionalibus aumma aestate, qua radii solares horizontem vix derelinquunt, contingere, pater meus Petropoli, et ego Vilnae, observavimus.

22) FR. HOFFMANN l. c. §. 13. MORCAGNI epist. III. 13.

23) CAMERARIUS memorabilia, Cent. XX. No. 84.

24) SCULTETUS obs. 11. et quotidiana experientia.

25) Acta med. Berolin. dec. II. Vol. III. 50. Schediasma de alapis auctore G. FRANCI. Hal. 1743. p. 15.

26) MORCAGNI epist. III. 30.

27) DARWIN Zoonomia. Vol. I. §. 24. p. 433.

28) FORESTUS lib. XXVI. obs. 20. FR. HOFFMANN de morb. ex nimio vener. usu. §. 17. Vir conspicuus, sexagenarius, quo tempore a. 1812. Viennae degebam, post lautum praudium coitum excoens, sub ipso hoc opere ab apoplexia correptus est.

29) ADULPHUS Act. nat. cur. T. I. obs. 241. COQUEURAU in *Histoire de la société R. de médecine.* a. 1776. p. 268. Vide et §. XXVII.

30) MORCAGNI epist. anat. med. III. 19.

31) SYDENHAM opusc. p. 65. MORCAGNI l. c. No. 11. BURSERIUS l. c. §. 84 (**).

ctio ³²⁾, contorsio ³³⁾, struma ³⁴⁾, sternutatio ³⁵⁾,
tussis ³⁶⁾, motus nimius ³⁷⁾, saltatio ³⁸⁾, decubitus
pleno ventriculo ³⁹⁾, praecipue capite declivi vel
fornaci admoto ⁴⁰⁾, insolatio ⁴¹⁾, calor balnei ⁴²⁾,
lapsus

32) *Abhandl. der Schwed. Acad. der Wissensch.* 19. B. p. 136. Et: *Apoplectischer Tod verursacht durch Druck auf die Jugularis interna, den man anwandte um eine Blutung aus derselben zu stillen.* Ex *Edinburgh medic. and surgic. journ.* in *HORN'S Archiv für med. Erfahrung.* 1828. Mai. Jun. p. 508.

33) FOTHERGILL in *Medical observat. and inquir.* Vol. VII. No. 9.

34) *Nov. sci. nat. cur.* Vol. V. obs. 64.

35) FABR, HILDAN. Cent. IV. obs. 12. MORAGNI epist. III. 12. Cfr. §. XXV. 1.

36) FR. HOFFMANN l. c. sect. I. cap. VII. §. 11. BANG l. c. Vol. I. p. 96.

37) WAFER l. c. p. 262. *The London medical repository.* Vol. V. 1816. *Authenticated cases.* No. 1.

38) De apoplexia ex choreis vid. DARWIN l. c. p. 433.

39) MORAGNI epist. III. 28.

40) PISO l. c. Plebs Polonica et adhuc magis Rossica, repleto ventriculo cibis rudioribus, cubitum super fornacem calefactum petit, unde pluries apoplexia animadvertitur. Mense Februario 1816. duo similia mihi obvenerunt exempla, et quidem solum ob cubitum prope fornacem, unum scilicet in monacho 55 annorum, alterum in juvene 30 annorum: ille obiit, iste evasit. Ibi cerebrum, notas inflammatorias exhibens, copioso sero inundatum erat.

41) PISO l. c. p. 105. Pluries milites, rustici tempore massis, et itineratores inde apoplectici fiunt. Cfr. THOMAS *practice of physic.*

lapsus in aquam frigidam et natatio ⁴²⁾, potus
 aquarum mineralium fortiorum, e. c. Carolinarum,
 sine debita corporis praeparatione ⁴⁴⁾, drastica ⁴⁵⁾,
 transpiratio suppressa ⁴⁶⁾, crapula ⁴⁷⁾, ebrietas ⁴⁸⁾,
 maxi-

- 42) RITTER in HUFELAND's *Journ. der pr. Heilk.* 7, B. 3.
 St. p. 66. Ex balneo vaporis apoplexia non rara inter
 Rossicos; miror non saepius adhuc accideret.
- 43) DARWIN l. c. p. 434.
- 44) FR. HOFFMANN P. II. sect. II. Enarrationes morbo-
 rum. Obs. I.
- 45) FR. HOFFMANN l. c. obs. II. apoplexiam ex spasmo
 abdominali, per drastica praesertim in feminis inducto,
 derivat.
- 46) Homines a liquoribus fermentatis vel a balneo vapo-
 ris excaefacti, qui se aurae frigidae dein exponunt,
 saepius in apoplexiam incidunt. Nec Rossicorum mos,
 sese post balneum vaporis illico in nivem conficiendi,
 semper ab apoplexiae periculo immunis observatur.
 Cfr. AMATUM LUSITANUM Cent. I. Curat. 36, et
 BETHKE op. c. p. 99.
- 47) SCHENCK lib. III. obs. 24. SCHROEDER diss. de apo-
 plexia ex praecord. vitiis. Goett. 1768. Opusc. Vol. II.
 FOTHERGILL l. c. Vol. VI. MURSIGNA *Journ. für die*
Chirurgie. 2. B. 1. St. p. 26. Saepius Parisiis et Vien-
 nae apoplexia hac ex causa obvenit, uti ex observa-
 tionibus PORTALII et meis apparet. Rarius inter Po-
 lonos, respectu ciborum sat sobrios. De apoplexiae
 ex crapula origine lege praeterea WARREN in *The*
New-England journal of med. and surgery. Boston
 1812. Vol. 1. CLARKE in *Medical transactions pub-*
lished by the College of physicians in London. 1825.
 Vol. 5 (Repletio ventriculi ab ostreis in gravidis) et
 BARRY über das Gaz in den Gedärmen Ex *Lancet*

maxime ex vino, sulphure imbuto⁴⁹⁾, et ex cerevisia, cum multo lupulo⁵⁰⁾, aut cum narcoticis praeparata⁵¹⁾, opium⁵²⁾, nicotiana⁵³⁾, carbonum

No. 188. April 1827. in FRORIEP'S *Notizen*. B. 17. No. 14. 1827. Juni.

48) SCHENCK lib. I. obs. 149. PLATER obs. lib. I. p. 17. et quotidiana inter nostrates experientia: „unde merito, sjente FR. HOFFMANNO (l. c.), hinc causam repetit HENRICUS AB HEER, quod septentrionalibus populis adeo frequens sit hic morbus.“

49) FR. HOFFMANN §. XV.

50) Idem. Potum cerevisiae Anglicanae, vulgo *porter* dictae, ad apoplexism excitandam conferre, GAITSKELL docuit (*The London medical repository*. Vol. 5. 1816. Febr.).

51) COLLENBUSCH *Rathgeber f. alle Stände*. 1800. No. 8.

52) PLATER l. c. p. 16. 17. LETTSOM *med. Nachrichten*. Pluries inter infantes Vilmenses apoplexiam ex syrupo diacodii cum opio parato vidi.

53) Eph. nat. cur. dec. II. sn. 10. obs. 3. Hist. morb. Wratislav. p. 203. DIDELOT *avis aux gens de la campagne*. chap. 17. p. 119. MURRAY *appar. med.* Vol. I. p. 464. De vi fumi nicotianae apoplexism producendi historia duorum fratrum Silesiorum (de qua et BURSERIUS l. c. §. 85. (**)) narrat), ac recentior a Dr. MARSHALL HALL tradita (*The Edinburgh med. and surg. Journ.* 1816. January), testantur. Et pater meus quondam ad amicum suum vocatus erat, quem famulus domum revertens apoplecticum invenit. Quum autem primus ille odorem fumi nicotianae in cubiculo percepisset atque scivisset, segrum tali nunquam uti fumo, exactius inde inquirens, accepit, amicum, doloris dentium causa, ad nicotianam confugisse. Si-

num vapor ⁵⁴); vesicatorium capiti admotum ⁵⁵),
 odores fortes ⁵⁶), cubicula calce recenter illita ⁵⁷),
 animi pathemata ⁵⁸), ut gaudium ⁵⁹), risus ⁶⁰),
 terror ⁶¹), ira ⁶²), potissimum indignatio ⁶³), ani-
 mi

millem casum ex fumo herbae hyoseyami nigri, adversus odontalgiam adhibito, ast letalem, in nosocomio Vindobonensi observavi. Ad pulverem nicotianae nariibus attractum quod spectat, notandum est. quod si homines tali consuetudini praeter modum addicti aliquando apoplexia pefferint, hoc minime nicotianae directe adscribi posse, cum desiderium tabaci familiare sit morborum cerebri symptoma, quod non solum in veaanis, sed et in ipsis apoplexiis vidi.

54) Vide P. H. Vol. II. cap. de Asphyxia. SCHENCK lib. de apoplexia ex fumo carbon.

55) SCHARSCHMIDT annot. med. et chir. T. III. p. 3137.

56) HEISTER *Wahrnehmungen*. 1. B. p. 792.

57) Ephem. nat. cur. dec. III. ann. II. obs. 162. ann. IX. X. obs. 74.

58) ZIMMERMANN von der Erfahrung. 2. B. p. 440.

59) LANCIS diss. de morb. ex animi contentione. v. Opp. T. II.

60) Dna. RZEWUSKA Vilmensis, sexaginta annorum, lepida et jocosa, hyeme a. 1821. sub risu effreni apoplectica evasit. Convaluit. Die 12. Aprilis a. 1822. sub eadem rerum positione en alter apoplexiae insultus, vitae finem imponens.

61) JOSEPH FRANK discours de l'infl. de la revol. franç. sur des objets relatifs à la méd. prat. p. 23.

62) WOLFF obs. med. chir. lib. II. No. 5. G. M. RICHTER synopsis prax. medico-obstetriciae. Mosq. 1810. cap. 22. apoplexia ex ira subito orta et lethalis in puerpera, quae per 12 dies post partum editum sa-

mi contentio⁶⁴⁾, ac tandem cohibita epistaxis⁶⁵⁾, retrocessio aut metastasis exanthematum⁶⁶⁾, herpetis⁶⁷⁾, podagrae⁶⁸⁾, tineae⁶⁹⁾, sanatio ulcerum antiquiorum⁷⁰⁾ ac resectio plicae⁷¹⁾.

3. Caus-

nissima fuerat. Cfr. esp. nostrum de Irae morbo. §. LXXXI. No. 2.

63) Sio avia mea apoplectica humum cecidit, cum iniquus vir, cui debitum quondam contractum jam dudum ea reddidit, eoram iudice, se id nunquam accepisse, jure jurando affirmasset. Et triste hujus generis exemplum die 6. Novembris 1814. in parturiente caelibe mihi obvenit, quae vix excluso foetu, de perfidia amasii certior reddita, praevio vomitu et delirio (*sub quo infantem sine adstantium cura trucidasset*), nec non convulsionibus in apoplexiam, sex dierum spatio letalem incidit. Secto cadavere vas meninges cruente turgida et cerebri superficies, imprimis circagyros, coccinea conspiciebantur. Largum extravasatum cruento-serosum circa medullam oblongatam et ad initium specus vertebralis obveniebat. Reliqua in cerebro et cerebello normalia erant. Potiora morbi symptomata fuere: lethargus, paralysis palpebrae sinistrae, lingua dextrorsum retracta, paraplegia, oscitationes, pulsus ad 127, lochia suppressa, alvus clausa.

64) NONNEMANN diss. observat. apoplexias ex nim. animi contentionibus ortae, Argent. 1771.

65) Acta Londinensis. No. 173. p. 1. c. 68. *Abridgement*, T. 3. p. 29. 30.

66) GÖLLI l. c.

67) LAMOUSIUS l. c. p. 67. GILBERT adversar. pract. prima p. 28. Monachus, de quo supra §. XXV. 2 (40), ex *herpete* regionis epigastricae a refrigerio fere retro-pulso apoplecticus evasiss videtur.

3. *Causa proxima* apoplexiae, sat secure, C. proxima^{ma}. quid quid dicatur⁷²), a compressione morbosa cerebri, cerebelli, medullae oblongatae, a sanguine arterioso, venoso⁷³), ab ossibus, a concretionibus, a tumoribus varii generis, a sero, praegressae inflammationis chronicae sive cerebri⁷⁴), sive vasorum sanguiferorum⁷⁵) effectū, derivari potest.

68) JUNCKEN diss. aeger apoplexia ex podagra retrocedente laborans. Giess. 1733. TODE in Collect. soc. med. Havn. Vol. II. No. 10. CONRAD in HUFELAND's Journ. der pr. Heilk. 6. B. p. 468.

69) Act. med. Berolin. dec. I. Vol. II. p. 20. Post illi-
 nationem capitis tinea affecti ope olei olivarum in infantibus anni circiter unius bis apoplexiam observavi.

70) SCHARSCHMIDT l. c. T. III. p. 58. BANO l. c. Vol. II. p. 92. FRANK epitom. L. IV. p. 59.

71) DE LA FONTAINE *chr. med. Abhandl. Polen betref-
 fend. Breslau 1792.* p. 55. Ipse tamen necdum apoplexiam hac ex causa vidi.

72) ABERCROMBIE l. c. append. cerebrum comprimi posse negat!

73) Apoplexiam in arteriosam et venosam dividere conatur MONTAIN.

74) DAN. DE LAVANTRIE diss. sur l'apoplexie considerée spécialement comme l'effet d'une phlegmasie de la substance cérébrale. Paris 1807.

75) BOUILLARD Untersuchungen, die dazu dienen sollen, zu beweisen, dass die chronische Entzündung der Hirngefäße eine wichtige Rolle in Erzeugung der Apoplexie spielt. Ex Mémoires de la soc. médicale d'émulation de Paris. 1826. T. 9. p. 147. in Samml. auserl. Abhandl. f. pr. Aerzte. B. 34. p. 303. Cfr. CRAIGIE in The Edinb. med. and surgical journ. No. 74. Jan. 1823.

potest. At, sicuti extrema ubique se tangunt, ita et hic: unde vel cerebri inanitio ⁷⁶⁾, forte collapsus et morbosus contractio ⁷⁷⁾, vel ablatum aequilibrium inter cerebri arterias et venas, quo arteriae cruore turgent, ubi venae vacuae sunt, vel vicissim ⁷⁸⁾, inter causas proximas apoplexiae recipienda videntur.

§. XXVII.

Diagnosis.

Sympt.
prodromor.
interpretatio.

1. In dijudicandis *moliminibus apoplecticis* aequae cavendum, ne realia vilipendamus et apparentia extollamus. Ultimo sub respectu errandi occasio praecipue quoad somnum cum respiratione profunda ¹⁾, aut horis inconsuetis ingruentem ²⁾, oculo-

76) *Je suis tenté de croire qu'un certain degré de pression uniforme est nécessaire à l'exercice concernant les fonctions du cerveau, et que toute augmentation ou diminution de cette pression les suspend* (EVERARD HOME l. c. p. 249).

77) GAYI hypothesis.

78) ABERCROMBIE l. c.

1) Eloquentiae quondam professor in R. universitate Ticinensi, nomine *Villa*, aetate jam provecta, valdeque obesus, Mediolani vacationes in domo amici sui transigens, lauto absoluto prandio, Italarum more somno consueto pomeridianis horis indulgebat. Accidit interea, ut in superiori contignatione ejusdem domus aegrotans jacuerit, pro quo sacerdos cum sacris advocabatur. Fortuito processio cubiculum professoris intravit, qui, utpote facie rubra decumbens, ac sub profundo somno cum stertore constitutus, indubitate

oculorum imbecillitatem¹⁾, aliasque sensuum affectiones, saepe coryzae simplici tribuendas⁴⁾ praesto est.

2. Nisi verbivellitatione ducti mortem in genere a statu apoplectico repetere vellemus⁵⁾, ca-
vendum est, ne casus interitus improvisi, saepe
nimis *homicidiis*, *rupturis aneurysmatum* in cavi-
tate pectoris, abdominis et pelvis, nec non *her-
niis incarceratis*⁶⁾ tribuendos, apoplexiae adscri-
bamus;

Morbi
ipsius di-
judicatione.

pro apoplectico habitus est. Jam exhortationes at can-
tus incaparunt, quum dormiens a pergefectus ac summo
terrore percussus se omnino valere quistamque expo-
scera asseruerit. Delirium soporis locum occupasse
existimarunt adstantes, donec propinqui errorem pata-
fecerint.

2) Plurimos homines novi, qui clandestine noctes cho-
reis ac vita luxuriosa transigentes, ob continuam dein
diurnam somnolentiam, propinquis bonis inanem im-
minentis apoplexiae timorem incutiebant.

3) Vtula elegantissima inter legendum a linea aberrabat.
Ad pariculum apoplexiae inde conclusit juvenis medi-
cus. Alter senior in consilium vocatus *ocularia* pro-
posuit, quibus adhibitis visus emendatus est.

4) Cfr. infra No. 5.

5) Ploucquet diss. de unica mort. causa. Tubing. 1786.

6) Viginti sex circiter abhinc annis bajulus in suburbio
quodam Viennensi instar apoplectici humum cecidit.
Chirurgus expertus *Rudtorffer* in transitu hunc ho-
minem, quem adstantes pro apoplectico habebant, ex-
actius examinans, verum mali causam in *hernia in-
carcerata* detexit, qua reposita aeger extemplo mentis
compos ac sanus evasit. Sic pater meus quondam cum

bamus; quem porro morbum sedulo ab *encephalide lethargica*, ab *hydrocephalo acuto*, a *catapra*, ab *ebrietate* et ab *asphyxiis* 7) distinguere oportet.

A. ab encephal. lethargica.

3. Febris morbi initium comitans, lethargus sensim sensimque ingruens, motuumque voluntariorum perseveratio, *encephalitidem lethargicam* ab *apoplexia* distinguunt. Ceterum magna in hos morbos, sicuti in genere inter inflammationes et haemorrhagias aliquando exstat affinitas, quod BOERHAAVIUM non latuit *).

A. hydrocephal. acuta.

4. *Apoplexia* ex sero cerebrum comprimitur orta multum cum *hydrocephalo acuto* convenit. Immo, *apoplexia infantum* 9) ut plurimum a

Principe Spirensi iter in curram, a sex equis admittens tracto, instituens, unum ex illis cum terribi ejulatu derepente humum prostratum atque mortuum vidit. Alii apoplexiam, alii rupturam vasis sanguinis arguebant, donec sectio cadaveris veram mortis causam in hernia incarcerata patefecerit.

7) Huc potissimum spectant *apoplexias* aic dictae a genere quibus locuti sunt GALENUS de morb. differe. c. 5. WEPFER l. c. p. 388. S. T. QUELLMALZ pro de frigoris acrioris in corp. hum. effectibus. Lips. 1785. in HALLERI Disp. pract. T. VI. p. 205.

8) Apoplexiam nexum saepe cum inflammatione habuisse summus vir (SWIETEN l. c. §. 1007).

9) Hunc morbum (Germanice *Wasserschlag*) descripserunt QUIN, PORTENACHLAG et GOELTS. Tria illi exempla Vilnae conspexi, et quidem ex suppressis morbis cutaneis, sudoribus et diarrhoeis.

aliud est, quam hydrocephalus acutissimus. Qua de causa etiam CULLEN¹⁰⁾ hydropem ventriculorum cerebri ad apoplexiam, quam appellat *cephalicam*, revocat. Interea cum in hydrocephalo, quamvis acuto, cerebrum *sensim sensimque* comprimatur, ac mala inde emergentia *pedetentim* evolvantur, in apoplexia autem causa et effectus *derepente*¹¹⁾ aggre-
diantur, differentia utrumque inter morbum sponte elucet.

5. Jam vero ad apoplexias propius determinandas accedimus. Earum *peculiaris* in encephalo *sedes* primum sese considerationi offert¹²⁾. Dolendum hoc sub respectu dumtaxat conjecturas exstare. Spectant huc locatio apoplexiae in *cerebri lobos anteriores* — ubi memoria et facultas vocabula efformandi delentur¹³⁾; in *cerebellum* — ubi priapismus vel erectio clitoris turgorque nym-
pharum observantur¹⁴⁾, et circa *medullam oblon-*

A. varia
sedes et
indoles.

A a 2

gatam —

10) Nosologia. Edit. 4. Ticinensis. p. 136.

11) De affectu compressionis subitaneae cerebri quacunque ex causa vid. HOME I, c. p. 248.

12) REIL diss. de locis in apoplexia affectis. Hal. 1795.

13) BOUILLAUD *traité de l'encéphalite* etc. Paris 1825.

Quam infirma sit doctrina a BOUILLAUD respectu sedis apoplexiae tradita demonstrare conatus est PINEL filius: *Quelques recherches sur le siège des altérations cérébrales* (Journ. de physiologie. T. 6. Janvier 1826. p. 192).

14) SERRAS in *Annuaire médico-chirurgical des hôpitaux et hospices civils de Paris*. 1819. MAGENDIE Journ. de physiologie etc. T. 2. 1822. No. 2. ROBLEY

gatam — ubi pulmonum cordis, linguae et o
phagi functiones laeduntur ¹⁵⁾). Divisionem a
plexiae in *superficialem* et *profundam* ¹⁶⁾ et
meningeam et *cerebralem* ¹⁷⁾ minoris adhuc
mus momenti. In genere apoplexiae peculi
sedes prognosin quidem, ast neutiquam therap
regit. Haec nimirum ex *indole morbi*, et ind
morbi non ex natura fluidi extravasati ¹⁸⁾ (a
pathologi olim apoplexiae divisionem imme
depromserant), sed ex natura caussarum illi
sam porrigentium determinanda est. Stabilius
itaque sequentes apoplexiae species.

A. trau-
matica.

6. *Apoplexia traumatica*, — quae in rec
natis a violentiis sub partu, in adultis ab injc
externis generatur. Qua in apoplexia dijudica
lapsus, quatenus morbi effectus, probe a lapsi
caussa, distinguendus.

A. acces-
soria.

7. *Apoplexia accessoria*, — quae nil al
est, quam *eruptio subitanea*, vitiorum anteced
tium, plerumque chronicorum encephali, e
rupturae arteriarum, venarum, jam dudum d
tatarum, exulceratarum, abscessuum, tumor
varii generis etc. In diagnosi hujus commu

si

DUNGLISON in FROBIEP's *Notizen aus dem Gei
der Natur- und Heilk.* B. 4. No. 3.

15) §. XXV. No. 3 (103). 16) *Annuaire* l. c. année 4

17) FLOURENS in *Analyse des travaux de l'académie
sciences. Partie physiologique.* 1828.

18) G. A. MANGOLD diss. apoplexiae plures praeter
guineam et serosam dari species. Erford. 1765.

simae apoplexiae, quammaxime ad stirpem et constitutionem aegrorum, nec non ad morbos praegressos, etiamsi adspectu leves, e. c. obtusum capitis dolorem, vertiginem, vomitum matutinum etc. respiciendum est.

8. *Apoplexia metastatica*, — quae caussis A. metastatica.
aliorum morborum, praecipue februm inflammationum, supurationum, exanthematum, impetiginum, lactis cohibitae secretioni ¹⁹⁾, — ob peculiarem sive aegrorum sive annuae constitutionis characterem, cerebro derepente infensis, tribuenda est, atque aaepe inter infantes vel ubera adhuc sugentes obvenit. Indoles apoplexiae metastaticae varia est. Ut plurimum processu inflammatorio, extravasatum cruentum aut aerosum largienti, adscribi ea debet.

9. *Apoplexia inflammatoria*, — quae in A. inflammatoria.
bustis, plethoricis, vitam sedentariam ducentibus, liquoribus fermentatis deditia, haemorrhagiis habitualibus quondam obnoxiiis, post violenta inprimis animi pathemata, insolationem, cum notis inflammatoriis generalibus occurrit. Faciei oculorumque rubor, ac pulsus plenus et fortis hanc apoplexiae speciem plerumque designant: at vidimus et faciem pallidam, cum pulsu debili. Nec convulsiones aliique spasmi, nec vomitus cum reliquis signis gastricis, ex mera encephali inflammatione

19) PUZOS l. c. LEVRET l. c. DELEUNTE *traité des accouchemens*. Paris 1770. §. 1059.

matoris irritatione venientes, huic apoplexias transea sunt. Ejus inde elucet cum encephal affinitas ²⁰). Ad *extravasati conditionem* spectat, est illud plerumque, at non semper, *entum*. In apoplexiis enim omnes notas inflammatorias præ se ferentibus cadavera nobis pl *extravasatum serosum* exhibuerunt ²¹). Cæ apoplexias vidimus certe non inflammatorias, tamen cadaveris sectio *extravasatum sanguis* obtulerit ²²). Patet hinc apoplexiam sanguis et apoplexiam serosam sibi invicem nequaquam positas esse, quod frequens earum *complicati* jam dudum docere debuisset. Interea non neq mus, dari apoplexiam quasi *accessoriam* di

20) *Dissertation sur l'apoplexie considérée spécialement comme l'effet d'une phlegmasie de la substance cérébrale. Paris 1807.*

21) Sic et illustris Cuvier l. c.

22) Fr. HOFFMANNUS (post quem de apoplexia scribere scire pudet) apoplexiam sanguineam nomine *haemorrhagiae cerebri* designat, hancque morrhagiam non solum ex plethora, sed et ex caussa derivat. Cfr. Rocheux l. c. Item Rom in Horn's *Archiv für med. Erfahr.* 1820 et 1823. Juni.

23) BAGLIVIVS (opp. omni, p. 681) exemplum apoplexiae refert, libras duas sanguinis nigri in *ventriculo c dextro*, sesqui unciam autem seri flavi in *ventriculo sinistro*, relinquentis. Pluries *extravasatum crassum* in ventriculis cerebri anterioribus, et *serosum* cerebrum effusum inveni.

dam, quae in *hydropicis* ex sero in encephalo sicuti in aliis cavitatibus exsudato ortum ducit ²⁴). Utrum apoplexia a sanguine, sive ex arteriis (*a. arteriosa*), sive ex venis (*a. venosa*) pullante, derivanda sit, ad lectum aegrotorum haud determinabimus.

10. *Apoplexia rheumatica* — quae obvenit in hominibus, aliquando ad apoplexiam ne dispositis quidem, sed quorum cerebrum ab aliis morbis laefactatum erat — nunc ut annuae constitutionis, nunc ut refrigerii aestuante corpore suscepti effectus, praeviis saepe coryza ²⁵) vel doloribus artuum. Cadavera extravasatum aliquando cruentum ²⁶), saepissime serosum, hinc inde

A. rheumatica.

24) Curavi plurimos senes, vitiis cordis aut pulmonum laborantes, in quibus primum hydrothorax et oedema pedum se se manifestabat, dein tumor crurum et ascites in conspectum venerunt, ac postremo, praevia somnolentia, extravasatum encephali, apoplexiam, sensu communiter accepto *serosam* inducens, ingruerat. Nulla hic sectio cadaveris exhibebat signa inflammatoria, ac cerebrum potius flaccidum comparebat. De hac apoplexia, nomine *hydrocephali senum* memorabilia protulit MOULIN l. c.

25) *Coryzam*, ut affectionem inflammatoriam membranae, cavitates nasales, cerebro adeo propinquas, ambientis, non semper insontem esse, debito loco patebit.

26) *Et cerebri haemorrhagiam indolem rheumaticam agnoscere posse*, nemo, qui meas de imperio rheumatis in arterias et sanguinis inde profluvia observationes in P. II. Vol. II. sect. II. cap. XX. perlegat, mirabitur.

inde mixtum, vix unquam sine notis inflammatoriiis ²⁷⁾ exhibent.

A. gastrica.

11. *Apoplexia gastrica* — quae a ventriculo
et

27) Magister linguae Rossicae in gymnasio Vilmensi, corpore robusto ad apoplexiam disposito instructus, haemorrhoidarins, Baccho plus quam Minervae indulgens, post insultum apoplecticum, quem a. 1812. perpassus erat, quique venesectionum ope profligatus fuit, usque ad d. 7. Februarii 1815. sanus vixit. Hoc autem die, postquam pridie frigus aestuante corpore excoeperat, iterum ab apoplexia, accedente hemiplegia lateris dextri, correptus est. Aegro lethargico, die sequente in clinicum suscepto, invenimus, *factem rubram*, tumidiusculam, oculos defixos, pupillas contractas, albugineam coccineam, trismi initium, deglutionem tamen expeditam, vocis abolitionem, respirationem anhelosam, laboriosam, brachium dextrum arcte thoraci, sinistrum partibus genitalibus admotum, *pulsum plenum, durum*, regularem, sano haud frequentiore; calorem cutis normalem, excepto latere hemiplegico, *frigidiusculo*, urinam debita copia inscie depositam, alvumque clausam. Irritis omnibus auxiliis aeger accedente paraplegia, die 16. ejusdem mensis obiit. *Sectionio cadaveris*. — Remoto cranio superiore *seri limpti* plurimae unciae mox obviam venerunt. Major etiam illius copia circa cerebellum, medullam oblongatam et ad introitum specus vertebralis comparuit. Vasa sanguinea meningum, ac si arte essent injecta, *cruore turgescabant*. Sic et sinus cavernosi. Cerebri substantia medullaris innumerabilibus punctis rubellis notata. Reliqua tum in cerebro, tum in cerebello normalia.

et intestinis alimentis, saburris, flatibus²⁸⁾, forte vermibus²⁹⁾ onustis aortam abdominalem comprimantibus³⁰⁾; aut pulmones, aliquando inflammatos³¹⁾, in angustum spatium pellentibus oritur. Qua in apoplexia dijudicanda semper fallacitatis signorum gastricorum memores esse juvat.

12. *Apoplexia arthritica*, — quae pulchre A. arthritica.
a MUSGRAVE³²⁾ et BARTHEZ³³⁾ descripta est, atque occurrere solet post cephalalgias et vertigines indolis quoque arthriticae, praecurrentibus susurru aurium, lipothymiis, nausea, vomitu, apud homines aetate provectos, praecipue dum vivendi modum lautum, cui diu adsueta erant, cum regimine egeno derepente commutant, interdum sub ipso podagrae habitualis paroxysmo, accedente forte vel levi licet animi pathemate, vel retrocessu affe-

28) *Observationes de apoplexia flatuosa* habet МОРОЗОВ I. c. epist. V. art. 17. 18. 19.

29) Qui exempla, mihi quidem suspecta, de *apoplexia verminosa* legere cupit, illa inveniet in SCHNARSCHMITZ annot. med. chirurg. T. I. p. 314. 324.

30) HELMONTIUS in capite: a sede animae ad morb. p. 236. §. 12. SWIKTEN I. c. §. 1017. HENR. RAHN de miro capitis et abdom. consensu. J. G. MOLL diss. de apoplexia biliosa. Goett. 1760. Exstat in J. P. FRANK delect. opusc. med. Vol. IX. p. 187.

31) BAKO vers. select. diarr. nosoc. R. Frid. Hafniens. T. II. p. 37 — 47.

32) De arthritide anomala. Amstel. 1710.

33) *Abhandl. von den Gichtkrankh.* A. d. Franz. v. BIRSCHOFF. Berlin 1803. 2. Th. p. 353.

affectionis pedis³⁴⁾, sociisque haud raro calculis biliosis³⁵⁾, urinariis³⁶⁾. Apoplexia ista arthritica saepe extravasato stipatur cruento: alias vasa solum sanguine distenta, ossificata inveniuntur.

A. periodica.

13. *Apoplexia periodica*, — quae rite docente BARTHEZ³⁷⁾, magnam cum apoplexia arthritica alit affinitatem, atque sociis symptomatibus paralyticis, nunc ut *febris intermittens larvata apoplectica*³⁸⁾, nunc ut symptoma *accessorium paroxysmorum febrium intermittentium evidentium, per se benignarum*, occurrit³⁹⁾. Cadavera plerumque nil morboſi in encephalo exhibent⁴⁰⁾.

14. *Apo-*

34) JUNGKEN l. o. CONRADT in HUFELAND's *Journal der pr. Heilk.* 6. B. p. 468.

35) WEITHRECHT commerc. liter. ann. 1734. hebd. 9. No. 2. MORGAGNI epist. anat. med. III. No. 5. IV. 13. V. 6. 19.

36) §. XXV. 3 (123). 37) l. c. p. 363.

38) BRAUNS diss. qua naturam febris et apoplexiae unam eandemque esse evincere tentatur. Erford. 1791.

39) Mense Augusto a. 1815. ad comitem H. *Stroynowski*, sexagenarium, quondam Rectorem hujus Caesareae Universitatis, dein Episcopum Vilnensem, in aeternum venerandum, a medico ejus ordinario, Dr. *Kossowski* adductus fui. Habitabat tunc temporis Episcopus ruri, in distantia sex miliarium ab urbe. Afficiebatur gracilis vir, ab hebdomade et ultra, febricula, est evidenter typum tertianae duplicis servante. Jam familiarium desiderio, ut medicum advocaret, pertinaciter obstiterat. Cum vero paroxysmus, qui pridie locum habuit, sopore stipatus esset, inscio aegrotante vocati fuimus. Circa meridiem adstantes Epi-

14. *Apoplexia scorbutica*, — quae non solum in genuino scorbuto, praeviis tremoribus, convulsionibus et paralyti, sed etiam in malis scorbuto affinis, e. c. in morbo maculoso haemorrhagico WERLHOFFII ⁴¹⁾, ingruere solet, praecipuis si haemorrhagiae, et maxime quidem epistaxis, vi cohibeantur, aut ulcera habitualia incaute sanentur. A. scorbutica.

15. *Apoplexia spasmodica*, — dum sanguinea est, ex imperio nervorum in vasa cruoris circulo dicata ⁴²⁾ facile explicatur. Alias ea a conditione peculiari systematis nervosi, cultro anatomico A. spasmodica.

scopum aedentem ac prandiam sumentem invenimus. Displacuit illi nostra apparitio, ac sine ambagibus, se crastina die Vilnam petiturum fore, hodie autem adhuc rusticana frui velle solitudine et tranquillitate declaravit. De sopore praegressi paroxysmi sciscitatus breviter respondit, se per totum vitae curriculum, accedente vel brevi febre, soporosum fieri. Apyrexiae symptomata, excepta faucium ariditate et in deglutendo quodam obstaculo, nil, ex quo latentem perniciosam apoplexiam arguere liceret exhibuerunt. Aegrum, nos vi remittentem, hortati sumus, ut urbem, quo citius id fieri posset, peteret. At hanc necdum nos ipsi reduces attigimus, cum ingruens paroxysmus apoplexiae, cum resolutione linguae musculorumque deglutitionis operi intervientium junctus, aegrum in agonem conjiceret.

40) RAHN I. c. p. 78. C. MEDICUS *Geschichte periodischer Krankheiten*. B. 2. p. 299 (Bilis abundans).

41) Acta mea clinica. Vol. III, p. 40—43.

42) P. II. Vol. II. sect. II. cap. XX.

tomico non semper demonstranda, repetenda. Hic ut effectus inanitionis ⁴³⁾, dolorum (potissimum a calculis felleis, a partu ⁴⁴⁾), animi pathematum, studiorum, odorum etc., maxime in hypochondriacis, hystericis et infantibus, comparet. Apoplexise species, de qua loquimur, nomine nunc *convulsivae*, nunc *spasticæ*, nunc *nervosæ* optime descripta est a SYDENHAMO ⁴⁵⁾, FR. HOFFMANNO ^{46 a)}, SEELMATTERO ^{46 b)}, LE CATIO ⁴⁷⁾, HAENIO ⁴⁸⁾, BOUCHERIO ⁴⁹⁾, MOLINARIO ⁵⁰⁾, TISSOTO ⁵¹⁾, BURSARIO ⁵²⁾, STOLLIO ⁵³⁾, KORTUMIO ⁵⁴⁾, ZULIANIO ⁵⁵⁾, WEIKARDO ⁵⁶⁾, SCHELLERO ⁵⁷⁾ aliisque ⁵⁸⁾.

Con-

43) Apoplexise ex inanitione præcipue meminerunt P. PAAW succentur. anat. Lugd. Bat. 1616. p. 109. BOERHAAVE de morbis nervorum. p. 652. PRZOLD diss. de apoplexia ex inanitione. Goett. 1783. Huc quoque apoplexise ex venere nimia spectant de quibus FR. HOFFMANN diss. de morbia ex intempestiva venere oriundis legi meretur.

44) §. XXIX. 45) In dissert. epist. 46 a) l. c.

46 b) Morbi circa Tobinium familiares. Basil. 1751.

47) Ad calcem libri DONALDI MONROI von der Wassertucht. A. d. Engl. Leipz. 1762. p. 361.

48) Ratio medendi. P. IV. p. 36.

49) Recueil d'observations de médecine. T. 47. p. 77.

50) l. c. 51) Epist. varii argumanti. p. 88.

52) l. c. §. 103. 53) Rat. med. P. VII. p. 205.

54) Diss. de apoplexia nervosa. 1785. Continetur in J. P. FRANK delectu opusculor. med. T. VI. p. 1.

55) l. c. 56) Vermischte Schriften, 2. B. p. 24.

57) Diss. de apoplexia nervosa. Goett. 1799.

58) NÜNNBERGER diss. de vulgari ætiologia apoplexise

Confusio apoplexiae spasmodicae cum *asphyxia nervosa* ⁵⁹⁾ evitari debet. Cavendum quoque, ne apoplexiam inflammatoriam, quae ob irritationem magnam, quam cerebro infert, multis symptomatibus nervosis stipatur, ob id pro spasmodica habeamus. Ad quos errores evitandos refert, constitutionis et temperamenti aegrorum, nec non morborum praegressorum memores esse.

16. *Apoplexia complicata*, — quae, quam frequens esse debeat, ex notionibus generalibus ⁶⁰⁾ quivis sponte intelliget. A. complicata.

§. XXVIII.

P r o g n o s i s.

1. Apoplexia morbum periculo plenum sitit ⁶¹⁾. Major minorve discriminis gradus ab aetate, fabrica aegri, vehementia symptomatum, causa morbi, ejusque indole, sede et reditu pendet. Generatim.

2. Apoplexia recens natorum et infantum saepe nychthemeri spatio letalis est. Alias formam hydrocephali acuti induens circa vigesimum diem protrahitur ⁶²⁾. Senum apoplexias cum *MORGAGNIO*, Ab aetate et fabrica corporis.

valde ambigua et fallaci. Wittemb. 1794. *PLoucquet* diss. de vi vitali ejusque mutationibus in apoplexia. Tub. 1796.

59) P. II. Vol. II. sect. II. cap. XXII.

60) Cap. I. §. IV. No. 24.

61) *HIPP.* aphor. 42. sect. II. T. IX. p. 84. *MÜLLER* diss. de prognosi apoplexiae. Hal. 1792.

62) De hydrocephalo acuto disserens (§. XII. 3) monui,

GNIO, contra SWIETENIUM ³⁾, minus cito letales, ast magis quam juvenum in diurnas resolutiones pronas, declaramus ⁴⁾. Obesi, capite magno colloque brevi instructi, periculosissime afficiuntur. Est praeterea nisus sanationis nonnullorum hominum talis, ut cerebri a haemorrhagiis excitatae devastationes, etiamsi magnae, emendari possint ⁵⁾.

A sym-
ptomati-
bus.

3. Ex symptomatum vehementia aut levitate dubium apoplexiae desumitur prognosticon, vidimusque plus vice simplici aegros ex apoplexia exquisita convaluisse, aliosque ex parapoplexia interisse. Pessimi ominis habentur: spuma circa os ⁶⁾,

hunc morbum aliquando ex apoplexia oriri. Vidi enim infantes, capite magno et collo brevi instructos, robustos, qui cum decimum mensum aetatis, quindentes in conspectum prodirent, attigissent, inopinante ab apoplexia correpti fuere. Recta adhibita medela omnia in melius mutabantur: ast vana inde oriebatur sanationis spes; cum morbus postea hydrocephali acuti sub forma ad interitum decurreret.

3) l. c. §. 1015.

4) BEAUCHESNE ergo apoplexiae senex quam juvenis opportunior. Paris. 1609.

5) Vere BRUNNER (BONETI sepulcr. edit. MARGOT. 1700. T. I., lib. I. sect. 2. p. 139. De apoplexia post quinquennium recurrente fortissima a sanguine extravasato cum capitis anatome.) „quidquid sit, saltem apparet vulnera et solutiones continui in ipsa quoque substantia medullari cerebri, tum artis, tum naturae beneficio consolidari.“ Cfr. ROMBERG l. c. p. 438. Cfr. No. 3 (18).

os ⁶⁾, facies livida, oblonga ⁷⁾, manus constanter uni capitis loco admota ⁸⁾, deglutitionis difficultas ⁹⁾, potulentorum per nares reditus, respiratio stertorosa ¹⁰⁾, praecordiorum prominentia ¹¹⁾, paraplegia ¹²⁾, decubitus ¹³⁾, pulsus ex parvo magnus redditus ¹⁴⁾, palpitatio cordis, sudores et aër expiratus frigidi ¹⁵⁾, evacuationes alvi et urinae involuntariae. Pro bonis declarantur signis: febris mature accedens ¹⁶⁾, valida ¹⁷⁾, ephemera, encephali-

6) HIPPOCRATES aphor. 43. sect. II. CHARTER. T. IX. p. 82.

Vidi tamen an. 1815. maniacum apoplexia correptum (de quo §. XXIX. 1 (4)), qui irrita spuma circa os convaluit.

7) CAELIUS AURELIANUS l. c. p. 199. „Pejorante passione atque in exitium aegrorum crescente, vultus adductio, ita ut longior nato videatur.“

8) QUARIN l. c. 9) Pro pessimo signo habeo.

10) BAGLIVI l. c. „Quo magis offenditur respiratio, eo fortior morbus.“

11) CAELIUS AURELIANUS l. c.

12) CELAUS l. c. „qui per omnia membra resoluti sunt, aolent celeriter rapi.“

13) Nullum apoplecticum cum decubitu sanatum vidi.

14) BAGLIVIVS l. c. Caveant hinc iyrones, ne hoc symptoma pro bono signo habeant, ut monet SWINTEN l. c. §. 1017.

15) HIPPOCRATES COSCAR. praenot. No. 479. CHARTER. T. VIII. p. 880. CAELIUS AURELIANUS l. c.

16) BUNSENIUS l. c. §. 120. Nec ROUONON (*considérations patholog. sémiot. Vol. 2. p. 379*) necque WHYTTE (*praktische Schriften p. 690*) assentio, quatenus contendunt apoplexiam absque febre melius semper cadere et pulsum quo frequentiore eo propius letum indicare.

phalitis¹⁵⁾, sudores copiosi, calidi, aequales, febrem

17) HIPPOCRATES lib. I. de morb. cap. VII. CHART. T. VIII. p. 558. ARETAKUS de curat. morb. acut. lib. I. cap. IV. p. 82. JUNCER diss. de prognosi HIPPOCRATIS, quod febr. solvat apoplexiam. Hal. 1734. BAILLIE (l. c. p. 470) jam din docuerat, quod RIONÉ (l. c.) contendit, naturam, febris ope, crnorem extravasatum per liquidum ex vasis exhalantibus manans, attenuare, atque sic ad absorptionem magis idoneum reddere.

18) Sienti pneumonorrhagiam aliquando cum fructu peripneumonia aequitur. ita haemorrhagiam cerebri encephalitis. Vir 30 annorum, de quo supra (§. XXVI. 2 (40)) quaestio erat, haemorrhoidarius, ac capite formaci, ut dixi, admoto dormire solitus, die 30. Januarii 1816. apoplecticus humum cecidit. Instituitur venae sectionibus, liberatur a lethargo, respiratione stertorosa, facie livida et trismo; at die 2. Februarii sequentis, commisso errore in dieta, illico a febre corripitur cum delirio. Illa continuante et invalescente die 5. ejusdem mensis ad clivum deportatur. Facies pallida, summa jactatio, respiratio anhelans, gravem exprimebant morbum. Praesertim circa continuo atrahebat denudabatque. Ceterum quamvis delirans, quaestionibus firmiter institutis sat congrue respondere solebat. Pulsus debilis, inconstans ad 120. Calor cutis normalis. Hypochondrium dextrum tensus, attactum aegre ferens. Alvus clausa, urina copiosa. Interdum subsultus tendinum. Morbum pro *encephalitis cum febre nervosa* declaravimus. Exhibetur calomel ad grana tria omni hora, injicitur clyster cum tartaro emetico et assa foetida et capiti deraso amplum applicatur vesicatorium. Die 6. suffugere tentat aeger

febrem aliaque symptomata levantes, urina multa, crassa, haemorrhoidum fluxus ¹⁹⁾, menstruorum restitutio, diarrhoea ²⁰⁾, levamen a venae sectionibus, et sugillationes extus ad faciem ²¹⁾ aut ad brachium ²²⁾

continuo delirans, ac manibus oculos ac nares perfricans. Pulsus 104, inconstans, myurus. Facies livida. Calor cutis sanus, sitis inexplebilis. Jam sumsit 36 grana calomel. Alvus semel tantum mota. Habeat adhuc tria grana ejusdem remedii omni secunda hora alternatim cum granis decem salis cornu cervi et grano uno camphorae. *Die 7.* alvua nonies aperta, liquida, biliosa. Per duas horas obdormivit. Nunc coma vigil observatur. Aeger de proprio statu sciscitatus in fletum prorumpit. Pulsus 94, elevatior, extremitates subfrigidae, respiratio liberior, hypochondrium dextrum normale. Seponatur calomel, cujus 72 grana jam sumsit, et continuet in sale cornu cervi, cui assa foetida superadditur. — Per duos dies status circiter idem, — ac alvus ter, quater spatio nycthemeri aperta. *Die 10. Febr.* Somnus per totam noctem aegrum refocillabat, nunc mente compotem, cum pulsu ad 74. Praescribitur infusum florum arnicæ et seminum coriandri. Sic res de die in diem in melius mutabatur, continuata alvi libertate, urina sedimentosa reddita, ac sudore quaque nocte apparente. De fame continua conquerebatur convalescens, nil aliud nisi carnem vitulinam exposcens. *Die 17.* ejusdem mensis sanus domum remissus.

19) HIPPOCRAT. *Coac. praenot.* No. 478. CHARTER. l.c. p. 880. Plurimae mearum observationum de apoplexia per haemorrhoides soluta testantur.

20) Pluries effectus salutare alvi profluvii in affectionibus apoplecticis expertus sum.

21) HONORÉ in *Gazette de santé*, 1814. Août.

Frank Prax. II. I. 1.

chium ²²⁾ comparentes. Convulsiones haud semper letales ²³⁾).

A causa
et indole.

4. Apoplexiae ex vulneribus capitis gravioribus, ex ruptura arteriarum, venarum encephali, vix aut ne vix quidem auxilium admittunt. Patet inde, *apoplexias traumaticas et accessorias* quammaxime timendas esse, unde fatales etiam esse solent apoplexiae, quibus capitis dolor ²⁴⁾, vertigo, epilepsia, mania, praecesserant. Contra ea *apoplexiae inflammatoriae, rheumaticae, arthriticae et periodicae*, sub recta et potissimum matura medela, sanitatis haud raro concedunt spem. Contrarium fere de *apoplexiis scorbuticis et spasmodicis* dicendum est.

A sede et
reditu.

5. Periculum autem apoplexiae maxime e *sede morbi* pendet. Quo propius illa medullae oblongatae, eo periculosior morbus. Quoties enim extravasatum cruentum ad basin cranii, praecipue circa originem nervorum glossopharyngei, vagi et hypoglossi reperi, toties apoplexia citissime interfecerat. Facile inde intelligitur, cur affectio deglutitionis, respirationis et sermonis, tam mali in apoplexiis sint ominis. Ad *reditum* paroxysmorum apo-

22) *Bulletin de la faculté de méd. de Paris. No. V. in Journ. de méd., chir. et pharm. de LEROUX. Vol. 36. Juin. 1816. Observatio Dr. HERREAD.*

23) Et CHRYNZ convulsiones minime pro pessimo signo in apoplexia habet.

24) CHRYNZ l. c.

apoplexiae quod spectat, singulo casu excepto ²⁵⁾, neminem, qui a tertio eoque exquisito insultu hujus morbi non fuerit trucidatus, novimus.

6. Apoplexiae, nec morte nec sanitate terminatae, paralyisin, amnesiam, amentiam ²⁶⁾, epilepsiam, gangraenam ²⁷⁾ relinquere et interdum peripneumoniam judicare ²⁸⁾ solent.

Transitus
in alios
morbos.

§. XXIX.

C u r a.

1. Quo pacto apoplexiae et illius repetitis insultibus occurrendum sit, tum ex consideratione caussarum praedisponentium ¹⁾, tum ex regulis prophylaxeos intelligitur; quas regulas CELSUS, „quietem et abstinenciam“ suadendo, duobus ver-

Prophy-
lactica.

B b 2

bis

25) Superior excubiarum Polonicarum praefectus *Gregorzewski*, vir septuaginta annorum, apoplexiae septem graves insultus sustinuit, et ab octavo dumtaxat, mense Martio 1818. Vilnae trucidatus est.

26) Inter quinquaginta maniacos, sex facti sunt fatui a praevia apoplexia (NAUMANN in HUFELAND's Journ. der pr. Heilk. 1824. Juli. p. 63).

27) ВУТСИКА *geschichtliche Darstellung eines Nerven-schlagflusses, welcher eine von der Natur allein bewirkte Abstossung des linken Unterschenkels zur Folge hatte. In Annalen für die gesammte Heilkunde, unter der Redaction der Mitglieder der Grossh. Badischen Sanitätscommission. 2. Jahrg. 1. Heft. p. 110.*

28) KREBS diss. de apoplexia peripneumoniam judicante. Helmst. 1780.

1) §. XXVI. 1.

bis designavit. Prædispositis ad apoplexiam *venaesectionem* ex pede, *hirudines* ad caput, et *cucurbitulas scarificantes* ad nucham, circa æquinoctiale potissimum tempus, cum FR. HOFFMANNO ²⁾ et experientia suademus. Maxime libertati alvi studendum, qui scopus si cum *extracto aloes aquoso* ³⁾ attingatur, haud raro spontaneus ac salutarius haemorrhoidum fluxus, artificiali illo ab hirudinibus excitato tutior ⁴⁾, oboritur. Specia-

tim

2) L. c. §. VIII. Usus tempore vernali venæ sectionem prophylacticam instituendi, in plethoricis saltem et ad apoplexiam dispositis, nuper a Dr. ADAMS defenditur (v. *med. and phys. Journ. by FOTHERGILL and WART. 1815. August*), quum, HEBERDENIO monente, mortes repentinæ, ab eo tempore, a quo tales venæ sectiones in Angliâ negligi incipiebant, duplo increverint.

3) R. Extracti aloes aquosi drachmam unam. Pulveris radiciſ rhei drachmas duas. m. f. c. s. q. syrupi rhei pilulæ granorum trium. Obducantur folio aureo. cap. 4. 6. ad noctem. Nunc maxime pilulis ex *extracto radiciſ jalappæ alealind* utor.

4) In rebus medicis nil celandum. Millies hæmorrhoides cum fructu, aut saltem sine damno aperiri jussi — at semel contrarium contigit. Aeger, de quo supra (§. XXVIII, 3 (6)) locutus sum, maniaſ chimerâ non sine suspitione latentis vitii hæmorrhoidalis laboravit. Sussi igitur applicationem hirudinum ad podicem. Maniacus autem, se nunquam id permissurum fore, declaravit. Interrogatus quare, respondit: nam illico corripiar apoplexiâ. Stulti verbis nil tribuens operationem nihilominus imperavi, cui dein aeger se

tim evitari debent: somnus et motus immediate post pastum, decubitus capite nimis declivi, mora in conclavi calido, vina dulcia, cibi flatulenti, vestes arctae, violenta animi pathemata'), sanatio ulcerum, et impetiginum antiquorum.

2. In

ultro submisit. Libra circiter cruoris educebatur. Ast en altera die (aut cum hoc, aut propter hoc) apoplexiam fere fulminantem cum Hemiplegia. Restitutus dein aeger non solum ab hisce morbia, sed et a mania, antecedentium sat memor, retulit, se apoplexiam ab applicatione hirudinum timuisse, quum in auriga suo quondam talem rerum successum observaverit. Verisimiliter in utrisque jam dispositio ad apoplexiam aderat, cujus forte evolutio a mutatione per hirudines in sanguinis motu operata, accelerata fuit. Idem relate ad venae sectionem reperi. Quum enim aegrot, de quo supra locutus sum (§. XXV. 1 (24)), ob constitutionem corporis floridam et pulsam plenum, durum phlebotomiam instituerim, illico vera paralysis linguae et brachii affecti secuta est. Reiterato adhuc venae sectione, quae ab omnibus signis expositi videbatur, en et pedis paralysis, et brevi postea mors. Cfr. §. XXV. No. 1 (15).

- 5) Hic latet difficultas! Sic mercator 50 annorum, quem a binis iisque terribilibus apoplexiae insultibus restitui, anno 1815, me matutinis horis, sanus et vegetus, adivit, ajens: timeo hodiarnam diem. Cur? Ex serario publico conspicua pecuniae summa exigenda mihi est, quo in negotio difficultates praevideo, quibus certe succumbam. Pro testimonio medico, tale periculum declarante, ultro me exhibui. Grato id quoque animo accepit; verum male nihilominus peractis negotiis, circa meridiem domum redux, eo ipso

Regulae
generales.

2. In quavis apoplexia vestes aegri atque omne id, quod libertati circuli cruoris obstare posset, quin tamen vel pedes refrigerentur, vel corpus ruditer commoveatur ⁶⁾, sine mora abigendum, caput denudandum, pulvinaria cum plumis rejicienda eorumque loco alia ex pelle et crinibus in usum ducenda, in partes paralyti obnoxias, vesica urinaria non excepta, inquirendum, corpori non quidem plane erecta ⁷⁾, sed neque declivis positio concilianda, nimius adstantium numerus imminuendus, quies imperanda, radii solares avertendi et alvus saepe repetito clystere ex *decocto furfurum* et *aceto*, nunquam vero *narcotico* ⁸⁾ sollicitanda. Si clysteres non retinerentur, *suppositorio* locus est. Ligaturam artuum, scopo venas, ut magis superficiales, quam arteriae comprim-

mento, quo pallium muro appendere consabatur, ab apoplexia fulminante trucidatus est.

- 6) Haec regula et sub totius morbi decursu essentialis est: vidi nempe pluries aegros post primum apoplexiae insultum jam multum sublevatos in alterum letalem incidisse, dum trullam sine cautela petebant. Nec aliter consilium REXELINI (lin. med. 1696. p. 607), post insultum aegros esse circumducendos, explicare possum, quam ex confusione apoplexiae cum reliquis morbis soporosis, quondam haud rara.
- 7) Sicuti enim nimius affluxus sanguinis ad caput evitandus est, ita et defluxus liquorum in encephalo collectorum ad spacum vertebralem.
- 8) E. g. ut radix hellebori nigri, folia nicotianae tabaci etc.

primendi, quondam adhibitam⁹⁾, ob periculum circulum cruoris et in arteriis impediendi, cum SWIETENIO¹⁰⁾ rejicimus.

3. Curam *apoplexiae traumaticae*, haud multum recedentis ab ea encephalitidis traumaticae¹¹⁾, ut chirurgiae objectum, quamvis non libenter¹²⁾, silentio praeterimus.

A. traumatica.

4. *Apoplexia accessoria* ita plerumque constituta est, ut nisi methodus apoplexiae inflammatoriae accommodata¹³⁾ conducat, nil plane ab arte expectandum sit. Immo artis interdum conamina rem adhuc in pejus praecipitant, quare cum CELSO¹⁴⁾ dicimus: „sanguinis detractio vel occidit vel liberat“¹⁵⁾. Quodsi apoplexia parturienti super accederet, exclusio foetus promovenda foret¹⁶⁾.

A. accessoria.

5. Apo-

9) DE LA MOTTE op. c. T. I. p. 122.

10) l. c. §. 1025. 11) Cap. III. §. XVIII. No. 2.

12) Quantum a magnis auxiliis chirurgicis in cura apoplexiae ex causa traumatica expectandum sit, et exemplum recens docet. Vide: *Transact. of a society for the improvement of med. and surg. knowledge*. Vol. III.

13) 6. 14) Lib. III. cap. XXVII. p. 178.

15) Deploranda ob id apoplectici non minus quam mementis conditio fit: nam, ut SWIETENII verbis utar, si venaesectione instituta morietur aeger, pronuntiabitur, quod medicus eum interfecerit: si non secatur vena, moriente aegro culpatur medicus, quod non juverit.

16) HERMENT an praegnantia apoplexia correptae partus

A. metastatica.

5. *Apoplexia metastatica* secundum praecepta apoplexiam rheumaticam et praecipue arthriticam tractandi ¹⁷⁾ curatur. Praeterea in infantibus medendi ratio plane cum ea encephalitidis ¹⁸⁾ et hydrocephali acuti ¹⁹⁾ convenit.

A. inflammator.

6. In *apoplexia inflammatoria* neque aetas provecta ²⁰⁾, neque gracilis aegrorum constitutio, neque causae debilitantes praegressae, neque pulsuum intermissiones *phlebotomiam magnam* ²¹⁾ e vena jugulari ²²⁾, aut brachio contraindicant. Sunt adeo qui arteriam temporalem secandam esse doceant ²³⁾. Elapso a prima venae sectione nonnullarum horarum curriculo, nisi symptomata omnino remittant, altera e pede instituitur. Praesente hemiplegia latus sanum pro hac operatione eligi

manu promovendus. PAR. 1732. G. M. RICHTER synopsis etc. p. 133. cap. 20. apoplexia gravidarum septimo mense non lethalis, sed partu praemature sublata. Et. p. 135. cap. 21. apoplexia gravidarum et parturientis lethalis, infante vivo per sectionem extracto.

17) No. 7. 9. 18) Cap. III. §. XVIII.

19) Cap. V. §. XXII. No. 13.

20) FR. HOFFMANN l. c. §. II. J. P. FRANK Ticini Marchionem Botta aenem 82 annorum per venae sectionem ab apoplexia in integrum liberavit.

21) „Si minna detraxeris, quam causa postulat, nil magni per magnum auxilium auferes.“ ARÆTAEUS l. c. cap. V. p. 81.

22) TRALLER de vena jugulari frequentius secanda. WRA-TISL. 1735. ABERCROMBIE eam reprobat!

23) WENDT in Bibliothek for Læger. 1823. Häft. 3.

eligi solet. Sequuntur *hirudines* ad caput ²⁴⁾, nec non ad latera colli, quibus *cucurbitulae scarificantes* ad utrumque spinae latus ²⁵⁾, occipite ²⁶⁾, nucha ²⁷⁾, lumbis ²⁸⁾ non exceptis, duodecim succedunt. Simul alvus *clysteribus* et *potione laxante antiphlogistica* ²⁹⁾, senescente morbo et drastici ³⁰⁾ movetur. Ea aperta, aqua rubi idaci, fragariae vescae cum *nitrate potassae* praecipua constituunt pharmaca. Horis vespertinis vicissim brachiis, cruribus et suris *leniora epispastica* applicentur. A *vesicatoriis* abstinenceatur oportet. Absente complicatione rheumatica aut arthritica, *epithemata frigida* ³¹⁾ per aliquot horae momenta ³²⁾,

24) Casp. I. §. VI. 9.

25) BURSEMIUS cucurbitulas dorso admotas sine debita ratione reprobat (l. c. §. 127).

26) ARETAEUS l. c. lib. I. cap. IV. AVO. FRID. WALTERIUS diss. de scarificatione occipitis, plurium capitum morborum auxilio. Lips. 1741.

27) THILANIUS *med. chir. Bemerk.* p. 58.

28) AETIUS lib. VI. cap. XXVII. p. 108.

29) Non certe *oleo Crotonis*, ut ABERCROMBIE sugget.

30) ARETAEUS (l. c. cap. IV. p. 82) in apoplexiis fortissima alvi purgantia jam commendavit. Interea haec in recenti morbo aestum argunt, unde serius ad ea confugiendum, praecipue ad *folia sennae*, *radicem jalappae*, *extractum colocynthidis* etc. Semper vero a subitis evscustionibus cavendum, ne viribus illico collapsis aeger pereat.

31) DAUTER diss. de usu aquae frigidae externo topico. Goetting. 1780.

ta ³²⁾, vix unquam autem glacies capiti admo-
 veri potest ³³⁾. Potus esto acidulus et victus tenuis,
 vegetabilis. Proveciori in morbo levamen ex par-
 vis *tartratis stibii et potassae* dosibus obtinuimus.
 Si deglutionis opus deletum fuerit, sub forma
 clysterum idem exhibetur remedium. *Digitalis*
purpurea, quam, ex analogia aliarum haemorrha-
 giarum cum apoplexia, saltem sanguinea, pluries
 adbibuimus, nunquam bonos, aliquoties vero ma-
 los, produxit effectus. Nec *urias hydrargyri*
mitis multum hic praestat. Verbo, quid methodus
 antiphlogistica, inprimis evacuationes cruentae,
 toties (saltem praesente medico, ut vena illico
 claudi possit, si videat vires vitales deficere), re-
 petendae, quoties caput a sanguine obruitur, pul-
 sus plenus est etc., quidque parvae tartratis sti-
 bii et potassae doses non efficiunt, id incassum ab
 aliis expectatur remediis; *elixirio acido Halleri*
 quodammodo excepto, quod praecipue in feminis,
 perstante arteriarum irritatione, vel absolutis eva-
 cuationibus sanguinis, interdum cum magno fru-
 ctu adhibetur. Ceterum et *naturae tempus*, ut
salutares suas operationes peragere possit, conce-
dendum. Hujus praecepti potissimum, si febris
 cum levamine ingruat, memores esse juvabit.

A. rheu-
 matica.

7. *Apoplexiam rheumaticam venae sectioni-*
bus,

32) Cap. I. §. VI. No. 50 (106).

33) QUARIN (l. c.) omni jure monet, frigus capiti ap-
 plicatum in apoplexia paralytin promovere.

bus, hirudinibus, cucurbitulis scarificantibus, epispasticis, eccoproticis, et nitrate potassae veluti inflammatoriam aggredimur. Virtus *tartratis stibii* et *potassae* ibi adhuc major, quam hîc. Nec apoplexia rheumatica *vesicatorium* in leviori malo nuchae, in graviori capiti, non quidem deraso, sed detonsis prius forfice crinibus, appositum, ac non facile ultra octo horas relinquendum, excludit. Vere hujus medendi rationis effectus WEPFERUS ³⁴⁾ depinxit. Quocunque in casu morbus viarum urinalium simul praesto esset, *setaceum* loco vesicatorii apponendum foret. Praeterea *urias hydrargyri mitis*, a GHISIO ³⁵⁾ jam commendatus, praesertim cum *foliis digitalis purpureae*, non spernendus. Etiamsi alvus inde aliquoties moveatur, nil timendum. Absente enim febre, praesertim in corporibus laxis, fortissima purgantia, *hydragoga* dicta, congestiones seri in capite aliquando auferunt. In genere magna similitudo inter curam hujus apoplexiae speciei et eam hydrocephali acuti intercedit.

8. *Apoplexiae gastricae* cura, quoque *venae A. gastricae* sectione e pede, vel saltem *hirudinibus* ad caput inchoatur. Nisi enim prius cerebri plethorae occurratur, *emeticum*, etiamsi indicatum, vel effectum recusat, vel damnum infert ³⁶⁾. Indicatur autem

34) *Observ. medic. pract. de affectionibus capitis.* p. 71. 130. 229. 250. 255.

35) *Lettere mediche. Cremona* 1747.

36) PORTAL l. c. MORGAGNI *epist. anat.* III. No. 4.

autem emeticum ³⁷⁾, ubi crapula apoplexiam proxime antecesserat, ubi annua constitutio morbiliosis favet ³⁸⁾, ubi venenum ingurgitatum est ita solum, ut spontanei vomendi conatus faciliores reddantur ³⁹⁾. Formale enim emeticum periculosissimo in apoplexiis habemus ⁴⁰⁾. E retine tutior usus *antliae stomachicae* ubi apoplexia ex crapula ⁴¹⁾ vel ex veneno deglutito ortum traxit? Si alvus segnis, ad fortiora purgativa, e. c. ad *infusum foliorum cassiae sennaelectuarium lenitivum* cum radice *convolvuli jilappae*, deveniendum est.

A. arthritica.

9. *Apoplexiae arthriticae* primo impetui *rheumaticae* ⁴²⁾, sanguinis detractionibus, habi

pra

luculentissimis facia hanc animadversionem commovit.

37) *Apoplexiae emeticorum* ope sanatae exempla referuntur in *Commerc. liter. Norimb.* a. 1739. p. 366. et NICOLAI diss. in *direct. vasor.* in HALLERI diss. aetom. T. II.

38) LANCISI l. c. lib. II. cap. V. §. 13. GRANT *von d Flebern. A. d. Engl.* 1776. p. 446. MOLL l. c. p. 20

39) *Grana duobna tartari emetici* ad libram aquae distillatae, exhibendo quarta horae parte unciam unam Cfr. C. A. MEYER de eximia *ippecacuanhae* nec non aliorum quorundam emeticorum refracta dosi exhibitionum usu. Goett. 1780.

40) BURNESIUS l. c. §. 131. rationes pulchre enucleavit

41) *Use of the stomach pump, in cases of repletion causing symptoms of apoplexy* (*The family oracle health.* 1827. No. 52. p. 117).

42) v. No. 7.

praesertim respectu ad vitium haemorrhoidale, occurrendum. Simul *pediluvia acria* ⁴³⁾ repetitis vicibus in usum ducenda. Quo facto alvi libertati ac evacuationi flatuum, si febris desit, cum *infusione radiceis rhei palmati et aqua destillata seminum sive pimpinellae anisi, sive anethi foeniculi, aliàs sulphate sodae cum infuso tenui seminum anisi stellati*, non neglectis *clysteribus* ⁴⁴⁾ studendum. Praemissis sic sanguinis et alvi debitis evacuationibus, ac sollicitata, si opus fuerit, ea lotii ope decocti *radicis ononidis spinosae*, impetum crurioris caput versum, ac virium, praesertim in senibus, decrementum impedire, ac simul transpirationis opus restituere solent *nitratis potassae cum exigua camphorae* ⁴⁵⁾, vel si facies nimis accensa camphorae usum impediret, *hydrosulphureti antimonii aurantiaci* ⁴⁶⁾ dosi. FR. HOFFMANNO hac circiter sub rerum positione formula ⁴⁷⁾,

43) Cum sinapi, cineribus etc.

44) R. Herbarum salviae, majoranae, seminum cumini, salis communis aa unciam semis. Infundatur c. s. q. aquae fontis fervidae ad colaturam unciarum novem. Cui adde olei cocti chamomillae unciam unam D. pro duobus clysteribus.

45) R. Nitratis potassae, sacchari aa drachmam unam. Camphorae granum unum. Divide in vj. p. ac. cap. bis de die pulverem unum.

46) R. Nitri puri, sacchari aa drachmas duas, sulphuris aurati antimonii grana sex, m. divid. in sex p. aequal. cap. dosin ad noctem.

la 47), a nobis modificata 48), pluries cum fructu adhibita, in usu erat. Descrescentibus adhuc viribus, *infusum florum arnicæ montanæ, seminumque coriandri sativi et gummi resina quajaci officinalis* praescribuntur. *Victus* simul, praesertim in hominibus laute vivere aduetis, ratio haberi debet. *Juseula* vicissim ex pedibus *vitulinis, gallinis, piscibus, ranis, testudinibus, avibus sylvaticis*, inprimis *tetraone bonasia*, cum herba *scandicis chaerifolii, rumicis acetosæ, butyro cancrorum fluviatilium, succo boleti esculenti, vitello ovorum, oryza*, ceterum sine *aromatibus*, nisi in aegro minime plethorico ac viribus digestionis fracto, quo in casu *amomum zingiber* exhiberi potest, maxime commendanda sunt. Hoc ultimo in casu aliquando tenue *cofeæ Arabicæ* leniter tostæ *infusum* concedendum. *Liquoribus fermentatis*, nisi forte vino cuidam tenui, albo, diuretico, nunquam locus est. Quæ singula artis adminicula effecta destituerentur, nisi superficiei externæ passim varia *irritamenta* admoventur, *fRICTIO* extremitatum inferiorum cum pannis laneis, *epispastica* ad suras plantasve pedum, *vesicatorium* inter scapulas, *illinitio tincturae cantharidum* ad
loca

47) l. c. §. VII.

48) R. Aquæ florum tiliæ uncias sex, succinatis ammoniac empyreumaticæ scrupulos duos, lapidum cancrorum, cinnabaris 2â drachmam semis, syrupi corticum aurantiorum drachmas duas. M. D. S. Bis de die unciam, vase prius concusso.

loca impetigine quondam detenta etc. Stupendos interea effectus nonnisi ex *fonticulis amplis* basi cranii admotis obtinuimus. Setacea, a LANCISIO ⁴⁹⁾ et DE LA MOTTE ⁵⁰⁾ commendata, iis anteponuntur a SWIETENIO ⁵¹⁾.

10. Sub paroxysmo *febris intermittens apoplecticae* venam tundimus, aut saltem hirudines capiti admovemus. Opium, alias in febribus perniciosis lethargicis indicatum, hic exhibere non audemus. Quo primum autem apyrexia incipit, praemisso *emetico*, ad *corticem cinchonae officinalis* pervenimus ⁵²⁾. A. periodica.

11. In *apoplexia scorbutica* curanda magis effectus morbi, quam morbus ipse, aggrediendus. Agitur nempe ante omnia de auferendo, si dicere liceat, *ecchymomate encephali*. Ad quem scopum consequendum hirudines capiti, ac, si morbus ex epistaxi praepostere cohibita originem duxerit, internae narium superficiei, applicandae. — frons, cervix, in morbo recenti cum solutione *muriatis ammoniae, nitratis potassae, muriate sodae et aceto*, in antiquiore cum herbis aromaticis in vino decoctis, fovendae, — alvus pulpa *amlycae Indicae* et *supertartrate potassae* leniter movenda, — dein infusum *florum arnicae montanae*, aut quod hic anteponimus, *decoctum seminum sinapis nigrae* ⁵³⁾. A. scorbutica,

49) l. c. p. 116. 50) l. c. obs. 9. 51) l. c. §. 1025.

52) Edit. 2. P. I. Vol. I. sect. I. cap. II. §. XXX. No.

14 — 20.

grae 3) porrigendum, — non neglectis sub virium decremento vino albo cum succo citri medicae et saccharo ac reliquo regimine antiscorbutico. Quodsi ulcus incaute sanatum morbo plus minus ansam porrexerit, id sive vesicatorio, sive alio modo aperiendum foret.

A. apasmodica.

12. Nisi *apoplexia spasmodica* evidenter ex inanitione ortum ducat, curatur primum *evacuationibus sanguinis, saltem localibus*⁵³). Quo facto, ventriculo ope *tartratis stibii et potassae* in aqua aromatica soluti, irritatio, citra tamen vomitum, inferitur, eo casu excepto, ubi morbus ex *spasmodica* tubi alimentaris affectione pullularet: tunc enim *demulcentia* potius et *oleosa* indicata essent. In genere abdomini fomentum tepidum, aromaticum imponitur; irritatis simul extremitatibus, praesertim inferioribus, per frictiones cum pennis lanceis calidis, aceto sive vino imbutis.

Prae-

53) Uncia semis ad colaturam librae unius.

54) Venae sectionem apud senes, pallidos et graciles, in apoplexiis, non nisi cautissime locum habere, praecautibus LE CAT, WEICKARD II. cc. jure monet VISUAREUX (*de la saignée et de son usage dans la plus part des maladies. Paris 1815*). Similia docent J. A. SCHOMBURG (diss. de venesectione in apoplexia. Goetting. 1783) et JAC. SCHAEFFER (*die Zeit- und Volkskrankheiten des Jahrs 1815. in HUFELAND's Journ. der pr. Heilk. 1816. May. p. 7*), qui praeterea ultimus monet, pulsum magnum et intermittentem, utpote summae debilitatis indicium, sanguinia evacuationem non indicare.

Praemisso clystere ordinario, sine temporis jactura, *gummi resina ferulae assae foetidae* non solum ano repetitis vicibus injicitur, sed et ori sub forma emulsionis⁵⁵⁾ exhibetur⁵⁶⁾. Complent illius virtutem *subcarbonas ammoniae empyreumaticus*⁵⁷⁾,
balsa-

55) R. *Assae foetidae* drachmam semis, mucilaginis gummi arabici, syrupi simplicis aa unciam unam, fiat cum libra aquae l. a. *emulsio*.

56) Mense Julio 1815 ad matronam Vilsnensem 48 annorum vocatus sum, quae post quatuor lustrorum et ultra sterilitatem nunc iterum sub partus opere constituta erat. Obstetricantis vicibus fungebatur egregius quondam *Niskowski*. Omnibus ad partum naturalem feliciter dispositis dirae convulsiones, subsequente statu plane apoplectico, prodibant. Laudatus vir illico amplam venae sectionem instituit, at sine levamine. Me interea adventante, cum novae convulsiones in conspectum venirent, infans, illico foreipibus extrahitur, asphycticus, at summo labore vitae activae feliciter restitutus. Puerpera excluso foetu ex sopore in delirium incidit, quod post dimidium horae iterum lethargus cum facie hippocratica, respiratione lenta, sonora, extremitatibus superioribus gelidis, elevatis proprio pondere concidentibus, pulsu frequenti, myuro, irregulari, sequebatur. Injiciuntur clystera ex assa foetida, exhibetur ipsa gummi-resina sub forma emulsionis, epispastica acriora suris applicantur, extremitates spiritibus acrioribus perfricantur, atque sic aegra, cum stupore adstantium, spatio nyctithemeri ex orci faucibus trahitur.

57) R. *Salis cornu cervi* graua decem. *Aquae chamomillae* unciam semis. *Syrupi ejusdem* drachmas duas. M. cap. talem dosiu omni secunda sive tertia hora.

balsamus vitae Hoffmanni ⁵⁸⁾, nec non *castoreu* *Pallida facie odoramenta* ⁵⁹⁾, *apophlegmatismos* ⁶⁰⁾ *balsamos temporibus admotos* ⁶¹⁾, *clysteres acres* *et vesicatorium ad nucham* non timemus: con-
vero sternutatoria ⁶²⁾. Fortiora irritantia, ut *a*
ustionem ⁶³⁾, hic minus idonea censemus. Quo
vitae imminens periculum fugatum sit, in *cas*
sam spasm, apoplexiam producentis, inquire-
dum, eaque secundum regulas alibi exponen-
abigenda est.

A. com-
plicata.

13. Regulas *apoplexiae complicatae* medei
meditatio circa dicta sponte suggerit. Solum a-
mo retinendum est, apoplexiam pluries recrui-
scentem non semper eundem retinere characterem
Filum curae apoplexiae in genere, quod hic co-
sulto rumpimus, in tractatu de *paralysi* iterum
recipiemus.

CAT

58) SCHAEFFER l. c.

59) Cap. I. §. VI. 45. Acetum acerrimum cum castoreo
praecipue in usu est.

60) Cap. I. §. VI. 44.

61) A veteribus *balsami* sic dicti *apoplectici* saepius pro-
scribebantur. En simplicissimam formulam. R. *Castorei*
expressi *nucis moschatae* *unciam semis*. *Oleorum*
essentiarum *rosmarini*, *majoranae*, *succini* *3ā* *gr.*
duodecim. M. D. *balsamus* pro suffitu sub naribus
circa tempora affricandus.

62) R. *Pulver. colocynthidis* *drachmam semis*. *Essentiae*
amaris *uncias duas*. In *unciis decem* *aquae decoctae*
S. pro *clymate*.

63) BÜCHNER de cauto usu sternutator. in apoplexia. 1

64) LANCISI l. c. cap. V. §. 12.

CAPUT VI.

Cataphora.

§. XXX.

*Definitio. Literatura. Varii gradus.
Divisio.*

1. **S**omnus, vi aut diuturnitate normam ex- Definitio.
cedens, *cataphoram* *) constituit.

2. Affectus soporosi illustrati fuere: ab HIP- Litera-
tura.
POCRATE ²⁾, ARISTOTELE ³⁾, GALENO ⁴⁾, CELSO ⁵⁾,
CAELIO AURELIANO ⁶⁾, PAULO AEGINETA ⁷⁾, ALE-
XANDRO TRALLIANO ⁸⁾, ORIBASIO ⁹⁾, AVICENNA ¹⁰⁾,
AMATO LUSITANO ¹¹⁾, ZACUTO LUSITANO ¹²⁾, AR-
GENTERIO ¹³⁾, BONETO ¹⁴⁾, BALLONIO ¹⁵⁾, RIVE-
RIO ¹⁶⁾,
C c 2

1) Καταφορά a καταφέρω, deorsum fero. Propensitas ad
somnia morbosae. GERM. *Schlafsucht*. GALL. *As-
sompissement, lethargie*. ANGEL. *Lethargy*. POLON.
Spiączka. RUSSIC. Сонная немочь.

2) Praenot. Coso, sect. II. lib. II. de morbis sect. V. 63.

3) Lib. de somno et vigiliis.

4) Liber de comate. cap. II. CHARTER. T. VII. p. 195.

5) Lib. III. cap. 20.

6) De morb. acut. lib. II. c. I. 7) Lib. III. c. 9. 10.

8) Lib. I. c. 20. 9) Synops. lib. VIII. c. 1.

10) Canon. lib. III. Fen I. Tract. 3. cap. 7. Tract. 4.
cap. 1.

11) Curat. med. cent. II. hist. 15.

12) Prax. med. admirand. lib. I.

13) De somno et vigil. lib. I. c. 19. p. 178. Florent. 1556.

RIO ¹⁶⁾, PLATERO ¹⁷⁾, FORESTO ¹⁸⁾, ROLFINKIO ¹⁹⁾, WEDELIO ²⁰⁾, EBERSBACHIO ²¹⁾, ETTMÜLLERO ²²⁾, MOORIO ²³⁾, FR. HOFFMANNO ²⁴⁾, STIEFFIO ²⁵⁾, VATERO ²⁶⁾, BRENDelio ²⁷⁾, G. G. RICHTERO ²⁸⁾, H. B. SCHINDLERO *) aliisque ²⁹⁾.

Varii gra-
dus.

3. Cataphora, pro vario ejus gradu, varia obtinuit nomina. Est *coma* ³⁰⁾ — ubi sopor altus, in quem aeger, etsi quovis modo excitetur et evigilet, tamen mox iterum illabatur: est *coma vigil* ³¹⁾

14) Sépulchr. lib. 1.

15) Consult. lib. I. cons. 45. lib. III. cons. 32.

16) Prax. med. lib. I. c. 2. 17) Prax. med. T. I. c. 2.

18) Lib. X. obs. 8. 9. 10. 11. 33. 34. 37. 38. 40.

19) Diss. de apoplexia, sopore ejusque cognato lethargo. Jen. 1630. Diss. de lethargo. J. 1629. 1652.

20) Diss. de affect. soporos. et catalepsi ex epitom. Prax. clin. Diss. de somno praeternaturali. Jen. 1656.

21) Diss. de somno excedente. Erford. 1707.

22) Diss. de vit. circa somnum vigilisque. Lips. 1720.

23) Pathologia cerebri. cap. VII. de affect. soporos.

24) Opp. Pars quarta, cap. II, de affect. soporosis.

25) De morbis ex somno. Lips. 1743.

26) Diss. de affectibus soporosis.

27) Diss. de affectibus soporosis. Goett. 1747. Opp. Vol. II. p. 103. Idem: de lethargo. ibid. Vol. III. p. 23.

28) Prolusio de salutari somni mensura et tempore, in opusc. med. p. 233.

*) Die idiopathische, chron. Schlafsucht, beschrieb. und durch Krankheitsfälle erläutert. Hirschb. 1829.

29) Vide §. sequent.

30) Coma simpliciter somnum apud poetas aliosque nonnullos auctores significare constat ex GALENO l. c.

vigil ³¹⁾ — ubi aeger oculis clausis cum summa ad somnum propensitate instar dormientis jacet, etsi dormire non possit: est *carus* ³²⁾ — ubi sopor profundus, ne fortiori quidem clamore discutiendus, cum privatione sensus et motus completa: estque *lethargus* ³³⁾ — ubi somnolentia constans, cum febre et delirio oblivioso, ac torpore ad motum.

4. Cataphoram in *symptomaticam* et *primariam* dividimus.

§. XXXI.

De cataphora symptomatica.

1. *Cataphora*, aliorum morborum symptoma, *symptomatica* dicitur. Definitio.

2. Observationes de affectibus soporosis perlegendibus nosse juvabit, maximam partem morborum sub nominibus *comatis*, *eari* et *lethargi* obvenientium, nil aliud, quam *febres* tum *internittentes*, tum *continuas*, *exanthemata*, *encephalitides*, *hydrocephalos*, *apoplexias* et *urinae difficultates*, quorum potissimum symptoma *cataphora* sistebat, fuisse. Monitum.

3. Fe-

31) *Κῶμα ἀγρυπνῶδες* HIPPOCRATIS. Typhomania, seu sopor apparet cum agrypnia.

32) *Κάρος*, CARUS, GALENO idem morbus est ac aphonia HIPPOCRATIS.

33) *Λιθάργος*, a *Lethe* tanquam flumen apud inferos omnium rerum oblivionem inducens, LATINIS VERNUS.

C. febr.
intermitt.
sympto.
ma.

3. *Febres intermittentes comatosae, caroticae, lethargicae*, a FR. HOFFMANNO ¹⁾, FR. TORTIO ²⁾, HALLERO ³⁾, SIGWARTO ⁴⁾, WERLHOFIO ⁵⁾, BÜCHNERO ⁶⁾, STRACKIO ⁷⁾, C. MEDICO ⁸⁾, LAFONDIO ⁹⁾, BURSERIO ¹⁰⁾, SEBASTIANO ¹¹⁾, PUCCINOTTI ¹²⁾ etc. ¹³⁾ descriptae, typum plerumque tertianae sequuntur, et in locis uliginosis epidemice regnant. Sopor incidit tam in initio, quam in augmento accessionis, atque cum eadem increscit, donec remittente ea, paulatim ipse discutitur. Non evanescit tamen ex toto, cum etiam intermissionis tempore aliqua in somnum propensio remaneat. Febres, de quibus agitur, obveniunt praesertim in infantibus ¹⁴⁾ et senibus. De earum cum

1) l. c. enarrationes morborum. Obs. 1.

2) Therapeutica specialis ad febres periodicas perniciosas.

3) Diss. observat. med. pract. Goett. 1750.

4) Diss. de febre tertiana soporosa ut plurimum funesta. Tab. 1759.

5) Opp. omn.

6) Diss. de febre tert. interm. epidem. soporosa, apoplexiam mentiente, ut plur. funesta, juxta tamen methodo feliciter curanda. Hal. 1763.

7) Observ. med. de febr. interm.

8) *Geschichte der period. Krankheit.*

9) De febribus interm. soporosis. Nancel 1783.

10) Institut. med. pract. Vol. I. §. 169—190.

11) *Ueber die Sumpfwescheleieber.* Karlsruhe 1815.

12) *Storia delle febbri di Roma.*

13) Cfr. Edit. sec. P. I. Vol. I. sect. I. c. II. §. XXI. No. 3.

14) GERM. *Das Todtenfieber.* v. HOFFENGAERTNER über die Hirnwassersucht.

cum encephalitiide affinitate jam actum est¹⁵⁾. A febre intermittente apoplectica¹⁶⁾, in quam facile transeunt, ob defectum symptomatum paralyticorum distinguuntur. Febris intermittens cum cataphora, saepe complicationem inflammatoriam, gastricam, tum biliosam, tum verminosam, prae se fert. Magno ea stipatur periculo. Sanati licet, facile relabuntur, et a praecipiti apoplexia pereunt, nisi lenta febre consumantur. Sub paroxysmo, si aeger fuerit plethoricus, *hirudines* ad caput, *cucurbitulae scarificantes* ad dorsum, *clysteres* cum *aceto* et *epispastica* ad *suras* adhibenda sunt: alias *vesicatorium nuchae*¹⁷⁾ applicatur. In summo vitae periculo aliquoties ad *opium*, consilio WISTENSONNI¹⁸⁾ et S. G. VOGELII¹⁹⁾ utiliter confugimus. Accedente apyrexia, praemisso *emetico*, hic fere semper indicato²⁰⁾, quo citius id fieri potest, ad *corticem cinchonae*²¹⁾ pervenitur.

4. Ca-

15) Cap. III. §. XV. 3. 16) Cap. V. §. XXVII. 10.

17) WOLF *Abhandl. v. d. Nutzen d. spanischen Fliegen-Pflaster in soporös. Wechselfiebern.* Altona 1785.

18) Diss. demonstrans opium vires fibrarum cordis debilitare. Monast. 1775.

19) *Handbuch.* 1. Th. p. 159.

20) FR. HOFFMANN l. c. SEBASTIANI l. c. s. c. ex drschma semis radicis ipecacuanhae pro adulto.

21) Secund. edit. P. I. Vol. I. sect. I. cap. II. §. XXX.

14. KEX de egregio cort. peruv. effectu in febribus soporosis. Argentor. 1782. RAHN in *Abhandl. der naturforsch. Gesellsch. in Zürich.* 1. B. p. 180.

C. febr.
continuar.
sympto-
ma.

4. Cataphora in *febris continuis*, praecipue *verminosis* ²²⁾, obvenire solet. Mali ea ominis est: in principio morbi, post urinam ante debitum tempus criseos notas exhibentem, cum sensu horroris vel caloris interni, respiratione brevi, vocis jactura pulsuque parvo ²³⁾. Bona est: ad finem morborum, post evacuationes criticas, post vigilias, post sitim, si delirium sopiat, si noctu vel mane ²⁴⁾, non autem post meridiem incidat, sique pulsu elevato, frequentia decrescente, respiratione profunda, decubitu sano et leni transpiratione stipetur. Morbi post cataphoram recedentis signum est, dum aeger incongruum aliquod atque absurdum sive cibi sive potus genus importune flagitat ²⁵⁾. Methodus medendi morbo primario accommodanda. Cavendum ne sub cataphorae curriculo *decubitus* ²⁶⁾ et *ischuria* praetervideantur.

C. in mor-
bis exanth.
sympt.

5. De cataphora comite *erysipelatis* ²⁷⁾, *scarlati-*

22) *Caras verminosis* SAUVAGESII. O. c. Vol. III. Class. VI. XXIX. 7.

23) HIPPOCR. COAC. §. 2. Epid. III. §. 3. GALEN (l. c. KLEIN interpret. clin. PEROLD progn. c. 4. §. 94. GRUNER semiot. P. I. §. 399. SPRENGEL Handb. der Semiot. §. 661—690.

24) HIPPOCR. progn. §. 9. COAC. §. 3.

25) SYDENHAMUS opp. sect. V. esp. 2. p. 278. Cfr. esp. nostr. V. §. XXVIII. 3.

26) SWIETEN comment. §. 705.

27) Edit. secund. P. I. Vol. I. sect. II. esp. XI. §. LX. Nö. 3. Cfr. FR. HOFFMANN l. c. obs. 3. 7.

latinae ²⁸⁾, *morbillosum* ²⁹⁾, *variolarum* ³⁰⁾ et *plicae* ³¹⁾, quod de sopore febrium continuarum diximus valet. Pessimum, si cataphora fugam praeposteram efflorescentiae cutaneae subsequatur.

6. Antequam *encephalitis lethargica* rite innotuerat, ea pluries cataphora salutabatur ³²⁾. Invasio, praeviis scilicet febre, cephalaea aut delirio, illam satis a cataphora primaria distinguit.

C. encephalit. sympt.

7. Sectiones cadaverum, ut ajebant, ex comate aut lethargo defunctorum, quorum in cranio *collectio serosa* ³³⁾, vel *hydatides* ³⁴⁾ detectae sunt, de confusione hujusmodi malorum cum hydroce-

C. hydrocephal. sympt.

28) Edit. secund. P. I. Vol. III. sect. I. cap. I. §. II.

29) Ibid. cap. II. §. VIII. 30) Ibid. cap. IV. §. XVIII.

31) Edit. secund. P. I. Vol. III. sect. II. cap. XXII. §. LXXI. No. 2.

32) BANG Act. S. R. Hafn. Vol. III. p. 127. SWERTEN I. c. p. 702. Ait nempe: „adeoque patet, diversam omnino esse indolem lethargi ab inflammatoria phrenitide.“

33) BONET lib. I. sect. II. opp. obs. 3. LA MOTTE op. c. lib. I. cap. IV. obs. 10. SCHNEIDER de affect. squorosis. p. 24. DUVERNEY in *hist. de l'ac. des sciences*. A. 1683. SEDILLOT in *recueil périod.* Vol. I. ZIEGLER *Beobachtungen*. p. 43. FAXE in *Läkaren och naturforskaren*. 12. B. V. RUDOLPHI *Schwed. Annal.* 1. B. p. 61. CHOMEL ex *clinique de la charité* in HORN'S *Archiv für med. Erfahrung*. 1828. Sept. Octobr. p. 899 (Agitur de hydrocephalo accessorio).

34) *Journ. général des hôpit. civils et milit.* No. 66. (Cysticercous cellulosus).

drocephalo abunde testantur. Ad eam evitandam initii et decursus morbi ratio haberi debet.

C. apoplex. sympt.

8. Cadaverum sectiones post morbos, pro cataphora declaratos ³⁵⁾, *apoplexiam* saepe cum illa confusam fuisse, docent. Apoplexia, non cataphora, proclamabitur, si respiratio stertorosa et paralysis adsint et mentis imbecillitas relinquatur ³⁶⁾.

C. difficultat. urinae sympt.

9. De cataphora, *difficultatum urinae* symptomate ³⁷⁾, alio agemus loco ³⁸⁾. Interea videantur BONET ³⁹⁾, VELSCH ⁴⁰⁾, TULPIUS ⁴¹⁾.

§. XXXII.

De cataphora primaria.

Definitio. 1. *Cataphora* morbum per se constituens, aut saltem ut unicus reconditae aegritudinis effectus comparens, *primaria* dicitur.

Exempla. 2. Fasti medici, ne dicamus de aliis ¹⁾, exempla somni dierum viginti quatuor ²⁾, triginta ³⁾,

35) BONET l. c. obs. 18. 23. BANO l. c. Vol. I. LE DRAN *observations de chirurgie*.

36) Est enim ipsa haec mentis imbecillitas, rite monente ROCHOUX, certissimum praegressae apoplexiae indicium.

37) *Carus ischuriosus, Coma ex ischuria* auctorum.

38) P. IV. Vol. I. sect. II. 39) Op. c. obs. 15.

40) Obs. 1 et 64. 41) Lib. II. obs. 15.

1) Sic historia ecclesiastica NICEPHORI (lib. XIV. c. 45), de somno non minus quam per 337 annos durante narrat.

2) G. SCHUSTER *med. Journ. Chemnitz* 1767. 2. Th. p. 182. *Med. Bedenken über zwei miserable Schwestern*,

ta³⁾, quadraginta⁴⁾, quadraginta septem⁵⁾, quadraginta novem⁶⁾, mensium duorum⁷⁾, quatuor⁸⁾, sex⁹⁾, duodeviginti¹⁰⁾, annorum quatuor
et

deren eine sich etlichemal im Walde verirrt, u. zu sechs u. vierundzwanzig Tage darinnen ohne Essen u. Trinken geschlafen. Cfr. FRONIEP Notizen aus dem Gebiete der Natur- und Heilk. B. 26. No. 21. p. 335.

3) JAMES ARROT in *Edinburgh medical and surgical journal*. 1818. Octob. Aegra, Margaret Lyae, vulgo, the sleeping girl from Montrose nuncupatur.

4) PLOT *natural history of Staffordshire*.

5) WENDELSTADT *Wahrnehmungen*. 1. B. p. 167. et HUFELAND's *Journ. der pr. Heilk.* 4. B. 3. St. p. 52.

6) BANO l. c. Vol. II. No. 17. De cataphora inconsumtae durationis cfr. RIEDLIN millenarius, No. 871.

7) MICHEL in *Journal de médecine T. II.* p. 109.

8) *Mémoires de l'ac. des sciences. à Paris* 1713. p. 419.

9) STOLL *praelect. in morb. chron.* Vol. I. p. 351.

Exemplum refert literis ab HOMBERGIO a 1707. Academiae Parisiensi communicatum. In *Journ. de méd., chir. et pharm.* 1754. Octobre. epistola Dr. BURETTE invenitur, quae de viro 50 annorum, sub nomine *le dormeur de la charité* noto, cujus somnus, per dimidium anni durans, neque per immersionem in aquam frigidam fugari potuerat, testatur. Vix minoris durationis erat somnus, de quo legitur in *philos. transact.* No. 304. p. 2177. *Abrid. T. 5.* p. 355. Cfr. SWIXTEN op. c. T. III. §. 1049. „Nec persuaderi sibi passus est (aeger), quod longam adeo noctem dormivisset, nisi postquam vidit messem adesse maturae segetis, probe memor, se sementis tempore obdormivisse.“

10) J. R. BISCHOFF *Darstellung der Heilungsmethode in der med. Klinik an der k. k. Joseph's - Academie in den*

et ultra ¹¹⁾, aliquando periodici ¹²⁾, alias continui ¹³⁾, continent.

3. Ad

Jahren 1826—27. Wien 1829. p. 263. Ipse aegrotum, de quo hic scribitur, Vindobonae die 9. Decembris 1824. vidi. Hominis placide obdormientis exhibebat adspectum. Sublevatis palpebris oculi fixi, cum pupillis normalibus, conspiciebantur. Superiores illae sibi dein ipsis relictas oculos rursus cooperiebant. Continuus observabatur trismus. Aeger dumtaxat jacula, quae per laenam a dente amisso relictam injiciebantur, haurire poterat. Respiratio erat expedita. Pulsus ad 62 ietus in sexagesima horae parte micabat. Urina aliquoties de die sponte effluebat. Alvus non nisi clysteris ope evacuabatur. Brachia elevata, proprio dein pondere cadebant. Nullo plane modo aeger e somno excitari poterat.

11) FR. MÜLLER *aktenmässiger Bericht einer höchst merkwürdigen Schlafsucht, welche vier Jahre, drei Monate, sechzehn Tage angehalten hat.* In HUYSLAND's *Journal f. d. pr. Heilk.* 1829. Febr. p. 1. H. BAUNO SCHINDLER *die idiopathische chronische Schlafsucht beschrieben und durch Krankheitsfälle erläutert.* Hirschberg 1829.

12) RIEDLIN cent. I. obs. 40—46. *Samml. med. Wahrnehm.* 2. B. 104. J. P. FRANK interpret. clin. obs. 69. In *Med. observat. and inquiries by a soc. of phys. in Lond. Vol. I.* casus invenitur feminae, quae per octodecim annorum curriculum, quotidie septemdecim vel octodecim horas in nycthemero dormiebat. Somnus adeo profundus erat, ut aegram excitare plane impossibile esset. Ingruebat iste somnus circa horam 2 aut 3 matutinam, unde misera vix unquam diurna fruebatur luce. Quo tempore febre intermit-

3. Ad causas tanti phaenomeni, vel minori CAUSSAC.
in

tante ea laborabat, cataphora in agrypniam mutata est. Casus sat similis in *Journal de méd., chir. et pharm.* 1755. *Janvier* continetur, feminae scilicet annorum 50, sub nomine *la Marmotte de la Flandre* notae, quae mane in somnum incidebat usque ad vesperras durantem. Nullo pacto ipsa excitari potuerat. In *Journ. de méd., chir. et pharm.* de Mr. Roux. T. XXII. *Paris* 1766. Mens. Febr. et in *Comment. de reb. in sc. nat. et med. gestis.* Vol. XVI. P. I. p. 73. De LA PLAIGNE sequentem narrat historiam. Virgo vicenaria in somnum incidere solebat, e quo constanter septimo die sponte evigilabat, vestes inducbat, edebat atque a domicilio suo ibat in templum, indeque reversa, rursus somno per septem dies continuante capiebatur. Semel tantum somnus quindecim dies duraverat, a quo nec unctione pedum excitari potuerat. Sudore tantum viscido inter somnum perfundebatur. Reliquae autem excretiones solum, dum expurgata erat, succedebant. Menstrua omni tempore et sub ipso somno redibant. Scena haec per triennium perseveravit. FORMEY (*Versuch einer Würdigung des Pulses.* Berlin 1823. p. 95) ait: „*Frau Präsidentin J... schlief fast alle Jahre mehrere Monate hinter einander, erwachte auf wenige Minuten, etwa einen Tag um den andern, erhielt dann Nahrungsmittel und leerte Urin und Darmkoth aus. Wurde dieser Augenblick veräußt, so schlief sie ohne Nahrung und Ausleerung wiederum auf die gewöhnliche Zeit ein. Ihr Puls war langsam und voll. Sie starb in diesem Zustande völlig abgezehrt, aber während des momentanen Wachens, völlig besonnen.*“

13) F. PLAZA lib. I. obs. de viro admodum obeso lo-

in gradu obvenientis, spectant: frigus et suppressa transpiratio ¹⁴⁾, balnea calida ¹⁵⁾, insolatio ¹⁶⁾, vigiliae et defatigatio ¹⁷⁾, vinum et alcohol ¹⁸⁾, nimius lactis, lacticiniorum ut et fructuum horariorum usus ¹⁹⁾, odores fortes ²⁰⁾, fumus carbonum ²¹⁾,

quitur, continuo ad somnum adeo propenso, ut inter loquendum, vel etiam comedendum, cibos vel poculum ori admovent statim obdormiret, in eoque situ, quo tum erat, permaneret. *De somno obsorum* vide etiam RICHTER l. c. p. 245. Cfr. JAC. BREWSTER in *transactions of the R. society of Edinburgh. Vol. 8. 1817.*

14) MARCHEAL DE ROUVERES epist. I. 116. WENDELSTADT l. c. p. 56.

15) Sic praecipue apud Turcas Persasque, nec non Ceylonenses. v. EBERBACH l. c. p. 9.

16) MORGAGNI op. c. epist. V. 13. ex ALBERTINO. Hic encephalitidem non semper latere docet observatio SAUVAGESII (l. c. 12) dicentis: „secto capite nil laesi inveni.“

17) Juvenem novi, qui cum Bacchanalium Italicarum tempore plurimas noctes inter choreas transegiasset, adventante quadragesima, a die Mercurii cinerum ad proximam usque dominicam continuo fere dormivit. Similia post itinera, celeriter et indefessae absoluta, contingere solent. Cfr. FONTANUS obs. rar. analect. SALMUTH cent. III. obs. 66. PLATER obs.

18) Cataphoram ex ebrietate a cremato ad quatuor dies protractam vidi. Lectu dignus hic est casus HERRI (Obs. med. lib. I. obs. 19. p. 178), quem et SWIZZEN (l. c. §. 1045) refert. Ebria nutrice infans saepe a sopore corripitur.

19) TIMAEUS a GULDENKLEE cas. med. No. IX.

num ²¹⁾, ira ²²⁾, terror ²³⁾, moeror ²⁴⁾, papaver
 somniferum ²⁵⁾, nicotiana tabacum ²⁶⁾, atropa
 belladonna ²⁷⁾, crocus ²⁸⁾, plumbago europaea ²⁹⁾,
 nux moschata ³⁰⁾, nuces juglandes ³¹⁾, umbra
 nucis arboris ³²⁾, inanitio ³³⁾, cruciatus tortu-
 rae ³⁴⁾,

20) PELAROUS *med. Jahrgänge*. 1. B. p. 174 (a lillio). —
 FABR. HILDANUS cent. V. obs. 85 (a decubitu in
 foeno recenti).

21) Hæc a causa cataphora, apoplexia et asphyxia, sese
 excipientes, succedere solent.

22) PELAROUS l. c. 2. B. p. 429. GALLOT in *Journal*
de méd. T. XLIV. p. 230. SWIETEN l. c. §. 1049.

23) FR. HOFMANN l. c. obs. 4. *Berliner Sammlungen*.
 1. B. p. 473. BISCHOFF l. c. MÜLLER l. c.

24) BURETTE l. c. Pluries somnum adeo profundum
 apud relictos a defunctis vidi, ut obdormientes neque
 centu funerali excitarentur.

25) BONET op. c. lib. I. sect. III. app. 2. SENNERT de
 caro. cap. 31. Et quidem non solum ab opio ore in-
 gesto, sed et per clysteres injecto (SALMUTH obs.
 97), vel pectori illinito (BOUILLIET apud SAUVAGES
 l. c. 14).

26) *Ephem. nat. cur.* dec. II. an. X. obs. 131.

27) JOSEPH FRANK *Handbuch der Toxicologia*. 2. Aufl.

28) BORELLUS c. IV. obs. 35.

29) SAUVAGES l. c. 10. Cæcus a plumbagine morbus est
 insectorum, colorem paleaceum flavum parantium.

30) Ex LOBELIO narrat LANGE (*Opp. med.* P. I. p. 403)
 de gravida a duodecim nucibus moschatis in soporem
 conjecta.

31) SIM. PAUL. *quadripart. botan.* p. 97.

32) PLUTARCH. III. *Sympos. Problem.* I.

rae ³⁴⁾, vermes ³⁵⁾, vulnera ³⁶⁾, suppressio menstruorum ³⁷⁾ et ptyalismus ³⁸⁾, graviditas ³⁹⁾, podagra retropulsa ⁴⁰⁾, angustatio carotidum ⁴¹⁾ et hypertrophia plexus solaris nervique intercostalis ⁴²⁾. Interdum caussa cataphorae explorari non potest ⁴³⁾.

Diagnosis. 4. Cataphora primaria distingui debet a *somno simulato* ⁴⁴⁾, a *somniatione*, a *lipothymia* et ab *asphy-*

33) BONET l. c. lib. I. sect. III. obs. 30. Post haemorrhagias, choleram etc.

34) HARTMANN diss. de somno praeternat. Hal. 1686. p. 5.

35) PAULLINI lanc. satur. obs. select. dec. I. obs. I. JOHNSTON idea universal. prax. med. lib. VIII. T. I. cap. VII. art. 3. J. P. FRANK l. c.

36) Ex vulnere fornice supra orbitam in puella facto, quod leve ab initio videbatur, aegra tandem in soporem delapsa est (GOOCH *med. and chir. observ. an appendix to a former publicat. Lond.* 1773. p. 266).

37) MICHEL l. c. *Ephemerid. méd. de Montpellier*. T. 9. p. 7.

38) MACLEOD zwey Fälle von Schlafsucht, die nach der plötzlichen Unterdrückung vom Speichelfluss entstanden. *Ex London medical and physical journal in Horn's Archiv* 1826. Sept. Octobr. p. 337.

39) HINZE in STARK's *Archiv*. 6. B. p. 178. Gravidas spatio nycthemeri octodecim horas dormientes conapexi.

40) FR. HOFFMANN l. c. obs. 6.

41) PORTAL *cours d'anatomie médicale*, 1. Vol. p. 21.

42) BISCHOFF l. c. p. 292 sq.

43) *Philosoph. irantact.* l. c.

44) Plurima exempla refert SWIETEN l. c. p. 1049. Cfr.

asphyxia *). Primo in casu *ammonia pura* naribus supposita ac *ferrum candens* cuti admotum, *secura* sistunt criteria. *Indoles* cataphorae per *causarum* considerationem conjectura saltem attingitur.

5. Cataphora primaria, excepto recidivae periculo 45), feliciter terminari solet apparentibus epistaxi 46), surditate 47), morbis cutaneis 48), parotide 49), metastasi praesertim ad pedes 50). Evanescit aliquando et sponte 51), vel relinquit amnesiam 52), aut praesagit maniam 53), vel phthisin pulmonalem 54).

6. In

KRÜCKELSTEIN *Erfahrungen über die Verstellungskunst in Krankheiten*, Leipz. 1823. p. 28.

*) *Carus a frigore*, quem SAUVAGES (l. c. 15) auctoritate MONTALTI (synopsis) et BORELLII (lethargus ingena, cent. I. obs. 52), nec non exemplum exercitus Gallici aeneo hieme, dum Moscu excederat, Imperialibus retro insequentibus, confirmat, confusioni asphyxiae cum cataphora innititur.

45) *Philos. transact.* l. c. 46) LANCISIUS op. c. p. 100.

47) ZACUT. LUSITANUS op. c. obs. 15.

48) *Act. nat. cur.* Vol. V. obs. 87. PELAROUS op. c. 5. B. p. 77.

49) LE COMTE an parotis unice lethargi vindex. Paris. 1696.

50) *Commerc. literar.* Norimb. 1732. p. 46.

51) SCHENCK lib. I. obs. 3. ex VALERIOLA. MÜLLER l. c.

52) Cfr. cap. XVIII. §. LXXIX. No. 1 (10), ubi stupendam plane morbi historiam, huc spectantem, invenies.

53) Cfr. cap. XXV.

FRANK PRAX. II. I. 1.

D d

Cura.

6. In cataphora ut auxilia (secundum indicationes in tractatu de apoplexia stabilitas usurpanda) commendata fuere: *venae sectio* ⁵⁴⁾, *cucurbitulae scarificantes* ⁵⁵⁾, *sinapismi* ⁵⁶⁾, *vesicatoria* ⁵⁷⁾, *ustio* ⁵⁸⁾, *urticatio* ⁵⁹⁾, *friktiones* ⁶⁰⁾, *odoramenta* ⁶¹⁾, *errhina* ⁶²⁾, *crinium evulsio* ⁶³⁾,
con-

54) „Qui vero ex lethargicis servantur, plerumque pectore suppurati fiunt.“ HIPPOCRATES praenot. Cosc. l. c. Aphorismus iste omnino a BISCHOFFI aegroto confirmatur.

55) ALEX. TRALLIANUS l. c. HARDOUIN ergo lethargicis phlebotomia. Paris. 1599. FESQUET ergo cataphora venesectionem expostulat. Monspel. 1659. VOUEL epist. de comate sanguineo, arter. temporal. sectione sanato. Goett. 1775. Cfr. BEHREND in HUFELAND's Journ. der pr. Heilk. 2. B. 2. St. p. 7.

56) ARETAEUS curat. acut. lib. I. cap. 2. PAUL. AEGINETA l. c.

57) CELSUS, ARETAEUS, PAULUS AEGINETA.

58) Si facies rubra sit, ad femora (PAUL. AEGINETA l. c.), alias ad nucham (SYDENHAM opusc. p. 281), aut ad caput derasum (BONET l. c. app. 8).

59) Ad cervicem (RHODIUS lib. I. obs. 36), retro aures (ZACUTUS LUSITANUS prax. histor. lib. VII. obs. 4).

60) ARETAEUS l. c. SELTI in BRUNATELLI *biblioteca fisica*, T. 2.

61) CAEL. AURELIAN. l. c. praesertim secundum longitudinem spinæ vertebralis, cui utiliter et emplastrum irritans applicui.

62) ASOLEPIADES apud CAEL. AURELIAN. l. c.

63) ALEX. TRALLIAN. PAUL. AEGINETA.

64) PAUL. AEGINETA l. c.

concussio ⁶⁵⁾, *perfusio corporis aqua frigida* ⁶⁶⁾, *illius in cavum oris instillatio* ⁶⁷⁾, *embrocatio* ⁶⁸⁾, *clysteres* ⁶⁹⁾, *purgantia* ⁷⁰⁾, *emetica* ⁷¹⁾, *acida vegetabilia* ⁷²⁾, *cofca* ⁷³⁾, *ammonia* ⁷⁴⁾, *castoreum* ⁷⁵⁾, *opium* ⁷⁶⁾, *galvanismus* ⁷⁷⁾, *magnes* ⁷⁸⁾.

Dd 2

debi-

65) Lepidam curationem ex AVICENNA DIETERICUS Jatr. Hippocras. p. 709 refert, maniac cum lethargico uno in lecto decumbentis, quorum ille a verberibus huic inflictis defatigatus obdormivit, hic autem vigil evasit. Accedit historia avari lethargici a sono nummorum aureorum, quos haeredes jam inter se dividebant, excitati, ex HORATIO in sermon. lib. I. Satyra 3.

66) CELSUS l. c. 67) FR. HOFFMANN l. c. obs. 6.

68) THEMISON apud CAEL. AURELIANUM. p. 93. BOURBON LAMY in Journ. de méd. T. 18. p. 64. v. Samml. auserl. Abh. f. pr. Aerzte. 21. B. 4. St. p. 358.

69) SYDENHAM l. c. FR. HOFFMANN l. c. RIVIERUS obs. cent. IV. No. 28.

70) THEMISON apud CAEL. AURELIANUM l. c. Egregios inde obtinui effectus.

71) Casu veneni ingesti excepto, ubi scilicet solutio sulphatis zinci optimum vomitorium sistit, tartarus emeticus, vel in refracta dosi, efficax in affectibus soporosis remedium est.

72) Indicantur potissimum in sopore ex veneno narcotico deglutito, sub studio excitationis. Aëstum et succus citri reliqua acida antecellunt.

73) Eo ipso in casu, est subintrante jam studio debilitatis.

74) In summa virium prostratione, et quidem sub forma salis cornu cervi.

75) Praecipue in cataphora apud hystericas et hypochondriacos. Sub forma clysterum adhibuit ARETAEUS l. c.

debitaque corporis positio ⁷⁶⁾ *aliaque absur-*
da ⁸⁰⁾.

CAPUT

76) MEZA in Act. R. soc. Hafn. Vol.III. p. 202.

77) HUYELAND's *Journal der pr. Heilk.* 20. B. 4. St. p. 5. 60. B. 4. St. p. 138.

78) *Mémoires de la soc. R. de médecine.* 1779. p. 653.

79) De corporis debita positione non in cataphora solum, sed etiam in somno sano, multum quondam disceptatum est. Legatur hoc de argumento: GALENUS lib. de instrumento odorat. cap. 6. PAULUS AEGINETA lib. V. de arte medendi. PROSP. ALPINUS op. c. lib. III. c. 8. p. 244. AVICENNA l. c. ZACUT. LUSITANUS in prax. histor. lib. I. c. 7. LOVERUS de corde, cap. II. p. 158. LOVERUS manuductio ad vitam long. P. I. cap. 10. p. 107. VIDIUS de tuenda valetudine general. lib. V. cap. 10. p. 89. PLATEN de laes. funct. p. 439. WUTTORUS diss. de cubitu dormient. sanor. salubri, Hal. 1745. etc. Omnes communi consensu decubitus supinum vituperant, suadentque juxta verum:

Dormire latus dextrum preme, deinde sinistrum,

80) Jubetur e. c. ut suspendatur pedibus posticis ad postes lecti, prope caput aegrotantis, sus, et stimulus posthac irritetur, horrenda enim animalis hujus vociferatione omnem torporem subito excuti testatur VILANOVA (in Breviario. lib. IV. c. 11).

CAPUT VII.

A g r y p n i a.

§. XXXIII.

Definitio. Literatura. Divisio.

1. **D**efectus somni morbosus, sive vigilia Definitio. involuntaria, *agrypniae* ¹⁾ nomine appellatur.

2. De hoc malo legantur: HIPPOCRATES ²⁾, LITERATU-
PLINIUS ³⁾, ORIBASIIUS ⁴⁾, AVICENNA ⁵⁾, ARGENTE-
RIUS ⁶⁾, CAPIVACCIIUS ⁷⁾, SCHENKIIUS ⁸⁾, FORE-
STUS ⁹⁾, BARTHOLINUS ¹⁰⁾, HEURNIUS ¹¹⁾, FAVEN-
TINUS ¹²⁾, DE LA PRADE ¹³⁾, JOERDENS ¹⁴⁾ aliique ¹⁵⁾.

3. Et

- 1) Ab α negativo et ύπνος, somnus. ARAB. *Sahara*.
LAT. *Pervigilium*, *vigilia abnormis*, *vigilium mor-*
bosum, *vigiliae immodicae*. GRÆC. *Schlafllosigkeit*.
GALL. *Insomnie*. ANGL. *Intense watching*, *want of*
sleep. ITAL. *Veglia*. HISP. *Vigilia*, *desvelo*. LUS-
IT. *Vigia*. POLON. *Bezsenność*. ROSS. *Безсонница*.
2) Locis infra citandis. 3) Hist. natur. lib. VII. c. 51.
4) Synops. lib. VII. cap. 31. 32. lib. VIII. cap. 1.
5) Canon. lib. III. Fen 1. Tract. 4. cap. 4.
6) De somno et vigiliis. Paris. 1556.
7) De capitis affectibus. c. 19.
8) Obs. lib. I. obs. 256. 9) Obs. lib. X. obs. 35. 36.
10) Hist. anat. cent. 1. hist. 64.
11) Opp. omn. Lugd. 1608. De capitis morbis.
12) De vigiliis modum excedente.
13) Samml. auserl. Abh. für pr. Aerzte. 1. B. 4. St. p. 45.
14) Ueber die Schlaflosigkeit in HUTELAND's Journ. der
pr. Heilk. 18. B. 1. St. p. 112.

Divisio. 3. Et *agrypniam* dividimus in *symptomaticam* et in *primariam*.

§. XXXIV.

De agrypnia symptomatica.

Definitio. 1. *Agrypnia*, aliorum morborum symptoma, *symptomatica* dicitur.

Ubi obve-
nire so-
let? 2. Pauci exstant morbi, quorum inter sym-
ptomata *vigiliae* non computentur. Maxime iis
stipari solent: febres ¹⁾, inflammationes, exanthe-
mata,

15) Praeter auctores §. XXXV. No. 2. citandos: A. GA-
ZIUS de somno et vigilia. Basil. 1539. CHRISTIANI
Ripensis disp. de somno et vigilia. Basil. 1583.
FLEISCHMANN diss. de somno et vigilia. Argent. 1590.
SENNERTUS diss. de vigiliis nimis. Witeb. 1626.
RIVINUS diss. de agrypnia. Lips. 1644. HEIMERBERG
diss. de pervigilio. Leid. 1671. WEDEL diss. de per-
vigilio. Jen. 1680. Idem Progr. de morte Attilii Re-
guli ex perpetuis vigiliis. Jen. 1686. NIMPTSCH diss.
de agrypnia sive vigilia praeternaturali. Altdorf. 1697.
ROLFINK diss. de pervigilio. Jen. 1699. ETTMÜLLER
diss. de vigiliis involuntariis. Lips. 1705. Idem diss.
de vitis circa somnum vigiliisque. Lips. 1720. HE-
BENSTREIT diss. de morbis ex pervigilio. Lips. 1740.
ALBERTI (ZUBEABÜHLER) diss. de noctibus agrypnis.
Hal. 1745. OUDENARDEN diss. de vigilio sano et mor-
boso. Lugd. Bat. 1757. VAN DRUNEN diss. de vigi-
liis. Lugd. Bat. 1787. VAN LEEMPOEL diss. de pervi-
gilio. Lovan. 1788. DÄAR de vita, maxime vigilia-
rum somnique respectu. Goett. 1819.

1) *Agrypnia febrilis* SENNERTI. Spec. 1. *Pervigilium*
febrile BOERHAAVI. aph. 708.

mata, psora, prurigo ²⁾, cephalaea ³⁾, panaritium ⁴⁾, otalgia, odontalgia, hystēria, hypochondriasis, melancholia ⁵⁾, mania, asthma, hydrothorax, podagra et mictus cruentus ⁶⁾.

3. Pervigilia in febribus acutis, inflammato- Semioti-
ca.
riis ardentibus, suppurationem incipientem et abscessum ^{6b)}, interdiu et noctu consistentia ⁷⁾, dolorem, laborem et futurum delirium; assidua in febre ardente et cum convulsionibus juncta ⁸⁾, periculum et mortem, nisi breviter abigatur; cum vomitu aeruginoso, dolore capitis et surditate, delirium ferinum ac fatum ⁹⁾ ineluctabile: cum sudore continuo et frigido ¹⁰⁾, itemque cum egestionibus imperfectis, pessima quaevis denunciant ¹¹⁾.

4. Pervigilium symptomaticum morbi pri- Cura-
marii

2) *Demangeaison universelle à la peau avec insomnie guérie par la laitue commune sans apprêt. Mém. de l'acad. R. de Paris a. 1705. hist. 53.*

3) BAATMOLINUS l. c.

4) HILDANUS cent. I. obs. chirurg. 97.

5) SCHENK lib. I. obs. 256 (vigiliae per 14 menses).

6a) CH. ROSSLER de mictione cruenta (in juvene cum somni interruptione plenaria per sex dies). *Miscell. acad. nat. curios. dec. I. a. 3. 1672. p. 529.*

6b) GORTER prax. lib. III. Tr. 1. 150. p. 135.

7) GALENUS in Progn. comm. II. 12. IV.

8) HIPPOCRATES sph. VII. 9) Praedict. I. 19.

10) CORC. §. 1.

11) G. GRUNER semiotice. Hal. 1775. p. 268.

marii agnoscit therapiam; non neglectis pro re nata sic dictis *hypnoticis* infra tradendis.

§. XXXV.

De agrypnia primaria.

Definitio. 1. *Agrypnia* morbum per se constituens, aut saltem ut unicus reconditi cujusdam mali effectus comparens, *primaria dicitur*.

Exempla. 2. Exempla agrypniæ primariæ in praxi nostra numeramus ¹⁾. Occurrunt illorum plurima apud citatos auctores. Alia etiam a PANAROLIO ²⁾, CUMME ³⁾, GOOCH ⁴⁾, SAILLANT ⁵⁾ describuntur.

Causæ. 3. *Agrypnia infantum* sæpe a latente meconio, ab intertrigine, dentitione, a porrectis rebus dulci-

1) Pusionem vidi, a prima nativitate usque ad sextum ætatis mensem, quo hydrocephalo acuto periiit, plane insomnem. Sine nota causa uxor Juriconsulti Vilenensis in agrypniam trium hebdomadarum incidit. Chirurgus Vilenensis uxorem duxit, prius infantum valetudinariorum curæ addictam, quæ vigiliis adeo adsueverat, ut deinde nunquam ultra horulam somni nychthemeri spatio capere potuisset.

2) Pentecost. V. obs. 4.

3) De agrypniis diuturnioribus; cum observat. Ros. LENTILII. Miscell. acad. nat. cur. dec. I. a. 8. 1672. p. 346. dec. III. a. 5 et 6. 1697 et 1698. Append. p. 127.

4) *Appendix to medical and surgical observations.* Lond. 1773. p. 218.

5) *Histoire de la société R. de médecine.* 1776. p. 318. (Hispani meminit, qui septuagesimo ætatis anno mortuus erat, quin per omnem vitam, paucis horæ momentis, somno gavisus sit).

dulcibus, a lacte nimio aut malae indolis, a pulmento spisso largius pusionibus exhibito⁶⁾, a fasciis stricte nimis alligatis, ab impuritate, calore, frigore cubiculorum infantilium oritur⁷⁾. *Feminae* potissimum retentionis menstruorum et graviditatis⁸⁾ caussa agrypnia laborant. *Senibus* vigiliae frequentiores etiam sunt⁹⁾. Subjiciuntur illis potissimum vigente temperie nebulosa, ventosa, humido-frigida, post cibi durioris esum, nec non flatuum, herniae, vitiorum diureseos et haemorrhoidum reconditarum culpâ. Ad *causas generales* agrypniae revocamus: tempora aequinoctialia et solstitialia, malam consuetudinem¹⁰⁾, morbos

6) RIEDLINUS lin. med. ann. IV. Sept. obs. 30. p. 801.

7) *De infantum vigiliis* cfr. SENNERT de regimine recens aëlor. PRIMEROSIUS de morb. puer. lib. I. cap. 2. LEONELL. FAVENTINI tract. de aegritud. infant. HARVAEUS de gener. anim. exerc. de partu. ETTMÜLLERUS in valetud. infant. c. II. §. 1. BLANCARD collect. med. physic. cent. V. No. 5. ne dicam de recentioribus circa morbos infantiles scriptoribus.

8) BARTHOLIN. cent. IV. hist. 70. HENZ in STARR'S Archiv. 6. D. p. 178.

9) Jam HIPPOCRATES agrypniam morb. senilibus adnumeravit (sect. III. aph. 31). Cfr. HEURNIUS in comment. sect. III. aph. 91. HENRICI AB HEERS diss. LANGII lib. I. ep. 26. de vigil. sen.

10) Infantes somno diurno nimis adsueta noctes insomnes transigunt. Sic urbium majorum incolae, qui ex nocte diem et ex die noctem facere solent, dum rus pelunt, atque ibi vivendi rationem naturae accom-

morbos imminentes ¹¹⁾, convalescentiam ¹²⁾, usum narcoticorum ¹³⁾, nicotiana non excepta ¹⁴⁾, sensibilitatem morbosam, morbos cerebri ¹⁵⁾, coecitatem ¹⁶⁾, palpebrarum resectionem ¹⁷⁾, insolationem ¹⁸⁾, studia ¹⁹⁾, praesertim brevi ante horam somni,

modatam resumunt, primis temporibus agrypniam experiuntur. Quam pulchre iterum HIPPOCRATES ait: sanus homo interdiu vigilet, dormiat noctu.

11) AUGENIUS lib. V. epist. 7.

12) Morbi vigiliis stipati saepe agrypniam relinquunt. Occurrit ea fere constanter in convalescentia ebriosorum, post morbos imperfecte judicatos. Quare „ubi vigilia convalescentes non deserit, reversionem mali vel novum morbum timere debemus.“ HIPPOCRATES lib. de judicationibus. §. 9.

13) Exhibitis per aliquod tempus narcoticia, iisque dein sepositis, pervigilium inevitabile. Cfr. Ephem. nat. cur. dec. I. ann. II. obs. 69.

14) CASP. HOFFMANNUS lib. II. cap. 3. §. 30. et Miscell. nat. cur. dec. I. ann. III. obs. 185.

15) BONET sepulchr. sect. V. obs. 1 (serum). sect. VI. obs. 1 (serum). obs. 4 (vasa distenta, ulcus et serum in ventriculis). obs. 5 (ichor in cranio). obs. 6 (abacessus).

16) Plures coecos aetatis propectae insomniis detentos inveni.

17) Poena, quam Romani et Carthaginenses infligere solebant, de qua lege WEDELIIUM l. c. et BAUMINIUM lib. III. anat. cap. 35. Et recentiori aeco reos vigiliarum tormentis excruciatos fuisse ex PAULI ZACHIAE quest. legal. (lib. VI. T. II. Qu. I. §. 24) apparet.

18) DE LA PRADE l. c. p. 46.

somni, animi pathemata, inprimis moerorem ¹⁹⁾, amorem, imaginationem ²¹⁾, malam digestionem ²²⁾, carnes ferinas ²³⁾, alvum obstructam ²⁴⁾, bilis copiosam secretionem ²⁵⁾, vitia hepatis ²⁶⁾, cystidis felleae ²⁹⁾, pancreatis ³⁰⁾, vermes ³¹⁾, vitam seden-

19) GILBERT *adversaria medica pract.* p. 261.

20) WILLIS *de anima brutor.* p. 2. SAUVAAGE *clas.* VIII. XXII. 2. *Agrypnia a pathemata.* Sic demortua prole, matri dormiendi desiderio devictae, mox imago objecti amissi coram oculis versatur, omnemque somnum fugat. Juvenem judaeum coram me habui, qui amlissis ante duos annos parentibus suis, ab eo tempore vix horula somni spatio nycthemeri fruebatur. Observavit ipse aeger a duobus quoque annis *crinet illi non amplius crescere.*

21) Timor futurae noctis insomnia ad agrypniam excitandam sufficit. Narrat WEPFERUS (*obs.* 93. p. 355) de femina, quae ob ipsam somni capiendi mentionem in cordis palpitationem et animi deliquium incidebat.

22) Coena lautior, vel et in adultis omissa, cibi flatulenti, flatus, acida primarum viarum, saepe vigiliis ansam praebent.

23) RHODIUS *obs. med. cent.* I. *obs.* 85. Cfr. GALENUS *de alimentor. facultat.* lib. 3. cap. 7.

24) Communis causa animadvertente jam RULANDIO in *lib. curat. empir.* IV. p. 234.

25) FORESTUS *lib.* X. *obs.* 35. in Schol.

26) RAHN *diss. sistens mirum inter caput et viscera abdomin. commercium.* Goett. 1774. p. 71. STROHITZ in HUFELAND'S *Journ. der pr. Heilk.* 1. B. p. 543.

29) STUART in *Philosophical transact.* No. 414.

30) BONET *l. c.* lib. I. *sect.* 6. *obs.* 8. AUBERTUS pro-

sedentariam, abusum veneris, retentionem spermatis, haemorrhoidum ³²⁾, potumque liquorum fermentatorum, theae et cofeae.

Diagnosis. 4. Sunt, qui ad vitam sanam ducendam pauciore somno indigeant ³³⁾. Neque vero horum vigilias, neque eas, quae fortuito a causis accidentalibus, e. g. a defatigatione, rumore, solitudine ³⁴⁾ inconsuetis, a luce, fame, temperie calida aut frigida nimis, ab insectis ³⁵⁾, somno pomeridiano ³⁶⁾ etc. contingunt, ad agrypniam revocamus. Agrypnia enim *morbis* est, cui potissimum *diathesis inflammatoria, gastrica, arthritica et nervea* ansam praebent.

A. inflam-
mat.

5. *Agrypnia inflammatoria* haemorrhagiis suppres-

gymn. Exercitat. 44. ad librum de abditis causis FARNELII.

31) WELSCH de vigilis cum ejulatu diurno. in Miscell. acad. nat. cur. dec. I. a. 8. 1677. p. 66.

32) Creberrime hac ex causa insomnia vidi.

33) Italum jurisconsultum, sanissimum Viennae cognovi, qui annum 65 aetatis attigerat, quin unquam spatium nycthemeri ultra duas horas dormiverit.

34) WEPFER (obs. 93. p. 355) de femina narrat, quae nunquam sola obdormiscere potuit. Cfr. FORTIS consult. et respons. T. I. cent. I. cons. 27. p. 33.

35) Culices a PLINIO aptissime cauponarum aestiva animalia appellantur.

36) Quaestio: an somno pomeridiano indulgend. sit nec ne? in docta dissertatione: *de recte capiendo somno pro tuenda valetudine*, auct. SCHLUNG. Jenae 1728. discutitur.

pressis, spermatis retentioni, insolationi, liquoribus fermentatis, animi intentioni originem debere solet. Comitantur eam saepe sensus caloris universalis, pruritus cutis, urina ignea, cordis arteriarumque vibratio insolita.

6. *Agrypnia gastrica*, infantibus et gravidis *A. gastrica*. familiaris, effectum sistit acidorum primarum viarum, vermium intestinalium, flatuum, voracitatis, nec non vitae sedentariae et moeroris. Committes agnoscit linguae siccitatem, sitim, halitum foetentem et pondus epigastrii.

7. *Agrypnia arthritica* aliquando podagrae *A. arthritica*. insultum sive praecedat sive sequitur. Variis anni temporibus, praesertim aequinoctiis, alligatur. Aggreditur tunc plerumque homines alias somno potius profundo gaudere solitos.

8. *Agrypnia nervosa* a mala consuetudine, *A. nervosa*. a metastasi ad cerebrum, a studiis nimis protractis, ex usu narcoticorum, a venere nimia, ab animi pathematibus oritur, ac symptomata hypochondriaca et hysterica, praesertim necessitatem iteratis vicibus mingendi, pavores, anxietates, calores fugaces, partiales, socia habet.

9. *Agrypnia* vix unquam salutaris ³⁷⁾, semperque intolerabilis ³⁸⁾, viam plurimis cerebri et ner-

37) BÜCHNER (SCHENKER) diss. de salutaribus agrotantium agrypniis. Erford. 1739.

38) Agrypnia laboranti non quadrat CHRYSOSTOMI effatum: advenit nox, portus malorum nostrorum, solatium calamitatum nostrarum, vulnere medicamen-

nervorum morbis munit. Periculum enim minatur: in aetate infantili, — encephalitidis, hydrocephali, convulsionum; in media, — vertiginis, melancholiae, hypochondriasis, phthiseos et maniae; et in senectute, praesertim si derepente ingruat, apoplexiae.

Cura.

10. Pro varia agrypniae indole, eliguntur³⁹⁾, inter auxilia externa: *venae sectio* praesertim e saphaena, *cucurbitulae scarificantes* ad dorsum, *hirudines* circa caput, aut loca quondam cum emolumento sanguinem fundere solita, *clysteres emollientes*, *anodyn*⁴⁰⁾, *pediluvia*, *maniluvia*, *lotiones*, *balnea tepida*⁴¹⁾, *frigida*⁴²⁾, *titillatio plantarum pedum*⁴³⁾, *pellis leporina*⁴⁴⁾, *remedia narcotica*

tum (Homil. II. ad Philipp.). Nec agrypnia primaria laborans spe fruitur debellato quodam morbo somnum redditurum esse.

39) S. SCHULTZ de euporistis quibusdam somnum conciliantibus, haud vulgaribus. Miscell. acad. nat. cur. dec. I. a. 6 et 7. 1675 et 1676. p. 234.

40) In vigiliis hystericarum clysteres ex infuso chamomillae et drachmis duabus olei cocti hyoscyami, perbelle conducere solent.

41) MARCARD *über die Natur und den Gebrauch der Bäder*, Hannov. 1793.

42) „Ter uncti
Transanto Tyberim, somno quibus est opus alto.“

HORATIUS.

43) P. ROMMEL hypnoticum rarum. Miscell. acad. nat. cur. dec. III. an. 7 et 8. obs. 43.

44) E. HAGENDOORN de pellis leporinae in vigiliis usu. Miscell. acad. nat. cur. dec. II. a. 5. 1686. p. 200.

tica naribus intrusa ⁴⁵⁾, *unctio capitis cum oleo croci* ⁴⁶⁾, — inter *pharmaca interna*: *pulvis temperans*, *acidum sulphuricum alcoholisatum* ⁴⁷⁾, *supertartras stibii et potassae* ⁴⁸⁾, *alvum evacuantia*, *potissimum aloe* ⁴⁹⁾, *emulsio amygdalina* ⁵⁰⁾, *seminum papaveris albi* ⁵¹⁾, *opium* ⁵²⁾, *hyoseyamus* ⁵³⁾,

45) TIMAEUS CAS. 9. lib. II. p. 94. Vix tale consilium dare auderem.

46) AVICENNA l. c. S. LEDER crocus externe capiti pro conciliando somno admotus ardorem ventriculi excitat. *Miscell. acad. nat. cur. dec. III. a. 4. 1685. p. 145.*

47) Excellit *elixirium acidum Halleri* in vigiliis inflammatorio-nervosis.

48) Parvae et repetitae tartari emetici doses non solum in agrypnia gastrica, sed etiam in nervosa, praesertim melancholiae periculum minitante, multum mihi praestiterunt.

49) FISCHER (l. c. §. 83) in agrypnia senili praesertim *alocen hepaticam* commendat.

50) FORESTUS. HEURNIUS. Amygdalis dulcibus nonnullas amaras addere aqleo, praesertim apud infantes, tamen non teneros nimis.

51) DIOSCORIDES. ORIBASIIUS. Simplici hoc remedio, Lithuanis usitatissimo hypnotico, agrypniam hysteriarum pluries fugavi.

52) Opium vigiliis ex causa inflammatoria et gastrica minime quadrare, nemo ignorat. Quocunque in casu haud tuto apud infantes et senes adhibetur. Conducit in agrypniis nervosis, convalescentium, et maxime sub forma *extracti aquosi*, et *narcotinae*. Commendatur et *illinitio opii* super palpebras (DE LA PRADE l. c.). *Subsumptio opiata* periculosa sunt (CHARP-

mus⁵⁹⁾, *atropa belladonna*⁵⁴⁾, *massa pilularum de cynoglosso*⁵⁵⁾, *theriaca*⁵⁶⁾, *electuarium sive requies Nicolai*⁵⁷⁾, *crocus*⁵⁸⁾, *camphora*⁵⁹⁾, *moschus*⁶⁰⁾, *ambra grisea*⁶¹⁾, *aether sulphuricus alcoholisatus*⁶²⁾, *tinctura martis solaris*⁶³⁾, *pulvis hypnoticus Kriellii*⁶⁴⁾, *gummi resina ferulae assae foeti-*

TIER DE CASSIOXY *Reise nach China und Bengalen.*
Berlin 1801. p. 288).

53) Rarius effectum desideratum praestat.

54) JAHN *Klinik der chron. Krankh. Erf.* 1815. 4. Abschn.

55) Nullum nosco hypnoticum, quod huic divinae compositioni anteponi possit. Adulto bolum ex granis quinque exhibeo.

56) Et haec compositio pluries simplicei opio palmam praeripit, praesertim si theriaca genuina Veneta sit.

57) Aemulatur theriacam. Dosis a drachma una ad duas (Uncia una continet quinque grana opii).

58) STÖRM libellus, quo continentur experimenta etc.

59) FISCHER l. c. §. 86. in melancholico juvene camphoram cum aloë hepatica porrexerat.

60) TRILENIUS *med. chir. Bemerk.* p. 46. In agrypnia infantum et hystericarum. Hic libenter moschi et cinnabaris grana tria, cum grano uno extracti hyoseyami exhibeo.

61) G. SCHÖNEN de essentia ambræ vi hypnotica. *Miscell. acad. nat. cur. dec. III. ann. 9 et 10.* p. 437.

62) BURSERI *inst. med. pract. Vol. III. cap. III. §. 68.*

63) J. WOLFF in vigiliis vel inquieto somno usus singularis tincturae martis solaris. *Miscell. acad. nat. cur. dec. II. a. 1688.* p. 359.

64) *Samml. auserl. Abh. f. pr. Aerzte.* 1. B. 2. St. p. 169. Cfr. cum J. C. JACOBI tract. de viribus hypnot., a minerali regno haud alienis. in *Act. nov. acad. nat. cu-*

foetidae ⁶⁵⁾; inter *auxilia dietetica*, — debitus regulisque generalibus non praescribendus *ordo in cibis sumendis* ⁶⁶⁾, *lac* ⁶⁷⁾, *caro leporina*, *pisces*, *cancer fluvialis* ⁶⁸⁾, *oryza cum lacte* ⁶⁹⁾, *lactuca* ⁷⁰⁾, *brassica aescens cruda* ⁷¹⁾, fuga liquorum ferment-

rios. T. I. p. 165. Remedium, de quo agitur, constat ex mercurio ex acido nitrico per hepar sulphuria praecipitato. Matrona Vilmensis perpeccis gravissimis nteri haemorrhagis in agrypniam rebellem incidit, restorationi virium adversam. A scrupulo *pulveris hypnotici Kriehli* vespere porrecto, somnus beneficus decem horarum secutus est, ac nil amplius convalescentiae obstitit.

65) BURSERIUS l. c. (ad noctem in pilulis).

66) Coena nunc nocet, nunc juvat. Immo agrypniam nonnulli eo percipiunt, quod vacuus ventriculus alimentum exposcit, quod consilio JOERDENS (l. c.) et ante noctis curriculo paratum esse curo.

67) AUGENIUS (epist. med. 7. lib. V) *lac caprinum* omnibus ut hypnoticum praetulit.

68) J. A. LIMPRECHT de modo extraordinarium conciliandi somnum fluviali astraco, qui latine auctore GERNERO, cancer, perperam, Germanis *Fluss-Krebs*, vocatur. Acta acad. nat. cur. Vol. 2. p. 192.

69) HERCULES SAXONIA praefect. pract. P. I. c. 10. p. 52.

70) GALAN lib. II. de alimentor. facult. c. 40. Cfr. P. II. Vol. II. sect. I. cap. X. §. LII. 15.

71) Lithuani hunc cibum (Germ. *Sauerkraut*) non coctum, cum junculo acidulo, quod ex illo fermentatione evolvitur, addito oleo olivarum, pro coena sumunt. Vigiliae haemorrhoidales perbelle inde compesci solent. Nec debili etiam ventriculo molestia inde infertur. Vilnae scripsi.

Frank Prax. II. I. 1.

E e

fermentatorum, theae et cofese, ast non sine exceptionibus ⁷²⁾, temperatura cubiculi moderata, pulvinaria dura ⁷³⁾, lectus suspensus et agitatus ⁷⁴⁾, usus *lecticarum* ⁷⁵⁾, *odoramaenta* ⁷⁶⁾, *musica* ⁷⁷⁾, exercitium corporis in aëre libero, aquae leniter cadentis, transfluentis murmur ⁷⁸⁾, dulcis loquentium ⁷⁹⁾

72) Vigiliae ex causa arthritica saepe potu cofese debellantur. Cfr. BLEONY de potu cof. p. 64. Ita et potus *punch* in nonnullis rebellem agrypniam in salutarem somnum commutat.

73) SCHENCK obs. 70. 74) OCTAVIUS HORATIANUS.

75) Specifica virtus, quae portatili motui inest, somnifera habetur, quod JUVENALIS testatur, cum Satyr. III. v. 242. canit:

„Namque facit somnum clausa lectica fenestra.“

76) *Nodulum* commendat HEURNIUS, cui insint flores violarum, nymphaeae àà pugillus, corticum mandragorae drachmae binae, seminis anethi drachma et eroci scrupulus: fiat pulvis, qui sindone excipiat.

77) Pythagorici quum vellent diurnas curas mollire, quibusdam cantationibus, musica ratione ad id concinnatis, utebantur. Leg. PETR. FORESTUM (lib. X. de cerebri morb. obs. 36) et HEURNIUM (l. c.). Idem nutrices cantilenis suis efficiunt. Narrante SENECA (lib. de providentia) MARCENAS per symphoniarum cantum ex longinquo lene sonantium, postquam per triennium fere noctes insomnes habuerat, sopitus fuit.

78) „Adhibenda aquae *destillatio* crebra, cujus sonitu saepe aegrotantes inducti somnum capiunt.“ CAEL. AURELIAN. „Prodest etiam aliquid ad somnum *Silanus* juxta cadens; vel gestatio post cibum, et noctu; maximeque lecti suspensi motus.“ Celsus lib. II. c. 18. „Cuique vero usitata somnum accersunt: nautis in

tium ⁷⁹⁾ aut legentium susurrus, molendinarum rumor, avium cantus, vel contra summa circum-
quaque procurata quies, silentium praevis strepi-
tu ⁸⁰⁾, et *magnetismus animalis* ⁸¹⁾).

CAPUT VIII.

*De rhoncho, jactatione, crampo,
ardore et pavoribus in somno.*

§. XXXVI.

De argumento generatim.

1. **Q**uam somnus non tantum excessu et de- Momen-
tum.
fectu, sed etiam *modo* peccare possit, praeter ca-
taphoram et agrypniam, phaenomena quoque mor-
bosa, sub actu obdormiendi et evigilandi, nec non
sub ipso somni curriculo contingere solita, exami-
nanda sunt. Spectant huc, ne dicamus de peculiari

E c 2 specie

cymba decubitus, et in mari navigatio, et litorum
sonus et undarum murmur, et ventorum bombus et
maris navisque odor." ANSTAXUS de curat. morb. acut.
lib. I. c. 1.

79) Senem Principem Polonum cognovi, vix aliter
somnum capientem, nisi advocatis circa lectum suum
plurimis venatoribus, invicem facta enarrantibus ve-
natoria.

80) GALENUS l. c.

81) Uxorem jurisconsulti Vilmensis magnetismi animalis
ope ab agrypnia libera vi.

specie maniae nocturnae ¹⁾: *rhonchus*, *jactatio*, *crampus*, *ardor pavorisque in somno*, nec non, uti ex sequentibus capitibus palam fiet, *somnia terrificae*, *incubus*, *somnambulismus* et quodammodo *somniatio*.

Limites. 2. Quibus morbis doctrinam generalem morborum nocturnorum ²⁾, ut *pollutionum*, *enuresis*, *asthmatis*, *sudorum*, quatenus noctu contingunt, libenter adderemus, nisi stabilitus rerum tractandarum ordo aliter juberet. De *epinyctide* jam diximus ³⁾.

§. XXXVII.

De rhoncho dormientium.

Definitio. 1. *Rhonchus* est stertor in inspiratione et expiratione operosa, cum raucō sonitu in larynge nariumque regione contingens.

Literatura. 2. Sat docta de praesente argumento exstat dissertatio auctore LUST ¹⁾.

Symptomata. 3. *Rhonchus* non solum adstantibus, sed et ipsi dormienti molestus evadit, si ipse se stertentem obscure audit, aut evigilatus temulentiam, faucium ariditatem, vocem raucam, nares obstructas, saporem ingratum percipit.

4. Rhon-

1) Cfr. cap. XXV.

2) GRASS diss. de morb. noctur. Jense 1709. et BASMANN in HUFELAND's Journ. der pr. Heilk. 10. B. 2. St. p. 120. Cfr. DARWIN Zoon. Vol. I. sect. 18. et Vol. II. art. somnus interruptus.

3) Edit. secund. P. I. Vol. I. sect. II. c. XIII. §. LXXXII. 6.

1) De rhoncho dormientium. Halae 1745.

4. Rhonchus sistit effectum malae consuetudinis, colli brevioris, vertebrarum cervicalium intus prominentium ²⁾, decubitus capite antrorsum super pectus declinato, defatigationis, sermocinationis et clamoris ante somnum, atmosphaerae calidae, a respiratione plurimorum vel a fumo carbonum inquinatae, diaetae crassae, coryzae, salivae copiosius secretae, affectionum morbosarum uvulae, tonsillarum, glandularum colli, plethorae, bilis, muci et polypi narium.

5. Rhonchus aliquando futuram cephalaeam ³⁾ Prognosis, et apoplexiam ⁴⁾ indicat.

6. Pro varia causa varia adhibenda methodus. Generatim commendantur *gargarismata emollientia, mel, conserva tussilaginis* ⁵⁾, *carminata, temperantia*. Cura.

§. XXXVIII.

De jactatione, crampo et ardore in somno.

1. Inquietudo actum obdormiendi comitans, Jactatio. aliquando ad ipsum protrahitur somnum, sese sub

2) Judaeus viginti circiter annorum e longinquo Vilnam a. 1813. petiit, unice ut a rhonchis somnum impediens liberaretur. Examinatis faucibus vertebrae cervicales intus prominentes conspeximus. Locus respondens ad nucham excavationem exhibebat, certe vitio rhachitico tribuendam.

3) Cfr. cap. II. §. VIII. No. 3.

4) Cfr. cap. V. §. XXV. No. 1.

5) Zorn botanol. med. p. 689.

sub forma *jactationis* continuae, scalptu universae cutis, perceptionem pruritus indicante, suspiriis crebris manifestans. Huic malo calor nimius atmosphaerae, potus liquorum fermentatorum, animi pathemata, denegata venus, vermes (ne dicamus de insectis), haemorrhagiae consuetae suppressae, imprimis autem molimina haemorrhoidalia, ansam praebent. Cura in fuga causarum, in *clystere emolliente* ante cubitum adhibito, in *pediluviis*, in *electuario lenitivo*, in *venae sectione*, et maxime in *eucurbitulis scarificantibus* consistit. Nonnunquam inquietudo solum *crura* ¹⁾ detinet, quae inde continuo jactantur. Intolerabile hoc incommodum, plerumque ex vitio abdominali flatulento et ex arthritica labe oritur. Praeter vix indicata auxilia, *decubitus super ventrem* ²⁾ levamen affert.

Crampus. 2. Alias *surae* tantum *spasmo* afficiuntur. Refrigeratio cutis, abdominis, flatus, copiosa alvi evacuatio, defatigatio in ascensu vel descensu montium vel scalarum, incommodum istud, frictione, aegroti ipsius manu peracta, leniendum, excitant. Tandem silentio non praeteribimus *jactationes*, si dicere liceat, *internas*, potissimum transitum somni ad vigilias comitantes. Nempe aeger cum anxietate, oppressione ³⁾ et palpitatione

1) *Inquietudo des jambes.*

2) Observatio patris mei, in se ipso, et a me confirmata.

3) Zecchi consult. 61. p. 627. De cordis molesta oppressione, in somno.

tione cordis, pulsu creberrimo, ructibus, concussionibus excitatur, ac per totum sequentis diei curriculum vix prospera fruitur valetudine. Hystericæ et hypochondriaci præcipue sic pati solent, maxime si tumultuarie expergeant. Erecta corporis positio, urinae evacuatio, balneum aëris, mutatio indusii, cyathus aquae frigidae, ac inde cofea epota, — en auxilia hic commendanda. Inprimis curandum, ut dormiens aut sponte evigilet, aut gradatim et quasi per ambages excitetur.

3. Sunt, quos *ardor universi corporis* aut *Ardor plantarum pedum* a somno recreante arceat. Malum istud nobis præsertim in feminis aetate provectoribus obvenit. Adeo id nonnunquam urget, ut affinitatem quandam cum *combustione spontanea**) habere videatur. Causam ut plurimum in victu, potu, hæmorrhoidibus, amenorrhoea, maxime autem in recondita phthisi pulmonali invenimus. Prodesse solent: lectus durus ex crinibus confectus, pelle alcis obductus, *pulveres temperantes, emulsiones refrigerantes, aqua selterana, elixirium acidum Halleri, affusio sive irroratio* ope aquae frigidae, *clysteres, hirudines* ad vasa ani aut vulvae, et aliquando *cucurbitulae scarificantes* ad dorsum.

§. XXXIX.

4) Edit, secund. P. I. Vol. III. sect. II. cap. XXVIII.

§. XXXIX.

De pavoribus in somno.

Definitio. 1. Expergefactio subitanea cum terroris sensu, *pavor* dicitur in somno ¹⁾.

Scriptores. 2. De pavore in somno recens natorum et pnerorum pulcherrime SENNERTUS ²⁾ scripsit.

Symptomata. 3. *Recens nati* pavoribus in somno obnoxii, dum obdormiscunt, faciem risum vel fletum experimentem exhibent, ac brevi post concussi, oculis trucibus, evigilant. Haud raro somno oppressi febricitant, sudant aut evigilando clamant trementes, perterriti et fere convulsi. Symptomata ista nec *pueris* et *juvenibus*, aliquando lectum deserentibus, et cum desperatione auxilium quaerentibus, parcunt. Immo et *adulti* haud raro clansis vix oculis, veluti imaginibus terrificis e somno cum concussionem quadam excitati, stratis prosiliunt, ac tremore, palpitatione cordis et lipothymia mulctantur.

Causae. 4. Quorum malorum *causae* quaerendae sunt apud *recens natos*, — in prava lactis conditione, acidis et flatibus, dentitione, calore aëris circa *cunas*

1) Thorybos et phobos HIPPOCRATIS (aph. 24. lib. III). *Ἰατροφόβια*, terror in somno. Conturbatio, consternatio, panicophobos HERODOTI (lib. VII). Panophobias SAUVAGESII (class. VIII. 12). GERM. *Auffahren*, *Zusammenfahren*, *Erschrecken im Schlafe*. GALL. *Terreur panique*, *frayeur nocturne*. POLON. *Zrywanie się ze snu*. ROSSIC. *вздригиванiя во снѣ*.

2) De morbis infantum. cap. 8.

cunas undique clausi et non renovati; apud *pue-ros* et *juvenes* — in vermibus³⁾ et reminiscentia fabularum nutricum de larvis et lemurbus noctu vagantibus; apud *adultos* denique — in morsu conscientiae, metu malorum imminentium, curis, sollicitudinibus, stragulis insolitis, coena largiore, potu calefaciente, venere nimia, arthritide et calculo.

5. *Pavores in somno* differunt, — a *terrore*, Diagno-
sis. quatenus terror plerumque causam agnoscit exter-
nam; — ab *epilepsia*, quatenus repetitis vicibus
in ea concutitur aeger, et ab *ephalte*, quoniam
aeger non a ponderis sensu affligitur; de quibus
rebus plurima infra.

6. Pavores infantum in somno saepe enco- Progno-
sis.
phalitidem, morbillos et variolas praesagiunt.

7. Therapia pro varia causa differt. In re- Cara.
cens natis primum est nutricis curam habere, quam
leniter purgare juvat. Acidis et flatibus *absorben-
tia* et *carminativa*⁴⁾, *clysteres* et *unctio abdomi-
nis*⁵⁾, opponuntur. Dentitionis effectus perni-
ciosi in robustis, praesertim genis rubentibus ca-
piteque fervente, *hirudinum* ope retro aures posi-
tarum, si alvus clausa foret, lenibus *evacuantibus*
et

3) *Panophobia verminosa* BENIVENTII. Vid. SAUVAGES l. c.

4) R. Lapidum cancrorum (sive magnesiae purae) grana
sex. Mucilaginis gummi arabici drachmam semis.
Aquaе foeniculi unciam unam. Syrupi rhei unciam
semis. M. D. S. omni hora cochleare cofeandum.

5) Oleum macis expressum maxime hic in usu est.

et *sinapismis* ad suras, tolluntur aut moderantur. Apud infantes graciles et systemate nervoso praeter modum sensili instructos, consilio SENNER-TI, semina nigra *paeoniae officinalis*, linteolo involuta, potu immitti curamus. Neque irridemus mulierculis *radicem* ejusdem *paeoniae*, dummodo recentem, collo infantum fili ope appendentibus. Mirum est FORESTUM adhuc *lapides agathi* ⁶⁾, aut *corallia* commendasse, dum ait: „a collo pyritem gestantes lemures et larvas non timent.“ Ubi vero agitur de pueris talibus praeconcepitis opinionibus imbutis caute et sensim sensimque effectus pravae educationis corrigendis ⁷⁾. Vermibus vermifuga opponuntur. *Adultos* regimen adversus jactationes supra commendatum juvat. Saepius *pulvis antispasmodicus ruber Stahlii* ante somnum ad scrupulum unum captus, nobis profuit. DARWINUS ⁸⁾ in vitiis somni hucusque recensitis *opium* ut sacram anchoram commendat, cui consilio indiscriminatim non subscribimus. *Magnetismus animalis* hic magis magisque experimento subji-ciendus.

CAPUT

6) Schreck-Steina.

7) Cfr. cap. de epilepsia et convulsionibus. — Leg. et terribile exemplum infantis a solitudine terrefacti in *Oesterreichischen Beobachter*. 1816.

8) Op. cit.

CAPUT IX.

De somniis terrificis.

§. XL.

Definitio. Literatura.

1. Imagines molestae, in somno cum angore Definitio. obversantes, subsequente plerumque sanitatis detrimento, *somnia terrificia* vocantur.

2. Mirabile hoc argumentum tractarunt: *Literatu-*
HIPPOCRATES ¹⁾ ejusdemque interpretes ²⁾, GALE-¹²⁾
NUS ³⁾, PLINIUS ⁴⁾, FERRENIUS ⁵⁾, QUERCETA-
NUS ⁶⁾, ARNOLDUS DE VILLA NOVA ⁷⁾, HORSTIUS ⁸⁾,
SCHARFF ⁹⁾, WEDEL ¹⁰⁾, LISCHWITZ ¹¹⁾, JA-
NITSCH ¹²⁾, HEGNER ¹³⁾, UDEN ¹⁴⁾, SCHULZE ¹⁵⁾,

DAR-

1) Liber de insomniis.

2) BRENTIUS comment. in Hippocr. de insomn. Venet.
1497. SCALIGER comment. in Hippocr. de insomn.
Amstelod. 1659. ZWINGERI fabulae in Hippocr. de
insomn. v. Comment. XXII. Hippocr. Basil. 1579.

3) De dignotione ex insomniis. Opp. T. IV.

4) Lib. I. epist. 18. 5) De insomniis liber. Lugd. 1549.

6) Diæteticon polyhistor. p. 299.

7) Expositiones visionum, quae sunt in somniis v. Opp.

8) Diss. de somno et somniis. Viteb. 1608.

9) Diss. de somno et somniis. Viteb. 1625.

10) Diss. de somniis. Jen. 1690. Sub nom. ROMMELII.

11) De vitis circa somnum et vigilias. Lips. 1720. Prae-
sid. ETTMÜLLER.

12) Diss. de somniis medicis. Argent. 1720.

DARWIN¹⁶⁾, SCHMIDT¹⁷⁾, DAVIDSON¹⁸⁾, CARMICHAEL¹⁹⁾, TITTMANN²⁰⁾, CARUS²¹⁾, WINKELMANN²²⁾, SPRENGEL²³⁾, NASSE²⁴⁾, SCHUBERT²⁵⁾ aliique multi²⁶⁾.

§. XLI.

- 13) De divinatione ex insomniis. Basil. 1733.
- 14) De insomniis. Helmstadt. 1742.
- 15) Diss. de somniis. Hal. 1759.
- 16) *Zoonomia or laws of organic life*. Lond. 1796.
- 17) *Physiologische Fragmente in HUFELAND's Journ. d. pr. Heilk.* 11. B. 4. St. p. 53.
- 18) *Ueber den Schlaf*. Berlin 1796.
- 19) *An essay on dreaming; including conjectures on the proximate cause of sleep*. Transactions of the college of physicians in Ireland. Vol. 2. p. 48.
- 20) Diss. de somniis. Lips. 1799. Recusa in BREHA syllog. opuscul. T. VI. p. 98.
- 21) *Physiologie*. 2. B. p. 212. *Ueber den Zustand des Träumens*.
- 22) *Archiv für Gemüths- und Nervenkrankheiten*. p. 43.
- 23) *Institut. med.* T. II. p. 224. sect. 2. de somniis.
- 24) *Untersuch. üb. d. Kunst auf Träume andrer Einfluss zu haben*. v. REIL u. HOFFBAUER's *Beiträge z. Beförderung einer Karmethode auf psychischem Wege*. Halle 1812. 2. B. p. 519.
- 25) *Die Symbolik des Traumes*. Hamb. 1814.
- 26) De somniis legere cupidus, res non injucundas inveniet apud TERTULLIAN. de an. C. 46. AUREL. VICT. de vitis illustr. c. 26. AEL. SPARTIAN. in Hadrian. c. 25. PLUTARCH. in vitis passim. DIONYS. HALICARNASS. lib. VII. c. 43. TACIT. an. c. 4. FLOR. lib. IV. c. 7. CASP. A REIES in camp. Elysio quæst. jucund. v. 456. SYNES. de insomn. p. 136. NICEPH. in Schol. ad SYNES. ARISTID. orat. scim. sack. T. I. BARLET

§. XLI.

Symptomata. Causae. Diagnosis.

1. Imagines molestas, quot quot in somniis ^{Sympto-}terrificis obvenire possunt, recensere velle, nimis ^{mata.} longum foret. Frequentissime somnia ista versantur circa incendia, lapsum ex alto, necem ¹⁾, apparitionem defunctorum, aut vivorum ac si mortui essent et similia. Gestus aegri ²⁾, pulsum concitatorum exploratio, suspiria crebra, ejulatus etc. nec non ipsa somni reminiscencia, de gravitate mali abunde testantur. Testantur itidem sensus defatigationis, inertiae, tristitiae, in vigili adhuc homine inde relictus.

2. Somniis terrificis causae pavorem in Causae. somno occasionem praebent. Ebrietatis, ast modicum tantum gradum jam PLINIUS ³⁾ huc revocavit.

lib. I. de gestis Scanderberg. c. 82. ARTEMIDOR. DALDIANI oneirocritica. lib. V. Ed. NIC. RIOALT. P. 1603. MAUCHANT *Phaenomene der menschlichen Seele*. Ejusd. *Allgemeines Repertorium für empirische Psychologie*. MORITZ und POCKELS *Magazin für Erfahrungseelenkunde*.

- 1) Memorabilem historiam somnii terrifici HENRICUS AB HEER refert (lib. I. obs. 2. p. 41. edit. secund. Lips. 1645).
- 2) HENRICI AB HEER aeger, funibus vel linteis multiplici plexu irretitus sciens, volens, imo praesentes hoc obsecrans, vespere vinciebatur, quae nihilominus aliquando diffringebat.
- 3) Lib. XIV. c. 22.

cavit. Addi debent cibi flatulenti, ut fabae ⁴⁾, et maxime res libero circuitui sanguinis obstacula ponentes, e. c. obstructions viscerum, prava decumbendi ratio etc. Feminae prae viris ad somnia dispositae sunt.

Diagnosis. 3. Cum somnia terrifica tam necessarium ad functionum integritatem somnum perturbent, secundaeque valetudini insidias struant, sane ad *morbos* revocanda sunt. Non idem somnia blanda, amoena, corpus potius recreantia, ac cum emolumento contingentia ⁵⁾. Quocunque in casu somniis omnis attentio tribuenda. Eorum interpretationem semiotices negotium sistere, jam HIPPOCRATES ⁶⁾ docuit. Ex natura enim somnii saepe indolem causae illud excitantis conjectare licet, de quo argumento inter alios docte disseruit SPRENGEL ⁷⁾. Praeterea, quamvis phantasia maxime in somno tyrannidem suam exerceat, et somnia pro vanis visionibus declaranda sint ⁸⁾;

atta-

4) DIOGENES LAERTIUS in vita Pythagorae. lib. IX. p. 222. et HIPPOCRATES lib. II. de diast. c. 13.

5) NASSE l. c. p. 527.

6) „Quisquis, inquit, de his, quae in somnis obveniunt, recte conjectat, is magnam habere vim ad omnia ipse reperiet.“ (l. c.). Cfr. J. FR. ZÜCKERT de insomniis ut signo in medicina observationes nonnullae, cum subjunctis de onirocritica medica meditationibus. Nova acta acad. nat. curios. T. III. p. 506. SPRENGEL *Handbuch der Semiotik.* §. 689.

7) Institut. l. c. §. 389.

8) CICERO lib. academ. quaestion. *Anschuldigung eines*

attamen inter ea aliquando talia obveniunt, quae saltem verisimile reddunt, clausis in somno plus minusve sensibus externis, contra *sensum universalem internum (coenaesthesin)*, simul cum attributo suo *instinctu* magis vigere, ideoque animam de mutationibus in corpore contingentibus, vel proxime imminetibus ⁹⁾, nec non appetitibus medicis certiore quandoque reddere, ad quod somniantium vaticinia ¹⁰⁾ et suggestiones ¹¹⁾ restringi

am Ehegatten begangenen Dingmordes auf dem Traume eines epileptischen Nachtwandlers beruhend. In HENKE Zeitschrift für Staatsarzneyk, B. 16. Heft 1. p. 359.

9) Amicus in aeternum venerandus, Fr. Nizkowski, chirurgiae quondam in universitate literarum Vilnensi professor, nocte, interitum ex ruptura cordis praecedente, somniavit cor sibi cultro transigi. Antea nunquam de incommodis circa cor conquirebatur.

10) Legatur de somnio futuri nephritici apud POTERIUM opp. Frf. 1666. lib. V. obs. 87. p. 600. G. HOYER de somniis futura praesagientibus. Act. acad. nat. curios. Vol. IV. p. 148. BAUTZMANN *hystericas passionis admirandum exemplum in virgine omnem morbi vicissitudinem ipsamque medendi rationem varitis somniorum praedictionibus edocens*. Miscell. acad. nat. cur. dec. III. a. 1. 1694. append. p. 35. Cfr. ALBERTI *semiologia*. sect. X. ubi varia HIPPOCRATIS testimonia (lib. de insomnio §. 8. Text 1—9) et GALENI suffragia (com. 8. in lib. I. epid. Hippocratis) collegit. ANDREAS RIDIGERUS *physica divina*. lib. I. c. VI. sect. 5. §. 89.

11) JANITSCH l. c. BÜCHNER miscellanea 1730. RUM-

stringi videntur. Absit enim a nobis; ut rebus absurdis, hoc sub respectu quondam jactatis¹²⁾, fidem habeamus.

§. XLII.

Prognosis. Cura.

Prognosis. 1. Insomnia diurnas actiones offerentia, eo modo, quo actae sunt, bona sunt et sanitatem significant¹⁾. Contra vero somnia insolita morbos imminentes praesagiunt. Instante crisi per haemorrhagiam objecta rubra, flammea somniari²⁾ fertur. Posse autem somnia terrifica gravibus malis, tum per se, tum phantasiam feriendo³⁾, ansam porri-

BAUM in *Breslansich. Samml. vom Jahr 1718*. BERG et BAUMGAERTNER in *Museum d. Wundervollen*. 2. B. 5. St. p. 428.

12) J. LAMONI de praesagio (de morte fratris) ex somnio. *Miscell. acad. nat. cur. dec. III. a. 1694. p. 48*. E. KÖNIG in somnium apri, ex rasurae dentis apri praescriptione. *Miscell. acad. nat. curios. dec. II. a. 3. p. 202*. Praeconceptas de insomniis opiniones collegit METZSCHMIDT in *disp. de insomniis*. Lips. 1667. Cfr. HAGNER et UDEN l. c. Spectat huc quaestio: *an femina in somnio imaginationis beneficio concipere possit?* quam affirmavit ALPHONSUS CARANZA (de part. nativ. et lig. c. XX. qu. 70) ac risui merito se exposuit, P. M. GAHN (*disp. an ea, quae hominib. in somno et somnio accidunt, iisdem possint imputari?* Vitomb. 1727).

- 1) HIPPOCRAT. l. c. §. 3. 2) LISCHWITZ l. c. §. 35.
3) G. HANNAEUS insomnium mortem accelerans. *dec. II. an. 10. 1691. p. 240*.

porrigere, et fasti medici ⁴⁾ et nostra ⁵⁾ aliorum-
que ⁶⁾

- 4) J. J. WALDSCHMIDT de ingenti catharsi ex insomnio. Miscell. acad. nat. curios. dec. I. a. 3. 1672. p. 423. *Pr observation d'une hydropisie ascite tout à coup survenue à un rêve effrayant et sans maladie préexistante, annales de la soc. de médecine prat. de Montpellier. T. 9. p. 132.* PAULLINI mora ex insomnio. Miscell. acad. nat. cur. dec. II. a. 9. 1690. p. 356. J. LANZONI de somnio mortem praedicente. Ibid. dec. III. a. 2. 1694. p. 44. G. SZOER de somnio exitioso. Ibid. dec. I. a. 3. 1672. p. 154.
- 5) Judaei Lithuani more gentia antiquae (exemplo *Abibimelechi*, *Joseph*. in Genes. XXXVII. XL) somniorum interpretationi multum tribunt, qua infansta praesagiente in graves aliquando ex terrore praecipitantur morbos. Luculentum autem exemplum perniciosi effectus somni terrifici centurio Russicus L. mihi a. 1815, die 18. Maii exhibuit. Pater hujus viri, dum 50 aetatis suae annum egerat, adspirationis aquae frigidae improvisae eoque inscio peractae culpa, illico in epilepsiam incidit. Paroxysmi inde tertia quavis hebdomade redire solebant, donec post 17 annos in uno eorum animam exhalavit. Filius, de quo sermo est, tunc decem numerabat annos. Sanus vixit usque ad annum decimum octavum. Eo versus finem vergente, sub somno nocturno, videbatur illi per somnium, ac si pater adhuc viveret, se paroxysmo epileptico correptus, pectori ejus incumberet. Illico expergefactus sat diu eandem coram oculis servabat imaginem. Paucis inde elapsis diebus ipse in epilepsiam, omni mense, *tempore diurno* redeuntem, incidit, quae, quum miser jam vigesimum quartum annum attingisset, perseverabat. Aeger morbum suum a ter-

quæ 6) testatur experientia. Legitur quoque de somniis salutaribus 7).

2. Qui

rore ex somnio derivat. Ast, fuitne somnium istud fortasse jam effectus *epilepsiae nocturnae*? Aut fuitne species *incubi*, futuram epilepsiam annunciantis? Attamen nunquam inde amplius epilepsia nocturna vexatus est nec subitanea expergefactio incubo propria esse solet.

- 6) Historiam somnii imaginationem ferientis ac eventu praesagio respondentis, ut exemplum, quid merus aliquando valeat casus, mihi narravit laudatus *Nizzkowski*. Nobilis Lithuana, vigesimum annum numerans, habitum scrophulosum exhibens, primis matrimonii noctibus derepente cum clamore expergefacta, toto corpore contremiscens, excitato inde marito, terribile vix habitum somnium retulit. Videbar mihi, aiebat, ecclesiam adivisse, deinde in catacombas descendisse ac ibi e longinquo feminam in aperto sepulchro sedentem duosque infantes foventem conspexisse, a cuius adpectu cum terrefacta fuissam, eam dicentem audivisse: „ne timeas, nam imaginem sisto tuam.“ — Maritus ad gravem a tam crudeli somnio relictam impressionem delendam omnia fecit, at incassum. Uxor enim, praecipue accedentibus paulo post graviditatis indiciis, melancholica evasit, ac sensim aensimque in leucophlegmatiam incidit. Accessit interea partus. Excluso infante, obstetrix matri parturientis retulit, alteram etiam in utero delitescere prolem. Ne id aciat filia mea! exclamavit prudens matrona. Ast illam parum geminum celare minime licuit, unde addidit hoc: „somnia ad complementum progreditur.“ Revera febris puerperalis paulo post miseram e medio tulit.

- 7) Ch. F. PAULLINI febris quartana insomnia curata.

2. Qui somniis terrificis exerciari solent, Curam lectum ingressuri, omnes cum vestibulis deponant graves curas tristesque cogitationes. Praeterea praesenti forte plethorae, vel vitio abdominali, vel nervorum sensibilitati nimiae, uti in capite de agrypnia docuimus, et in sequenti de incubo docuimus, occurrendum. Utrum in homines a molestis somniis exerciarios, ope musicae, rerum suaveolentium, frictionum etc. tale exercere possimus imperium, ut imagines tetrae amoenis locum cedant, aut aliis verbis, utrum potestas concessa sit somnia ad libitum excitandi incendique, quaestio est *), quam resolvere non audemus.

F f 2

CAPUT

Miscell. acad. nat. cur. dec. II. a. 6. 1687. p. 21. S. SQUIRE the case of Henry Axford, who recovered the use of his tongue, after having been four years dumb, by means of a frightful dream. Philos. transact. y. 1748. p. 148.

- 8) De imperio, quod res externae in dormientes exerceant, legatur: WEINHOLD *Kraft d. thierisch. Magnetismus*. 3. B. 1. Abth. p. 233. NASSI l. c. p. 450. BATTIE *dissertationes crit. and moral.* p. 27 (Hic narrat, amicum vigilem, alteri dormienti totam certaminis singularis historiam auri insusurrasse, huncque eam ad literam somniasse).

CAPUT X.

D e i n c u b o .

§. XLIII.

Definitio. Literatura.

Definitio. 1. **P**erceptio suffocationis seu ponderis et oppressionis in pectore sub somno, cum desiderio vehementi locum mutandi, quin aeger id efficere queat, *incubum* ¹⁾ constituit.

Literatura. 2. De morbo isto nec poetis ²⁾ ignoto, multorumque dissertationum inauguralium argumento ³⁾, scripse-

1) *Synon.* Ephialtes (ab ἐφάλλομαι, insilio). Pnigation SWEDIAURII (a πνίγειν, suffocare). Ἐπιβολή, oppressio, compressio. Πνιγμός ἐνύπνιος DIOSCORIDIS. Oneirodynia gravans CULLERII. Succubus. Asthma nocturnum (falso). GERM. Nacht-Maare, Alp, Alp-drücken, die Trute, das Nachtmünchen. GALL. Incube, ephialte, chauchemar, cochemar. ANGL. Night-mare. ITAL. Incubo, pesarolo. HISP. Incubo, pesadilla, mampesado, mampesadilla. LUSIT. Pesadelo, pesadello. POLOX. Mara. Ross. давленіе во снѣ. DAN. Maren, Mareriden. SUEC. Mara. BELG. Alp, Nagtmerrie.

2) VIROILIUS Aeneidos lib. XII.

3) BORDINGI diss. de incubo. Jen. 1602. BACHMANN diss. de ephialte. Sedan. 1607. HETTENBACH diss. de ephialte seu incubo. Wittemb. 1607. MACROVSKY diss. de ephialte. Basil. 1618. SCHNIDT de incubo. Basil. 1618. ANASVERUS diss. de incubo. Rostoch.

scripsere: CARLIUS AURELIANUS ⁴), PAULUS AEGINETA ⁵),

1625. STOCKMANN diss. de somno, ecstasi et ephialte. Rost. 1625. WERNER diss. de incubo. Basil. 1626. FABRICIUS diss. de ephialte s. incubone. Rost. 1627. SENNERT diss. de incubo. Jen. 1630. KEPLER diss. de incubo. Regiomont. 1634. RASTHELIUS diss. de ephialte, s. incubo. Erford. 1634. ZEIDLER diss. de incubo. Lips. 1643. SCHELHAMMER (HASSELT) diss. de incubo. Jen. 1646. BANZER diss. de incubo. Witteb. 1651. ROLVINK method. cognosc. et curand. affect. particul. disp. VIII, de incubo. Jen. 1653. *Ejusdem* (GEORGI?) diss. de incubo seu ephialte. 1658. DREYER diss. de incubo. Ultraj. 1660. FRANKENSTEIN diss. de ephialte. Lips. 1660. TAPPIUS diss. de incubo. Helmst. 1661. BLUM diss. de incubo. Argent. 1662. MENJOT diss. de incubo. v. Diss. patholog. Parisien. 1662. RUTTORFER (FRIDERICI?) diss. de incubo. Jen. 1665. GROJEAN diss. de incubo. Basil. 1665. ARSEN diss. de incubo. Argent. 1666. BROTHMECK diss. de incubo. Tub. 1666. HULLENBERG diss. de incubo. Leid. 1675. OHRIM diss. de incubo. Altd. 1678. WEDEL diss. sager incubo laborans. Jen. 1678. *Ejusd.* de incubo ex epitome praxeos med. Jen. 1708. MEINCKE (CRAUSIUS?) diss. de incubo. Jen. 1683. PATERMANN (MÜLLER?) diss. de ephialte. Lips. 1688. ALBINUS (WENZLOVIUS) diss. de incubo. Francf. 1691. MAEVIUS diss. de incubo. Lugd. Bat. 1692. PETRI AN HARTENFELS diss. de ephialte. Erf. 1694. CONVENT diss. de ephialte. Leid. 1698. CROLLUS diss. de incubo. Marb. 1707. VARUS diss. de oppensione seu incubo. Jen. 1709. CRÜGER diss. epictisis de menstrui obstructione et ephialte infantum. 1712. FISCHER diss. de ephialte s. incubo. Erf. 1728. SCHIMOWSKI diss.

NETA⁵⁾, ORIBASII⁶⁾, WILLIS⁷⁾, BONET⁸⁾, HENRICUS REGIUS⁹⁾, PARACELSI¹⁰⁾, DOLAEUS¹¹⁾, HORSTIUS¹²⁾, SCHENKIIUS¹³⁾, FORESTUS¹⁴⁾, STOLL¹⁵⁾, DARWIN¹⁶⁾, REIL¹⁷⁾, WALLER¹⁸⁾, DONT¹⁹⁾.

§. XLIV.

*Symptomata. Necroscopiae.*Sympto-
mata.

1. Incubus insomniis, pavoribus, concussio-
nibus, crampis, somniisque terrificis annunciari
solet.

de incubo. LUTHER diss. de incubo. Kiel. 1730.
CHARDULLIET diss. de incubo. Argent. 1734. HUS-
SINGA diss. de incubo. Lugd. Bat. 1734. JUCH (NOR-
LER?) diss. sistens casum de incubo. Erf. 1736. TEICH-
MEYER diss. de incubo. Jen. 1740. JOSA diss. de ephial-
te. Budae 1778. KÜFFNER diss. de incubo. Pragae
1778. VAN DER BELEN diss. de incubo. Lovan. 1782.
TOURNAY diss. de incubo. Nanceji 1783. FORBER
diss. de incubo. Edinb. 1788. EYSKEIJA diss. de in-
cubo. Erf. 1798. WAECHTER diss. de ephialte. Hal.
1800.

- 4) Morb. chron. lib. I. cap. 3. 5) Lib. III. c. 15.
6) Synopsis. lib. VIII. c. 2. 7) De anima brutorum.
8) Sepulch. T. I. sect. 5. 9) Praxeos lib. I.
10) De morbis amentium. cap. IV. p. 571.
11) Encyclopaedia medica. cap. XIII.
12) Apud SCHENCK obs. med. p. 139.
13) Lib. I. obs. 253. p. 205. 206.
14) Lib. X. obs. 50. 51. 52.
15) Praelect. in morbos chronic. p. 332.
16) Op. c. Vol. 2. p. 400. 17) Fieberlehre. 4. B. p. 524.
18) A treatise on the incubus or night-mare, disturbed
sleep, terrific dreams, and nocturnal visions. Lond.
1816.
19) Diss. de incubo. Berol. 1829.

solet. Succedit sensatio ingrata, e cruribus, columna vertebrali, praecordiis, capite aut e plurimis locis simul emanans. Sensatio ista in perceptione ponderis, suffocationis, oppressionis consistit, nunc super universum corpus extensa, nunc ad praecordia circumscripta, plerumque sine visibili respirationis difficultate, cum pulsu saepissime regulari ¹⁾. Cui perceptioni phantasia plurimas causas assignat. Enimvero imaginantur aegri nunc, ac si canis, ursus, leo, gigas, vir niger ²⁾, faunus, satyrus, spectrum, saga, diabolus ³⁾ cubiculum intraret, prope lectum sederet, stragula attraheret, pectori iusliret, illudque comprimeret, mammas exsugeret ⁴⁾, quandoque ad usum turpissimae libidinis excitaret ⁵⁾; — et nunc ac si domum incensam inhabitarent, aut venti prius susurru, dein procella agitantur. Aeger se somniare ut plurimum conscius ⁶⁾, sensibus externis plane feriantibus,

1) DARWIN l. c. 2) MÜLLER l. c. Thez. 14.

3) S. LEDEL de ephialte, singularia quaedam exempla, lusum diaboli frequenter admixtum probantia. Miscell. acad. nat. curios. dec. II. n. 8. 1689 p. 236.

4) DOLAEUS (l. c.) de viro narrat, qui singulis noctibus, dum somno indulgebat, sensilem mammaram suctionem experiebatur. Papillae mammaram revera intumuerunt.

5) Tale symptoma non solum apud feminas, sed contra communem opinionem et apud viros obvenire, docet observatio ab HENRICO REGIO relata (l. c.).

6) Contraria refert exempla SCHENK (l. c.). „Nuperrime, ait, sacrificus quidam me convenit: domine,

tibus, hostem debellare, vel ipse fuga sibi consu-
lere

inquit, nisi anceurus misero afflicto, actum est et prorsus perii, tabes me habet. Vides, quam sim emaciatus, quam exsanguis? vix tenui pelle contegor, succulentus esse soleo, speciosulus et bene habitus, nuno foedum spectrum videor, hominisque inanis imago. Quid, inquam, te eruciat et quam affectus tui caustam opinaris? Dicam, ait, intrepide et valde admiraberis: sub quamlibet fere noctem ad me com meat muliereula mihi non ignota, et pectori meo illabitur, illapsa violenter comprimit, atque coarctat animae meae vias, ut aegre respirare queam. Quin clamitare cupienti vocis iter praecludit, ut quantum prae pavore nitor attollere, minime queam. Nec manus ad propulsandam injuriam, nec pedes ad capessendam fugam expedire valeo. Vinctum me et affixum tenet. Hena, inquam aubridens, nihil admirandum praedicat (ex narratione incubonem intelligebam), merum est phantasma, merum ludibrium. Nec plura moratus, phantasma, inquit: ludibrium, inquit: profecto non est, ita me Deus amet, quae hisce oculis conspiciat sum, et quae hisce manibus excreui, denarro. Equidem vigilans mentisque composita eam video eoram, et invadentem accipio conorque obluctari, sed prae languore, metu, angustia et impacta vi nihil efficio. Hominem hunc vix quivi ulla ratione ab insania revocare, sed a secundo tertiove congressu hilarior factus, morbum agnoscere coepit, et sanationis spem fiduciamque concipere. Idem pergit: „non injucundum est, quod medica quidam scribit contigisse *Avernos* in coenobio quodam. Cum enim pharmacopola, quem accubabat, inter dormiendum ineubo laborasset, eos, qui in eodem cubiculo erant, accusavit. Se enim ab

lere tentat; at incassum ob impotentiam motus voluntarios excitandi, aut clamorem, excepto interdum gemitu, edendi; donec paroxysmus sensim sensimque increscens et ad acmen tandem perductus, per subitanam expergefactionem, non sine relictis sensu defatigationis et aliquando sudore capitis pectorisque, tremoribus artuum, palpitatione cordis, susurru aurium, cephalalgia, maculis lividis 7) etc. terminatur. Paroxysmi plerumque sub primo somno, raro mane ingruunt. In recenti adhuc malo solitarii obveniunt, aliàs ita compositi, ut quivis eorum ex plurimis, aliquando decem 8) accessibus conjunctus sit, quin tamen inter unum alterumve accessum expergefactio completa, nisi rarissime, concedatur. Paroxysmus per nonnulla horae momenta durare solet. Eum ad tres horas protractum fuisse legimus 9).

nunc

illis noctu prope jugulatum fuisse, constricto collo. Quod cum socii audacter negarent, totamque in eum culpam rejicerent, qui noctem insomnem furore quodam percitus duxisset, jussus deinde est solus, laeta coena sumpta, exhibitis etiam flatuosis alimentis, dormire, cubiculo undique optime clauso. Rediit paroxysmus: daemonem esse juravit, cujus etiam faciem et gestus mirifice depingebat. Neque unquam illi aliter persuaderi potuit, nisi ubi curationem inito consilio adeptus est."

7) GRAM, *Alpenflecken*. Cfr. SCHMALL *Versuch einer med. chir. Diagnostik*, XXXVII. 6.

8) REIL l. c. p. 532.

9) LEDER l. c.

nunc semel in anno, nunc omni mense aut hebdomade, nuncque quavis nocte locum habet.

Necroscopicae.

2. Serum in cavitatibus cerebri inventum ac ventriculorum quartum attingens ¹⁰⁾. Arabum opinionem, adhuc a SENNERTO ¹¹⁾ receptam, incubum ex istius ventriculi vitio originem trahere, confirmare videtur. Praeterea incusabantur pancreas ¹²⁾, pulmones et diaphragma ¹³⁾, nervus intercostalis, phrenicus et recurrens ¹⁴⁾. Nec cordis vitia a morbo nostro aliena sunt ¹⁵⁾.

§. XLV.

Causae, Diagnosis.

Causae.

1. Hystericæ, hypochondriaci, homines timidi ¹⁾, juvenes decimum tertium aetatis annum excedentes ²⁾, praesertim incubo subjiciuntur. Pro causis occasionalibus habentur imaginatio ³⁾, moeror, curae, vigiliae, intentio animi, vita sedentaria, flatus ⁴⁾, vermes ⁵⁾, crapula ⁶⁾, ebrietas ⁷⁾,

10) BONET l. c. p. 180.

11) Lib. I. med. pract. part. II. cap. 29.

12) Exulcerationem detexit HIGHMORUS teste BONETO l. c.

13) ETTMÜLLER. 14) DOLAEUS l. c.

15) MORGAGNI de sed. et caus. morb. epist. XVIII. art. 6.

1) Teste FORESTO (l. c. obs. 51) cordati et animo alacres nunquam vexantur ephialte.

2) PUMINE vid. RICHTERS chir. Bibl. 11. B. p. 347.

3) RÖPER (diss. de imaginatione morbor. causae. Hal. 1694. p. 11) de studioso narrat, qui cum praecedente die de ephialte loqui audivisset, ab eo altera nocte prehensus est.

4) HALDREHEIM (de affect. caput. p. 434) ait: qui scire

tas 7), plethora 8), retentio menstruum 9) et spermatis, aërque oclusus et decubitus supinus 10).

2. *Incubus a somniis consuetis terrificis in eo* Diagno-
sis. differt, quod somnians phantasias suas pro realibus habet, aeger autem ephialte laborans se somnare ut plurimum conscius est. Ab *asthmate nocturno* distinguitur *ephialtes*, quod illud in homine vigili cum summa respirandi difficultate contingat; hoc vero in dormiente, plerumque sine evidenti pectoris agitatione. Non ignorandum, veteres ephialten feminarum *incubum*, marium autem *succubum* denominasse 11), morbumque, de quo agitur, alias aegritudines, epidemicis 12) et febribus intermittentibus 13) non exceptis, comitatum fuisse.

§. XLVI.

cupit, quid sit incubus, is ante somnum comedat castaneas et desuper bibat vinum faeculentum.

5) PAULLINI cent. IV. obs. 3.

6) CAEL. AURELIAN. p. 239.

7) TIMAEUS A GÜLDENKLEE lib. I. cap. 17.

8) JUNKER conspect. med. theor. pract. Tab. I. de incubo. p. 425.

9) SCHNIEWSKI l. c. p. 11.

10) ABERKINA lib. I. Fen 3. Tr. 2. c. 5. BONET l. c.

11) RUTTORFER l. c. cap. I.

12) LYSIMACHUS apud CAEL. AURELIANUM. LAURENT notice sur une éphialte, qui a attaqué à la fois un bataillon du Régiment de la Tour-d'Auvergne. SEDILLOT rec. périod. de la soc. de méd. de Paris. T. 63. p. 17. Et Dict. des sciences médicales, T. 24. p. 309.

13) SYLVIVS praxis.

§. XLVI.

Prognosis. Cura.

Prognosis.

1. Progrediente aetate incubus saepe sponte evanescit. Aliquando haemorrhagiis, imprimis epistaxi, menstruis, haemorrhoidibus, nec non febribus ¹⁾ solvitur. Aliàs, praesertim si accessus crebro redeant, debilitatem, sudorem capitis et pectoris, maculas lividas, tremores artuum, et palpitationem cordis relinquunt ²⁾, transitus ephialtae in epilepsiam, melancholiam, maniam, catalepsin, et praesertim in apoplexiam, timendus est. Quid quod incubi letalis habetur exemplum ³⁾.

Cura.

2. Cura incubi in fuga caussarum excitantium, praesertim vitiorum diaetae ⁴⁾, ac pro illarum natura aegrorumque constitutione, in evacuatione sanguinis, praesertim locali, temperantibus, alvum subducentibus ⁵⁾, clysteribus, frictionibus abdominis, emeticis ⁶⁾, amaris, anthelminthicis, antispasmodicis, ut croco ⁷⁾, paeonia ⁸⁾, et tonicis,

1) RICHTER l. c. 2) BONET anat. pract. lib. I. sect. 5. p. 153.

3) M. FR. LOCHNER incubus in juvene lethalis. Miscell. acad. nat. curios. dec. II. an. 5. 1686. p. 446.

4) Quare cibna commendandus, qui facile concoquitur, plurimum nutrit, bonum alimentum suppeditat, non facile corrumpitur, ac paucis excrementa relinquit.

5) Aloe commendatur a ZACUTO LUSITANO in prax. histor. lib. VIII. obs. 10.

6) C. AURELIANUS p. 291. 7) HERTOD crocologia. c. 8.

8) PAULUS AEGINETA l. c. GORNAKUS refert, paeoniam ab antiquis *ἑπιάλιον*, eo quod adversus ephialten valeat, vocatam fuisse.

nicis, e. c. ferro ⁹⁾ et cinchona ¹⁰⁾, non neglectis consortio amoeno, peregrinationibus, equitatione, decubitu in lecto duro etc. consistit. Redeuntibus crebro insultibus custos prope aegrum cum jussu, apparente inquietudine mox illi aliam corporis positionem conciliandi, constituendus est ¹¹⁾. Aegrum per odoramenta, errhina, aut sonum campanulae ¹²⁾ excitare, periculosum videtur. Quodsi jam sponte evigilaverit, membra perfricanda ¹³⁾.

CAPUT XL

De somnambulismo.

§. XLVII.

Definitio. Literatura.

1. **M**unia vigilantis hominis in somno, ce-
terum sano, exercita, *somnambulismum* ¹⁾ de-
signant.

2. Sin-

9) CHIRAC, an incubo ferrum ruginosum? Montpel.
1612.

10) DARWIN l. c. p. 461.

11) BONET l. c.

12) DARWIN l. c.

13) SENNERT l. c.

1) Morbus GRAEC. *αἰθήρη*, noctegesia, hypnobatosis et nyctobasis. LATIN. Noctambulatio, noctisurgium, ambulatio in somno, nocturna insania SOHENKIT, mania somni PARACELSI, sopor vigilans PLATERI, oncirodynia CULLEN, rhembasmus SWEDIAUR. GERM. *die Mondsucht, das Nachtwandeln*. GALL. *Maladie*

Literatura.

2. Singularis et admirabilis hujus passionis mentionem injecerunt ²⁾: HIPPOCRATES ³⁾, ARISTOTELES ⁴⁾, GALENUS ⁵⁾, DEL CONIMBRIONES ⁶⁾, LAURENTIUS ⁷⁾, SCALIGER ⁸⁾, LANGIUS ⁹⁾, PETRUS SALIUS DIVERSUS ¹⁰⁾, LIBAVIUS ¹¹⁾, FR. VALERIO-LA ¹²⁾, ZACUTUS LUSITANUS ¹³⁾, HELMONTIUS ¹⁴⁾, SYLVIVS ¹⁵⁾, WILLISIUS ¹⁶⁾, COELIVS RHODIGI-NUS ¹⁷⁾,

des somnambales. ANGL. Sleepwalking. BELG. Nachtwandeling. POLON. Lunatyzm. ROSS. во-снѣ хожденіе. Aegri lunatici, noctivagi, noctivadentes, ambulones LEMNI, citrones. GERM. (quondam) Mondensüchtige, Mondenschichtige. ITAL. Nottambulo, sonnambulo. HISP. Noctambulo, somnambulo. DAN. Søvngænger. SUEO. Sömnngångar.

2) Praeter auctores mox laudandos, quorum elenchum peculiari studio colligere sategi, plurimi etiam alii a GREGORIO HONSTIO, ut ALBERTUS, TOLETUS, TATARETUS, MIXALDUS, FRACASTORIUS, BODINUS, COELIVS adducuntur.

3) Epidemicor. p. 252. 4) De generatione animal. c. I.

5) De motu musculari. lib. I. cap. 4. Comment. I. in Lib. III. Hippocr.

6) Lib. de somno et vigiliis.

7) Hist. anstom. lib. IV. Qu. 11. p. 208.

8) Lib. de subtil. ad Hieron. Carden. Exerc. I. sect. I.

9) Epist. II. epist. 45.

10) Lib. de affect. particular. cap. 18.

11) Part. II. singul. tract. de somnambulis. p. 259.

12) Lib. II. observat. med. obs. 4.

13) Med. pr. historia, lib. I. No. 15.

14) Tract. demens idea. §. 37. p. 269. Tract. pharm. §. 54. p. 136.

15) Prax. med. c. 33. p. 474.

NUS¹⁷⁾, JACOBUS HORSTIUS¹⁸⁾, MOEBIUS¹⁹⁾, TANDLER²⁰⁾, FONSECA²¹⁾, MARCELLUS DONATUS²²⁾, SENNERTUS²³⁾, PLATER²⁴⁾, FABRICIUS HILDANUS²⁵⁾, ETTMÜLLER²⁶⁾, GREGORIUS HORST²⁷⁾, J. LANZONIUS²⁸⁾, MAJOLI²⁹⁾, DEL - RIO³⁰⁾, JONSTON³¹⁾, BLANCARDUS³²⁾, HAEFFER³³⁾, AB HEER³⁴⁾, POMARIUS³⁵⁾, SALZMANN³⁶⁾, SCHENKIUS³⁷⁾,

16) De anima brutorum. c. 26. p. 141.

17) Lect. antiquar. 1517. lib. XVI. c. 86. recens edit. lib. XXX. c. I.

18) De natura, differentiis et causis eorum, qui dormientes ambulant. Lips. 1593.

19) Epist. anat. med. lib. II. Part. 2.

20) Diss. de noctisurgio. Witenb. 1602.

21) Consil. med. T. II. Consil. 100. p. 576.

22) Hist. med. mirab. lib. II. c. 1. p. 93.

23) Pr. lib. I. P. II. c. 10.

24) Observat. lib. I. p. 12. Praxis med. c. 4.

25) Op. med. chirurg. cent. II. obs. 84. 85.

26) Opp. med. omn. lib. I.

27) Diss. de noctambulis. vid. Opera med. Norimb. 1660. Institut. medicar. disput. III. coron. II. p. 202. Quaest. XI.

28) De noctambulatione periodica. Miscell. acad. nat. cur. dec. III. ann. 5 et 6. 1697. 1698. p. 246.

29) Dierum canicul. T. I. Colloq. 4. p. 87.

30) Lib. I. disquis. magic. c. III. Qu. 3. p. 22.

31) Thaumatochr. natur. class. 10. c. 6. art. 6. p. 487.

32) Instit. c. XXI.

33) Hercul. med. lib. I. c. 4. de affect. capitis. p. 50.

34) Obs. med. No. 2.

35) Diss. I et II. de noctambulis. Wittenb. 1649.

KIUS ³⁷⁾, LEMNIUS ³⁸⁾, MOEBIUS ³⁹⁾, SCHOTTUS ⁴⁰⁾,
 HECKLER ⁴¹⁾, CABALLIS ⁴²⁾, HERMES ⁴³⁾, THEIS-
 NERUS ⁴⁴⁾, THEODOR CRAANEN ⁴⁵⁾, ALBINUS ⁴⁶⁾,
 CLAUDER ⁴⁷⁾, REUSNER ⁴⁸⁾, BONETUS ⁴⁹⁾, FR. HOFF-
 MANN ⁵⁰⁾, STEFFANIUS ⁵¹⁾, ZWINGER ⁵²⁾, BOHN ⁵³⁾,
 BOUGEANT ⁵⁴⁾, KNOLL ⁵⁵⁾, ROEFER ⁵⁶⁾, PAGANI ⁵⁷⁾,
 SOAVE ⁵⁸⁾,

36) Diss. de somnambulismis. Argent. 1651. 1663.

37) Diss. de ambulatione in somno. Jenae 1671. observ.
 lib. I. p. 127.

38) De occultis naturae miraculis. lib. II. c. 5.

39) Epit. institut. lib. II. P. II. c. 12.

40) Phys. curios. lib. III. c. 22.

41) Diss. de noctambulis. Giesae 1665.

42) Act. erudit. a. 1688.

43) Diss. de somnambulis. Brem. 1669.

44) Diss. de ambulatione in somno. Jenae 1671.

45) In observat. super Henr. Regii prax. med. lib. I.
 medicat. 10.

46) Diss. de somnambulismo. Fr. 1689.

47) Rara somnambuli historia. Miscell. acad. nat. cur.
 dec. II. an. 5. 1686. p. 380.

48) Noctambulatio curata. Ephem. acad. nat. curios.
 cent. 5 et 6. p. 24.

49) Sepulchr. anat. lib. I. s. v. p. 152.

50) Diss. de somnambulis. Hal. 1695. Opp. Suppl. II, 2.
 p. 230. Etiam sub nomine HORSTETRA.

51) De somnambulis. Basil. 1701.

52) Diss. in fascic. diss. med. select. Basil. 1710.

53) Casus aegri noctambulat. morbo laborantis resolu-
 tus. Lips. 1717. Haller coll. diss. pr. Vol. VII. p. 438.

54) *Observations curieuses*. T. 3. p. 256.

55) *Abhandl. eines kürzl. vorgefall. Nachtwandlens*. Hal-
 berst. 1747. *Abh. v. d. Nachtwandlen*. Quedlinb. 1753.

SOAVE ⁵⁸⁾, PORATI ⁵⁹⁾, RICHTER ⁶⁰⁾, MEIER ⁶¹⁾,
SAUVAGES ⁶²⁾, FRICKE ⁶³⁾, HIESMANN ⁶⁴⁾, HEN-
NINGS ⁶⁵⁾, FIGATTI ⁶⁶⁾, LEVADE ⁶⁷⁾, BURSERIUS ⁶⁸⁾,

VAN

58) *Von d. Wirkungen der Seele in d. menschl. Körper, nach Anleit. der Geschichte eines Nachtwandlers.* Halberst. 1748.

59) *Aggiunta alla storia del sonnambulo.* Vicenza 1751.

60) *Relazione di un nuovo e meraviglioso sonnambulo, Gaetano Castelli.* Opuscoli scelti sulle scienze e sulle arti T. 3. p. 204. 265. Et: *Opuscoli metafisici.* Milano 1794. p. 181.

61) *Storia d'un celebre sonnambulo, Gaetano Castelli.* Opuscoli scelti sulle scienze e sulle arti T. 16. p. 267.

62) *Dist. de statu mixto somni et vigil., quo dormient, multa vigilantium munera obeunt.* Goett. 1756. Op. Vol. II.

63) *Versuch e. Erklärung des Nachtwandlens.* Halle 1758.

64) *Nosologia method.* T. III. P. I (Class. VIII. genus VI. p. m. 306).

65) *Commentatio de noctambulismo.* Hal. 1773.

66) *Briefe üb. Gegenstände der Philosophie.* Gotha 1778.

67) *Von den Träumern u. Nachtwandlern.* Weimar 1784.

68) *Journ. encyclop. de l'an* 1762. *Sonderbare Geschichte des S. B. Nigretti, eines Nachtwandlers.* Nürnberg. 1783. item: *Magaz. z. Erfahrungseelenkunde v. MORITZ und POCKEL* 7. B. 2. St. p. 70. Berl. 1789.

69) *Détails sur une espèce de somnambulisme causé par des coups reçus à la tête.* in *Mémoires de la société des sciences physiques de Lausanne.* Vol. 3. hist. 6. mém. 31. Et LEVADE, REYNIER, BERTUOUT VAN BERCHEM rapport fait à la société des sciences physiques de Lausanne sur un sonnambule naturel. ibid. Vol. 3. hist. p. 8. mém. p. 98. 124.

Frank Prax. II. L. 1.

G g

VAN DER BELEN ⁶⁹), DARWIN ⁷⁰), UNZER ⁷¹), WIENHOLT ⁷²), FEDER ⁷³), PEZZI ⁷⁴), DESSESSARTZ ⁷⁵), SCHLOEZER ⁷⁶), YEATS ⁷⁷), PALLONI ⁷⁸) aliique ⁷⁹).

§. XLVIII.

- 68) Instit. pract. med. T. III. cap. V.
- 69) Diss. de somnambulatione. Lovan. 1786.
- 70) Zoonomia or laws etc. Vol. I. sect. 19.
- 71) Der Arzt. 74. St. p. 337.
- 72) Sieben psychologische Vorlesungen über d. natürlichen Somnambulismus. Lemgo 1805.
- 73) In MORITZER's Magazin für Erfahrungseelenkunde 2. B.
- 74) Storia di un stranissimo somnambulismo. Giornale della soc. med. chirurgic. di Parma. Vol. 14. p. 41.
- 75) Extrait de l'histoire d'un somnambulisme, qui a duré depuis le 26. Novembre 1806. jusqu'au printemps 1808. et dont les phénomènes ont été accompagnés d'une affection nerveuse très-grave, lue à l'acad. de médecine. SEDILLOT rec. périod. de la soc. de médec. de Paris, T. 40. p. 155.
- 76) Diss. de somnambulismo. Vilnae 1816.
- 77) History of a case of somnambulism. Medical transcript. published by the college of physicians in London. Vol. 5. p. 444.
- 78) Istoria di un somnambulismo con alcune riflessioni sopra questo fenomeno e sul sonno. Livorno 1829.
- 79) Mémoires de l'ac. des sciences à Paris. 1742. p. 409. Literaturbriefe 6. Th. No. 97. Opusc. scelti T. 3. p. 265. Hamb. Magazin 7. B. p. 489. Lettera sulla malattia e morte del somnambulo Gaetano Castelli. In Nuova scelta d'opuscoli interessanti sulle scienze e sulle arti T. 1. p. 361.

§. XLVIII.

Symptomata. Causae.

1. Homo somnambulismo subjectus ^{veritati} ^{Sympto-} ^{mata.} sanus cubitum petit, ac somno plerumque normali indulget, donec post horam unam alteramve, prae-
via aliquando inquietudine, nunc silens, nunc tumultuans, vel clausis vel apertis oculis, immobili pupilla, circumeat, et aut pauca et vilia, aut plura miraculosa et vigilantibus impossibilia molitur: iterumque cubitum petens tranquille obdormiat. Fertur de somnambulo, qui clausis oculis noctu surgebat et oberrabat, clavem vero secum portabat, januam post se clausam rediens aperiebat, ac hanc clavem consulto ab aliis subter pulvinar absconditam inveniebat ¹⁾, — de duabus monachis, quae fere singulis noctibus apertis oculis totum monasterium perambulabant, per scalas cursim descendebant et ascendebant, lumina accendebant etc. ²⁾, — de famulo, qui equum constitutis horis ad fores Praefecti deducebat sub somno, quadam nocte ephippium imposuit, frænum adaptavit, stapedis lorum pro more arripuit, ad facilem domini adscensum, praeivit illi laternam gerens: iis, qui in excubiis erant, cum acclamarent, *qui va là?* respondebat, *sergent major* etc. ³⁾; — de somnambulo, qui nudus surgebat,

G g 2 silens

1) HELMONTIUS l. c. p. 126.

2) WÄFFER obs. med. pract. Obs. 44. p. 335.

3) BONET thesaur. med. pr. lib. II. esp. 20. p. 718.

silens ad fenestram pergebat, funem e trochlea pendentem arripiebat et in domus fastigium prorepens in opicarum nidum incidit, pullos indusio involvit, eosque ad lectum retulit, bene inde dormiens 4), — de alio, qui noctu surgens pluteum aperuit, scripsit, saepius alta voce, quod scripserat, relegit, demum cum risu et cachinno sibi ipsi applausit 5), — de alio, qui somnians se propter negotia sua equitaturum esse, e lecto surgens, indutus vestimentis suis, cothurnisque et calcaribus appositis, super fenestram conscendit et hinc indeque divaricatis cruribus parietem, perinde ac si equus esset, et voce et calcaribus ad cursum incitabat 6), — de alio, equite Malacensi, qui quasi Mauris obviam iturus, surrexit noctu, arma cepit et ad litus equitavit 7), — de alia, quae sub somno varias perficit gesticulationes, nonque solum varia colloquia incipit, clare ridet et flet, sed et ceteros animi motus, mimi versati instar, exprimit, mappas in lecto jacentes in literarum speciem complicat, petit lumen, quaerentibus, cuinam illas datura sit, hanc vel illam amicarum suarum nominat recitatque, schedam inscribit sermone gallico, obsignat, ac, veluti famulae illam porrigens, cursui publico tradi jubet 8), — de alio, qui

4) JAC. HORSTIUS p. 173.

5) AB HEER l. c. p. 32.

6) SALIUS DIVERSUS l. c.

7) REIES elys. jucund. quaest. camp. Qu. 37.

8) Acta Vratisl. 1722. Feb. Class. IV. Art. 2. Cfr. UNZER der Arzt 3. Th. 74. St. p. 295.

qui artem gladiatoriam exercuit⁹⁾, — de alio, qui fornacem ad ligna ordinanda intravit¹⁰⁾; — de alio, qui sub somno filum per acus foramen ducebat¹¹⁾; — de alio, qui notas botanicas vegetabilium juxta Linnaeum determinavit, formulas medicinales expedivit, pecuniam pro medicamentis accepit et quod pretium superabat reddidit¹²⁾; — de alio, qui laboribus campestribus incumberebat¹³⁾; — de alio, qui oculis clausis ex chartis musicis ludebat super cymbalum¹⁴⁾, — de alio, qui orationem sacram concinnavit, cacophonias et errores orthographicos emendabat¹⁵⁾, — de alio, qui carmina composuit¹⁶⁾ — alioque, qui ea composita recitabat, ita, ut ad illum audiendum multi in domo ejus pernoctarent et eximios sibi a doctrina ejus profectus promitterent¹⁷⁾, — de alio, qui acus puncturam non percipiebat¹⁸⁾, de alio denique, qui famuli officium peragebat, comedebat, bibebat, sine gustu tamen¹⁹⁾. Quibus exemplis quatuor observationes ex nostra experientia desumptas addamus¹⁹⁾. E somno vel sponte vel vi

exci-

9) SCHANCK l. c. obs. 137. 10) LIBAVIUS l. c. p. 2.

11) KNOLL l. c. p. 110. 12) SOAVE l. c.

*) PALLONI l. c. 13) FEDER l. c. p. 83.

14) *Dictionnaire universel raisonné des connoissances humaines*. T. 38. et WIEBHOLT l. c. p. 22.

15) SCHUBERT l. c. p. 351.

16) EUSEB, NIERENBERG philosophia curiosa. lib. II. c. 25.

17) MONBODDO *antient metaphysics*. Lond. 1782.

18) FIGATTI l. c.

19) *Observatio I.* Vidus viginti sex annorum, e stirpe

excitatus somnambulus, aliquando furiosus evadit ²⁰),

plicosa descendens, constitutionis acrophulosa, nutritia officio per septem menses exercito, menstrua sine nota causa privatur. Hinc a bimestri infirmior, morosa, taciturna, irascibilis, sociarumque impatiens, noctes ita turbatas habuit, ut vix lecto recumbens vociferare, surgere, huc illic vagari, infantem, quem lactabat, manibus vibrare, nullum clamorem, nisi nomina compellatione, aut fortioribus a hero alapis inflatis excitari consueverit. Die septima Maii 1815, in clinicum institutum Vilmense recepta, ac per unam et viginti noctes observata, has fere somni turbas exhibuit. Femina decimam inter et primam horam noctis, vix aliquo ant et longiori somno usa, subito jactat porrigitque corpus, brachia oculosque saepius fricat, dyspnoea frequenter angitur, ea remittente crebro gemitu et vociferatione quasi acerrimi doloris sensum gestusque hominis veluti sceleris conscientia agitati prodit. Quas inter corporis volutationes mira quadam loquacitate garrit de rebus domesticis, de infante, cui sibilando veluti somnum conciliat, saepissime autem de morbo, quodque maxime mirum, quacationibus cuique horum objectorum suo tempore accommodata apte respondet: spasmos itaque, capitis, lumborum abdominisque dolorem, sitim, famem, nec non pruritum universalem inquit: balnea vero, sanguinis missiones, frictiones camphoratas, prunorum domesticorum nec non foliorum sennae usum certissima morbi remedia fore, indicat; aemrocinationis vero filum, seu somno tranquilliori intercurrente, seu alio modo praeruptum, scite colligit. Inter ea aegram aemel vel bis de nocte festinanter e lecto prosilientem, vestes, more vigilantium, prius examinatas circumcingentem, eas consilio

dit²⁰), semper nescit quid peregerat, et quid factum

absconditas arrepta aut quæsitæ candela, invenientem, sabulum plantas pedis inhaerens, antequam calceamento indueret, abstergentem, acceleratoque et vacillante gressu cubicula permeantem, et, quin oculis apertis candela opposita aut adstantium numero turbaretur, foras petentam, ibique, obiecta omni pudicitia, trullæ insidentem. Ast nil unquam excrevit, eademque via lectum repetiit, vestes suo loco deponendas auxit, pulvinaribus opposito in latere consulto stratis nil cunctans rite sese componit. Haud vice simplici in itinera suo horologium aspiciens horam recte indicabat, ædilia opposita arte evitabat, e permultis poculis illud aquam continens eligebat, idque genus alia in obscuro ceterum loco perficiebat. Interea omnes istæ turbæ crebro, ast perbrevis somno quietiori interrumpi, sed cessantibus ante auroram jactationibus placidus binarum vel trium horarum somnus eegram reficere solebat. Eadem interdum frustra de noctu actis interrogabatur. — Præstigio ægræ nocturno, quantum fieri lixuit, morem gerentes, vanaectionem, balnea, lenia alvi subducentia, in usum ducebamus, addito, cum morbi longior duratio dispositionem in maniam aliquomodo denotaret, tartaro amético, dosi ad grana octo sensim prolata. Quorum, uti videbatur, beneficio, expeditis menstruis copiose per triduum fluentibus, morbus ita extinctus fuit, ut femina anno 1817. adhuc incolumis viveret.

Observatio II. Juvenis rusticus, sedecim annos natus, ingenio, pro ætate et conditione sua, sagaci, pavidus et meticulosus, dum patrem ante aliquot hebdomadas repentina absumptum morte lugebat, ipsam mediam ad noctem duos ignotos horribilesque viros in

ctum ab eo inscio, admiratur, aut per somnia talia

somno sibi vidisse erat visus: tum conclave tardis passibus ingressos lectum ejus accedere, ac, ut ipsos protinus sequeretur, vultu minaci voceque aspera evocare, quod ni faceret, proxima nocte vi correpturos tracturosque secum. Juvénis prae formidine excitatus hoc majori moestitiae sese dedit. Biduo inde exacto, dum placidum carpebat somnum, ecce pallida defuncti parentis umbra, in eorundem virorum comitatu, aegro juvenis animo observatur, ac sectatores illos, ut filium, quanquam invitum, secum portent manibus, jubet. Fertur per amoenissima et immensa camporum spatia, audit jucundos fidium tiliarumque cantus, loca omnia personantes, videt juvenum per prata laetissima saltantium choros, epulisque opimis in optimatum corona fruitur. At subito rerum omnium pervertitur facies. Nimirum evanescente patris imagine duri illi comites juvenem in aëra sublatum subito in dolium projiciunt. Postridie famulae contubernales, vacas mulsum cuntes, juvenem in stabulo, reipso dolio vacuo inclusum, levi stragula, quam secum abstulerat, contextum, eumque frigore obrigescentem (hiema enim tum rigida erat) et prope exanimem inveniunt. Frictionibus ac leni calore excitatus praeter enarratum somnium nihil quicquam recordabatur. Exacta hebdomade iterum media nocte e lectulo discessit, sed januam elusam frustra aperire conatus, mox ad cubitum sese contulit. Deinceps morbus omnino cessavit.

Observatio III. Sartor judaeus, pauper, 24 annorum, ex gubernio Witepsk, constitutionis sat gracilis, mense Octobri 1816. servitii quaerendi causa Vilnam pervenit, atque, quo primum vires ab itinere pedestri amissas recuperaverat, sequentia mihi multis-

taliam apparuisse firmiter sibi persuadet. Expergefit autem

que alia exhibuit. Cubitum petens, somno sano spatium dimidiae horae fruebatur. Dein oculis et ore ad apertiam, pupilla tamen admota luce immobili, humili voce, at distincte preces suas consuetas hebraicae praecinebat. Ad nonnullas vero earum atrophas perventus, en darente vocem ad vehementissimam ejulatus naque attollebat, additis simul singulis rabbinorum in templis gesticulationibus. Tunc faciem pallidam, motus convulsivos veluti fletum exprimentes, praese ferebat. Corporis universa superficies sudore copioso, viscido, frigidoque, cooperiebatur, cum pulsu contracto ad 130. Scena haec stupenda a placidiore orandi modo excipiebatur, subsequente citius tardiusve novo furore, et sic alternatim per horam unam alteramve, donec scilicet preces terminum praescriptum attingerint. Concussio fortiter aegro terrefactus evigilabatur; ast concessa de novo quiete, iterum in somnum incidebat, quo vigente filum precum *ibi, ubi abruptam fuerat*, exacte reassumebat. Vigil se rerum sub somno peractarum haud recordari fessus est. Narrabat tamen de somnio habituali, sub quo illi judaens senex, barba candida instructus, et librum secum gerens, apparere solet, *aiens: surge et lege.* — Malum, de quo agitur, ab infantia repetit juvenis, ceterum sanus, asserens et fratrem suum simili pacto laborare. Paroxysmi quotidie exceptis die Martis, et casu defatigationis inusitatae corporis, recurrere erant soliti.

Observatio IV. Sacerdos Novocomensis hieme 1830. curru, equo singulo vecto, *Varese* petiit. Sex circiter absolutis miliaribus Italicis, propter intensum frigus currum dereliquit atque iter pedibus prosequutus est. Lente sic proficiscenti supervenit nox. Con-

autem saepe per nominis sui acclamationem; alias ne humum quidem cadendo ²¹⁾. Fertur de somnambulo, quem uxor nullo pacto in lecto retinere potuerat ²²⁾.

Causae. 2. Somnambulismus vitium est aliquando haereditarium ²³⁾, adolescentes, juvenes et viros crebrius, quam infantes, pueros et senes aut feminas afficiens, nulli temperamento parcens ²⁴⁾, crebrius apud hypochondriacos ²⁵⁾ et homines ultro citroque discursantes mirisque uti gestibus solitos ²⁶⁾ obveniens; cui in praedispositis ansam dare solent, aër humidus nebulosus ²⁷⁾, plenilunium ²⁸⁾, praecipue si radii lunares caput dormientis allidunt ²⁹⁾,

fugit itaque ad cauponam pagi proximi atque, equo stabulo commisso, coenam sibi ordinavit. Haec cum retardaret, defatigatus prope caminum sedens, incidit in somnum, quo vigente surrexit, cauponam dereliquit, ac rursus Novocomium versus passus direxit. Absolutis sic jam quatuor milliaribus, dormiens, vicum, horologio publico horas pulsante, intravit. Terrefactus a tali sono humum cecidit, expergefactus est, atque in propinqua domo auxilium petiit obtinuitque.

20) SOAVE l. c. p. 265.

21) THEISENER l. c. p. 20.

22) AB HEER l. c.

23) WILLIS l. c.

24) LIBAVIUS l. c. p. 358. JAC. HORSTIUS l. c. p. 135. 226. TANDLERUS l. c. p. 171. contra RHODIGINUM temperamentum melancholicum inculpantem.

25) SALIUS DIVERSUS, HECKERMANN, RHODIGINUS, SCHENCK.

26) LEVIN. LEMNIUS l. c.

27) JAC. HORST l. c.

28) LANZONI l. c.

dant ²⁹⁾, vinum ³⁰⁾, cerevisia crassa, lupulata, fortis, semina papaveris, pisa, fabae, lactuca vespere in coena largius sumpta *), vermes, percussio capitis ³¹⁾. Ad causam proximam quod attinet, communi consensu ³²⁾ in phantasia per aliquod objectum, quod ipsa sibi vel memoria repraesentat, irritata, ponitur, ita ut homo, sensibus externis quasi ligatis, ratione obscurata, per phantasia concitatus cogatur e lecto surgere, ambulare et sic ad propositi finem usque agere. Pro varia autem objecti indole variae excitantur actiones. Sic adolescens de servitiis ad mensam in convivio propediem celebrando, parentum repetito monitu sollicitus, vespera tandem convivii diem praecedente, circa mediam noctem surgendo et ambulando triclinium adiit, exinde cochlearia, mappulas, cultros auferre volens ³³⁾; sic juvenis post rixas inter studiosos Hispanos et Gallos Montis pessulani, alto somno oppressus, derepente se attollens, arma capiens, fores aperiens, multa obmurmurans, quasi furio-

29) MACROBIUS lib. VII. Saturnal. c. 16. SENBERTUS l. c. cap. 19. p. 121. MORBIUS l. c. p. 258.

30) AB HEER l. c. LIBAVIUS l. c. p. 266.

*) J. E. FODÉRE *essai théorique et pratique de pneumatologie humaine, ou recherches sur la nature, et le traitement des flatuosités et diverses vésanies, telles que l'extase, le somnambulisme etc.* Strasbourg 1829.

31) LEVADE l. c.

32) SYLVIVS l. c. p. 474. BLANCARDUS l. c. p. 434. BOHN §. 17. FR. HOFFMANN §. 8.

33) FR. HOFFMANN l. c. §. 5.

furiosus prosilire est visus ³⁴⁾; sic juvencula casta prima matrimonii nocte somnians, virum quendam sibi vim inferre velle, fugam in somno tentavit ³⁵⁾; sic tandem virgo furore uterino cum frequentibus pollutionibus nocturnis vexata, sub somnambulismo, forficem majorem in uteri vaginam violenter intrusit, seque hac ipsa sauciavit sat periculose ³⁶⁾. Praeterea quivis actiones temperamento suo respondentes peragere videtur. Bellicosus saltem erat somnambulus gladiator, de quo SCHENCK ³⁷⁾ refert.

§. XLIX.

D i a g n o s i s.

S. simul-
latus.

1. Ne noctivagantes illico pro somnambulis declaremus! Illorum enim multos eheu! quaevis urbs, praesertim scientiarum universitatum sedes, continet ¹⁾. Nec *simulati somnambulismi*, inprimis clandestini amoris causa, desiderantur exempla ²⁾. De criteriis hic in usum ducendis alibi ³⁾ actum est.

2. SA-

34) VALLERIOLA l. c.

35) SALIUS DIVERSUS l. c. THEOD. CRAANEN l. c. p. 95.

36) CABALLIS l. c. et ALBINUS l. c. p. 29. 37) l. c.

1) Legatur, quod Jesuita BELLARMINUS (oper. T. VI. conc. 6) de discipulis suis Lovanii, quodque B. FRANZIUS P. I. hist. animal. c. 25. de helluonibus dixerat, quorum auctorum verba a BONNIO (l. c. §. 2) referuntur.

2) BONN l. c. §. 12.

3) Cap. VI. §. XXXII. 4.

2. SALUS DIVERSUS ⁴⁾ et ETTMÜLLERUS ⁵⁾ S. an morbus? somnambulismum e morborum civitate excludunt. Erroneam hanc opinionem GR. HORST ⁶⁾, FR. HOFFMANNUS ⁷⁾ et THEISNERUS ⁸⁾ aliique refutarunt: ac re quidem vera, nisi somni, ad functionum integritatem tam necessarii perturbatio, caque per phaenomenon tam arduum, ut somnambulismus, effecta, morbosa haberi posset; dimidia morborum pars ex compendiis medicis exulare deberet. Sunt porro, qui indolem quidem morbosam noctambulismi concedentes, hanc passionem tamen nihil aliud, quam aliorum morborum symptoma ⁹⁾, cum comate, caro et lethargo ¹⁰⁾, vel cum incubo ac vertigine ¹¹⁾ affinitatem servans, declarent.

3. Quum in somno etiam normali homo ma- Limites.
nus et pedes de loco in locum transferre, nunc de latere in latus sese movere, modo in dorsum modo in ventrem se convolvere, seque erigere possit; *non omnis sane dormientium motus* pro somnambulismo declarandus est. *Somniloquentia* fortasse excipi ac singularis ejusdem morbi forma haberi mereretur. In somnio saltem magis motum minorum musculorum, voci et articulationi verborum inservientium, quam majorum illum, corpus o loco moventium, admiramur. Et homo secreta
sua

4) L. c. 5) L. c. p. 425. 6) L. c. 7) L. c. §. VI.

8) L. c. p. 7. 9) THEISNERUS L. c. p. 7.

10) SENNET L. c. 11) MORBIUS L. c.

sua sub somno enuncians certe somnambulo non felicior. Praeterea somniloquentiam somnambulis junctam fuisse constat ¹²⁾. Ad somnambulismum autem conditio ea minime pertinet, sub qua *ebrii* aliquando surgunt ad naturae postulatis satisfaciendum, neque id satis vigilanter, ut LIBAVIUS de sartore quodam narrat ¹³⁾. Tandem ad somnambulismum quoque non revocamus statum eorum, qui, per plana iter facientes et sub eodem somno capti sensim obdormiscunt, dormientesque aliquo usque progrediuntur, donec ad minimum obstaculum allidentes, iterum expergiscantur, id quod GALENUS de se ipso conscripsit ¹⁴⁾; aut conditionem illius, qui, ut PLATERUS ¹⁵⁾, testudinem a coena pulsans et obdormiens in lusu nihilominus pergebat, quod adstantes asseverarunt; vel casum in typographo observatum, qui graecum exemplar corrigens et obdormiens a lectione tamen non cessavit ¹⁶⁾. Contra vero ad somnambulismum efficiendum id nequaquam requiri nobis videtur, ut homo sub somno absolute *nocturno* vagetur, aut ut necessario *de lecto* surgat: cum in eo theo-

logo,

12) HENR. AB HEER lib. I. obs. 2. p. 34. Vir surgens noctu et ambulans comitanti uxori omnis, quae per diem callide celaverat, sincere exposuit et secretissimos cordis sinus aperuit, post haec multum miratus, unde experta esset, quae a vigili marito nullis blanditiis eliciisset.

13) l. c. p. 266. 14) l. c. csp. 4. 15) Obs. lib. I. p. 12.

16) PLATER l. c. p. 11. BOHN l. c. §. 4.

logo, de quo CASTELLIUS ¹⁷⁾ narrat, in *somno meridiano* desbulante, singulae somnambulationis notae inveniantur; cumque celeberrimum aegrum *Nigretti* ¹⁸⁾ super sedile noctu sedentem, obdormientem et dein vagantem nemo non somnambulis adnumeraverit.

4. Quibus omnibus collectis in ea versamur opinione, ad somnambulismum constituendum opus esse, ut *somnus*, qui ambulationi ansam praebet, ceterum per se *sanus* et *normalis* sit, et inprimis cum consuetudine cubitum petendi cohaereat, ut munia sub eo exercita non sistant *continuationem* eorum, quae tempore adhuc vigiliae locum obtinuerant, ut *ebrietas*, quatenus peculiarem morbi formam efficiens, excludatur, utque *motus* sub somno aegrum de loco moveant.

5. Posito igitur, somnambulationem legitimam ex somno alioquin sano, normali, habitaque ratione consuetudinis cubitum petendi, evolvi debere, per se patet, phaenomena somnambulismo plus minus similia, quae in somno morbozo, abnormi et a consuetudine sana aberrante, ut effectus vel causae accidentalis, vel operationis magnetismi animalis oriuntur, nullo pacto pro genuino somnambulismo haberi posse. Amplectimur ea vocabulo *somniationis*, ut ex capite sequenti patebit. Quam *somniationem* cum somnambulismo

Conclusio.

S. differt a somniatione.

com-

17) Lex. graec. lat. p. 674. sub voce somnambulo.

18) PICATTI l. c.

complicari posse putamus ¹⁹⁾. Nec de facili ejus cum *ecstasi* ²⁰⁾ et *catalepsi* ²¹⁾ complicatione dubitamus.

Varii gra-
dus.

6. Somnambulismus quoad gradum ab auctoribus ²²⁾ dividi solet in *ordinarium* seu *consuetum* et in *rarum* seu *extraordinarium*. In illo aegri tacite in cubiculis vel domus parte interiori deambulant, iterumque post moram ad lectum redeunt; in *hoc* talia ab iis suscipiuntur, qualia demirari satis nequimus. Admittit porro somnambulismus divisionem in *simplicem* et *complicatum*, in *accidentalem*, *habitualement*, *furentem* et *periodicum* a LANZONIO ²³⁾ descriptum. Somnambulismum *catalepticum* SAUVAGESII ad *somnationem* revocamus.

Indoles.

7. *Indolem* somnambulismi variam esse, tum e causarum, quae illi occasionem praebent, diversitate, tum ex multiplici medendi ratione efficitur.

19) Sic historia morbi pharmacopolae de quo SOAVE et PORATI (ll. cc.) scripserunt, praeter somnambulismi symptomata, alia *somnationi* potius addicta exhibuit.

20) CARMOT observation sur une espèce d'affection cataleptique, compliquée d'extase et de somnambulisme. Bulletin de l'école de méd. et de la société de Paris (Année 1) an. 13. p. 120.

21) SAUVAGES DE LA CROIX observation concernant une fille cataleptique et somnambule en même tems. Mém. de l'acad. R. de Paris. Année 1742. Mém. p. 409.

22) BOHN l. c. §. 13. SAUVAGES l. c. p. 308. BURSERIUS l. c. §. 161. 162.

23) l. c.

citur. Interea extraordinarium morbum inter consuetos diathesium cancellos revocare, non audemus. Id solum secure affirmare licet, saepe plethorici, haud raro gastrici quid latere, ne dicamus de peculiari sensus cerebri exaltatione, ad diathesin nervosam revocanda.

§. L.

Prognosis. Cura.

1. Periculo somnambulismus non caret, cum Prognosis aegri sibi met ipsis ¹⁾, aut aliis ²⁾ vim inferre queant. Plerumque tamen minus quam vigiles a lapsu offenduntur ³⁾. Facilius morbus in pueris et

1) ZACUTUS LUSITANUS (l. c.) de juvene bilioso narrat, qui inter dormiendum repente e lecto surrexit, arma capiens foresque aperiens, furiosus veluti et multa obmurmurans in plateam exiit, et solus rixabatur, hostes impetuose confodere imaginatus: donec in solum irruens parvam absuit, quin contorto gladio, vulnere in pectore sibi inflicto, vitam adimeret. HOFFMANN viri exemplum refert, fenestram pro lecto adeuntis, qui in plateam devolutus mortem oppetiit (l. c. §. 5). Recentissimus hujus generis casus enarratur in *Oesterreichischen Beobachter* 1816.

2) MENDOZA (viridar. problem. lib. IV. 16) de juvene narrat, qui sub somnambulismo gladium sibi aptavit, foras exivit, urbem peragravit, in magistratum civitatis magno satellitum numero stipatum irruit, punctim caesisque feriit, donec ab uno satellitum ipse vulneratus expergisci coeperit.

3) FAB. HILDANUS l. c. obs. 84. p. 161. GR. HORSTII T. III. p. 112. 114.

Frank Prae. II. I. 1.

H h

et feminis⁴⁾, quam in adultis et maribus curatur. Appropinquante senectute aliquando sponte evanescit⁵⁾. Aliàs in melancholiam⁶⁾, epilepsiam⁷⁾ et apoplexiam⁸⁾ transit.

Cura.

2. Cura bifaria, altera *paroxysmi*, altera *temporis liberi*. Haec pro varia rerum conditione ex praeceptis generalibus⁹⁾ facile eruenda consistit in *venaesectione*¹⁰⁾, in *pulveribus temperantibus* aliisque compositionibus *nitratem potassae* et *magnesium* continentibus, in *emetiis*, e. c. *tartrate stibii* et *potassae*¹¹⁾, in *purgantibus*, inter quae *rheum* et *aloes* communia suffragia collegerunt, in *decoctis*, ut dicunt, *purificantibus*¹²⁾, in *tonicis*, praecipue *marte*¹³⁾, in *nervinis* sic dictis *cephalicis*, ut *aethere sulphurico alcoholisato*, *succinate ammoniac* *empyreumatico*¹⁴⁾, *radice paeoniae*, *herba beto-*

4) BOHN l. c. §. 31.

5) JAC. HORST p. 232. TANDLER. SENNERT. l. c.

6) SYLVIVS l. c. 7) SENNERTUS l. c.

8) HORSTIVS l. c. 9) Cap. I. §. VI.

10) REZIVS PRAX. CAS. 10. p. 97. et obs. mea No. I.

11) Meretur praecipue tentari, utpote in aliis cerebri morbis tam utilis. Cfr. diss. SCHLOZZEN l. c. p. 92.

12) R. Radicis asparagi, chinæ nodosae, bardanae aa unciam semis, seminum foeniculi drachmas duas. S. pro nodulo in sero lactis coquendo.

13) BOHN §. 32. Somnambuli curam medicamentis martialibus, essentia castorei volatili et sale volatili oleoso succini peractam lege in Miscell. nat. cur. dec. II. obs. 189. p. 380.

14) FR. HOFFMANN (l. c.) testatur, praecceptorem suum

betonicae ¹⁵⁾, *castoreo*, *ambra*, *camphora*, in narcoticis, ut *opio* ¹⁶⁾, in *helleboro nigro* ¹⁷⁾, in *electricitate* ¹⁸⁾, in *balneis* ¹⁹⁾, in *pediluviiis* cum floribus *tiliae*, *papaveris erratici*, *malvae*, *rosarum*, *sambuci* ²⁰⁾, in vesicatorio ²¹⁾ et in lavatione ac unctione capitis ope infusionis herbarum cephalicarum et balsamorum ²²⁾. *Regimen diaeteticum* consistit in aëre puro, fuga radiorum lunae, animi quiete, aduefaciendo phantasiam, ne uni actioni diutius inhaereat ²³⁾, venere et exercitio corporis moderatis, quandoque ad defatigationem usque ²⁴⁾, coena parca, in qua parum bibendum,

H h 2 usu

Petermannum somnambulium, omnibus fere septimanis nocturnam aliquam excursionem celebrantem, per usum liquoris cornu cervi succinati cum essentia opii Langelotti et essentia castorei (tartarisata praeprimis) combinati ita restituisse, ut postmodum ab hoc malo liber fuerit.

15) Ex ANTONIO MUSA et TIRAQUELLO commendat MAJOLUS l. c.

16) DARWIN magnam opii dosin ante somnum commendat (l. c.).

17) Consilio FR. HOFFMANNI (l. c. p. 236). R. Fibrarum hellebori nigri unciam unam, limaturae martis drachmas tres, tartari tartarisati unciam semis, cubeborum, cardamomi, schoenanthi aa drachmas duas: infunde mensuram unam vini Rhenani, de quo bibat aeger omni die ad minimum uncias sex.

18) POOANI l. c. 19) ZACUTUS LUSITANUS l. c. p. 188.

20) FR. HOFFMANN l. c. 21) BOHN l. c.

22) THEISNER l. c. 23) SYLVIVS l. c. §. 39. p. 477.

24) Usus *sphaeromachiae* noctambulii suadet a NERN-

usu cerevisiae tenuis, abstinencia a castaneis, fabis, lentibus etc. Positio in tergum vitanda est et capite elevato decumbendum. Praeterea aeger in cubiculo fenestris clatheratis instructo custodiri vel fasciae ope lecto alligari ²⁵⁾ debet. *Lamina plumbea*, quo scopo nescimus, ad lumbos commendatur ²⁶⁾. Accedit consilium, quo vas, aqua frigida repletum, ante lectum ponitur, ut aeger exiens pedibus illi immersis de errore admoneatur: ast apoplexiam exinde observavit JAC. HORST ²⁷⁾. Afflatus aëris ²⁸⁾ et titillatio labiorum ope plumae ²⁹⁾ nisum somno vagandi reprimere fertur. In pueris juvat aliquando blanda increpatio ³⁰⁾, vel etiam lenis fustigatio ³¹⁾, de quo auxilio certe rejiciendo multum GREG. HORST ³²⁾ et FELIX PLATER ³³⁾ disseruerunt. Acclamatio et violenta excitatio aliquando periculosa est et nunquam suadenda. Quid hic a magnetismo animali expectandum sit, experientia docebit.

CAPUT

TERO (fund. med. P. II. p. 807) ut exercitium vehemens et laboriosum.

25) BOHN l. c. §. 32. 26) CABALLIS l. c. 27) l. c.

28) DAVIDSON *über den Schlaf*. p. 201. 209.

29) *Encyclopéd. méthod. art. Somnambulisme*.

30) J. HORST p. 251. BLANCARD p. 213. CRAANEN l. c. TANDLER p. 251.

31) SENNERT l. c. FR. HOFFMANN l. c. §. 24.

32) In problem. med. dec. II, qn. 6. p. 44.

33) Praxis p. 152.

CAPUT XII.

De somniatione.

§. LI.

Definitio. Literatura et divisio.

1. **M**orbus vigilantes, saepe periodice, ad- Definitio.
 riens, somni fere imaginem exhibens, aegro simul
 gesticulatore, ambulatore, scriptore, loquaci, poë-
 ta, cantatore, saltatore, quasi vaticinatore reddi-
 to, sine ulla, post paroxysmum, rerum peracta-
 rum memoria, nobis est *Somniatio* ¹⁾.

2. Exempla morbi, de quo agimus, sub no- Literatu-
ra. et di-
visio.
 minibus vel somnambulismi, vel catalepseos, vel
 magnetismi animalis spontanei, inveniuntur (ne
 ad STRABONEM ²⁾, ARISTIDEM ³⁾ et ARISTOPHA-
 NEM ⁴⁾ ascendamus, qui de hominibus in templis
 incubantibus, quidquid in contrarium sentiant
 KINDERLING ⁵⁾, WOLF ⁶⁾, NASSE ⁷⁾, BOUYS ⁸⁾,
 KLU-

1) Somnambulismus catalepticus SAUVAGESII l. c. Spe-
 cies morbi a DARWINIO *reverie* sive *studium inane*
 dicti, l. citando, sub *rhembasmo* SWEDIAURI l. c.
 comprehensa.

2) Geogr. lib. XIV. p. 649. 3) Serm. sacr. IV. opp. T. I.

4) Plutus act. III. sc. 2. v. 31. 32. 41. 94.

5) *Der Somnambulismus unsrer Zeit mit der Incubation
 oder d. Tempelschlaf u. d. Weissagungsträumen der Al-
 ten in Vergleichung gebracht.* Dresd. u. Leipz. 1787.

KLUGE ⁹⁾, alii, fabulas enarrarunt ¹⁰⁾), apud SAUVAGES DE LA CROIX ¹¹⁾, HAEN ¹²⁾, ELLERT ¹³⁾, DARWIN ¹⁴⁾, TOMMASINI ¹⁵⁾, DESSESART ¹⁶⁾, STROMBECK ¹⁷⁾, SWEDIAUR ¹⁸⁾, A. G. RICHTER ¹⁹⁾, alios ²⁰⁾, nostra ipsorum et viri, nobis amici ²¹⁾,
 expe-

6) In *Berliner Monatsschr* 1784. 2. B. p. 235. 237. 238.

7) L. c. in REIL's und HOFFBAUER's *Beyträgen zur Beförderung einer Curmethode auf psychischem Wege* p. 251.

8) *Novv. considérations puisées dans la clairvoyance instinctive de l'homme sur les oracles, les sibilles et les prophètes, et particulièrement sur Nostradamus*. Paris 1806.

9) *Versuch einer Darstellung des thierisch. Magnetismus*.

10) ANTONIS VAN DALE, Poliatr Harleimensis, de oraculis veterum ethnicorum dissertationes duae, edit. secunda, Amstelod. 1700. FONTANELLE *oeuvres* T. 2. *Sur les oracles*, STIEGLITZ op. c. p. 652.

11) In *Act. acad. Upsal.* a. 1741. p. 41. et *Mémoire de l'ac. R. de Paris* 1742. Ed. in 4. p. 409. Ed. in 8. p. 557.

12) *Rat. med.* P. IV. c. V. §. 3. p. 185.

13) WIENHOLT l. c. p. 52.

14) *Zoonomia or laws etc. Vol. 1. sect. 19. Of reverie. 2. case of a young Lady.*

15) *Giornale di medicina pratica del Professore BARRA*. Vol. 4.

16) *Journal général de médecine* T. 40. 1811.

17) *Geschichte eines, allein durch die Natur hervor gebracht, animal. Magnetismus. Mit Vorrede v. MARCARD*. Braunsch. 1813.

18) *Novum nosologiae methodicae systema*. Vol. I. p. 475.

19) *Neue medicinisch - chirurg. Bemerkungen*. 1814. p. 123.

20) *Acta Vratislav.* 1725. Decemb. Class. IV. art. 7.

experientia suffragante. Quibus singulis observationes de *somnambulis*, ut dicunt, *magneticis*, addi possunt, ad quas tamen, ut decet, a reliquis separandas, somniationem in *spontaneam* et *artificialem* dividimus.

§. LII.

Symptomata.

1. *Somnatio spontanea* sub vigilia vel *dere-* Somniationis spontaneae.
mente, vel praeviis nonnullis prodromis, tristitia, saltem suspirio, capitis dolore, lipothymia, motibus convulsivis variis, inprimis e genere catalepticos aut choreae St. Viti, ingruit. Jam vero aegrotans hominis somno correpti imaginem plus minusve refert.

Hannövr. Magaz. 1787. 64. St. *London med. and phys. journ.* Sept. 1808. *A case of a very singular nervous affection, supposed to have been occasioned by the bite of a Tarantula. By Dr. J. Comstock of South-Kingston, America.* Vid. STIEGLITZ über den thierischen Magnetismus. p. 255. LARREY in *Journ. de méd., chir. et pharm.* 1816. Mars. *Obs. sur certaines plaies d'armes à feu, accompagnées de circonstances particulières. Beobachtung eines von selbst entstandenen schlafwachen Zustandes.* In *Jahrbücher für d. Lebensmagnetismus.* Herausgeb. v. WOLFART. B. 5. Heft 1. p. 68. *DELPIE Gazette de santé.* Septembr. 1817. MÜLLER von selbst entstandener Magnetismus. In *Zeitschrift für die Anthropologie.* Zweites Vierteljahr für 1826. FRÄHLER historia morbi nervosi somnambulistui et ecstatico symptomatibus stipati, feliciter persanati. In *Comment. soc. phys.-med. Mosquensis.* Mosq. 1827.
 21) Dr. Friedländer, medici egregii Vohlhyniae.

refert. Oculos enim habet, nisi semper clausos, certe insensiles. Pulsus saepe senus aut sano et lentior est, corporisque calor normalis. Respiratio vix perceptibilis. Praeterea, hac sub rerum positione aegri vel ciliis nictitant¹⁾, vel gestibus scenam ludunt ac factum aliquod repraesentant²⁾.

Dis-

- 1) SAUVAGES l. c. 17. sub nomine *cari nystagmi*, casum aegrae describit, quae tranquille sedens, per horae quadrantem eclipsin omnium sensuum patiebatur, pulsu, calore et colore, totiusque corporis flexilitate integris. Sub hoc paroxysmo cilia (non palpebrae) velocissime movebantur.
- 2) Aegra, de qua in *Nouv. mémoires de l'Ac. R. des sciences et belles lettres de Berlin* 1774. p. 10, nec non in *Commentar. de rebus in scient. natur. et in med. gestis. Tert. Decad. Suppl. II. p. 204.* legitur, a vicesimo quarto aetatis anno usque ad quadragesimum quintum per intervalla somno sepulta jacebat, eoque tam vehementi, ut membra subito rigida fierent. Duos tales paroxysmos quotidie experiebatur, alterum matutinum, pomeridianum alterum. Maxilla inferior, *ac si cibos manderet*, clausis labiis convulsive agitata, movebatur. Majoris vero momenti casus est sequens. Die 13. Septembris 1813. an. nobilis virgo, quindecim annorum, urbem ex rure advecta, rite menstruata, habitum quidem gracilem, at sanum illum et formosum exhibens, oculis coeruleis crinibusque fulvis instructa, curae mese tradita est. Haec 1812. anno a militibus gallicanis, qui patri illius mortem minitantes, concessis petitis enumeratisque conditionibus, a nefando demum proposito destitere, vehementer perterrita fuit. Postridie eadem ipsa hora morbo correpta est, cujus singuli paroxysmi quotidie, sub solis occa-

Discusso accessu, veluti e somno ad se redeunt,
aut,

sum, ad praesens usque tempus, paucis concessis interval-
lulis, sequenti ratione, ut ipse vidi, redibant. Indicata enim die aegram hora quinta pomeridiana in-
visens, sedentem eam, jam tristem et taciturnam, in-
veni. Interrogationes meae monosyllaba obtinebant
responsa. Elapsis nonnullis horae momentis, en aspi-
rium sonorum, quasi ejulans, quo facto aegra, veluti
somno correpta, concidit. Itaque supra lectum turci-
cum, vulgo *sopha*, deportata, et conciliata corporis
positione erecta, oculis clausis somno tranquillo frui
videbatur. Paulum vero post, praevis risus vestigia,
vultus quasi hominis numine afflati cernebatur. Tunc
brachium dextrum sursum, sinistrum deorsum exten-
debat, atque hanc positionem plane catalepticam, per
sexagesimam horae partem retinuit. Huc perducta in-
opinate et velociter pugnum dextrum sinistro allide-
bat, quasi, praevia haesitatione quadam, propositum
aliquod firmiter exsequi vellet. Ac revera signum sic
dabat *exercitio militari*, scenam terroris quondam per-
pessi accurate designatura. Manu enim dextra char-
taceum farturae modulum e theca bombardaria prope
dorsum magna cum vi et proprias fere dilacerando
vestes, arripere, ac ori ad demordendum admovere vi-
debatur. Quo facto eadem manu pulverem pyrium
super pugnum sinistrum, veluti foco sclopetario, in-
spergere simulabat. Succedebant actus quasi sclopetum
virgae atipatoriae ope pulvere tormentario et glande
plumbea farciendi, tum ferendi. Interea aegra, etsi
ceteroquin sermonia gallicani imperita, per intervalla
secum murmurabat: *marche! Où est le baron* (sic
militae Galli possessores praediorum Lithuania appel-
lare solebant), *sacré nom de Dieu!* Absoluto ferendi

ant, somnambulatorum instar, sed diurno tempore, deambulant ³⁾, immo itinera faciunt ⁴⁾, aut scribunt ⁵⁾,

actu, digitis conditiones quasdam computare videbatur. Sic eodem prorsus ordine eadem circiter scena ter repetebatur, donec post quartae horae partis spatium, pugnis iterum invicem perennis, comparente sudore frigido universi corporis, retrorsum, lipothymia affecta, concidit. Illico autem sponte evigilans, apertisque oculis quasi quidquam amissum quaerens, strophionum suum enixe exposcebat, eoque sudorem abstergebat. Rebus huc perductis plane sui conscia, alacris et serena fiebat, non solum peractarum, sed etiam adventus mei, immemor. Reversi cum proposito aegram postridie iterum visendi et variis experimentis subijciendi, relicta, ut mos fuit, formula, pulveris antispasmodici rubri Stahlii et aquae melissae usum praescribente. At vero aegra postridie, praeter debilitatem, hora prius paroxysmo dicata ingruentem, nil accusabat, ac continuato ejusdem pharmaci usu omnino convaleuit. Vere 1814. anni solum febrem catarrhalem, fortuitis symptomatibus spasmodicis stipatam, perpessa est. Simulationis suspicio nullo erat. Similis historia morbi in *Journ. de méd. chir. pharm.* T. 17. 1762. p. 432. invenitur: *sur une abstinence de 33 jours avec des circonstances singulières, par M. ALLIET.* Virgo, a milite in horto terrefacta, circa mediam noctem paroxysmum experiebatur, sub quo deleta audiendi et videndi facultate, oculis semiclausis, quasi terrefacta et furibunda ejulabat, ac varias actiones, terroris causam respicientes, perficiebat.

- 3) SWIETEN (comment. Vol. III. §. 1086) casum SAUVAGESII DE LA CROIX ita refert: „viginti annorum virgo catalepsi vera et antiquissima per aliquot men-

bunt ³⁾, aut sermocinantur ⁴⁾, idque peregrinis

ses laboraverat, deinde in *allam factem* mutabatur morbus, fere quotidie recrudescens. Sic autem incipiebat paroxysmus: corripiebatur primum catalepsi, post quinque vel sex temporis minuta oscitabat, erigebat corpus, dein loquebatur magna cum vivacitate et feliciori ingenio, quam solebat extra paroxysmum: videbatur alloqui plures, qui lectulum circumdabant, mores adstantium fictis sub nominibus perstringebat acriter, gestibus et motu oculorum comitabatur hos sermones, et tamen omni sensu carebat. Deinde incipiebat cantare, ridere; exsilliebat de lecto, ambulabat per conclave nosocomii, omnia obstacula evitabat, ad lectum suum redibat, stragulis corpus tegebat, et paulo post denuo catalepsi corripiebatur: elapso quadrante horae evigilabat quasi de profundo somno, penitus immemor omnium, quae paroxysmi tempore contigerant.⁵⁾

4) Funarius viginti trium annorum, de quo acta Vratislav. narrant, plerumque interdum in somni speciem, oculis plane clausis, incidebat, sub quo nunc res parum antea gestas repetebat, nunc in occupationibus inceptis pergebat. Dum a somno sub deambulatione corripiebatur, gressus eadem ratione, immo celerius etiam perficiebat, impedimenta omnis generis evitando. Sic pluries in ipso paroxysmo Vinaria Namburgum iter per pedes fecit. Aliàs equitando flumen *Ilms* transiit, equum potionabat, erura, ne aquam attingerent, retrahebat etc. Terminato paroxysmo, rerum eo vigente peractarum immemor erat.

5) Aeger Richter: sub somniatione, morbi nervosi symptomate, litteras sermones graeco, latino et anglico, correctius, quam aliàs potuerat, scripsit (l. c.). Delineabat et problemata mathematica solvebat aegra Desseant: (l. c.).

nis interdum linguis ⁷⁾, aut carmina recitant ⁸⁾,
aut

6) Juenis, de quo cl. *Friedlaender* me certiores reddidit, vigesimum primum annum agens, temperamento cholericò, sanguineo praeditus, puellae ejusdam immodico, eoque minime mutuo, amore captus fuit. Itaque infelix in chartarum lusu solatium quaesivit, ac omnia, quae possidebat, sic amisit. Adversus tot tantasque aerumnas, quum auxilium apud avunculum opulentum quaerere in animum induxisset, nuncium de illius morte accepit. Ab omnibus sic derelictus, perseverante amore insano et zelotypia, in gravem melancholiam, socio capitis dolore, incidit. Accesserunt convulsionones, quas postridie, praevio fornicationis in facie sensu et stupore, singularis affectus excipiebat. Aeger nempe impos sui atque immobilis, oculis apertis, defixis, vultu accenso, severo et indignationem exprimente, decumbebat. Tota corporis superficies viscido sudore cooperiebatur. Pulsus a naturali haud recedebat. Respiratio vix perceptibilis. Qua sub rerum positione risus blandus oriebatur, post quem voce prius humili, dein alta, colloquium cum amasia sua inire videbatur. Manum illius exposcebat, eam comprimere et osculari prae se ferebat, uti ex brachiorum aegri labiorumque motu clare apparebat. Multa ex ea quaerere conabatur, scilicet, cur tam crudelis sit, cur alium sibi anteponat etc. Interea lacrymae genas inundabant. Paroxysmus sic per horas 4. 6. 8. durabat, ac plerumque motibus convulsivis terminabatur. Tum aeger, totius scense ignarus, nil nisi debilitatem, capitisque, oculorum et articularum dolores querebatur. Hinc inde morbus una accessione de die, praesertim mane post somnum ingruente, contentus erat: aliàs nyctatheri spatio bini et amplius

aut cantant⁹⁾, aut saltant¹⁰⁾, aut vaticinia¹¹⁾

pro-

paroxysmi miserum exercebant, attamen non semper sermocinatione stipiti. Quibus vigentibus sensus omnes plane feriati erant, excepto tactu morbose aucto, ac ne stragulorum quidem attactum perferente. Hoo enim, tanquam ictu electrico, concutiebatur. Attactus partis denudatae corporis tetani varias formas excitabat, illico evanescentes. Continuato morbo per plures menses musicâ imprimis sanatus est: quae sola aegrum sub paroxysmo excitare valuit, interrogantem, cur campanae tam vehementer pulsant? Ad firmandam plane valetudinem bona fratris aegri officia accesserunt. Cfr. LARREY l. c.

7) LEMNIUS de occult. natur. mirab. lib. II. cap. 2. ALBERTI disp. de mensium anomaliis convulsivis.

8) DARWINII elegantissima virgo, septemdecim annorum, absoluta solita menstruatione, morbo mirabili (*wonderful*) correpta est, cujus paroxysmi convulsionibus, inani vomendi nisu et vehementi singultu ingruiebant. Sequebatur post horae dimidium spasmus, sub quo manus capiti admovebat. Post simile temporis spatium spasmus iste cessabat, incidente aegra in somniationem (*reverie*), sub qua vultus attentionem exprimebat. Oculis apertis cum hominibus imaginariis colloquebatur. Ex verbis ejus responsa ficta facile intelligebantur. Aliquando vel cantabat, ac *paginas poetarum anglicorum recitabat*. Aegra post horam sui conscia facta timorem patefaciebat, ac nonnunquam convulsionibus corripiebatur. WIELSCHMANN (diss. an et quatenus somnia hominibus imputentur? Lips. 1703. §. 51) de pannifice narrat, qui tempestate autumnali, singulis ferme diebus, circa horam ut plurimum quartam vespertinam, fixativo ligatus somno conciones sive homilias e lecto recitabat.

proferunt, quin rerum in paroxysmo actarum vel
mini-

9) Puella, de qua HAEN scripsit (l. c.), prius genuina catalepsi laborans, dein sub paroxysmo garrula evadebat. „In plurimis paroxysmia praesens audiavi eam *Psalmos Davidicos* cantantem Cantus autem ille notas musicas exacte observabat Tum audiavi recitantem catechismum, quem tenuerat memoriter, una cum pluribus textibus ex sacra Bibliis. In vitia hominum acriter invehebatur, praecipuis autem in hominem viduum, in vicinia habitantem, quod pellicem domi aleret; qui tamen ipse, paroxysmum visurus advolaverat, itaque praesens praesentem audiebat, has diras imprecationes in aese proferentem, quanquam ipse nullatenus puellae sub conspectum caderet“ Sensuum officium plane feriatum erat.

10) COMSTOCKII aegra, ab araueno ignota specie puncta, praeviis et persistentibus quodammodo symptomatibus choreae St. Viti vel potius tarantismi, in somniationem incidit, sub qua oculis spasmodice clausis, colores per tactum, praesentiam patris in cubiculo quamvis obscuro, cognoscebat, ac tandem in usum deducta musica choreas ducebat.

11) De melancholicorum ad divinandum proclivitate jam ARISTOTELES testatus est (quaest. nat. sect. 30). Vid. et ZACCHIAS de divinatione quaest. med. leg. lib. IV. tit. 1. Qu. 5. Generatim de vaticiniis aegrorum egerunt. CASPARUS REYES camp. elys. juc. quaest. 27. FRANKENAU satyr. med. 9. GARMANNUS de mirac. mort. diss. praelimin. de cadav. §. 29, ubi de *ecstasi naturali* agit. ANDR. MOLLERUS in Annal. Freibergens. WELLERUS et JOH. FINCKLIUS de puella, vaticinia sub statu alicujus ecstaseos proferente, testantur. Addit LASSET (diss. de vaticiniis aegror. Hal. 1724.

minimam conservent memoriam. Paroxysmi nunc cum ordine, nunc inordinate recurrunt, relicta saepe debilitate.

2. Per severum examen experimentale, scopo Somniationis artificialis. potissimum physiologico - pathologico peractum, cujus eventus ex quatuor huic capiti annexis observationibus elucebit, certo comperimus, *magnetismi* sic dicti *animalis* ope, in plurimis hominibus ¹³⁾, praesertim juvenibus aut puellis rapido corporis incremento insignibus, talem statum produci, qualis requiritur, ut, praeviis, pro re nata, horripilatione ¹⁴⁾, calore vago, sudore ¹⁵⁾, oscitatione, nictitatione, palpebrarum quasi constrictione ¹⁶⁾, cum ponderis sensu, risu aut fletu convulsivo ¹⁷⁾, aurium tinnitu, salivae frequenti de-

gluti-

Praeside ALBERTI): „quidam aegrotantes sub praecedente insolito somno experiuntur internam illam revelationem, ex qua deinde aliquod praesagium proferunt“.... „ita dantur *epileptici*, qui praenunciant, quando paroxysmus ingruet et quoties quolibet die repetet, quo gradu insistet“ (l. c. p. 25). Cfr. deiu casum STRAOMBECKII, qui virginem nobilem respicit, spasmis, lipothymiis, et catalepsi prius subjectam, dein in statum somno similem incidentem, sub quo proximae somniationis tempus praedicebat et auxilia ad hoc indicabat.

13) Inter triginta homines, quos magnetismo animali subjeci, quatuor in somniationem inciderunt, quorum historiae ad calcem hujus capituli inveniuntur.

14) Obs. I. consessus 5. 15) Obs. I. consessus 2.

16) Obs. II. 17) Obs. IV.

glutitione, dentium stridore, singultu, concussione, crampo somnique desiderio, homo, dormienti similis, oculis clausis, saepe sursum retractis, pupilla immobili, possit, interrogationibus ab artifice factis, voce quodammodo aliena, verbis plurimisque selectis, respondere, de valetudinis suae statu accuratissime rationem reddere, futuras in eo mutationes praesagire, atque remedia scopo sanitatis sive tuendae sive amissae restituendae, indicare; quin posthac excitatus, ac capitis gravedinem, temulentiam, motus febriles experturus¹⁸⁾, dictorum vel minimam conservet memoriam. Eventus quidem saepius verbis, allata sub rerum positione edictis, respondet, at certe non semper¹⁹⁾. Mirabilem hanc conditionem, sub qua sensibus externis sopitis, sensus internus universalis, una cum instinctu et phantasia, exaltatus cernitur; quaeque vulgo *somnus magneticus* appellatur, et quidem in gradu dicto *clairvoyance*, *somnationem artificialem* vocamus²⁰⁾.

§. LIII.

18) Obs. II.

19) Obs. I. Cfr. Consensus 1 et 2. cum eventu.

20) GIUSEPPE FRANK *sul magnetismo animale* (Articolo tratto dal Giornale di medicina, chirurgia e farmacia, che si pubblicava dalla società Imperiale di medicina di VVilna. Traduzione dal Polacco. In OMODEI *annali universali di medicina*. Milano. 1826. Ottobre e Novembre. p. 208).

§. LIII.

C a u s s a e.

1. *Causa* ad somnationem sive spontaneam Praedis-
sive artificialem *praedisponens* in morbosa systema- Ponentes.
tis nervosi sensibilitate quaeritur. Forte huc quo-
que conditio specifica exaltata partium genitalium,
praesertim ovariorum ¹⁾ et testium ²⁾, perti-
net ³⁾; imprimis qualis ea circa pubertatis tempus
obvenit ⁴⁾.

2. Somnationem *spontaneam* excitant: gra- Excitan-
via animi pathemata, terror, amor infelix, zeloty- tes.
pia, forte ictus insectorum et serpentum ⁵⁾ quo-
rundam, et vulnera plexum solarem attingentia ⁶⁾
— *artificialem* vero operandi methodus peculia-
ris. Effectus productus certe neque ab imagina-
tione, neque a libidine repetendus est.

3. *Caus-*

- 1) Feminae vulgares aliaeque crebro coitum celebrantes
vix aut ne vix quidem magnetismi animalis percipiunt
effectus.
- 2) Spadonem sine omni effectu iteratis magnetismi ani-
malis tentaminibus subjeci. Portuit tamen ipse somnia-
tionem magneticam in femina producere.
- 3) Infantes quidem vim magnetismi animalis experiri
possunt, sed, ni fallor, nunquam usque ad somnia-
tionem.
- 4) OSIANDER *üb. d. Entwicklungskrankheiten*. Goett. 1817.
- 5) Cfr. quid DIOSCORIDES (lib. VI. c. 54), AETIUS (te-
trab. III. scim. I. c. 20) de morsu aspidis referunt.
- 6) Aeger LARREY in loquacitatem et speciem somnia-
tionis incidebat, quoties specillum ulcus fistulosum,
regionem ventriculi attingens, irritabat (l. c.).

Proxima. 3. *Caussam proximam* somnationis nec conjectura attingere audemus. Generatim imaginationem et aestum venereum, quae ex causis somnationis exclusimus, ut *effectus* scenam in ea ludere posse, persuasi sumus. Multum quoque electricitatis hic subesse, quamvis contrarium contendatur ⁷⁾, suspicamur ⁸⁾.

§. LIV.

Diagnosis.

Generatim.

1. *Somnatio a cataphora, somnambulismo, ecstasi, catalepsi, delirio* (utpote si clausis oculis contingat imaginem somniantis exhibente ¹⁾) et *hysteria* ²⁾ distinguenda est.

2. *Ca-*

7) NAESE in REIL's *Archiv* B. 9. *Hef* 2.

8) Cfr. historiam ad calcem capitis XIV.

1) Anno 1825 incunte quidam Meyer multum rumoris Vindobonae excitaverat. Adolescens erat quatuordecim annorum, habitum serophulosum exhibens, necdum vocis mutationem expertus, litterisque modice incumbens. Hic die 17. Januarii, sine nota causa, profundo sopore sepultus inveniebatur. Accersitus medicus capiti hirudines adplicare et clysterem injicere jussit. Praescripsit quoque calomel, et aeger quatenus veluti trismo laborans, illud deglutire haud potuit. Postridie sponte expergefactus, aeger se bene dormivisse retulit, cibos sumpsit et deinde in pristinum soporem incidit, sicque vicissim per nonnullas hebdomadae. Tandem soporis loco *delirium* apparuit, sub cujus curriculo, *palpebris clausis*, rheda vehi, equitare, saltare optabat, haecque munia, venia concessa, levi opera absolvebat. Qua sub rerum positione interrogatus,

2. *Cataphora*, ut somnus vi aut diuturni- A cata-
 li 2 tate phora.

quaestionibus respondebat, praeterea quin palpebras manifeste invicem deduceret, legebat, scribebat, chartis ludebat (idque libentissime), futuros paroxysmos praesagiebat, et de pharmacorum illi exhibitorum effectu disserebat. Paroxysmi ejusmodi quavis hebdomade bis terve rodibant. Eorum singulum die 20. Martii observavi. Durabat a hora octava matutina usque ad meridiem. Intercurrebant motus convulsivi vagi omnis generis modo opisthotonum, modo catalepsi simulantes. Pulsus remanebat normalis. Aeger me (quem nunquam viderat) cum medico ejus ordinario D^{re}. *Kaufmann* advenam, illico nomine proprio compellavit. Terminato paroxysmo *Meyer* nec morbi memoriam habebat nec ejus indicium prae se ferabat. Simulationis suspicionem parentum conditio omnino excludebat. Interrogatus quomodo morbum definirem? respondi quaestione altera: quomodo morbus definiretur, si oculis adspertis contingeret? Pro *deltio periodico* sano. Bene, addidi; retineat et modo tale nomen, palpebrarum oculorumque enim spasmus rem non immutat. Nec ille tantus erat ut aeger per palpebrarum rimam deorsum plus minus videre non potuisset. Ac re quidem vera dum quid legendum ei porrigebatur, librum seu chartam myopis instar oculis adpropinquabat. Vectio in curru, utpote instituta equis seculis et domesticis (qui et per se visum invenissent) alioquin nihil miri habuit. — Cum allata morbi historia similitudinem alit casus ad J. CATCHTON enarratus (*Edinburgh medical and surgical journal*. April 1829) cui etiam nomen *mentis periodicae alienationis* impositum est. Conferatur alter consimilis casus, ubi aures oculorum vices peragere videban-

tate peccans, per se a *somniatione*, ut vigilantium morbo, differt.¹ Cataphora porro longe diutius protrahitur, quam *somniatio*, ac praeter somnum nullum memorabile phaenomenon patefacit.

A som-
nambu-
lismo.

3. *Somnambulismus.*

1. *Somnambulismus* sub somno contingit.

2. *Somnus*, ex quo *somnambulismus* proficietur, legitimus est, per se sanus et naturalis.

3. *Somnambulus* se res gestas saltem *somni-asse* haud raro commemorat.

Continua-
tio.

4. *Phaenomenon*, quod et *somniationem* magneticam sub somni adpectu comitatur, morbosum et abnorme esse, atque plane a somno sano et normali

Somniatio.

1. *Somniatio* sub vigilia locum habet.

2. *Phaenomenon* *somniationem* sub somni adpectu comitans, morbosum, abnorme est, et a genuino somno plane differt.

3. Post *somniationem* rerum gestarum nulla prorsus memoria.

tur (CAZAINTE in *Ephemerides de la soc. de mjd. de Montpellier. Vol. 3. p. 286*).

2) Si hystericarum motus et positiones abnormes, sique earum vaniloquia, mox pro epilepsia, catalepsi, vel mania declarari vellent, multum foret laboris magisque adhuc erroris. Absit eodem jure ut *somniationis* symptomata in hystericis obvia, mox pro legitima *somniatione* declarentur, ut apud KLEIN (HUFELAND's Journ. der pr. Heilkunde 1828. Januar. p. 99) accidisse arbitrator.

mali differre, ut jam DARWIN ³⁾ et STIEGLITZ ⁴⁾ omni jure docuerunt, ex sequenti comparatione elucet.

Somnus.

1. Palpebras laxas exhibet.
2. Musculos oculum moventes absolute quietos relinquit.
3. Pupillam ad dilationem disponit.
4. Sensus externos quot quot sunt clausos habet.
5. Recreat plerumque.

Somniatio artificialis.

1. Palpebras contractas prae se fert.
2. Musculos rectos superiores contractos habet.
3. Pupilla contractioni instruitur.
4. Auditus, saltem pro artifice, apertus est.
5. Ut plurimum molestias relinquit.

§. LV.

Prognosis. Cura.

1. Periculum, quo somniatio stipatur, phaenomeni abnormitati haud respondet. Interca sem-

per

3) „It appears from hence, that *reverie*... is totally different from *sleep*; because the essential character of *sleep* consists in the total suspension of volition, which in *reverie* is not affected; and that the essential character of *reverie* consists not in the absence of those irritative motions of our senses ... but in their never being productive of sensation.“ l. c. p. 230.

4) „Unter der Gestalt von Schlaf ist das Gehirn auf eine eigene, von dem gewöhnlichen Schläfe ganz abweichende Art afficirt.“ l. c. p. 138.

per transitus in graviora mala generis nervosi, ut catalepsi, aut epilepsiam, timendus, quod imperiti, cum magnetismo animali (ut morborum auxilio a nobis nondum debitis experimentis confirmato), quasi ludentes, probe retinere debeant.

Cura.

2. DARWIN ¹⁾ et SWEDIAUR ²⁾, largam *opii* dosin ante paroxysmum somniationis spontaneae ut specificum accipiunt. Effectus *pulveris anti-spasmodici rubri Stahl*i et *musicae* ex allatis historiis ³⁾ elucet. Et *oxydum zinci* laudem obtinuit ⁴⁾. Ceterum praecepta generalia ⁵⁾ sequamur, necesse est. Iis incaassum tentatis *magnetismo animali* locus foret. In somniatione ex eo orta, quid praeter tractus, iis, qui prius adhibiti fuerunt, oppositos, adhibendum sit, ignoramus.

Appendix ad caput XII.

Somniationis artificialis quatuor exempla continens.

Observatio I. Virgo duorum et viginti annorum, cute candida, crinibus fulvis, oculis coeruleis instructa, valde excitabilis, capitis universi dolori saepe obnoxia, hieme 1814. anni, e trahis forte ejecta, vehementem ad os parietale dextrum accepit contusionem. Venae sectione, hirudinibus, fotu frigido, malum quidem sanatum fuit, relicto tamen in parte affecta doloris gravativi sensu, sub temperiei mutationibus, corporis reclamatione, animi pathema-

1) l. c. p. 227. 2) l. c. p. 476. 3) §. XLVI. No. 1.

4) MUHRBECK *über die Wirkung des Zinco oxydatum im Somnambulismus.* HUFELAND's *Journal der pr. Heilk.* 1829. Decembr. p. 119.

5) Cap. I. §. VI.

thematæ, in graves cruciatus, ab habituali quondam cephalæa plane diversos, transeunte. Subjiciebatur operationi, ut dicunt, magneticæ (de qua certissime nunquam quid audiveras), die 8. Aprilis 1814, hora octava vespertina, præsentē familia ægræ aliisque. Post sexagesimam jam horæ pariam somnatio obrepsit. *Interrogatio.* Dormisne? *Responsio.* Dormio vero. *I.* Num quid habes morbi? *R.* Capitis dolore exerceor. *I.* An malum hoc cito evanescet? *R.* Minime, sed morsem mihi injicies. *I.* Quid ad levandam te facturum sis? *R.* Acetum adhihero mihi. Quo mox apposito cum frontem humectassem, naribusque vaporem admissem, ægra in fortes, horam fere dimidiam durantes, convulsiones incidit. Expergefacta nihil quidquam memorabat, nisi se ad operationis initium irrisisse. Capitis dolor, per unam fere hebdomadem, maximam partem depulsus videbatur. Quo temporis spatio exacto cum multo majore vi rediisset, altera operatio die 30. Aprilis 1814. perfecta erat. Prævio copioso sudore post quinque temporis minuta incessit somnatio. *I.* Quid dormis? *R.* Omnino. *I.* Num quo dolore angeris? *R.* Capitis, illo. *I.* Ubinam loci? *R.* Ubi aliquando contusa fui. *I.* Quem in finem durabit isthuc mali? *R.* In annum integrum. *I.* Quid, ut te sanem, fieri expediat? *R.* Balneis frigidis me uti jubeto. *I.* Num in flumine? *R.* Omnino. *I.* Mane, an vesperi? *R.* Mane. *I.* Num qua etiam indiges medicina? *R.* Maxime. *I.* Quamvis illa? *R.* Nescio. *I.* At indica saltem, utrum excitantia remedia, an vero refrigerantia tibi sint magis profutura? *R.* Refrigerantia sane. *I.* Num se operationi magneticæ subicere debeam? *R.* Sic, omni secunda hebdomade, sed necessario horâ sexta vespertina. *I.* Quid ita? *R.* Quia hac eadem hora caput contusa sum. *I.* Quamdiu adhuc dormies? *R.* Unum temporis minutum. — Hic ego, cum expromptum horologium invitum nimis prope
virgini

virgini admovissem, nonnulli motus corporis convulsivi, brachii sinistri rigiditate atipati, oriebantur. Tum aegram palmis manuum molliuscule traciavi, quo mox mentis vires recuperavi. Nec plura moratus ita *vigilem* illam alloquor: *I.* Utrum semper eadem hac hora artificium magneticum subire vis, an aliam quandam deligemus? *R.* Ut id per tua negotia optime licebit; equidem semper sum otiosa. *I.* An saepius balneis frigidis utere? *R.* Satis raro. *I.* Multumne tibi placent? *R.* Non admodum. — Aegra eodem illo vespere fori capitis dolore atque spasmia vexabatur. Tertium experimentum die 3. Maji ad horam quintam et dimidiam vespertinam susceptum erat. Post tractationem, sex temporis minuta durantem, consecuta est somnatio. *I.* An somno oppressa es? *R.* Utique. *I.* Potesne palpebras reserare? *R.* Impossibile id sane. *I.* Ubinam liseret dolor? *R.* In capite. *I.* Unde putas contractum hoc mali? *R.* A lapsu. *I.* In quam re doloris causa consistit? *R.* Istiuc me penitus laet. *I.* Quid, prosint balnea frigida? *R.* Et maxime quidem. *I.* Quando eorum usum instituemus? *R.* Ad mensis Maji exitum. *I.* Utrum in *Willia* an *Wilenka* (fluvius parvus ad *William* influens) lavare se praestat? *R.* In *Wilenka*. *I.* Num etiam medicamentorum usus usque in Maji finem rejiciendus? *R.* Minime, sed in unam hebdomadam solum. Uberiores interrogationes convulsivis motibus impeditae fuere. Qui postquam cessaverant, aegra magnum aestum querebatur. — Tum brevi incidens menstrua purgatio, atque meae diversae occupationes quartum experimentum solum die 2. Junii, ad sextam horam vespertinam, suscipere siverunt. Postquam interrogationes, prioribus similes, factae erant, eademque responsiones obtentae, quae aivi quoque ex aegra, num semper eadem hac hora vespertina operationi submittere se velit. *R.* Omnino (at enim vigil sibi tali pacto vespertinam deambulationem impediri, quere-

querebatur). Propter apasmos brevi post consecutos proximum experimentum ad aliquot dies dilatum erat. Quintus consessus hora sexta vespertina. Primae manipulationes frigoria sensum induxerunt: post sex autem temporis minuta orta est somniatio. *I.* Num nocet operationem tam diu dilatam fuisse? *R.* Haud quasquam: verum postiduo ipsa eadem hora iterari debet. *I.* Quam ob rem semper hora sexta? *R.* Quia circa illam capiti offensio erat illata. *I.* Quando balneorum frigidorum usum instituemus? *R.* Post quatuordecim dies. *I.* Ergone tum tepidam amocnamque habebimus tempestatem? *R.* Omnino. *I.* Utrum in *Wilia* an in *Wienka* lavare se praestat? *R.* Nil interest, in utraque. Brevi fortea et ad horam dimidiam protractae incesserunt convulsiones, quibus profligatis aegra plorans capitis dolorem querebatur. Consessus sextus die 22. Junii hora sexta vespertina. Post sextam horae partem obrepsit somniatio. *I.* Somniasne? *R.* Minime. *I.* Dormiane? *R.* Sic, dormio. *I.* Quamdiu es dormitura? *R.* Horam dimidiam. *I.* An quotidie iterari conveniat operationem? *R.* Non, sed ter in hebdomada solum. *I.* Quibusnam diebus? *R.* Nil intereat, quoquo. *I.* Quanam hora? *R.* Sexta vespertina. *I.* An non eadem hora expectiari soles? Nulla responsio. *I.* Quando balnea frigida adhibebimus? *R.* Ad finem mensis. *I.* Ubinam loci es? *R.* Nescio. *I.* An me agnoscis? *R.* Minime. *I.* Nostine Doctorem *Frank*? *R.* Novi sane. *I.* Illine faves? *R.* Omnino. *I.* Qui sic? *R.* Quia me morbo liberabit. *I.* Utrum te ulterius interrogem an quietam relinquam? *R.* Posterius malim. *I.* Num hodie apasmi vexabere? *R.* Paucis illis quidem. Post horam dimidiam aegra evigilavit atque belle se habuit. Deinceps duodecim balnea frigida adhibui, et omnino ex cephalaea, quae lapsu inducta erat, recreata est.

Observatio II. Famulam viginti annos natam, erysipelati

pelati crurum habituali obnoxiam, quae vix urbem adven-
nerat, neque quidquam ant de magnetismo animali, aut de
electricitate nunquam audiverat, die 16. Maii 1814. anni,
operationi magnetismi animalis, in societate hominum eru-
ditorum, experimenti causam, subjeci. Operatione vix in-
cepit palpebrarum constrictionem percepit. Iam clausis
adhuc vigil ad interrogata respondebat. Somniatio enim
elapsa tantum hora dimidia obrepit. *I.* Num somnus te
cepit? *R.* Sic belle dormio. *I.* Quem in finem dormies?
R. Multas in horas. *I.* Quando erysipelas tuum in pede
erupturum est? *R.* Deo soli id notum est. *I.* Num quid
ad praepediendum hoc mali possim facere? *R.* Sic, deco-
ctum aliquod mihi praescribito. *I.* Quale? *R.* Ex herbis
nonnullis, quae ad fluminum ripas crescere solent. *I.* An
hirudines profuturæ sint? *R.* Et maxime quidem. *I.*
Ubinam loci applicandæ sint? *R.* Nimirum pedibus:
isthuc quidem in promptu est. *I.* Quantum earum adhi-
bendæ sint? *R.* Decem. *I.* An utrique pedi? *R.* Omni-
no. *I.* Quando hoc fieri oportet? *R.* Dux post hebdo-
madæ. *I.* Quanam hora? *R.* Post meridiem. *I.* Num
sanguis diu debeat fluere? *R.* Usque dum sol occidet.
I. Num profutura sit deambulatio? *R.* Equidem sine hac
multum cursitare debeo. *I.* An choreæ noccant? *R.* Mi-
nime, si moderatæ sint. Tum adstantes quædam ex fa-
mula quærebant, quæ quanquam sermone polono cultiori,
quam ipse possem, enunciata fuissent, nihilominus ægra
multo malignius ad ea respondebat. *I.* Ubinam es? *R.*
Nescio. *I.* Viden', qui adstant? *R.* Sic, video quidem,
sed minime internosco. *I.* Favesc heræ tuæ? *R.* Ma-
xime faveo. *I.* Num etiam sorori tuæ? *R.* Etiam. *I.*
An diu adhuc dormies? *R.* Equidem libenter evigilare
velim, nam heræ meæ ministrare debeo. Tum ego, in-
cisum sermonia filum pertexens, quin ergo evigilas? in-
quam. *R.* Nequeo sane. *I.* Quid, ut excitegis, fieri ex-
pedist?

pediat? *R.* Nimirum, ut me concutias. Quod cum continuo fecissem, surrexit vacillans, oculosque perfricans, multumque, quid sibi acciderit, demirata: dormivisse vero se, cum interrogaretur, fassa est. Facies tum erat rubra, oculi scintillantes, manus autem frigidae. Ac ita quidem consternatam se et fatigatam sensit, ut, levi etiam febricula tentata, mox cubitum se conferret, ac, postquam luculento somno quicvisset, altera die omnino recte valuit.

Observatio III. Quarta et vicesima Aprilis die (lunae), 1845. anni, cum Marchionem Vilnensam L..., leviter aegrotum visitarem, ab uxore ejus invitabar, ut degentis in illorum domo nobilis puellae G.... ancillam, eamque pectoris incommodis oppressam, operationi magneticae subjicerem. Quod consilium cum probassem, eamque ancilla, cujus ex habitu obstructions viscerum imi ventris facile conjiceret, post sex tractationis minuta somniatione capta fuisset, haec fere ex ea quaesivi. *I.* Num sopita es? *R.* Omnino. *I.* Estne conditio haec tibi jucunda? *R.* Minime, pectoris enim oppressionem sentio. *I.* Quid mali hujus causam esse putes? *R.* Vitium haemorrhoidale, siquidem sanguinem versus caput ascendentem percipio. *I.* An te pluries artificio magnetico tractare debeam? *R.* Omnino bis adhuc, die nempe Veneris et Jovis, quarum illa hujus hebdomadis, haec vero sequentis. *I.* Ad quam horam? *R.* Ad horam decimam matutinam. *I.* Qualia remedia morbo tuo maxime sint accommodata? *R.* Cichoreum cum sero lactis decoctum. *I.* Quando cura haec institui debet? *R.* Primis mensis Maii diebus. — Tum ortis nonnullis motibus convulsivis ancilla evigilavit, nimium conditionem suam admirata, ac praeteritorum penitus inscia. Proxima die Veneris, nona videlicet Aprilis, aegram quidem conveni, sed jam versus meridiem. Viginti temporis minuta interfluxerant, priusquam in statum quendam somno similem incideret. Palpebris quippe clausis,

clausis, quae nullomodo reseraro potuit, se necdum somno captam esse, et, ut pulvinar commodius poneretur, rogabat. Quadraginta minutis praeterlapsis in somniationem incidit. *I.* Quid hodie tam aegre somnus te complexus est? *R.* Quoniam non ad decimam horam venisti. *I.* Quandone iterum operationi magneticae subiacere necesse sit? *R.* Proxima Jovis die, sed omnino aut hora decima matutina, aut etiam quinta pomeridiana. *I.* Num serum lactis cum cichoreo decoctum proderit? *R.* Maximo sane, dummodo diligenter erit clarificatum. *I.* An balnea etiam tepida usurpanda sint? *R.* Omnino, idque cum artemisia vulgari. *I.* Quomodo iis balneis usura es? *R.* Bis de hebdomade, post singulos quatuordecim dies: cum autem o balneo exitura fuerim, cyathus vini optimi hungarici, mihi roborandi gratia, ministretur. *I.* Num itaque nervi tui labefacti sint? *R.* Minime, sed sanguis meus est depravatus. *I.* Numquid pectoris oppressio imminuta est? *R.* Vero. Tum Marchionis uxor interrogationem quandam interposuit, unde mox somnians evigilavit, gestorum omnino inscia, convulsivis quibusdam motibus consecutis. Sequenti Jovis die, 15. Aprilis, ipsa hora decima ad aegram me contuli. Manipulationes vix ad quinque temporis minuta productae jam somniationem induxerunt. *I.* Num consensuum priorum recordaris? *R.* Bene recordor. *I.* Qui laesa valetudo tua restituitur? *R.* Primis Maii diebus serum lactis cum cichoreo adhibeam, in ejusque usu binas septimanas persistam, necesse est: tum quatuor balneis tepidis utar. — *I.* Quam cito menstrua purgatio reductura sit? *R.* Postridie. *I.* Num hepar tuum omnino incolume est? *R.* Immo vero pustulis (*pryszcz*) nonnullis occupatum. *I.* An istae discutientur? *R.* Omnino. Tum odoratus sensum explorare conatus moschum naribus admovi, sic interrogans: Qualis est iste odor? Responsi loco convulsiones sat vehementes ortae fuere: quibus, cum aegram volis

vollis manuum deorsum aliquoties tractavissem, sedatis, brevi expectata est. Ad interrogationem, ubinam hepar situm sit, nescire se, et ad alteram illam, quando menstrua purgatio eruptura sit, his fere diebus cam instare, retulit. Reipsa altera die, ipsa hora decima, menstrua apparuerunt. — Aegra autem, sub nou remediorum indicatorum unius mensis spatio convaluit.

Observatio IV. Nobilis puella D... ruri habitans, viginti annos nata, recte semper menstruata, ab annis amplius octo, dolorem pedis sinistri, in quo tophus viscebatur, ad vespervas auctum somnumque fugantem perferebat. Præterea guttæ roseæ et spasmoticis adfectibus obnoxia erat. Plura interna remedia, ipsumque cauterium pedis affecto, sine emolumento applicata fuere. Quum itaque de magnetismo animali fama ad eam pervenisset, ultro ad me, ut illi subjiceretur, se contulit. Quamvis autem, malum esse syphiliticum intelligens, nihil auxilii a magnetismo animali expectarem, se alterius generis curam, proximo adventante vere, proponerem; tamen ab aegra vehementer rogatus, periculum hujus rei die 17. Decembris 1815. anni, hora sexta vespertina, præseute sorore et adfina quodam aegrae, perfeci. Ad quartam horae partem protracta operatio somnationem iniecit. At quum protinus aegra a sorore sua, quae e sedili subito levaverat se, excitata fuisset, risu spasmodico, ploratu mixto, correpta est. Qui postquam sedatus erat et operatio in alterum horae quadrantem continuata, ecce profunda incessit somnatio. Ad primas meas interrogationes, num dormiret? an morbo quodam teneretur? nihil retulit: ad tertiam vero illam: unde suspicaris malum tuum esse collectum? respondit: anno fere setatis tertio ancilla nostra, morbo syphilitico infecta, mecum eundem hunc communicavit. *I.* An medicamenta quaedam sumpisti? *R.* Sic, mercurio cum lacte sumpto multum levamenti percepi: brevi post medicus quidam militaris

litaris majorem etiam hujus remedii copiam exhibuit, quod mihi insigniter nocuit. *I.* Quam ob rem? *R.* Quia mercurius in me remansit. *I.* Ubinam? *R.* In pollice (excidit tum e memoria interrogatio, utrum in pollice manus aut pedis, dextri aut sinistri lateris). *I.* Num te sanabo? *R.* Omnino. *I.* Quis sum? *R.* Frank. Soror mea me a te sanatum iri assernit, meque in coenobio trans fluvium (*Wilenta*) posito habitare debere. Neque vero me cito posse sanari puta: nam curatio quinque ipsos menses exigit. Inprimis faciei ruborem evanescentem videbis, pustulis quibusdam ad dorsum formatis: deinde morbo oculi dextri tentabor, minime horrenti illo aut pernicioso. Ruborem faciei magnam etiam partem ploratu contractum esse, scito: cum et irritabilis sim, et multis curis angar. *I.* Quid tibi ministrem? *R.* Decocta. *I.* Quenam? *R.* E plantis exoticis parata. *I.* Nihilne praeterea? *R.* Pilulas etiam. *I.* Quasnam illas? *R.* Nescio. *I.* Quid si cum mercurio? *R.* Avertant auperi. *I.* An balnea conducent? *R.* Sic, ter hebdomade adhibita. *I.* Qualia? *R.* Ex artemisia vulgari decocta. *I.* Num cura ad vernum tempus remittenda sit? *R.* Minime. *I.* An adhuc artificio magnetico tracteris, necesse sit? *R.* Sic, semel adhuc. *I.* Quandone? *R.* Duas post dies. *I.* Itaque die solis? *R.* Non, lunae illa. *I.* Quanam hora? *R.* Undecima. *I.* An aliam horam indicare possis? illa enim mihi est admodum incommoda. *R.* Ergo die lunae, hora sexta matutina. *I.* Num forte eadem vespertina? *R.* Minime. *I.* Itaque, si videtur, horam undecimam retineamus. *R.* Haudquam, sed sextam matutinam. *I.* Quid si nolim? *R.* Tum differamus operationem ad tertiam aut quartam diem Maii. *I.* Quid tam horam matutinam urges? *R.* Quia jejuno ventriculo plura tibi enunciare possim. *I.* Num operationem in tua aut mea habitatione suscipiam? *R.* In tua vero. *I.* Qui aio? *R.* Quia tum minorem pectoris oppressio-

pressionem patiar. At nunc jam fessa sum loquendo et pecten me incommodat (re ipsa e latere dextro, cui incumbebat, crines pectine colligati fuere). Die lunae plura tibi denunciabo. *I.* An proxima nocte placide dormies? *R.* Utique. *I.* Num aquam magneticam bibere libeat? *R.* Minime. *I.* Quam ob rem? *R.* Quia male inde habeam. *I.* Viden' omnes, qui tibi adstant? *R.* Haudquaquam. — Cum aegrae quietem dedissam, post aliquot temporis minuta evigilavit, risu spasmodico exagitata, oculos confricans, omnes cum admiratione circumspiciens, atque, quid rei evenisset? exclamans. Tum lecto eam commendantes, pectinem illum e dextro capitis latere deteximus. — Die 18. Decembris aegram invisi, quae belle dormivisse se retulit, at cordis quandam palpitationem solum incusabat. *I.* Recordarisme nostri consessus hesterni, et quid tum aentires? *R.* Recordor usque ad id temporis, quum soror mea tumultuarie consurgens me excitavit. Principio aestum totius corporis percepi, cum sensu rei cujusdam me opprimantis, ac leviter super corpus ponderantis. *I.* Undenam malum tuum contractum sit? *R.* Prorsus nescio. *I.* Num ab ancilla infecta fueris? *R.* Isthuc affirmare nequeo. *I.* Etiamne nunquam id dictum audisti? *R.* Nunquam, ita me deus amet: mater solum retulit mihi, me inde a teneria valetudinariam fuisse. *I.* Exhibitumne fuit aliquod medicamentum cum lacte? *R.* Minima recorder. *I.* Nescis itaque te malo syphilitico fuisse infectam? *R.* Prorsus ignoro. *I.* Nunquamne mercurium sumpsisisti? *R.* Qui noscerem medicamenta, quae mihi praebebantur? *I.* Age, subjicim te magnetismo die lunae, idque multo mane. *R.* Hoc etiam mihi relatum erat; sed, si molestum est, aliam deligas horam. Tum admonita aegra, praedictis sub somniatione parendum esse, eandem illam horam retinimus. Die igitur 20. Decembris, hora sexta matutina aegra cum adhibuit aus, praesente etiam Dr. *Herberski*,

berski, me convenit. Expectavimus *Dr. Nizkowski* (nam etiam adventurum se promisit), usque ad horam sextam cum 25 minutis: cum autem non compareret, operationem institui. — Advenit ille paulo tardius, quin id aegrae, quae necdum somniatione capta erat, molestum videretur. Decem minuta post somnatio consecuta est, praevio risu fletuque spasmodico: facies aegrae tristitiam prodebat. *I.* Dormisne? *N.* Nulla responsio. *I.* Recordarisne superioris consessus? *R.* Omnino. *I.* Ubinam loci insidet malum tuum? *R.* In pede. *I.* Num quae medicamenta adhibuisti? *R.* Sic, lacte sum usa. *I.* Minime mercurio? *R.* Etiam. *I.* Num te adhuc magnetismo animali subicere debeam? *R.* Sic, ad finem curationis. *I.* Quandone id? *R.* Post quatuor aut quinque menses. *I.* Quid nuper facturus sis? *R.* Balneis pedum cum camphora me uti iubeto. *I.* Nam hora praescens accommodata est operationi magneticae? *R.* Minime. *I.* Atqui hanc ipsa delegisti? *R.* Atqui cunctatus es aliquantum. *I.* Diuine dormies? *R.* Nequaquam. Tum apparente risu fletuque spasmodico evigilavit. Interrogata vicissim a *D. Nizkowski*, *Herberski* et me, se nihil praeteritorum recordari, asseverabat, nisi quenquam adstantium cum anhelitu spirasse (*Professor* quippe *Nizkowski* festinanter advenit), atque aërem ab ipso expiratum sibi pectoris oppressionem induxisse, etsi quatuor amplius pedes ab illa remotus esset. Ac omnino quidem praesentem magnetisationem minus jucundam sibi fuisse, quam anteriorem, fatebatur. Interrogata, num camphoram nossset, se illa in odontalgia aliquando usam esse, perhibuit. Proposui alterum consessum hora sexta vespertina proximae diei apud aegram ipsam. Memorandum quoque est, aegram postridie superioris consessus hora sexta vespertina sponte obdormivisse, quod nunquam antea contigerat. Die 21. Aprilis mane, dum aegram conveneram, hesternae die multis spasmodicis passionibus, pectoris

ctoris oppressione, cephalalgia, et cordis palpitatione vexatam se fuisse, querebatur. Cum itaque diem hanc operationi haud accommodatam esse cernerem, eam in proximam diem, idque sexta hora vespertina apud me ipsum, distuli, quod aegra probans, ut etiam interrogationes quaedam a sanitate alienae fierent, rogavit, quodque promisi. Die 22. Aprilis, hora quinta et dimidia vespertina, aegra ad me omnino hilaris advenit, adfini suo et quadam matrona familiari comitata. Post tractationem per quartam horae partem durantem, nullis praecurrentibus symptomatibus spasmodicis, somniatio obrepsit. *I.* Num dormis? *Nulla responsio.* *I.* An confert, te hodie magnetismo esse subjectam? *R.* Omnino. *I.* Cur anteriore consensu multum turbata esse videbare? *R.* Quia horam stricte non servasti. *I.* Num praeterea molestum quid tibi erat? *R.* Sio, anhelitus hominis illius mihi pectoris oppressiorem effecit. *I.* Quid ad tollendam illam facturus sis? *R.* Syrupum coloris rosei mihi praescribito. *I.* An oculi dextri morbum quem habebis? *R.* Omnino, dum faciei rubor evanescet, nisi mihi venae sectionem ordines. Nam etsi inde quidquam debilitabor, cito id praeteribit: — tum relinques me unum mensem sine medicina, et recte post-hac valebo. *I.* Num cura continuo instituenda est? *R.* Omnino. *I.* Quid tibi praescribere debeam? *R.* Omnia, quae quidem de me cogitasti, admodum idonea et accommodata sunt. *I.* Nostine, me de curatione tua cogitare? *R.* Sio sane aliquoties cogitasti (consanguineus aegrae tum retulit, eam simul de mutando pedum balneo quidquam suaurasse, quod ego non audivi). *I.* An possis altiori voce loqui? *R.* Possum sane. *I.* Sumpsistine aliquando mercurium? *R.* Vero. *I.* Illiusne quid in corpore remansit? *R.* Utique. *I.* Ubinam? *R.* (Cum indignatione) jam dixi, in crure dextro. *I.* Illumne vides? *R.* Video sane. *I.* Sub quam forma? *R.* Sub pulveris albi illa. *I.* Er-

gone tibi trium mensium spatio remedia ministrare debeo, dein unum per mensem quietam relinquere? *R.* Omnino, *I.* Num te adhuc magnetismo subjici expediat? *R.* Sic, semel adhuc ad finem curationis, *I.* Quando igitur? *R.* Mense Maio (tum promissi mei hesterni recordatus sum), *I.* An proficiscar Viennam? *R.* Habebis impedimenta, *I.* Quot personarum hic sumus? *R.* Tres, *I.* Videntur nos? *R.* Video, *I.* (Hic sumpto strophilo) Quid manibus teneam? *R.* (Cum indignatione) Nescio. Tunc aliquot motus convulsivi somnitioni finem posuerunt. — Aegra sat hilaria et serena respondebat ad factas sibi interrogationes: se nec unquam sumpsisse, neque vidisse etiam syrupum coloris rosei, — nunquam de meo proposito, Viennam proficiscendi, audivisse, neque unquam alium mercurium vidisse, nisi fracti barometri illum. — Curam aegra venescione, leni eccoprotico, balneis, et decocto lignorum institui. Brevi rus profecta, cum pedis dolore cruciaretur, medicum quendam adhibuit, qui eam mercurio tractavit, usque dum salivatio comperuit. Qua irrita aegra Vilnam advenit. Remediis evacuantia et emollientia salivationem cito stiterunt. Tum resumpto usu decocti lignorum et balneorum, exhibitisque dein magnis Guaiaci dosibus, aegra convaleuit, solumque inter rapidas temperiei mutationes dolorem pedis perentiscere solet. Guttis quoque rosea multum imminuta est.

CAPUT

CAPUT XIII.

D e e c s t a s i.

§. LVI.

Definitio. Literatura.

1. *Contemplatio profunda, aegro sese e* *Definitio.*
 loco haud movente, sensibus externis, citra somni
 imaginem, feriantibus, cum gestu, sermone can-
 tuque veluti visiones divinas, consortium angelo-
 rum, aut daemonum indicante, *ecstasin* ¹⁾ con-
 stituit.

2. De ecstasi, non semper sine confusione *Literatu-*
 somnationis et catalepseos, egerunt: COBOLD ²⁾, ^{ra.}
 GERDESIUS ³⁾, PANECIUS ⁴⁾, WEDEL ⁵⁾, EBER ⁶⁾,
 ZORNIUS ⁷⁾, HANDTWIG ⁸⁾, BEHREND ⁹⁾ aliique ¹⁰⁾.

Kk 2

§. LVII.

1) Ab ἔκστασις, privatio sensuum HIPPOCR. — GALL.
Extase, GERM. *Begelsterung*. POLON. *Zachwoyconie*.
 ROSSIC. *Измывленіе*.

2) Narrationes aliquot epistolicae de puero ecstático Al-
 renburgensi. App. ad LENTULI hist. de inedia Schreie-
 rre. Bern. 1604.

3) Diss. idea errans in ecstasi seu enthusiasmo. Gry-
 phiae 1692.

4) Diss. de ecstasi. Witeb. 1695.

5) Pr. de ecstasi putata Christi. Jenae 1704.

6) De puella ecstática. v. HALLER bibl. med. P. II. p. 131.

7) Diss. de philtis enthusiasticis Anglico - Batavis.
 Witeb. 1745.

§. LVII.

*Symptomata. Causae.*Sympto-
mata.

1. Aeger incunte paroxysmo derepente contemplabundus, phantasia absorptus, physiognomia corporisque positu imaginem, animum suum possidentem, exprimens, oculis apertis, fixis, auditu consueto ¹⁾, tactu orbatus, jacet, sedet, stat, emphaticas voces ²⁾ profert, cum angelis sermocinari videtur ³⁾, idiomate extraneo loquitur ⁴⁾, cantat ⁵⁾,

8) Diss. de ecstasi. Rostoch. 1755.

9) *Briefe über die wahre Beschaffenheit des neu- inspirirten Teuerbacher Mädchens. Erf. 1768.*

10) Act. nat. cur. Vol. I. obs. 250. obs. 105. VII. obs. 40. Ephem. nat. cur. dec. I. an. IV. V. obs. 81. dec. II. an. I. obs. 76. dec. III. an. I. obs. 17. cent. IX. obs. 23.

1) Cfr. Appendix ad cap. XIV.

2) Puella, de qua SAUVAGES narrat (Vol. III. p. 422), sedebat, nulli interrogationi aut signo aut verbo ullo respondens, parum cibi sumens, brachiis in crucis formam compositis, prolatis his verbis vernacula lingua: *Joannes, Joannes, paradisum peto!*

3) Puella, de qua alibi locutus sum (Edit. 2. P. I. Vol. III. sect. II. cap. XIV. §. XXXVI. No. 3 (8)), praeyio ejulatu, uti ex adpectu improvise objecti desiderati, physiognomiam aliàs vulgarem in angelicam prorsus commutabat, oculis apertis, fixis, ad coelum conversis, quem in locum et brachia, sedens in lecto, extendebat, ajens: *O sancte Aloysi! venustissimo juvenum, accede et accipe me.* Porro voce argentea psalmos cantavit. Aphonia paroxysmum praecedere et sequi solebat.

cantat⁴⁾, quae singula nunc periodice redeunt, nunc per longum temporis spatium protrahuntur, ac pro re nata convulsionibus, catalepsi, somno terminari solent.

2. Caussae ecstaseos in iis catalepticos inve- Caussae.
nientur⁵⁾. Ad illas tamen praecipue meditatio protracta circa unum idemque objectum, inprimis suam cujusque labefactatam salutem, spectare videtur. Nec effectus *gaz oxydi nitrosi*, ut specificae ecstasis caussae⁷⁾, hic silentio praetereundi sunt.

§. LVIII.

4) BORELLI cent. II. obs. 54. Cfr. KRÜGER's *Versuch einer Experimental-Seelenlehre*. Halle 1756. in *Anhang* p. 11. Narratur de femina Aquitaniae, quae in paroxysmo ecstaseos lingua hispanica, quam aliis ignorare se credebat, locuta est. Procul dubio varia hujus idiomatis verba quondam per accidens ac inscie quasi impressa fuere.

5) Cfr. Append. ad caput XIV. 6) Cap. XIV. §. LXI.

7) HUMPHRY DAVY *researches chem. and philosoph. chiefly concern. nitrous oxyde or dephlogisticated nitrous air, and its respiration*. Lond. 1800. De inspiratione hujus gaz rationem reddens, ait vir egregius p. 488. „By degrees as the pleasurable sensations increased, I lost all connection with external things; trains of vivid visible images rapidly passed through my mind and were connected with words in such a manner, as to produce perceptions perfectly novel. I existed in a world of newly modified ideas. I theorised: I imagined, that I made discoveries. When I was awakened from this semi-delirious trance by Dr. Kinglake, who took the bag from my mouth, indignation and

§. LVIII.

Diagnosis. Prognosis. Cura.

Diagnosis. 1. *Ecstasis* a *somniatione* (quacum magnam ceterum alit affinitatem) in eo differt quod in ista aeger saepissime somni imaginem exhibet, somnambuli instar se gerit, e loco movetur, ad vaticinium inclinatur, ac non semper omni destituitur sensuum officio. Differentia *ecstasin* inter et *cataplepsi* infra tradetur. Ad *ecstasin* conditionem quoque poetarum italicorum, qui extemplo versus faciunt (*Improvisatori*), accedere existimamus. WEPFERUS hominis etiam meminit, qui tum mathesi vel poësi incumberebat, in *ecstaseos* speciem incidere erat solitus ¹⁾.

Prognosis. 2. *Ecstasis* potius ob morbos, quibuscum
socie-

pride were the first feelings produced by the sight of the persons about me. My emotions were enthusiastic and sublime: and for a minute I walked round the room perfectly regardless of what was said to me. As I recovered my former state of mind, I felt an inclination to communicate the discoveries I made during the experiment. I endeavoured to recall the ideas, they were feeble and indistinct: one collection of terms, however, presented itself; and with the most intense belief and prophetic manner, I exclaimed to Dr. Kinglake: Nothing exists but thoughts! — the universe is composed of impressions, ideas, pleasures and pains!"

Cfr. SILLIMAN ex *American journal of sciences and arts* Vol. 5. p. 194. in *FRONIER's Notizen aus dem Gebiete der Natur- und Heilk.* B. 4. No. 11. 1823.

1) De morb. capit. obs. 66. p. 208.

societatem inire solet, timenda videtur. Seculis barbaris ad rogam aliquando viam sternebat²⁾.

3. Cura ab ea catalepticos mox tradenda non Cura differt.

CAPUT XIV.

D e c a t a l e p s i .

§. LIX.

Definitio. Literatura.

1. **F**eriatio subita sensuum motuumque voluntariorum, aegro in eadem positione, in qua sub morbi ingressu versabatur, consistente et ad omnes inflexiones recipiendas servandasque paratissimo, pulsu et respiratione perstantibus, genuinam constituit *catalepsin*¹⁾.

2. Morbum istum rarissimum²⁾, plurimi *Literatura* quidem^{3a}.

2) Legi hic meretur SAUVAGES nosolog. method. lib. IV. p. 397. Cfr. capita de *daemonia vera* in auct. de medicina forensi, inter quos PLENKIS eleuenta a. 1781. edita p. 126, citare iuvabit.

1) *Synonym.* Catochie, catochus GALENI, morbus stonitus CELSI, prehensio, congelatio, aphonía DIOCLIS, anaudia ANTIOENIS, CLEOPHANTINI, congelario Arabum, GERM. *Starrsucht*. GALL. *Cataleptie*. ANGL. *Catalepsy*, *trance*. POLON. *Katalepszja*. ROSS. Одеревенѣлость членовъ.

2) Catalepticos, mihi quater conspexi (semel in nosoco-

quidem describere sategerunt: ast, uti docte demonstrarunt HERCULES SAXONIA ³⁾, VOGEL ⁴⁾, LUDWIG ⁵⁾ et TISSOT ⁶⁾, pauci revera descriperunt. Dubium est, utrum HIPPOCRATES ⁷⁾ de legitima catalepsi locutus sit. Casus GALENI ⁸⁾ minoris morbi gradum exhibet. Contra de genuina catalepsi disseritur apud COELIUM AURELIANUM ⁹⁾, N. PISONEM ¹⁰⁾, DODONAEUM ¹¹⁾, FERNELIUM ¹²⁾,

FORE-

zulo Mediolanensi a. 1794. bis in clinico Viennensi, in puero scilicet a. 1799. et in juris studioso postea, ac Vilnae 1816), exempla tam rara sunt, ut fatente Tissoto (l. citando) inter mille medicos vix unus obveneriat, qui morbum hunc observaverit; ac ipse in tot annorum praxi non vidit. Cum an. 1802 et 1803. magnam Europae partem pergrassem, inter millenos tamen segros, quos in magna nosocomiis Germaniae, Galliae, Britanniae inviseram, nullum catalepticum inveni.

3) Praelectiones practicae. Pnlchre FERNELII observationes criterio submittit.

4) In notis ad §. 572. de morb. cognosc. et curand. cap. de catalepsi. p. 473.

5) Institut. med. clinicae. Vol. I. §. 3. p. 114.

6) *Oeuvres* T. 13. *Traité des nerfs et de leurs maladies*, chap. 21.

7) Lib. V. epid. c. 12.

8) *Proorrh. comm.* T. II. 56. lib. IV. de locis affectis.

2. Cfr. BROTHMERUS diss. de catalepsi a Galeno descripta. Tub. 1660.

9) In acut. morb. lib. II. cap. X.

10) De morb. cognoscend. et curand. lib. I. cap. 13.

11) Obs. cap. IV—VI. 12) *Pathol.* lib. V. c. 2.

FORESTUM¹³⁾, BUCHANANUM¹⁴⁾, TULPIUM¹⁵⁾, BONETUM¹⁶⁾, WEPFERUM^{17a)}, ALBINUM^{17b)}, CAMERARIUM¹⁸⁾, HENR. AB HEER¹⁹⁾, MARCELLUM DONATUM²⁰⁾, RONDELETUM²¹⁾, REYNELL²²⁾, FR. HOFFMANN²³⁾, WEDELIUM²⁴⁾, BRENDELIUM²⁵⁾, DIONIS²⁶⁾, RÖDER²⁷⁾, SAUVAGES²⁸⁾, HIRSCHEL²⁹⁾, DELIUM³⁰⁾, COSNIER³¹⁾, BAUMER³²⁾, LAMBERGER³³⁾,

13) Lib. X. obs. 41. 42. 14) De rebus scoticis. lib. VI.

15) Diss. de catalepsi. Helms. 1660.

16) Medicin. septentrionalis. lib. I. sect. XVI. cap. 6.

17a) Observat. de affection. capitis. obs. 124. 125.

17b) Diss. de catalepsi. Frsf. 1690.

18) Diss. de catalepsi epileptica. Tub. 1690.

19) Lib. I. obs. 3. 20) Lib. II. c. 7.

21) Meth. curand. omn. morbor. Ed. Lugd. lib. I. c. 20.

22) *Phil. trans.* No. 437. p. 49. et *Auserl. Abhandl. prakt. und chirurg. Inhalts.* v. LEXER. 2. Th. p. 307.

23) De affectu cataleptico rarissimo. Frf. 1692. Med. rat. syst. lib. IV. P. III.

24) Diss. (sub nomine SCHOMBURG.) de catalepsi, rarissimo affectu. Jen. 1690. Diss. de affectibus soporis et catalepsi. Jen. 1708.

25) Diss. de catalepsi. Witteb. 1700.

26) *Sur la mort subite et la cataleptie*, Paris 1718.

27) Diss. de raro affectu cataleptico praesid. DE PAX. Erford. 1721.

28) *Mémoire de l'Acad. R. des sciences.* 1742. p. 409 (De ipsa aegra, de qua antea cap. XII. de somniatione §. LII. No. 1 (2) quaestio.

29) *Gedanken von der Starrsucht.* Berlin 1769.

30) De catalepsi diatrib. medic. Berg. 1752. sec. edit.

31) *Rapport sur les avantages de l'électricité dans la cataleptie.* Paris 1773.

GER ³³⁾, LATOUR ³⁴⁾, SCHILLING ³⁵⁾, FRANK A. FRANKENAU ³⁶⁾, TARGIONI ³⁷⁾, VANDERMONDE ³⁸⁾, WEBER ³⁹⁾, GRUNDAMM ⁴⁰⁾, SCHRAFF ⁴¹⁾, BURSE-RIUS ⁴²⁾, FABRI ⁴³⁾, DREYSSIG ⁴⁴⁾, LA LAN ⁴⁵⁾, GER-SON ⁴⁶⁾, OSIUS ⁴⁷⁾, ILLGNER ⁴⁸⁾, BEHREND ⁴⁹⁾, HENRY ⁵⁰⁾, PETETIN ⁵¹⁾, BAUDE ⁵²⁾, LAURENT ⁵³⁾,

SAR-

32) De ecstaseos et catalepseos differentia et de vera catalepseos notione etc. Giessae 1776.

33) Diss. puellae catalepticae historia et sanatio. Lugd. Bat. 1776.

34) *Journal de médecine*. T. 52. p. 349.

35) Diss. aegrum ex amore catalepticum factum exhibens. Giess. 1776.

36) In additamentis ad quaestiones medico-legales PAULI ZACCHIAE, lib. II. tit. I. quaest. 15. p. 187.

37) *Raccolta prima d'osservazioni mediche*. p. 97.

38) *Recueil périod. d'observat. méd.* T. 5. 6. p. 41.

39) *Observat. med.* Fasc. I. an. 1764.

40) Diss. de catalepsi. Helmstad. 1776.

41) Diss. de vera catalepseos notione et rationali curatione. Giessae 1776.

42) *Institut. med. pract.* T. III, cap. V.

43) *Tract. patholog. de catalepsi*. Hal. 1780.

44) *Handwörterb. der med. Klinik*. 2. B. 1. Th. p. 55.

45) Diss. de morbo cataleptico. Lugd. Bat. 1781.

46) De catalepsi. Goett. 1797.

47) De catalepsi. Marburg. 1799.

48) Diss. de catalepsi. Frcf. 1800.

49) In BALDINGER's *u. Magazin*. 9. B. p. 193.

50) *Recherches sur la catalepsie*. Paris 1803.

51) *L'électricité animale*. Lyon 1805.

52) Diss. medica de catalepsi. Paris. 1806.

53) Diss. med. pract. de catalepsi. Paris. 1806.

SARLANDIÈRE ⁵⁴⁾, STEARNS ⁵⁵⁾, MERKEL ⁵⁶⁾, RE-
NARD ⁵⁷⁾ et MATTERS DORF ⁵⁸⁾.

§. LX.

Symptomata. Necroscopiae.

1. Si catalepsis, quod admodum rarum est, Sympto-
matibus prodromis annunciat, ad ea spec-
tant: anxietas ¹⁾, aurium tinnitus, somnia tur-
bulenta, vertigo ²⁾, dolor capitis ³⁾, oscitatio ⁴⁾,
rubor faciei ⁵⁾, rigor colli ⁶⁾, stupiditas ⁷⁾, aura
a praecordiis ad caput ascendens ⁸⁾, abdominis
cruciatus ⁹⁾, et lipothymia. Paroxysmo ingruente
aeger in ea corporis positione plane retinetur, sub
qua invasio locum obtinuit. Sic FERNELII aegro-
rum unus, in opere legendi et scribendi prehensus,
calamum scriptorium retinuit ac legere videbatur:
alter autem in lecto jam decumbens adeo immobi-
lis mansit, ut mortuus videretur. Iste e lecto tra-
ctus, pedibusque innixus statuae instar stabat. Ta-
les

54) LE ROUX etc. *Journal de médecine*. T. 36.

55) *American medical register*. Vol. I. art. 8.

56) Diss. de catalepsi ejusque speciebus et modis. sect. I.
Erlang. 1814.

57) HOFELAND'S *Journ. der pr. Heilk.* 1815. Junl.

58) Diss. de catalepsi. Berol. 1823.

1) Appendix ad praesens caput. 2) LA METTAIRE.

3) FORESTUS lib. X. obs. 42.

4) DOLAEUS encyclop. med. dogm. lib. I. c. 6. p. 107.

5) DOLAEUS l. c. 6) HENRI obs. 3. p. 48.

7) In juris studioso Vindobonensi. 8) DOLAEUS l. c.

9) HELVIGII obs. phys. med. obs. 64.

les aegros per impulsum gressus facere ¹⁰⁾, cum TISSOTO ¹¹⁾ dubitamus, quin potius reptare videntur ¹²⁾. Apud HEER ¹³⁾ capucinus statuae marmoreae similis uno genu terrae innitebatur, alterum ceu flexurus curvabat. Brachium sinistrum pendebat ad genu, dextrum in aërem elevatum erat, diductis digitis. In catalepsi positionem corporis, in qua prehensi fuerant, retinere; — comœdiarum histrio, coronam praemii gratia impertitam e capite suo in aliud transferendo ¹⁴⁾, — aegrorum secundus, chartis ludendo ¹⁵⁾, tertius sub scalarum ascensu ¹⁶⁾, quartus saccum ad murum appendendo ¹⁷⁾, quintus comedendo ¹⁸⁾, sextus in castaneis torrendis ¹⁹⁾, et septimus abituro medico valedicendo ²⁰⁾. Idea ultima verbis expressa ante paroxysmum est prima, quam paroxysmo elapso homo enunciat. Quodsi in media verbi cujusdam parte paroxysmus ingruat, altera pars eo terminato consequitur. Artus mira et cerea flexibilitate praediti, quemvis situm, qui iis intra gravitatis centrum impertitur ²¹⁾, ad finem paro-

10) FR. HOFFMANN l. c. DIDIER in Act. nat. C.

11) l. c. p. 11. 12) SAUVAGES l. c. 13) l. c.

14) PLINIUS hist. nat. lib. VII, c. 53.

15) GOURIN apud TISSOT l. c.

16) BUCHANANUS, SAUVAGES l. c. 17) DE LA TOUR l. c.

18) JACOT in COCHES, p. 68. 19) SWIETEN l. c.

20) BORRHAAVE prax. med. ad aphor. 1043. T. IV, p. 324.

21) Catalepticus in clinico Vindobonensi theatrales adeo corporis positiones, alias nonnisi arte addiscendas, retinebat.

paroxysmi usque retinent. Pulsus aliquando lentus²²⁾, pluries parvus et frequentia normalis. Respiratio vix perceptibilis, aliquando a sana non recedens²³⁾. Alvus interdum pertinaciter clausa²⁴⁾. Musculi abdominales²⁵⁾ et aliquando maxilla inferior²⁶⁾ in statu convulsiyo. Temperatura corporis frigida²⁷⁾, cum facie, saltem ab initio paroxysmi²⁸⁾, rubra. Oculi fere semper aperti, cum pupilla ad lucem minime contractili. Visi tamen sunt cataleptici cum oculis clausis²⁹⁾, atque hic palpebrae remotae sponte cadebant. Quocunque in casu oculi immobiles, fixi sunt, ac videndi facultate orbat. Pupillam contractilem observavimus³⁰⁾. Acclamatio ipsas in aures, rumor summus, adustio³¹⁾, aegrum minime excitant. Resori immissae, quamvis lente³²⁾, deglutiuntur³³⁾, aliquando vero rejiciuntur³⁴⁾. Odoratus aliquando exqui-

22) SAUVAGES l. c. ad 50 ictus in sexagesima horae parte numeravit.

23) Appendix ad praesens caput. 24) HÆRZ l. c.

25) FORESTUS, DOLAZUS alique. 26) TISSOT l. c. p. 25.

27) Frigoris marmorei meminerunt Eph. nat. cur. dec. II. ann. I. obs. I.

28) WÄDEL l. c. No. 1.

29) PISO l. c. p. 150. SWINERT lib. III. §. 1036. p. 312.

30) Appendix.

31) In *Histoire de l'Acad. des sciences de Paris* a. 1738. legitur casus mulieris catalepticae, quae na igne quidem pedibus supposito a paroxysmo excitari potuerat.

32) Appendix. 33) FORESTUS. Puer nosocom. Vindobon.

34) Nova acta med. physica. T. I. obs. 99.

exquisitus³⁵⁾. Cute fortiter irritata, acu lacescita, perceptionis nullum consequitur indicium³⁶⁾. Contra vero lenes impressiones, praecipue si in regione epigastrica, ad apices digitorum manuum et pedum, aut ad verticem contingant, ab aegrotantibus perceptas fuisse, fertur³⁷⁾. Duratio paroxysmi a nonnullis horae momentis³⁸⁾ usque ad octodecim horas³⁹⁾ observata est. Plerumque inter tres et quindecim sexagesimas horae partes absolvitur. Terminatur accessus plerumque suspirio, oscitatione, brachiorum extensione, loquacitate in delirium desinente⁴⁰⁾. Nulla rerum sub paroxysmo cum aegro aut circa eum peractarum relinquitur memoria, ac aeger tunc aliquando sanus videtur. Paroxysmi nunc determinatis sive diebus⁴¹⁾, sive horis⁴²⁾, redeunt, nunc porrecta vel levi occasione, e. c. odore ingrato, gestu peculiari⁴³⁾, clystere irritante⁴⁴⁾, excitantur. Decem
 paro-

35) LA METTRIE. 36) Appendix.

37) PETITIN - RENARD l. c. Cfr. Appendix.

38) Momentaneae catalepseos meminit GOUNIN apud TISSOT l. c. p. 63.

39) SWIETEN l. c.

40) Aegra ATTALINII apud TISSOT (l. c. p. 16), de lite, quam cum alia experiebatur, loqui non desinebat. Cfr. Appendix.

41) Sic omni die veneris aut sabbati apud SWIETEN l. c.

42) Cfr. Appendix.

43) Puella, quam in nosocomio Mediolanensi a. 1791. vidi, toties in paroxysmum incidebat, quoties sanctae crucis signo muniret se, aut signum hoc in aliis ad-

paroxysmi visi sunt de die. Tempore a paroxysmo libero evacuationes vix a norma recedunt ⁴⁴⁾, ciborum desiderium nunc languet, nunc normale est ⁴⁵⁾, nunc in voracitatem degenerat ⁴⁷⁾.

2. Catalepticorum cadavera obtulerunt an-
guinem atrum cerebri et cerebelli vasa distenden-
tem et cruorem extravasatum ⁴⁶⁾, concreciones
polyposas in sinu longitudinali, laesis simul pul-
mone et hepate ⁴⁹⁾, ulcera cerebri ⁵⁰⁾, hoc viscus
anteriorius durius, posteriorius mollius, nervos ad
corum origines siccos, tenues ⁵¹⁾.

§. LXI.

Caussae. Diagnosis.

1. Catalepsia feminis communior, mediae *Caussae*.
aetati maxime infensa, interdum et inter infantes
obveniens ¹⁾, nulli anni tempori ²⁾, nulli genti ³⁾
addi-

spiceret, unde constanter cataleptica evasit, adportata
in cubiculum sacra eucharistia, reliqua quippe aegro-
tantibus crucis signum facientibus.

44) KUEHN in *Schriften der berlinschen Gesellschaft naturforschender Freunde* 1. B. p. 367.

45) HOFFMANN l. c.

46) VOOEL praelect. de cognoscend. et curand. morb.
§. 569.

47) Eph. nat. cur. dec. V. p. 195.

48) HOLIER de morbis internis, Cap. I. c. 9. in Schol.

49) LIEUTAUD *précis de médecine, maladies internes de la tête*, lib. I. p. 212. Cfr. AB HEERS l. c.

50) HOVEN *Handbuch der pr. Heilk.* 2. B. §. 43. p. 49.

51) SCHENK de caussis catalepticos. lib. I. obs. 1. 2. 3.

1) Vide de puella quinque annorum cataleptica Act. nat.

addicta, excitari solet protracta circa unum idemque objectum, praecipue religiosum ⁴⁾, meditatione, — mentis applicatione ⁵⁾, morbis diu noctuque excruciantibus ⁶⁾ — expectatione eventus rei dubiae ⁷⁾, moerore diuturno, e. c. ob gravem

cur. dec. II. an. I. et virgine tredecim annorum eodem morbo detenta DE LA TOUR l. c.

2) Communi consensu opinio FR. HOFFMANNI, catalepsin morbum hiemalem declarantis, falsa habetur.

3) Judaeos catalepsi praecipue obnoxios esse, cl. DIERSSIO (l. o. p. 67) contendit, ac suspicatur cum SPRENGELIO (*Handb. d. Pathol. 3. Th. §. 507. p. 303*), onaniam, cui dediti dicuntur, potissimum accusandam esse. Ad me quod spectat, nunquam catalepsin in judaeis observavi, ac onaniae vitium longe rarius inter eos, quam alia apud gentes inveni.

4) Catalepsin morbum claustralem esse docent observationes AB HEER, CAPO DA VACCA spud FORESTUM (obs. T. I. obs. 42. in scholio), ac celeberrima historia monacharum Lugduni (in Vol. XX, du *Mercur de France*), quippe quibus imago sacerdotis nomine *Urban Grandier* in paroxysmo cataleptico ecstasice sub forma quadam horribili comparuit: quod pro maleficio, ab eodem illo sacerdote operato, quem habitum fuisset, miser die 18. Augusti 1634. vivus flammis consecratus fuit. Cum a. 1815. Minskii degerem, pro juvene monacha cataleptica in consilium ductus sum, quam tamen in ipso paroxysmo non vidi. Cfr. ZIMMERMANN *von der Erfahr.* 14. B. 12. C. et LIXUTAUD synops. P. I. p. 153.

5) GALENI casus. PLATER obs. lib. I. p. 27.

6) Appendix.

7) Aegra ATTALINII spud TISSOT l. c. p. 11.

vem mariti morbum⁸⁾, ob carceris timorem⁹⁾, ob matrimonii futuri spem delusam¹⁰⁾, ob iter a fratre dilecto suscipiendum¹¹⁾, ob nuncium tristem et repentinum¹²⁾, a terrore incendii causa¹³⁾, ab ira¹⁴⁾, ab antipathia¹⁵⁾, ab amore¹⁶⁾, ab imaginatione¹⁷⁾, a liquorum fermentatorum potu¹⁸⁾, a vermibus¹⁹⁾, a menstruorum defectu aut irregulari

8) WEDEL l. c.

9) Idem, ibid. BONET l. c. (signorum desertor Polonus captus).

10) TULPIUS obs. med. lib. I.

11) MARX de spasmodis. Halae 1765. §. 61.

12) In Actis academiae Parisiensis de fabro lignario narratur, qui audiens alterum, quem verberaverat, perisse, in catalepsin incidit.

13) MARX l. c.

14) DODONÉ encyclop. med. lib. I. c. 8. Act. nat. cur. dec. II. an. I.

15) RONDELET (lib. I. cap. 20. p. 98) de femina narrat, quae cataleptica fiebat, dnm mariti nomen coram ea pronunciabatur, et ob illius adventum, *etiam priusquam eum audiret aut videret*.

16) SCHILLING l. c.

17) Sacerdos, dum in passionis historia ad verba: *consummatum est*, perveniebat, semper catalepticus reddebatur. Puella nosocomii Mediolanensis, de qua supra (43), catalepticos paroxysmum experiebatur. nomen JESU audiendo.

18) SCHRAFF l. c.

19) ALEX. BENEDICTUS VERONENSIS lib. I. cap. 26. SWIFTEN l. c. §. 1040. WEAVER in *The London medical repository*. 1817. No. 4.

Frank PRAX. II. l. 1.

gulari decursu ²⁰⁾, ab ovariorum vitiis ²¹⁾, ab onania ²²⁾ et externa demum capitis laesione ²³⁾. Hypotheses, proximam catalepseos causam spectantes, invenire licet apud PLATERUM ²⁴⁾, RIVIERUM ²⁵⁾, FORESTUM ²⁶⁾, THONERUM ²⁷⁾, DE LA TOUR ²⁸⁾, HOME ²⁹⁾ et PETETIN ³⁰⁾.

Diagnosis. 2. Catalepsis, aliquando *simulata* ³¹⁾, aut *voluntaria* ³²⁾, ab *apoplexia* ³³⁾, *congelatione* ³⁴⁾,
side-

20) FONSECA lib. II. Consultat. LA MATTRIE et RAYWELL l. c.

21) RENARD l. c.

22) Juris studiosus clinici Vindobonensis.

23) STARK *Handb. zur Kenntniss und Heilung innerer Krankh.* 2. Th. p. 150.

24) PRAX. T. I. c. 2. 25) PRAX. c. 4.

26) De cerebri morbis. lib. X. obs. 50. in Schol.

27) Lib. II. obs. de catalepsi.

28) *Recueil périodique d'observations de médecine*, par VANDERMONDE. T. 5. p. 45.

29) Principia medicinae. P. II. 30) l. c.

31) MARX l. c. §. 19. de femina Londinensi loquitur, cujus fraus eo detecta erat, quod brachium extensum, cui pondus appensum fuit, retinebat, quod in catalepsi non accidisset.

32) Presbyter quidam nomine *Restitutus*, quando ei placebat, ita auferebat se a sensibus et jacebat mortuo simillimus, ut non solum vellicantes et pungentes minime sentiret, sed aliquando etiam igne ureretur admoto, sine ullo doloris sensu, nisi postmodum ex vulnere (AUGUSTINUS lib. XIV. de civitate Dei. c. 24. p. 158).

33) Aegra ATTALINII, de qua TISSOT refert (l. c. p. 12), pro apoplectica habebatur.

sideratione ³⁴⁾, *lipothymia* ³⁵⁾, *asphyxia* ³⁷⁾ et *anaesthesia*, facile distinguitur. Non ita a *somniatione* et *ecstasi*.

Somniatio.

1. Somni imaginem refert.
2. Motus concessi.
3. Aeger loquax.
4. Membra situm iis impertitum non retinent.

Catalepsis.

1. Oculos plerumque apertos exhibet.
2. Corpus statuæ simile.
3. Aeger sermone orbatus.
4. Membra situm impertitum retinent.

Ll 2

Ecsta-

34) In exercitus *Napoleonis* reditu per Vilnam a. 1812, ardeliones judaei joci gratia in plateis congelatis militibus varias positiones militares impertiebant, quas eorum cadavera diu retinebant. Rigorem ex frigore generis plene alius esse, quam catalepsis, jam *SENNERTUS* (l. c. p. 721) animadverterat.

35) *CARDANUS* de octo messoribus, sub quercu decumbentibus atque coenantibus narrat, qui fulmine tacti in ea forma, qua fuerant prehensi, manserunt. Unus videbatur comedere, alter poculum ori admoveere (lib. de fulgur. c. 7. T. II. opp. p. 726).

36) Cfr. *REYNELL* l. c.

37) *PINEAU sur les dangers des inhumations précipitées. Paris 1776.* *BRUHIER von der Ungewissheit der Kennzeichen des Todes. A. d. Fr. von JANKE* p. 126. 135. *MERKEL* l. c. p. 120. *MASON GOOD the study of medecine Vol. 3. p. 582.*

Ecstasis.

1. Aeger valde animatus.
2. Sermo sublimis vel cantus.
3. Gestus contemplationis objectum exhibent.

Catalepsis.

1. Aeger statuae similis.
2. Os mutum.
3. Motus voluntarii nulli.

Praeter genuinam a nobis definitam catalepsin (catalepsis perfecta), varii etiam ejusdem morbi existunt gradus minores (catalepsis imperfecta), quos ducibus ROLFINKIO³⁸⁾ et praesertim HERCULE SAXONIA³⁹⁾ nomine *affectionum catalepticarum* insignimus. Hujusmodi affectiones in hysteria⁴⁰⁾, in *febris* tum *continuis*⁴¹⁾, tum *intermittentibus*⁴²⁾ et ab *ovariorum vitiis*⁴³⁾ visae fuere, quibus

38) Epit. de cognoscendis et curandis particulari corp. affect. lib. c. 8.

39) Praelect. practicae.

40) PETETIN l. c. et BURSERIUS l. c. p. 107. in nota. Casus hic narratus, ut auctor ipse existimat, vix ad catalepsin pertinet. Idem de passione hysterica valet, quae in HORNII diario (*Archiv für med. Erfahrung.* 1829. März, April. p. 248) pro catalepsi proclamatur.

41) BOERHAAVE l. c. ad aph. 1040.

42) *Febris intermittens perniciosa cataleptica.* Cfr. C. MEDICUS *Gesch. der period. Krankheiten.* 1. B. 2. Aufl. 1792. p. 16. *Ephem. nat. cur.* dec. II. an. I. obs. I. De catalepsi periodica in cane vid. ibid. ann. V. obs. I. *Act. med. et philos. Hafniens.* T. III. obs. 52. BOERHAAVE aphor. §. 1140. BALDINO. *Mag.* l. c. p.

bus tamen in morbis non quivis motus automaticus, fortasse sub sopore, uti in hydrocephalo ⁴⁴⁾, aut ex vermibus ⁴⁵⁾ contingens, mox generis cataleptici habendus est. Quodsi symptomata cataleptica in uno tantum latere ⁴⁶⁾, aut una in parte ⁴⁷⁾, ast cum reliquis morbi, de quo agitur, indicibus obvenirent, ea a genuina catalepsi non excludenda forent. Postremo haud ignorandum, catalepsin societatem cum *cataphora* ⁴⁸⁾, cum *somniatione ac ecstasi* ⁴⁹⁾, et, quod mirum videtur, cum ipsa *chorea Sti. Viti* ⁵⁰⁾, inire, quibus in casibus *composita* dici solet.

§. LXII.

207. THYSSSEN *Geschiedkundige Beschouwing der ziekten in de Nederlande. Amsterd. 1824.*

43) RENARD l. c. 44) Cap. IV.

45) BENEDICTUS de curat. morb. lib. I. c. 26. TISSOT l. c. p. 54.

46) DE LA METTRIE p. 273. WEBER obs. med. fasc. I. an. 1764. Cfr. FABRI l. c. p. 69. et OSSII l. c. p. 21. partialem catalepsin minime admittentes.

47) TISSOT l. c.

48) *The gazette of health. No. 158. p. 458. Febr. 1829.* (Casus Sarah Carter puellae prope Cambridge habitantis).

49) Cf. Appendix. Quidam cataleptici, ait R. A. VOORZ (praelect. de cognos. et curand. praecip. corp. human. affect. Lausan. 1781. Ed. TISSOTI P. II. §. 570. p. 157) simul ecstatici fiunt durante paroxysmo, atque mira phantasmata, visiones divinas, angelorum consortium enarrant, linguas, quas non didicerint, loquuntur, si fabula vera, quin etiam futura pronuntiare videntur.

50) CAUS A SAUVAGESIO ex actis academicae Upsaliensis a. 1712. p. 41, sub nomine catalepseos delirantis, al-

§. LXII.

Prognosis. Cura.

Prognosis.

1. Rarius catalepseos inveniuntur exempla funesta ¹⁾: unde mirum est, hunc morbum pro admodum periculoso declaratum fuisse ²⁾. Solvitur aliquando narium haemorrhagia ³⁾, aut menstruatione ⁴⁾, verum fugatus facile recrudescit ⁵⁾; hinc inde per totum vitae decursum durat ⁶⁾. Catalepsis in morbis acutis pejor, quam in chronicis. Attamen et hic in maniam ⁷⁾, melancholiam ⁸⁾,

latus (l. c.) nil aliud, quam catalepsis, primum cum somniatione, dein cum chorea complicata fuisse videtur.

1) Letalem catalepsin refert DODONAEUS in adnotat. ad cap. 46. de abditis rerum causis BENIVENTII. De aegro in paroxysmo demortuo refert LONICERUS de exempl. morb. in cap. de congelat. p. 5.

2) PISO. SENNERT. BOERHAAVE.

3) AETIUS lib. VI. c. 4. 4) DE LA TOUR l. c.

5) SAUVAGES l. c.

6) FAHR in Eph. nat. chr. dec. II. ann. 2. obs. 1.

7) MARCELLUS DONATUS l. c. Vir triginta annos natus, vitam omnino vitiosam et intemperatam ducens, quum Vilnae, anno 1815, quadragesimae tempore, concionem quandam acerbiorum audivisset, ac malefactorum suorum conscientia nimis agitaretur, in ipso templi ostio catalepseos impetu prehensus fuit. Qui quamvis post quartam horae partem discussus fuerat, homo tamen tristis et cogitabundus, post aliquot dies in maniam incidit, quae praecipue desperatione, aeterni supplicii timore ac fuga a daemone prosequente insigniebatur. Curae nostrae traditus duarum septimanarum spatio convaleuit.

liam ⁸⁾, epilepsiam ⁹⁾ et atrophiam ¹⁰⁾ transivisse est visa.

2. Pro variis hypothesibus, quas sibi auctores de catalepticos causa proxima excogitarunt ¹¹⁾, variam quoque medendi rationem proposuere. Nos ducibus indicationibus generalibus, placide, ut TISSOT suadet ¹²⁾, incedendo, pro re nata *hirudines* ¹³⁾, *balnea frigida* ¹⁴⁾, *emetica* ¹⁵⁾, *enemata et suppositoria* ¹⁶⁾, *anthelminthica* ¹⁷⁾, *opium* ¹⁸⁾, *subsulphatem cupri et ammonia* ¹⁹⁾, *electricitatem* ²⁰⁾, *magnetismum animale*, *musicam* ²¹⁾, si liceat, *coitum* ²²⁾, *frictiones, titillationem plantarum pedum* ²³⁾, *lac et saccharum* ²⁴⁾ proponimus, habita summa *regionis epigastricae cura* ²⁵⁾, ac relegatis ultra Garimantes irâ, terrore et curis.

Appen-

8) ORTUS l. c. p. 20.

9) NIC. PISO l. c.

10) POSTELLIUS in *Journ. de méd.* T. 20. p. 407. BOERHAAVE l. c. Et juris ille studiosus in tabem incidit.

11) Cfr. PISO, SENNERT, BOERHAAVE. 12) l. c. p. 81.

13) Cfr. Appendix. 14) MARK l. c.

15) WEDEL l. c. 16) Idem l. c.

17) e. c. oleum terebinthinæ (WEAVER l. c.), sed non ad insaniam ut ille dosin.

18) WEDEL l. c.

19) THOMASSEN & THURSSINK *Verhandelingen te Vlossingen. Deel 14.* p. 363. *Samml. auserl. Abh. für pr. Aerzte* 17. B. p. 279.

20) COSNIAK l. c.

21) PETROZ in *Dictionnaire des scienc. méd.* T. 4. p. 281.

22) Ephem. nat. cur. dec. II. obs. 42. 23) WEDEL l. c.

24) Appendix. 25) PETETIN et appendix.

*Appendix ad caput XIV.**Historiam mirabilem catalepticos compositas continens.*

Ludovica Baerkmann, viginti duos annos nata, fabri lignarii *Kierslingii* filia, religionis evangelicae, confectoris horologiorum catholici uxor, oculis nigris vividis crinibusque fuscis praedita, educatione, quae civem deceat, instituta, idiomate polonico ut familiari utens, linguam germanicam callens, minime vero italicam, quamvis per plures annos apud sororem suam, Italo nuptam, habitaverit, in musica non versata, theatrum tamen quondam saepius frequentare solita, primo felicissimi matrimonii anno versus finem vergente, praevia graviditate ad nutum procedente, die secunda Decembris 1815. n. st. prolem, brevi demortuam, non sine metrorrhagia sat conspicua peperit. Rebus jam omnino bene incedentibus, postquam ope aquae frigidae puritati partium genitalium studuerat, derepente die vicesima tertia Decembris in febrem ardentem incidit, accedente simul tumore sic dicto *albo puerperarum in crure dextro*. Venae sectiones, hirudines, lenia evacuantia, vesicatoria, diaphoretica, diuretica, calomel, acarifactiones partis adfectae, aliaeque multa localia, sensim acutiusque in usum ducta fuere, at omnia incassum. Immo accessit et alterius cruris tumor plane similis. Tumores huiusmodi tanti fuerunt, ut crura et pedes ultra triplex volumen adepta essent. Praeterea attactum et motum vel minimum ita respuebant, ut aegra immobilis continuo dorso decumbere deberet, ac atrocibus doloribus diu noctuque excruciat, vix per horae dimidium nycthemeri spatio somno frui posset. Atque sic urgente semper febre vehementi cum sudoribus profusis, non per unam alteramve hebdomadem, sed per plures menses grabato adfixa erat. Tot acriminis exhausta ac plane desperabunda, omnem in medicos fidem amittens, die quarta Martii iis valedixit, atque agyrtarum et vetularum consilia secuta est. Illorum

unus

unus pulveres ex cremore tartari, nitro, magnesia et castoreo praescripsit, quibus alvus copiose frequenterque mota est, consequente magna virium jactura. Accidit tum forte, ut aegra lapsu infantis cujusdam admodum terrefacta esset. Brevi post, die scilicet 19. Martii n. st., ecce delirium, sub quo aegra, se bene valere, domumque derelinquere velle esserebat, vestem induere optabat, et id genus alia, quae scena post horam, supervenientibus nonnullis symptomatibus catalepticos (sic saltem ex narratione mariti judicare licet), terminabatur. Tunc misera, exceptis partibus tumidis sceletis similis, pristinos iterum experiebatur cruciatus. Jam vero, spreto qualicumque humano auxilio, omneque solatium a Deo omnipotente expectans, diu noctuque fervidissimae preces fundebat, ac fidem evangelicam cum catholica commutavit. Reddit interea post hebdomadem idem delirium, ac, ut adstantes agebant, cantu et symptomatibus catalepticis, quemadmodum antea, stipatum. Et haec remiserunt, decrepescitibus magis magisque viribus atque appropinquantibus mortis indiciis. Jam vero duo paroxysmi spatio hebdomadis, constanter inter horam quartam et quintam vespertinam, incidebant, sub quibus aegra (si ex adstantium narratione judicare liceat), primum cataleptica, dein ecstasica evadebat, ac postremo in tantum prorumpens, quo terribilem suum statum deplorabat et coeli exposcebat auxilium; utebatur sermone polonico, integris phrasibus italicis intermixtis. Haec omnia a marito et consanguineis aegrotae pro delirio, proximam mortem annunciantes, habita fuerunt. Qua de causa sacerdotes quidem, sed non medici adducebantur. Accidit forte, ut frater mariti, *Joannes Baerkmann*, medicinae doctor, ab itineribus, quae per Galliam et Germaniam plurimum annorum curricula fecerat, Vilnam redux esset. Qui invisit quidem aegram, ac cum eam in statu, uti credebatur, plane conclamato invenisset, cumque ipse plurimis negotiis obrueretur, peculiarem illi laud dedit curam. Contigit in-

teren, ut die 13. Maii fortuito paroxysmi cujusdam testis fieret. Tum protinus, non delirium hic, sed stupendum agi phaenomenon cognoscens, sine temporis jactura rem ad me detulit. Accessi die sequente ad quintam horam pomeridianam. Horrui terribilem aegrae, a me per quatuor menses non visae, adaspectum, mortis imaginem prae se ferentem. Quin immo mortuam eam dixissem, nisi genae subrubrae, oculi aperti, fixi, respiratio sublimis ac lenta, pulsusque ultra centum in horae sexagesima parte micans, de superstitute vita tastarentur. Incassum proprio nomine miseram compellavi brachiaque concussi. Omnia docebant, ipsam mantis impotem esse. Status iste haud diu duravit: paucis enim elapsis horae momentis, compos sui facta est. Num dormivisti, interrogavi. Sic sane, et placidissime quidam, respondit. Per dimidium nunc horae mecum de statu suo loquebatur, tantos cruciatus inonsans, quantos nemo mortalium sustinera valerat. Consolationem, quosdamque mihi licuit, verbis offerans, cum nemò pharmacum a me expeteret, ac nil memorabilia observaretur, discessi. Advoco iterum hora octava vespertina, qua, praevia anxietate quadam, denuo immobilis et mentis impos evasit: atque sic eam inveni, excepto motu quodam labiorum, ac si oraret aut secum clam loqueretur. Brevi autem alapsa mora, eu cantus, prius voce humili, dein alta at sonora. Non quidem versus profarebat, attamen poetico quodam afflatu et matro cantus insignitus erat. Ecce prolata verba, sicuti ex ore aegrae fluabant charitis me praesente commissa, quibus versionem latinam addi curavi.

Verba aegrae.

Ach Ty Boże wielki litościwy!

Ach ratujcie nieszczęśliwą.

Pocieszycielu utrapionych,

Uzbroy mię cierpliwością.

Ty

*Ty tylko jesteś nadzieją moją,
 W Tobie mą ufność pokładam.
 O wy moi ukochani!
 Patrzcie na me udręczenia.
 Widzicie, jak człęk jest nikczemny,
 Jak mało różny od prochu.
 Bóże wielki, Bóże dobry;
 Ty moja nadzieja,
 Skróć me cierpienia,
 Lub powróć mi zdrowie.
 Niech ci był przestają, którzy żyli długo na świecie,
 Lecz ja nędzna poczynam usychać w świecie.
 Nie karz Panie szemrania mego,
 Wszaktem się już dawno Twój świętej woli oddała.
 Racz tylko pocieszyl kochanego męża,
 Który ze mną równie cierpi.
 I wy siostry i bracia zbliżcie się do cierpiącej,
 Ona was opuszcza i tęga na wieki.
 Lecz nie rozpaczajcie, prędzej lub później
 Złączą nas Nieba statecznie.
 Precz okropny szatanie, wszak nie masz domnie prawa.
 Kto się Bogu oddał, nie ulega twej władzy.
 Oddał się z myśli moich, poczwaro piekielna,
 Bo dusza moja ma innego Pana.*

Versio latina.

*Summe et misericors Deus!
 Heu, fer opem mihi miseræ!
 O tu afflictorum consolator!
 Fac armes me patientiæ virtute,
 Quippe qui solus es spes mea.
 In te fiduciam meam repono.
 O vos dilecti mei!
 Spectate meam afflictionem,*

Perci-

Percipitis, ut homo parvi aestimandus sit,
Utque vix differat a pulvere.

O magnum bonumque numen,

Unica spes mea.

Impone finem doloribus meis

Aut redona me valetudine.

Desinant vivere ii, qui diu gavisii sunt vita,

Ast ego en inops exaresco in ipso flore:

Ne punias attamen questus meos,

Jam pridem utique dedidi me tuae sanotae voluntati.

Age adice solatio dilectum conjugem

Participem dolorum meorum.

Vosque sorores et fratres adeste mihi conflictanti,

Eu illa ego relinquo vos, atque aeternum dico vale;

Verum non desperetis velim, serius ocyus

Jungemur supernum ope haud dissociandi.


Apoge tu male daemon, cui nullum ius in me competis;

Qui se commisit Deo, non ille obnoxius est tibi;

Aufer te ex animo meo, monstrum tartareum!

Quandoquidem anima mea alio gaudet domino.

Melodia, quae intercipiendo declamationem, Italici
recitativo, non neglectis, ut dicunt, *forte et piano*, sae-
pissime sequebatur, haec fere est:



Ach ty Boże wielki litościwy ach ratuyże nie szczęśliwą.

Brachiorum, inprimis sinistri, gestu, moderato illo quidem, at significante et cum dignitate quadam conjuncto, vocem sequebatur. Arrepta brachia motui a me impertito sine difficultate obediebant, et situm qualemcumque, utut incommodum retinebant. Quum per horae dimidium hujus stupendi phaenomeni testis fuissem, acclamatione iterata, eaque semper fortiori, aegram excitare tentavi: at iucassum. Oculi quidem aperti erant, sed defixi, cum pupilla

pilla immobilis, palpebris admoto etiam digito haud titubantibus, nullisque visus indicibus. Cuius acui puncta nulla observabantur doloris signa. PETETINI tum mihi in mentem venerunt observationes: qua de causa, admoto ore regioni epigastricae humillima, ac a nemine adstantium percipienda voce, loqui incepi. Extemplo aegra, quasi ad se rediens, interrogationibus respondebat, et quidem haec fere ratione. *Interrogatio*, Dormisne? *Responsio*, Dormivi, sed nunc non dormio. I. Num quid doloris est? II. Ut semper, ad crura et lumbos. Concessa aegrae quiete iterum cataleptica facta est, et post pauca horae minuta denuo, uti supra, cantabat. Iteravi tunc periculum eam modo consueto excitandi, verum id nullo pacto efficere potui. Contra vero sermone ad regionem epigastricam repetitio, mox iterum respondebat. Et sic bis etiam, intermedium semper catalepsi et cantu. Morbum hunc pro ecstasy, catalepsi juncta, declaravi. Praeterea cum varia experimenta capere mihi proposuissem, socium, ut testem, habere volui virum, potius incredulum; ac res admirandas non facile admittentem, cl. nempe *Andream Sniadecki*, chemiae professorem, ac medicum simul expertum. Eo postridie circa horam quintam pomeridianam praesente, tota hesternae iterabatur scena.


Die 16. Maii. Cantavit heri usque ad horam decimam vespertinam. Nox erat reliquis tranquillior. Hora quarta pomeridiana, praevia hilaritate, mentis exaltatione et delirio, sub quo se sanam esse fatebatur, ac vestes induere voluit, novus paroxysmus ingruit, praesente, praeter D. *Sniadecki*, professore chirurgiae *Nitzkowski*, et paulo secus me ipso. Cantabat voce minus sonora, ac magis declamatione (*recitativo*) utebatur. Ideae cantu elatae esedem fuere. More solito brachio sinistro maxime gestus agebat. Sermocinando super regionem epigastricam excitabatur et respondebat, quamvis interrogatio humillima voce facta fuerit. Ast interrogata a D. *Sniadecki* humili quoque

voce

voce prope aurem dextram, etiam experspecta respondebat. Non excitabatur neque respondebat loquendo super pulvinar, cui caput illius incumbibat. Excitabatur vero et loquebatur admoſta auri dextrae virga ferrea, longitudinis unius ulnae cum dimidio, super cujus alteram extremitatem D. *Sniadecki* humillima voce loquebatur. Repetiit idem experimentum D. *Nizkowski* eodem cum successu, applicando virgam super os frontis. Quoties quies concederetur, toties in ecstasin et aliquando in catalepsi iterum incidebat. Ex hac, uti ex illa, excitari aequo pacto potuit. Inter unum varo et alterum insultum motus faciei convulsivos inscia patiebatur, capiteque nutabat. Quum semel manum unam super regionem epigastricam, alteram ad occiput posuisssem, protinus evigilavit. Interrogabam tunc: dum dico aliquid, quo pacto id sentis? Respondit: dum circa caput loqueris, audio, — dum vero ad cordis scrobiculum me compellas, calor sensum percipio, qui respirationem mihi impedit, indeque evigilo. *I.* At quo pacto tunc audis? *R.* Nescio, sed existimarim, uti prius. Cum paroxysmi stata hora pomeridiana inciderent, et aegra sat bene comederet, scopo videndi, utrum illi cum digestionis opere cohaerent, consilio *Sniadeckii* prandium hora citius praescriptum fuit. Alvus et urina semper normales.

Die 17. Maii. Aegra heri vix sola relicta iterum in paroxysmum cum delirio incidit, ad horam decimam nocturnam durantem. Eo vigente aiebat se sanam esse, vestes expetebat, cognoscendo tamen nominandoque adstantes. Nox bona. Mane hora octava ecstasis, sub qua hilaris cantabat de angelis formosis, quibuscum ludebat, flores pro illis se carpere credens. Prandium hora undecima sumpsit. Circa horam quartam pomeridianam nova ecstasis cum lacrymarum profluvio, ob exacerbatum, uti aegra dein referebat, pedum dolorem. Hora 5—7. praesentibus DD. *Sniadecki*, *Nizkowski*, *Baerkmann* et me, sub catalepticos

lepseos insulta virga duarum ulnarum vitrea super aurem dextram posita est, ad cujus alteram extremitatem loquebatur *Sniadecki*. Spatio unius temporis minuti evigilavit,iciens, se caloris sensum ad aurem percipere, at nil aliud. Quum mox in catalepsin relaberetur, eadem virga vitrea cava, cujus per medium *filum ferreum* ductum erat, eodem pacto applicabatur. Citius tum excitata caloris sensum incusabat: interrogata autem, num audiverit, fassa est, voce adeo humili locutum fuisse, ut nil intelligi posset. Virga ex carbone, ejusdem longitudinis auri adnota, citissime expergefata est, ac omnia verba intellexit. Utrum oculi minimae luci, quemadmodum aures minimo sono, responderent, observare cupidi, conclave ultro obscuravimus, at incassum. Neque enim sponte evigilabat, neque arte excitata in obscuritate videra potuit. Horologium meum, modo insensibili micans, enim auri admotum fuisset, illam protinus excitavit. Ita attactus pedum aegrotantium. Sub ecstasi faciem exhibuit serenam ac cantabat, se sanam futuram esse: *Deum* quippe, exauditis ejus precibus, misisse ad eam viros, quos illa deos habuerit, quorumque conaminibus morbum, non sine praevis adhuc doloribus, fugatum iri speraret. His sequentem vocem saepissime intercalabat:



Bärkma-no-wa będzie zdrowa — — —

U-xor Bärkmanni fi-et sana — — —

Die 18. Maii. Brevi post exitum maum delirium hilarae scenae finem posuit. Nox adhibitia nonnullis laudani liquidi guttulis placidissima. Mane aliquot cautus uti heri. Dr. *Nizkowski* incisiones crurum ad tibiam sat profundas fecit. Exiit humor lymphaticus, tumore quidquam subsidente. Hora tertia pomeridiana eu catalepsin, sub qua Dr. *Sniadecki* aequantia fecit experimenta. Calami scriptorii parte superiore cutim lenissime tractabat, nimirum

ut

ut videret, an minimus attractus, sicuti minimus sonus, effectum evidentiorē produceret. Illico aegra brachia adversus calamum porrexit, eumque manu avidē arripuit; eum autem vi evulsus esset, manus post illum, quoquo-versus moveretur, itidem extendebat. Moīna vero illi non fuerant similes motibus voluntariis, sed brachia machinae cuiusdam instar, ut fere corpora electrica invicem attrahuntur, calamum sequi videbantur. Calamo super mensam posito omnino conquiescebant; eoque iterum manibus nostris assumpto, brachium iterum movebatur erga calamum. Deportato eo in illud eubiculum, tam inquieta fiebat aegra, ut, brachiis versus calamum directis, e lecto quasi prosilliret. *Cera sigillatoria* eundem effectum in aegram habuit. Dum eam in una, calamum autem scriptorium in altera manu e longinquo, et quin aegra me videre potuisset, etiamsi visū gavisa esset, tenebam, utrumque brachium ad objecta haec extendebat. Sicuti calamus scriptorius et cera sigillatoria, ita *succinum*, a Dr. *Baerkmann* admotum, agebant. At haec omnia tunc solum tam evidentem effectum in aegram exercebant, eum inter manus hominis, non autem, eum quiescentia super mensam manerent. *Vitrum* aegrae appropinquatum nullos brachiorum motus excitavit. Videndo sic corpora idioelectricā tantum in corpus aegrae exercere effectum, incidit mihi cogitatio *folem*, ut animal summopere electricum, illi ad-movere. Parvulum itaque animal in distantia pedis unius a lecto super brachium tenens, altera manu illud tractim lenissime fricavi. Illico aegra in atroceā motus convulsivā incidit, ambabus manibus caput amplectebatur, ac ab objecto sibi horrendo avertebat, adeo, ut eam excitare co-acti fuerimus, nomen illius in aurem insusurrando. Ex-pergefata, se paulo antea summam anxietatem perpessam esse, asseruit. Interrogata, an soles toleraret, se id minime posse, respondit. Per omne horum experimentorum curri-culum cataleptica erat, at non cestatica ut aliās, aut cantans.

Die

Die 19. Maii. Heri ad vespertas, cum maritus in tertio cubiculo, neque ab aegra visus, sorori ejus historiam de calamo narraret, illumque forte manibus arripuisset; aegra tunc sibi compos mox in delirium incidit, manusque adversus calamum extendebat. Advocato autem marito, repositoque calamo, omnes turbae compositae fuere. Nox bona. Mane lectus mutabatur, quod ob dolorum subitus mutatione saevitiam omni tantum decima die fieri potuit, qua occasione *Nitzkowski* tumorem, nates et crura occupantem ac fluctuantem vidit. Ex incisionibus heri factis copiosum serum manabat. Genua quidquam detumescere. Cantavit iterum, uti nudius tertius. Prandium cum paucis appetitu sumpsit. Hora tertia in catalepsi et ecstasi incidit. Intrante fortuito cane in cubiculum valde inquieta facta est, donec fugatus fuit. Experimentum cum calamo scriptorio, eodem cum eventu, et in tertio cubiculo repetitum erat: sequebatur stridor dentium. Sericum eodem pacto agebat, experiente *Snladecki*. Cantabat iterum iterumque, at profundiore debilioreque voce. Quum plurima experimenta cum sensibus visus, auditus et tactus facta fuissent; *gustum* quoque examini subicere volui. Regioni hinc illi, qua tam facile audiebat, epigastricae nempe, solutionem sacchari in aqua frigida linteo exceptam imposui, ac manum meam prope hanc regionem tenens, anper verticem humillima voce allocutus sum. Iude non excitabatur, at in somniationem conjecta interrogatis respondebat. *I.* Dormisne? *R.* Non, somnio. *I.* Num vides? *R.* Nec video, neque audio. *I.* Percipis tamen vocem meam? *R.* Percipio eam, sed tuam unice tantum. *I.* Quot homines hic adsunt? (aderant Doctores *Nitzkowski*, *Barankiewicz*, *Homolicht*, *Harberski*, plurimaeque affines et amicae aegrae.) *R.* Nescio: plurimos adesse ex habitu eorum nosco, sed nec video, nec audio. *I.* Noscis me? *R.* Utique. *I.* Quis sum? *R.* (Post aliquot momenta)... *Josephus Frank*, benefactor et salvator meus etc.

Frank Prax. II. I. 1.

M m

L. Visuc,

I. Visne, ut te magnetismo animali submittam? *R.* Non video necessitatem, nam egomet ipsa nosco, quid ad restituendam sanitatem meam requiratur. *I.* Quid ergo? *R.* Unguentum ante omnia genubus illiniendum. *I.* Quodnam? *R.* Nescio. *I.* An album aut nigrum? *R.* Potius nigrum. *I.* Quoties in die? *R.* Ter. *I.* An incisiones adhuc necessariae erunt? *R.* Tempus id docebit, sed existimari necessariae fore. *I.* Quid dein? *R.* Liberatio eruribus a materia balnea adhiberi debent. *I.* An remedia interna quoque necessaria sunt? *R.* Utique. *I.* Quanam? *R.* Cortex peruvianus. *I.* Quo pacto paratus? — (Hic modum ipsum corticis frigidum parandi, de quo heri inter medicos sermo erat, accuratissime recitavit.) *I.* Nam ossa tua corrupta? *R.* Non, sed debilitata a longo decubitu. *I.* Videsne ea? *R.* Non video quidem, sed nimis, eheu! sentio. *I.* Usus phosphori eritne hic indicatus? *R.* Puto phosphorum esse rem ardentem, — non juvabit. *I.* An rubia tinctorum? *R.* Cur non? *I.* An aqua calcis cum lacte? *R.* Vehementer dubito, ventriculum meum hoc perferre posse: nam etiam sanus illud respuit. *I.* Sed tamen fortasse post corticis usum? *R.* Forsitan: alioquin enim timerem diarrhoeam, quae mihi admodum nocuit. *I.* Quae alimenta essent tibi accommodata? *R.* Res subacidae, carnes gallinarum juniorum. *I.* An ciocolata? *R.* Minime: multum enim me calefacit. *I.* Quid musica? *R.* Utilis esset ad mentem meam recreandam: verum et amicorum consortium id levamina affert mihi: pessime enim habeo, dum sola in praeda dolorum et cogitationum mearum maneo. — Musica multas impensas faceret, et jam tot earum pharmacia dedit (non medici ... quanta urbanitas!). *I.* An te interrogationibus meis defatigo? *R.* Immo gaudeo, me multa circa valetudinem meam loqui posse. *I.* Quando habebis menstrua? *R.* Vix antequam surgam et balnea adhibebo: nam decumbens femina ac nil, nisi caput et brachia movens, difficulter menstruat. *I.*

Credisne,

Credisne, te adhuc prolem habituram fore? *R.* Credo, sed numerum non possum determinare. Nunc *Dr. Barankiewicz* aegra interrogationem fecit. Nullum responsum. Rogavi tunc, ut mihi manum suam daret (alteram ego constanter ad regionem epigastricam tenebam). Interrogavit denot quia sum? *R.* Doctor *Barankiewicz* (non viderat antea hunc medicum in cubiculum intrasse). Resumpsi tunc interrogationes egomet ipse. *I.* Quid habes super scrobiculum cordis? *R.* Aquam saccharatam. *I.* Quomodo id acis? *R.* Percipio sensum caloris humidi ab ea regione ad linguam ascendentis, quae mox levi dulcedine afficitur. *I.* Num grata est haec aenatio? *R.* Admodum; suget ea nonnihil febrem, sed hoc nil nocet, nam inde etiam ad loquendum excitior. *I.* Permittisne, me aliquid aliud scrobiculo cordis admoveo? *R.* Permitto quidem, ac nil aliud mihi tam gratum erit. *I.* Datur ne modus, ut te nunc ad videndum idoneam reddam? *R.* Debeo cogitare — utique — si trea hirudines vertici admoverentur, viderem et fortasse etiam omnes audirem. Nunc iussi, ut removeretur linteam aqua saccharata imbutum. Protinus excitata est. Dormivisse ac optime, ac grato somnio gavisam esse affirmabat. *I.* Quid habuisti super regionem epigastricam? *R.* Aliquid humidum. *I.* Quid? *R.* Nescio. — Pulsa hodie frequentior, debiliior. —

Die 20. Martii. Nox bona — Dolor genu minor, immo pars ista attactum fert. Hora quarta pomeridiana catalepsis. Dum quis adstantium brachium vel caput fortius movet, aegra eundem motum facit. Idem hoc accidit, dum quis in tertio cubiculo motum quemque de industria exerceat. Si vero manus in poculum vitreum introducatur, brachium moveri potest, quin aegra simili motu respondeat. Applicita altera manu mea ad regionem epigastricam, altera ad caput, aegra excitabatur. Somniavit vero illico, adposita, ut heri, solutione saccharata regioni epigastricae, ac me tangente hanc regionem et interrogante.

Ab hac solutione repetiit ipsa loquendi facultatem, actionem illius ut heri explicando. Dixitque ultro, sibi solutionem sacchari idem praestare, quod aliis magnetismus animalis, quem vigil cognoscere se negabat. *Sniadecki*, *Nizkowski*, *Mianowski* et *Baerkmann*, aegram separatim interrogantes, nullum responsum obtinuerunt. Quo primum vero mecum *catenam* manibus iniecerant, cum dextram *Sniadeckio* dedissem, interrogationibus omnium respondebat, nominibusque designavis adstantes, in ordine, quo stabant aut sedebant, in eo solum errando (fortasse nomine magis, quam re), quod *Nizkowski* sedantem, *Mianowski* stantem diceret, dum prorsus contrarium agebatur. Quum manum meam sinistram ab epigastrio removissem, nemini adstantium amplius respondebat: illa vero remissa, ut prius, iterum loquebatur. An interrogationes nostrae tibi incommodae sint? quaesivi. *R.* Immo vero me recreant; nam multum habeo de statu meo dicendum. *I.* Vis sponte cogitationes tuas enunciare, an interrogationes faciam? *R.* Facilius mihi est ad interrogata respondere. *I.* Dicis nobis, quo pacto in statum, in quo nunc veraaris, incidis? *R.* Doloris vis me videndi et audiendi facultate privat, unde mentis praesentiam amitto, quin ideae meae confusae sint. *I.* An solum scrobiculo cordis gustum sonosque percipere potes? *R.* Gustum aquae saccharatae solum scrobiculo cordis percipio: sonos etiam capitis vertice audire possum. Ablato linteo saccharato a regione epigastrica, eoque aliis locis admoto, revera non respondebat amplius interrogationibus. Idem accidit applicito ibi infuso corticis peruviani frigido. Interea solutionem salis super scrobiculum cordis imposuit Dr. *Baerkmann*, adjuvante *Sniadecki*. Continuavit loqui, sed faecules prius aereae, paulo post severa facta est. Interrogavi tunc: num quid patiat? *R.* Pondus magnum percipio ad scrobiculum cordis, cui incumbit aliquid, quod aegro sero, sed indicare nequeo. *I.* Quis tibi id regioni illi imposuit?

posuit? *R. Baerkmann* adjuvante *Sniadecki*: verum magnas inde percipio molestias. Tum solutionem saccharatam epigastrio iterum admoventi curavi. *I. mea*. An melius te habes? *R.* Necdum omnino. *I.* Vis aquam saccharatam habere? *R.* Utique. *I.* An aquam magneticam? *R.* Non. *I.* Visne ipsa bibere? *R.* Non video vas, porrigatis cochlearia nonnulla coseana. — Appropinquato vix cochleari avide labiis obviam venit ac deglutiit. *I.* Quid, melius nunc habes? *R.* Sis sane: ridiculum profecto est, rem nullius prorsus momenti posse tantum effectum praestare. *I.* Habeone pecuniam tecum? *R.* Metalla, ut argentum et aurum in me non agunt (suggerente clam mihi *Sniadeckio*). *I.* Quid maxime te afficit? — Responsum nullum. *I.* Cur non respondes? *R.* Interrogationem tibi suggestam non intelligo. *I.* Quanam res tibi molestiam afferunt? *R.* Dum homines brachia aut caput movent, dumque pluma ex alis volatilium decerpta movetur. *I.* Quid vitrum? *R.* Bene id fero. *I.* Quid cera sigillatoria? *R.* (facie torva) Ah, — essem ferre nequeo, — in mille fragmenta eam rumpere vellem: — (irata) sola ejus mentio jam me angit. *I.* Visne aquam saccharatam? *R.* Vellem equidem, nam male me sentio. *I.* Vis, ut cantemus? *R.* Bene. — Nunc in consensum iraxi cantatorem spadonem italicum, nomine *Tarquinio*, qui curiositatis gratia adstiterat, quin aegra eum videret, aut etiam sciret, eum Valuae degere. Per duos enim annos aberat, et reversus est ante mensem, morti proxima jam decumbente aegra. — Cantavi simul cum eo initium sic dicti *Duetto*, ex opera *Debora e Sisaro*. „*Al miq contento in seno.*“ — Aegrae vultus voluptatem exprimebat. *I.* An placuit tibi cantus noster? *R.* Admodum. *I.* Quia tecum cantavit? *R.* Possem id divinare. *I.* Quis igitur? *R.* *Tarquinio*. *I.* An debemus iterum cantare? *R.* Valde optarim. Cantavimus tunc initium *Duetto* ex opera *Gislietta e Romeo*: „*Dunque mio bene.*“ *I.* Noscis hunc cantum? *R.* Ex opera italica: verum

verum nimis est tristis, meque magis melancholicam reddit. *I.* Visne cantum hilariorē? *R.* Rogo. — Cantavit tunc *Tarquinio* initium *Duetto*, ex opera *la Molinara*: „*Nel cor più non mi sento brillar la gioventù.*“ Jam vultus aegrae serenus factus est ac ridans, capite nutans, manibus mensuram dabat. Vix finito cantu — ipsa eandem melodiam cantavit: mox vero, italice quidem cantare nequeo, sed non arit male et polonice, dixit, tamque verba polonica spem sanationis declarantia melodiae illi adaptavit. — Cum interea coelum ex sereno nubibus esset obiectum, maximaeque pluvia caderet, interrogavi: quaeenam est tempestas? *R.* Imber est maximus. *I.* Audisne illum cadentem? *R.* Minime, sed cognosco ex gravitate aëris. *I.* An bene esset fenestras aperiri? *R.* Circa meridiem, aliis non. *I.* Quid ita? *R.* Fortior enim mans, nam post prandium dein in paroxysmum incido, — sed jam defatigatam me sentio. *I.* Quo pacto excitare te possim? *R.* Per afflatum aëris super os vel ad nasum; — loquendo super cervicem. *I.* Qualis modus gratior? *R.* Afflatus. Jussi tunc maritum aegram halitu suo afflare, unde mox subridens manteque compos facta est. Interrogata nunc, an dormiverit, respondit, bene dormivi. Somnias-tine quid? *R.* Non credo me somniasse. *I.* Audivistine musicam? *R.* Minime vero. Noscisne *Tarquinio*? *R.* Vidi eum ante sex annos. Consessui hodierno adstiterant praeterea duo medicinae Doctores, *Abicht* et *Meyer*.

Die 21. Mart. Noctu somno tranquillo et non interrupto usque in septimam horam matutinam dormivit. Hora decima accessu cataleptico abrepta jam cantus inchoabat suos: sed cum adveniens senex quidam baculum grandi globo metallico munitum ad ipsum lectum collocasset, protinus conticuit. Tum maritus baculum illum amovere, aegra autem post remotum manus extendere, erubescere, dentibus stridere, vultuque indignationis prodere, ut levi halitu excitari debuerit. Hora secunda pomeridiana, cum
odores

odores succini forte incenderentur, mox animo linqui, jactari, erubescere, angoresque significare magnos. Rursum halitu excitata, se magnam pectoris oppressionem pertulisse, ut paene morti esset proxima, asseruit. Brevi post linteum tanna acu pingebat: at confectis quatuor dentibus (dentata quippe erat delineatio linteo supposita), a sensibus secessit, oculisque trucibus et palpebris immotis opus institutum prosequabatur, ita ut iterum quatuor dentes, prioribus similes, confecerit, eosque fornice omnino excidarit: quanquam et oculi in alia prorsus objecta fixi erant, neque adstantium clamores percipiebat. Sponte expectata profectum opus admodum mirabatur, ac sororem suam id effecisse perhibebat: neque enim se somno detentam acu pingere potuisse. In eodem hoc labore occupata hora quarta pomeridiana, cum ecstasi prehenderetur, rectissime tamen per aliquot temporis minuta snebat: at vero charta crassiore oculis praesentia mox palpebras clausit, facieque convulsa et indignata linteum procul a se reiecit. Deinceps pacatior haec fere cantare coepit: „jamque mihi id opus intermittendum est, multa enim de sanitas meae cogitare debeo.“ Tum vero, ingrediente viro quodam, quem sibi vigil odiosum esse aiebat, subito siluit, erubuit dentesque collisit. Hora sexta recuperato sensuum usu inconsueta quadam hilaritate de multis lepida cum adstantibus sibi loquebatur, continuo fere irridens. Exacto horae dimidio in catalepsi relapsa est. Tunc Dr. *Baerkmann*, altera manu epigastrio, altera capiti aegrae admoia, ita eam allocutus est: Equid nunc meditaris? — Post moram aliquam, voce humili et cum difficultate quadam retulit: Cogito, quid contra morbum meum optime profuturum sit. — *I.* Idne jam intelligis? *R.* Equidam tibi bene referre nequeo, cum saccharum non sit in epigastrio positum. *I.* Illudne desideras? *R.* Et maxime quidem: protinus enim exhilarabor, et promptius et facilius loquar. — Cum linteolum plicatum solutione sacchari intinctum, epigastrio

gastrio appositum esset, mox hilaritas et oblectatio quaedam ex vultu habitu eminebat. *I.* Idne jucundum tibi est? *R.* Jucundissimum sane, sed admove etiam pollicem tuum linteolo, si vis me facilius loqui. — Admoto digito ad epigastrium interrogavit: Ecquid nunc sentis? *R.* Calorem sentio auctam saporemque dulcem. Nunc interroga. *I.* Num colores rerum epigastrio appositarum discernere posses? *R.* Forsitan possem. *I.* Num etiam librum illi admotum legere? *R.* Perdifficile id sane. *I.* Vel certe litteras aliquot grandes dignoscere? *R.* Neque id sine magna virium contentione fieri potest. *I.* Permittisne id experiri? — Tum responsi loco faciem rubore suffundit et indignationem prae se ferre: dentes autem collidi et fremere. *I.* Appetisne aquam saccharatam? *R.* Appeto, sed parvulum cochlear solum. *I.* Num etiam cibos? *R.* Belle appeto. *I.* Quid tandem expeteres? *R.* Caseum, panem cum butyro recenti et cerevisiam. *I.* Num e somno excitari velles? *R.* Vero, quia fame conficior. *I.* Quomodo excitare te possem? *R.* Halitum tuum cominus mihi affla: nam si id eminus fieret, de lecto me levare debuisssem. — *Expectrecta praeteritorum minime recordabatur.*

Die 22. Maii. Post noctem inquietam mane conscia lacrymabatur. E vulneribus pedum nil effluit. Hora quarta pomeridiana in catalepsin incidit. Duos ecstaseos paroxysmos tum experta est, cum cantu. Hora quinta inveni aegram simpliciter catalepticam, facie solito tristiori, praesentibus Dr. Barankiewicz et Baerkmann. Illico frustulum panni scarlati, quod insciis omnibus mecum adtuleram, sacchari solutione imbui, ac super regionem epigastricam applicavi, eique superimposita manu sinistra ita cum aegra colloquebar. *I.* Videris mihi solito tristior? *R.* Sum revera tristior. *I.* Cur? *R.* Multum patior, nam materiae e cruribus fluere omnino cessavit. *I.* Quid igitur faciendum? *R.* Novae dandae sunt incisiones. *I.* Ubinam? *R.* Infra loca jam saucista. *I.* Quid habes super scrobiculum

lum cordis? *R.* Sacellarum, a quo loquendi facultatem accipio. *I.* Quid etiam? *R.* Aquam. *I.* Quid praeterea? *R.* Lintei frustulum. *I.* Cujusnam coloris? *R.* Albidi. *I.* Certe? *R.* Non video, sed mihi ita cogitatione fingo. *I.* An interrogationes meas omnino verba exponere debeo, an vero posses eas, mente mea adhuc inclusas, intelligere? *R.* Longe facilius mihi est, si eas verbis exprimis. *I.* Permittisne, ut nunc tantum interrogationem mento faciam? *R.* Domine! status meus jam non diu durabit. Ad tantam mentis contentionem sustinendam impar fio. Ideo meae invicem confundi incipiunt. Venae capitis tensae sunt, et nisi cito occurratur, unius earum ruptio imminet, quo facto maniaca fiam, sine spe mentis nunquam recuperandae. Quid tunc commodi habebit vita miserae mihi, nam victura sum, sed maniaca. Sic sub somnio noctis elapsae aliquis retulit mihi. *I.* Quisnam? *R.* Spiritus quidam. *I.* Quid dixit? *R.* Dixit: „quid facis? Credisne te posse hoc in statu diu versari? Minime, sed implora promptum auxilium: alioquin stulta fies.“ *I.* Quid ad impediendum tantum malum requiritur? *R.* Applicandae mihi sunt tres hirudines ex utroque verticis latere. *I.* Quando id? *R.* Crastina die hora decima matutina. *I.* Quamdiu sanguis dein effluat necesse est? *R.* Si largo flumine fluit, per horam tantum: alias per duas horas. *I.* Non debilitaberis inde? *R.* Minime. *I.* Incisio cruris eritne hac ipsa die facienda? *R.* Nequaquam: nam licet non debilitabor multum ab hirudinibus, tamen semper aliquid: unde melius erit incisionem ad sequentem diem remittere. *I.* Facta incisione quid tunc postea? *R.* Effluente materia tumor imminuetur, et tunc unguento locus erit. *I.* Quis hoc unguentum praescribere debeat, an *Spjadi*, *Nizkowski* an *Frank*? *R.* Idem est, utervis, dummodo salutare sit. *I.* Nonne liceret materiam illam per urinam evacuare? *R.* Jam id tentare voluerunt (revera diuretica ab initio morbi me suadente adhibita fuere), at incassum:

nam

nam materia fixa est et tenax. *I.* An recordaris, dum cantas? *R.* Recordor, cantus me sublevat: status, in quo enim, nimis violentus est, — diu non durabit sine confusione idearum (Revera toto capite sudabat). *I.* An toto cerebro, an tantum parte ejus cogitas? *R.* Toto vero, at multum defatigor. *I.* An te excitara debar? *R.* Utique bonum erit, tristes quodammodo meas discutere ideas. *I.* An expectata non amplius in praesentem statum incidet? *R.* Si quis mecum loquetur, minime incidam. — Per afflatum tunc aegram illico excitavi. Primus motus fuit sudorem strophiliolo abstergere. Interrogationes ad vigilem. *I.* Dormivisti? *R.* Ita, sed somno gravi. *I.* Somniasti? *R.* Non recordor. *I.* Somniastine nocte elapsa? *R.* Sic videtur, sed etiam oblita sum. *I.* Cur es tam tristis? *R.* Multum patior. Hodie mane pro prima vice magnam vertiginem perpessa sum. Materies plane fluere cessavit. Tum da hirudinibus applicandis, de crurum incisione facienda locutus sum, ac aegra curiose quaesivit, quantus earum numerus esse debeat, et cuinam loco sint applicandae. Aegrae animum spe proximae sanationis recreare conatus sum, ac reipsa miseram magis serenam dereliqui.

Die 23. Maii. Vix aegra hesternae die sola fuerat, cum, praevia vertigine, in delirium incidit, sub quo marito et adstantibus vim inferre conabatur. Dein turbatior facta, in statu somnationis omnino spontaneae, repetitis vicibus dixit: „nisi mihi illico, et ante solis occasum hirudines applicabuntur, in aeternum perdita ero.“ — Post meditationem: „monui quidem hirudines crastina die hora decima applicandas esse, at erravi, — nunc enim percipio, ante solis adhuc occasum adhibendas esse.“ Hirudinibus adportatis et ad verticem positis, aegra semper quaerebat, utrum sol adhuc super horizontem sit. Cum id affirmaretur, gratulabatur sibi et quietior evasit. Hirudines per horae curriculum sat multum sanguinis detraxerunt. Nox non fuit optima. Mane tamen serena erat, asserens, caput nunquam

nunquam ita liberum fuisse, quam hodierna die. Hora quinta pomeridiana aegram invisens, eam omnino, si unquam, serenam, mentisque plane compotem inveni, idemque invenerunt *Sniadecki*, *Nizkowski*, *Barankiewicz* et *Baerkmann*. Oculi et pulsus praecipue in melius mutati erant. Crurum tumor, tensio et dolor sub tactu multum imminuta fuere. Aegra ab hirudinibus nequaquam debilitata in usu corticis pergebat.

A die 24. ad 30. *Maii* nullus paroxysmus: facies et omnia in melius mutata, praeter pulsum ad 130. Plurimae incisiones ad crura factae erant, unde serum copiosum manabat. Die 31. *Maii* praevia lipothymia, paroxysmus catalepticos simplicia ad horam dimidiam protractus ingruit sponteque evannit. Ab ea die usque ad 12. Junii res quotidie in melius procedebat. Fonticuli cruribus admoventur. Effluit inde serum multum, quin tamen crura multum detumeant. Interea vires crescunt, aegra obesior evadit, ac de aorte sua gratulatur. Die decima quarta Augusti praeviis febre et vomitu erysipelas crurum apparuit, sensim sensimque usque ad pedes migrans, ac tumoris maximam partem dispellens, aequabantur catamenia, quibus rite absolutis aegra, excepto rigore genuum, gressum impediens in integrum convaluit, ac hodiedum adhuc (die 30. *Maii* 1817) laeta floret. Dein gravida evasit, ac abortum perpessa est. Sanissimam eam anno 1823 dereliqui.

CAPUT XV.

Notiones praeparatoriae ad tractatum de vesaniis.

§. LXIII.

De argumento generatim.

Propositum.

1. **D**octrinae morborum systematis nervosi obscurissimam partem, *vesanias* videlicet, aggressuri, descriptioni morborum huc spectantium, *hallucinationum* videlicet et *maniarum*, *notiones* nonnullas *praeparatorias* praemittere, utile censemus. Notiones istas lucem quandam et super capitum praecedentium obscurissimam partem (quippe quae somniorum, incubi, somnambulismi, somniationis, ecstaseos et catalepseos causas proximas respicit) sparsuras esse, speramus. Est igitur caput hoc *episodion*, quod tum *complementum* partis doctrinae jam traditae, tum *introductionem* ad partem adhuc tradendam exhibet, in quo *breve examen physiologico-pathologicum actionis sensuum et facultatum animi sine fuco* exponitur.

Monitum.

2. Argumentum tam grave, atque *psychologiae* et *philosophiae morali* necessario alligatum, ad trutinam breviter revocaturi, a speculationibus metaphysicis, quoadusque fieri potest, abstinemus, experientiam, duce sensu communi, unice consectantes.

3. Sen-

3. *Sensus recipiendis impressionibus destinantur.* Praeter sensus quinque externos, unus internus, *universalis* admittendus est ¹⁾. Receptae a sensibus impressiones *per nervos proprios* cerebro communicantur. *Cerebrum* facultate allatas impressiones recipiendi pollet. Dum cerebrum hac facultate utitur, *attentionem* exercet. Adhibita attentione fit, ut impressiones, sensuum et nervorum ope receptae, in cerebro *imagines*, objectis, quae super sensus egerunt, respondentes excitent, vel aliis verbis, ut cerebrum imagines receptas sibi ipsi repraesentet. Imagines istae *ideae*, aliquando *notiones*, vocantur. Ex ideis, tum a sensibus externis, tum a sensu interno universali ortis, *conscii* sumus, id est, situm nostrum relate ad res externas et conditionem nostram cognoscimus. In cerebro praeterea facultates resident: 1. ideas receptas et absente objecto, quod eas excitavit, revocandi (*memoria*); 2. ex ideis receptis novas ideas generandi (*imaginatio*) et 3. ideas separandi, jungendi, comparandi, earumque differentias eruendi determinandique (*ratiocinium* et illius effectus *judicium*). Quae singulae facultates, simul sumptae, nomine *intellectus*, sive *ingenii* salutantur. Exercitium eorum novis impressionibus ansam praebet. Singulae autem impressiones, sive a sensibus, sive a facultatibus intellectualium exercitio profectae, *modo* vel *grato*, vel *ingrato* corpus

1) Cap. I. §. III. 22 (47).

corpus afficiunt. Oritur inde aut *voluptas*, aut *molestia*. Illa *appetitus*, haec *aversationes* generat. *Appetitus* et *aversationes*, expletæ aut non expletæ, *affectus* excitant, gratos aut ingratos. *Affectus grati delectationem*, *affectus ingrati fastidium* producant. Ex affectibus istis, concurrentibus attentione et imaginatione, *animi pathemata* evolvuntur. Dividi ea solent in *excitantia*, *deprimentia* et *mixta*. *Animi pathemata* et iudicium vim excitare valent, qua imperante plurimæ corporis humani partes ad motum impelluntur: dicitur ea vis, *voluntas*. Et aliae causæ, magis materiales, inscio fere intellectu varias partes ad motum excitant, quod *instinctui* tribuitur. De singulis speciatim.

§. LXIV.

De sensibus, de attentione et de perceptionibus.

Sensus.

1. Laesa sensuum functione, impressiones vel nullæ, vel nimix, vel contra normam recipiuntur. Cerebrum inde vel nullas perceptiones accipit, vel a perceptionum numero obruitur, vel perceptionum erronearum præda fit. Hæ, dum solum ab uno alterove sensu veniunt, *hallucinationem* quidem inducunt, at, ceteris sensibus sanis, facile pro falsis agnoscuntur, ac mente ceterum sana corriguntur. *Hallucinationes maniacorum* in sensu auditus longe frequentiores sunt, quam eæ visus. Cavendum autem est, ne phantasmata imagina-

ginationis, in sensibus sese exserentia, hallucinationi sensuum ipsorum adscribamus²⁾). Communissima hallucinatio, sensibus auditus, visus et tactus propria, ea est, qua res, quae diutius istos in sensus egerunt, etiamsi remotae, adhuc agere videntur. Quodsi vero omnes sensus laedantur, tunc cerebrum undique perceptionibus erroneis obruitur, ac cum instrumenta, quorum ope eae corri-

- 2) *Miror* cl. Esquimaux (*Gazette de santé*. Nov. 1844), ex una auditus hallucinatione visum aegroti cujusdam ad suicidium repetiisse. Fertur enim aegrum hunc continuo voces audivisse, cum ad vitae suae destructionem invitantes. Quis autem non videt, hic imaginationem praecipue laesam fuisse, et forte *pabulum* in sensus auditus laesione invenisse? Tale exemplum et mea suggerit experientia. Anno 1845. in clinico Vilnensi vir decumbebat, mania phantastica laborans. Exhibebat ipse hinc inde intervalla sat lucida, sub quorum curriculo *aurium susurrum valde molestum* incusare erat solitus. Quo primum autem pejus se habere et delirare ineipiebat, illico se angelorum voces campanarumque pulsationes audire asseribat. Nonne hic imaginatio laesa in morbosa sensus affectione alimentum invenit, huiusque typum suum impressit? Ita sane: nam cum auribus aliquot olei hyoscyami guttas infundi curassem, de vocibus et sonis illis amplius non querebatur. Contra vero, cum paulo post ventriculus magnis tartari emetici dosibus, ut vomendi conatus testabantur, vehementer irritaretur, aeger asseruit, se angelum in stomacho habere, suadentem, ne medicamenta, venenum scilicet continentia, sumeret. Remoto tartaro emetico, exhibitisque remediis mucilaginoso, aeger iterum siluit.

corrigantur, alienata sint, perceptiones falsae pro realibus habentur. Nam si dederis etiam, quod perversis sensibus omnibus iudicium, memoria et imaginatio illaesa manere possint, materiae, quibus hae animi facultates utuntur, nimis corruptae forent, ut quid boni ex iis fabricari liceret. *Causa* sensus, citra vitia structurae manifesta, laedens, quaeri solet in *sensibilitate morbosa* nervorum iis dicatorum, vel ubi in ipsis sensuum instrumentis expanduntur, vel ubi communicationem inter haec et cerebrum sustinent. Ac re quidem vera de plurimis phaenomenis optime sic ratio redditur. Eritne enim sensibilitas partium indicatarum *aucta*? ecce aeger, qui lucem, colorem album, rubrum, sonos fortes, rumorem, odores aromaticos, cibos conditos, temperaturam calidam, vestes graves, verbo impressiones vehementes respuit, ac contra obscuritatem, colores fuscios, silentium, res foetidas, alimenta insipida, gelu, nuditatem quaerit. Eritne sensibilitas organorum sensus nervorumque *imminuta*? Ecce aeger radiis solaribus, rumore, clamore, errhinis, cibis irritantibus, igne delectatus, et opposita cane et angue magis effugiens. Tandem eritne sensibilitas organorum illorum *perversa*? En res, quae sanis intolerabiles sunt, aegro gratae evadunt. Nil hinc mirum, si ille summa cum voluptate torqueri homines et bruta adspiciat, vagitus et ejulatus eorum dulcissimae harmoniae anteponat, faeces naribus admoveat, propriumque corpus dilaceret mutiletque. Nec satis!

Saepe

Saepe accidit, ut aucta sensibilitate unius sensus reliqui vitio opposito peccent et vice versa. Quanta inde impressionum diversitas, oppositio, confusio oriri debeat, sponte intelligitur. Cum vero de vitiis sensuum in specie, loqui haud liceat, quin de morbis prius agatur, a quibus organa unicuique sensui dicata affici solent, consultum credidimus, de perceptionibus morbosis quatenus a specialibus sensibus profisciscuntur, ibi sermonem instituisse, ubi de morbis oculorum, aurium, cavitatum nasalium et oris quaestio erit. ³⁾ Vitiis enim tactus doctrina jam tradita est, illaque laesionis sensus interni universalis in capite de hypochondriasi exponetur.

2. Impressiones super sensus factae, aut ob- ^{Attentio.}jecta a memoria vel imaginatione suggesta, non percipiuntur, nisi prius *attentio* in ea figatur. *Attentio* majori in gradu in plurima objecta simul figi vix potest, unde dictum: „pluribus intentus minor est ad singula sensus.“ *Attentio*, quae super objecta a sensibus oblata exercetur, *observatio* dicitur; quae vero in res a memoria vel imaginatione exhibitas dirigitur, *meditationis* nomen obtinet. Facile hinc intelligitur, cur aeger in *ecstasi* et *catalepsi*, attentus in res ab imaginatione suggestas, impressiones externas non percipiat. *Ecstasis* hoc sub respectu cum *catalepsi* conveniens, differt ab illa quoad *voluntatem*, quippe quae in ^{ecstasi}

3) Edit. secundae P. I. Vol. III. sect. II. cap. XXIV.

Frank Prax. II. I. 1.

ecstasy varias partes ad motum excitat, in catalepsi autem plane suspenditur. Accedit ad dictos morbos phaenomenon, *distractio animi* 4) dictum, de quo tot exstant singulares narrationes 5). Talis enim in vitio attentio objecto cuidam ab imaginatione, memoria aut iudicio suggesto, omnino incumbit, ita, ut impressiones externae vix ac ne vix quidem percipiuntur, unde voluntas (saepè et solus instinctus), actiones inducit, quae rerum hominem circumdantium positioni minime quadrant. In morbis soporosis, ut *apoplexia* et *cataphora*, pro re nata, cerebrum vel nullas accipit perceptiones, vel attentionem figere nequit. Praeterea quovis in homine, sive sano sive aegrotò, attentio peculiare habet *affinitates*. Quae nisi apprimè eruantur, quibus muneribus exercendis homo magis sit idoneus, haud determinabitur. Postremo *attentio et propriis vitiis subijcitur*. Spectant huc: impotentia illam in unum objectum figendi, — facilitas, qua fixa a levissima causa divertitur, — et ejusdem absorptio ab uno objecto, cum reliquorum detrimento. Ad causas attentionem labefactantes revocari praecipue solent: debilitas, quae vel ex neglecto hujusmodi facult-

4) GALL. *Distraction*. GRAM. *Zerstreuung*.

5) *Lettres de M^{de}. DE SÉVIGNÉ* 1. Vol. *lett.* 28. p. 199. *lett.* 100. p. 239. ubi de duce Brancas mentio fit. Cfr. LA BRUYÈRE *satir.* *le portrait du distrait* (*oeuvres*) et REGNARD: *le distrait*, comédie en vers (*oeuvres* T. 2).

facultatis exercitio, vel ex illius abusu nimiaque exercitatione, vel ex morbis praegressis oritur. Negligitur exercitium attentionis a divitibus, qui nunquam, quid inopia (maximus attentionis stimulus) sit, noverunt, item a prava educatione, quâ infantes ad debitam attentionem praestandam non adiguntur, nec non a mala consuetudine, attentionem nulli determinato objecto exclusive applicandi. Juvenum attentionem nimis intendunt parentes et institutores, qui illos praeter modum ad studia cogunt, vel diu nimis in uno eodemque objecto detinent ⁶⁾, vel eos ad objecta, cum quibus attentio nullam affinitatem habet, adstringunt. Ad morbos, attentioni infensos, pertinent: febres, cephalalgia, encephalitis, apoplexia, haemorrhagiae, diarrhoeae diuturnae, repletio ventriculi nimia ⁷⁾, hysteria et *hypochondriasis*, quo in morbo,

N n 2 ut

6) In doctrinarum universitatibus, ubi professoribus in genere praescriptum est, cujusvis hebdomadae spatium per sex horas legere, plurimi id commodi inveniunt, non quotidie per unius horae curriculum, sed quater solum de hebdomade per horam unam cum dimidia, docere. Defatigatur sic attentio auditorum, quae vix ultra horam uni eidemque objecto applicari potest, quia dicam de difficultate, quae hiemali praesertim tempore, ubi dies tam breves sunt, in dispositione lectionum ad horam unam cum dimidia protraharum, oritur, aut de ea, quae perceptionem sui horologiorum, dimidium horas indicantium, respicit.

7) Vel citra morbum, repletio ventriculi impotentiam attentionis secum trahit. Pessimum hinc est, quod in

ut palam fiet, attentio plane ad proprii corporis conditionem dirigitur.

Perceptio-
nes.

3. *Facultas*, quâ impressiones super sensus factas, cerebro communicatas, deducta in auxilium attentione, *percipimus*, nobisque inde *imagines praesentamus*, basin reliquarum animi facultatum sistit. Enimvero sine ideis nec memoria, nec imaginatio, nec iudicium exstant. Tali in casu hinc, homo brutis inferior est, et solo instinctu, eoque saepe laeso, regitur. Praeterea, perverso perceptionis et formationis idearum opere, sensibus licet optime valentibus, *hallucinationibus et maniiis* via patula est. *Hallucinamur*, quoties ideas, objectis haud respondentes, concipimus. *Mania* corripimur, quoties ideas erroneas pro realitatibus agnoscimus, et secundum tales ideas agimus. Impediunt perceptiones et formationem idearum (praeter vitia sensuum, nervorum, qui inter sensus et cerebrum communicationem sustinent et defectum attentionis) 1. objectorum rapida nimis succes-

scholis et universitatibus, ubi aliquando plus commodis professorum, quam utilitati studiosae juventutis prospicitur, horae pro praelectionibus saepe ita disponuntur, ut discipuli vix terminato pastu scholam adire debeant, eo fine, ut magister tempus prandii sumendi post lectionem inveniat. Nil progressibus in studiis et sanitati commilitonum magis infensum! Lex igitur academica requiritur, cujus ope temporis spatium a meridie ad horam secundam pomeridianam liberum relinquatur.

successio (e. c. in *vertigine*), 2. objectorum fortis admodum impressio (e. c. per animi pathemata), 3. res affluxum sanguinis ad encephalum promoven- tes (e. c. liquores fermentati, febres), 4. vene- na sensibilitatem cerebri obtundentia et 5. vitia cranii, meningum, cerebri, a prava structura, a violentiis externis, a processu inflammatorio orta.

§. LXV.

*De memoria, de imaginatione et de
judicio.*

1. *Memoria* respicit verba, res, et loca. *Memoria.*

Obedit aut nutu voluntatis, vel sponte nobis etiam nolentibus excitatur. Utroque in casu memoria ad associationi idearum originem debet. Junguntur autem ideae inter se, vel cum animi pathematibus, vel cum impressionibus externis, etiamsi vix aut ne vix quidem perceptibilibus ¹⁾, vel cum motibus corporis. Ad causas, quae ideas inter se jungere solent, spectant actio simultanea objecto- rum in plures sensus ²⁾, relationes, quae inter causas et effectus animadvertuntur ³⁾, rerumque
tum

1) Sic hominis absentis cujusdam idea se aliquando sponte memoriae exhibet, cum homo paulo post ipse compareat. Verisimiliter hic effluvia illius insoe agentis, respondentem individuo ideam clam excitarunt.

2) E. g. adspicio Romae imaginem pictam, quam Parisiis olim videram. En illico et locus, ubi imago ista Parisiis affixa erat, et homines, in quorum societate eam videram etc., memoriae sese exhibent meae.

3) Sic punctorium ideam doloris excitat.

tum similitudines et dissimilitudines ⁴⁾. Facultas, qua anima pollet, ideas socias inter se separandi, ac novas adassociationes ad libitum creandi, *abstractio* dicitur, doctrinarum fundamentum. Quo pacto memoria generetur, utrum per impressiones in cerebri substantia relictas, credentibus Locke, Hook et Haller ⁵⁾, an modo minus materiali, ut suspicamur, ignoramus Memoriae jacturae integrum dicabitur caput ⁶⁾.

Imaginatio.

2. *Imaginatio* vel *voluntaria* vel *involuntaria* est. Utraque effectum facultatis animi, sibi imagines receptas varia sub forma repraesentandi, sistit. *Imaginatio voluntaria*, apud poëtas, litteratos etc. maxime obvia, summam exercitii variarum animi facultatum sistit. *Imaginatio involuntaria* progenies est animi pathematum, caloris febrilis aliorumque morborum. Quoties impressio, quae ab ideis per imaginationem suggestis oritur, impressionem, quae a rebus in sensus agentibus proficiascitur, vi superat, toties imaginationis phantasmata pro realibus habentur. Acquirunt autem
ideae

4) Ad *Croesus* vix cogitatur, quin *Irus* in mentem veniat. Manisci inprimis adassociationibus ex dissimilitudinibus ortis indulgent.

5) „Eas mutationes in sensorio conservatas *ideas* multi, nos *vestigia rerum* vocabimus, quae non in mente sed in ipso corpore, et in medulla quidem cerebri ineffabili modo incredibiliter *minutis notis* et copia infinita inscriptae sunt.“

6) Cap. XVIII. de amnesia.

ideae ab imaginatione suggestae vim, quae impressionem a rebus externis proveniente[m] excedit, si ideae illae crebro repetantur, si ab animi pathematibus foveantur, si sensus parum exerceantur, sique objecta, ad eos excitandos idonea, desint. En cur mendaces fictionibus suis tandem ipsi fidem adhibent; — ac homines imaginationem continuo exercentes, quam maxime ad manias dispositi sunt, — en cur animi pathemata viam ad manias sternunt, quin immo majori in gradu maniam quandoque constituunt; — en cur obscuritas et solitudo plurimis deliriorum speciebus favent. Verum imaginationis exaltatio eo minus timenda erit, quo magis illi *judicium* aequilibrium tenet. Tali enim ex aequilibrio, ambabus facultatibus ceterum excellentibus, *ingenium* oritur.

3. *Judicium* exercetur: 1. comparando inter se perceptiones ab objectis externis excitatas, e. c. si quis numerum, magnitudinem, pondus etc. objectorum praesentium determinet; 2. comparando perceptiones, quae ab objectis externis praesentibus veniunt, cum ideis et opinionibus, quae jam pridem acquisitae erant, e. c. si quis *judicium* de aedificio, ante oculos versante, relate ad alia aedificia quondam visa ferat; 3. comparando inter se ideas et opiniones jam dudum acceptas et stabilitas, e. c. in quaestionibus metaphysicis et philosophiae moralis et 4. comparationes variis his modis inter se perficiendo, e. c. ut medicus facit, qui praesentem aegri statum cum observationibus, de aliis

aliis aegrotis, simili morbo adfectis, jam dudum collectis comparat, ac inde non solum de natura morbi, quem pertractat, sed etiam de illius probabili exitu, judicat. *Judicium enim futuri*, quod si enuncietur, *praedictionem* constituit, plane experientiae praeteritorum innititur, ac verum sapientiae sistit characterem. Excipi forte possent praedictiones, quae existentiam nostram respiciunt (*praesagia animi* ⁷⁾ sic dicta), quippe quae effectus esse videntur perceptionum insolitarum atque obscurarum, ex laesa viscerum functionibus vitalibus dicatorum (cerebri, cordis, pulmonum), vel nervorum (inprimis plexus coeliaci) actione, proficiscentium. Quaecumque autem sit judicium, quod de rebus sive praeteritis, sive praesentibus sive futuris fertur, semper ex *perceptione similitudinum et dissimilitudinum* duarum aut plurimarum notionum, emerget. Facultas tamen similitudinem aut dissimilitudinem percipiendi, quatenus notiones generales et abstractas respicit, *ratio* dicitur. Constituit ea pretiosissimum ac incomparabilem generis humani thesaurum ⁸⁾. Ratio enim est,

qua

7) GALL. *Présentiment*. GERM. *Ahnungen*. — Exempla hominum, morbos et mortem proximam accurate praedicentium, copiosa nimia collegi, ut animi hujusmodi praesagis, ab imaginationis effectibus probe distinguendis, fidem recusarem.

8) Brutorum judicia ad res externas et objecta specialia circumscripta sunt, nullum autem eorum exstat, quod conclusiones logicas, aut notiones abstractas concipere possit.

qua res cognoscimus, ratio, qua intelligimus, omnia capimus; ratio, qua aeternae beatitudinis cupiditatem insatiabilemque scientiarum appetitum persentiamus; ratio denique est, qua infinitis bonis fruimur. Illius usu amisso homo desinit homo esse. Usu dicimus *amisso*, nam rationem ipsam aegrotare posse negamus. Vis quidem iudicandi in homine sana mente praedito et in maniaco diversa videtur, at re ipsa eadem plane est. Differunt enim iudicia solum ob id, quod perceptiones maniaci, utpote cerebro et nervis laesis praediti, a perceptionibus sani hominis discrepant, qua de causa uterque diversas conclusiones facere cogitur. Illustrabuntur haec omnia magis magisque in capitibus de *delirio*, *ebrietate*, *paraphrosyne* a *venenis* et *manis*.

§. LXVI.

De fontibus voluptatis et molestiae, appetitus et aversionis, nec non de affectibus.

1. Conservatio individui sui, propagatio suae speciei et cura sobolis, quibus generis humani innititur existentia, aliter obtineri haud potuissent, nisi homo ad res, quae naturae scopo respondent, sibi procurandas et adversas fugiendas, per voluptatis et molestiae sensum impelleretur. Excitant autem *voluptatem* impressio alimentorum in organa gustus, respiratio atmosphaerae purae, actio temperaturae modicae, exoneratio materialium ex-

Fontes
volupt. et
molest.

cernen-

cernendarum, corporis motus, quies post defatigationem, levamen dolorum etc. Procreant *molestiam*, fames et sitis, impedimenta respirationis, temperatura frigida, calidissima, retentio materiarum excernendarum, inertia, defatigatio, laesiones externae etc.

Fontes appetit. et aversat.

2. Voluptas *appetitum* et molestia *aversationem* generat. In appetitu quid grati, in aversatione quid ingrati praevidemus. Afficimur inde opposito plane modo.

Affectus.

3. *Affectus* igitur est sensus sive gratus, sive ingratus, qui expletionem appetituum et aversationum comitatur. Affectus ab appetitibus et aversationibus eo differunt, quod *appetitus* et *aversationes* solum in ea corporis parte, unde originem ducunt, percipiuntur, e. c. fames et anorexia in ventriculo: *affectus* autem in universo corpore et praecipue in cordis regione persentiuntur. Est enim *cor* veluti praecipua affectuum sedes; unde vulgus non immerito de *gaudio* et *moerore* cor afficientibus, vel de *indole cordis bona* et *mala* loquitur. Affectus eo vividiores sunt, quo major occurrit systematis nervosi aentiendi facultas. In genere ex systematis nervosi et sensuum conditionibus abnormibus, fontes morborum voluptatis et molestiae, appetitus et aversationis, nec non affectuum conjectura saltem attingi possunt. De *appetitibus et aversationibus morborum*, quas SAUVAGESIUS nomine *Morositatum* comprehendit 1),

dit'), iis in locis, ubi de morbis viscerum, ex quibus proficiuntur, quaestio fiet, mentionem passim injiciemus.

§. LXVII.

De animi pathematibus et de voluntate.

1. Affectus vehementes attentionem omnino absorbent, ac ab objectis, quae cum affectu nullum agnoscunt nexum, declinant. Frangitur inde iudicium, utpote quod sine analysi aequali idearum et attentione jussu ejus subdita, rite existere nequit. Quo magis autem iudicium frangitur, eo magis imaginatio caput attollit. Obruitor inde animus cohorte imaginum cum affectu cohaerentium. Status talis violentus sensorii communis *animi pathema* dicitur. Universum inde in consensum trahitur corpus. Definimus igitur animi pathema per eam conditionem, in qua affectus attentionem, cum detrimento iudicii et exaltatione imaginationis absorbet, universo simul in consensum tracto corpore. Animi pathemata generatim in temperaturam corporis, nervos, arterias et venas maxime imperium exercent. Praeterea quodvis eorum peculiar-

Animi
pathema-
ta.

- 1) Nosol. method. T. IV. p. 309. Ordo secundus. "Morosus est ille, qui sine ratione quodpiam constanter appetit, quod ipsi bonum reale non est, aut aversatur, quod malum apparens est tantummodo, licet realiter bonum sit." Ad morositates tantum revocarem: *picam* (*appétit dépravé*), *bulimiam* (*faim canine*), *polydipsiam* (*soif excessive*), *satyriasin*, *nymphomantiam* et *anipathiam*; — limites latiores concedit SAUVAAGES.

culiarem cum quibusdam visceribus agnoscit⁴ affinitatem. Sic apciatim afficiunt *timor* tubum intestinalem et renes, — *moeror* ventriculum et glandulas lacrymales, — *ira* hepar et cystidem felleam, — *amor* partes genitales, — *terror* musculos imperio voluntatis subditos. Ut morbos speciales sufficiat considerare *moerorem profundum*, *iram effrenam*, et *amorem insanum*.

Animad-
versio,

2. Ab animi pathematibus non satis separari solent *conditiones nonnullae morales*, quae sensum voluptatis aut molestiae *superioris ordinis* excitant. Fit inde, ut animi pathematibus excitantibus et voluptatibus spiritualibus adscribantur: gaudium, ex rebus aut actionibus praegressis ortum (*animi securitas*, seu *animus suis rebus contentus*), gaudium anticipatum (*spes*), voluptas veniens ex desiderio pro bono hominis, a quo beneficia accepimus, quid operandi (*gratus animus*, *beneficiorum memor*), amoenus sensus, quem ex eo percipimus, dum aliis succurrere prompti sumus (*commiseratio*) et jucunda perceptio, qua afficimur qualitates eminentes hominis cujusdam considerando (*aestimatio*, *admiratio*, *amor platonicus*). *Animi pathematibus deprimentibus* et *molestiis spiritualibus* adnumerantur *moeror* ex actionibus nostris veniens (*pudor*, *poenitentia*, *morsus conscientiae*), *moeror anticipatus* (*sollicitudo*, *anxia expectatio*), sensus ingratus ab aliorum pravis qualitatibus ortus (*contemptus*, *odium*), molestia ab injuriarum perceptione (*ira*), aut ex aliorum felicitate veni-

veniens (*invidia, zelotypia*). *Animi pathematibus mixtis* conatus injurias vindicandi (*ultio*) adjungitur.

3. *Animi pathemata*, res, quae voluptatis aut Voluntas molestiae perceptionem excitant, nonnullaque judicia et conclusiones, quae ex idearum comparatione emergunt, eam animi facultatem excitare solent, quae *voluntas* dicitur, cujusque nutu plurimae corporis partes (organa voluntatis imperio subdita) ad motum impelluntur. Patet hinc, re ipsa motum voluntarium ab appetitu et aversatione determinari. Ast hoc non est tam materialiter intelligendum. Ratio enim ita voluntatis imperium firmare potest, ut partes tali imperio subditae neque voluptatis neque doloris imperio obediunt. Qua de re animi constantia, qua homines casti veneri illicitae resistunt, aut martyres cruciatus, aegri imbelles operationes chirurgicas, et delinquentes quaestionem sustinere valent, testatur. Falsum igitur est, homines mente sana, eaque praeceptis religionis et officiorum, ut decet, munita sistere automata, attractioni voluptatis, repulsuique molestiae obtemperantia, quae nefanda opinio, suffragio potissimum medicorum suffulta, quatenus ad negandam *actionum libertatem* ducit, mala peste longe graviora societati intulit. Interea liberum voluntatis exercitium in *consuetudinis legibus* hostem dirissimum agnoscit. Quoties enim ob educationis defectum, aut alias causas necdum satis intellectas malae contrahuntur consuetudines, fieri

ferri potest, ut motus voluntarii mechanice legi adassociationis prius obtemperent, quam *deliberatio*, voluntatis rationalis fons, locum habere queat. Qui enim motus in prima infantia solo voluntatis nisu (c. c. actione musculorum singulorum in litteris alphabeti pronunciandis), producuntur; hi serius, in aëre fere animo, per adassociationis leges, peraguntur. In genere ideae, quae actiones corporis excitant, earum plurimas uno eodemque tempore producere queunt. Non ita ideae, quae solum animi facultates occupant. Nemo enim aibi duas ideas, vel a memoria, vel ab imaginatione, vel a iudicio excitate simul praesentare potest. Quin immo, si duae ideae voluntatem impellant, haec vero ad actionem producendam iisdem nervis uti coacta sit, altera impedit alteram ac *haesitatio* oritur. Vitium istud plerumque dubitationi adscribendum est. Dubitatio autem timiditatis est effectus. Praeterea voluntatis impulsus morbi organorum imperio illius subditorum saepe eludunt, teste *paralyti*, *incubo*. In *catalepsi* voluntatis impulsus deficit. Omni in casu impulsus externi facilius actiones producunt, quam illi, qui solum in animo renovantur ¹⁾.

CAPUT

1) Inde dictum: *Les absens ont tort.*

CAPUT XVI.

D e v e r t i g i n e .

§. LXVIII.

Definitio. Literatura.

1. **P**erceptio erronea, transitoria, quâ ob- Definitio.
jecta, licet quiescentia, e loco et praesertim in
gyros moveri videntur, cum metu lapsus aut lapsu
ipso, saepeque tinnitu aurium et visus obfuscatione,
vertigo ¹⁾ dicitur.

2. De vertigine scripserunt: GALENUS ²⁾, Literatu-
ra.

ARE-

1) Illius SWEDIAUR. Alii voce metaphorica hunc
morbum *Dinos* (gr. *Δῖνος*) appellant, id est, saltus
in gyrum; inde etiam *Σκοτιδῖνος*, vertigo tenebricosa
aut *Scotoma* (gr. *Σκότμα* a *Σκότος* tenebrae, caligo).
Alii etiam *Hypochyma* (*Τρόχυμα*), seu suffusionem,
aut obscuracionem cornae transparentis, quae ad vi-
sus vitia pertinet, male huc referunt. *Vertigo*: latinis
(a vertendo). GERM. *Schwindel* (a *Schwinden*), *Tau-
mel*, *Wirbelsucht*. BELG. *Duizeling*, *Sutzeling*, *Be-
dwelmdheid*, *Draaying*, *Hoofddraaying*, *Hoofddayzeling*,
Wervelziekte. GALL. *Vertige*, *tournoyement de tête*.
ANGL. *Swimming of the head*, *giddiness*, *dizziness*,
swimming, *scotomy*, *turning of the brain*. ITAL.
Giramento di capo, *capogiro*, *giracapo*, *vertigine*.
HISP. *Valdo*. LUSIT. *Vagado*. POL. *Zawrót głowy*.
ROSS. Головокружение. DAN. *Orhed*, *Swimmel*,
Tumten, *Tummel*. SUEC. *Swindel*, *Hiernhvarf*.

2) De loc. affect. lib. III. c. 8. lib. IV. Rat. vict. in acut.

ARETAEUS³⁾, CAELIUS AURELIANUS⁴⁾, ORIBASIIUS⁵⁾, AVICENNA⁶⁾, EBN SINA⁷⁾, ZACUTUS LUSITANUS⁸⁾, THEOPHRASTUS⁹⁾, MERCURIALIS¹⁰⁾, FORESTUS¹¹⁾, PLATEBUS¹²⁾, WILLIS¹³⁾, ETTMÜLLER¹⁴⁾, HAMBERGER¹⁵⁾, LIBAVIUS¹⁶⁾, SCHEIBIUS¹⁷⁾, STEINMETZ¹⁸⁾, BAILLOU¹⁹⁾, SENNERT²⁰⁾, KEST²¹⁾, VAN DER MYE²²⁾, ROLFINK²³⁾, DIEMERBOECK²⁴⁾, FRIEDERICI²⁵⁾, MANGOLD²⁶⁾,
BAU-

8) Chronia. lib. I. c. 2. 9) Morb. chron. lib. I. c. 2.

5) Synopsis. lib. VIII. c. 5.

6) Canon. lib. II. fen I. tract. 5. c. 1.

7) Vid. cap. I. nostrum §. I. No. 2 (39).

8) Opera. T. II. p. 243. 9) Tractatus de vertigine.

10) Consil. I. No. 29. 89. 107. II. No. 76. 91. III. p. 1.

11) Lib. X. obs. 43—46.

12) Praxeos medicae T. I. p. 185.

13) Opp. T. II. p. 184. 14) Opp. omnia. p. 428.

15) Diss. de vertigine. Tub. 1589.

16) Diss. de vertigine. Jen. 1591.

17) Diss. quaestiones de vertigine etc. Lips. 1592.

18) Diss. de vertigine. Lips. 1592.

19) Diss. suntque vertigines magnor. morbor. prodromi.

Paris. 1597. Comment. in Libr. Theophrasti de vertigine. Opp. I. p. 291. Consil. III. No. 1. 24. 62. 101.

20) Diss. de vertigine. Viteb. 1610—1626.

21) Diss. de vertigine. Lips. 1621.

22) Historia medica de vertigine. App. ad Tr. de arthritide, Hagae 1624. 4.

23) Diss. de vertigine. Jen. 1633. 1644. 1665. Diss. de vertiginis diagnosi. Jen. 1659. Diss. de dolore capitis, vertigine et phrenitide. Jen. 1633. 1635. 1651. 1652.

24) Disput. de morbis capit. No. 10. Diss. de vertigine. Jen. 1652.

BAUHINUS ²⁷⁾, MURALTO ²⁸⁾, BÖTTICHER ²⁹⁾, WEDEL ³⁰⁾, KROKISIIUS ³¹⁾, BOERHAAVE ³²⁾, GORTER ³³⁾, EICHNER ³⁴⁾, NICOLAI ³⁵⁾, SAUVAGES ³⁶⁾, PLOUCQUET ³⁷⁾ et, detractis hypothesibus, perbelle MARCUS HERZ ³⁸⁾. Item CAPARLIER ³⁹⁾, PURKINJE ⁴⁰⁾, KIND ⁴¹⁾, KRAUSS ⁴²⁾, ZEPFENFELD ⁴³⁾ et BRACH ⁴⁴⁾.

§. LXIX.

- 25) Diss. de vertigine. Jen. 1669.
- 26) Diss. de vertigine, imprimis literatorum. Erf. 1673.
v. Opusc. med. phys.
- 27) Diss. de hemisrania in vertiginem transeunte. Bas. 1677.
- 28) De vertigine. Miscell. acad. nat. curios. dec. II. a. 8. 1689. p. 24.
- 29) De singulari vertigine, tam idiopathica, quam sympathica feliciter curata. Acta acad. nat. curios. Vol. VIII. p. 186.
- 30) Diss. aeger vertigine laborans. Jen. 1682. Diss. de vertigine. Jen. 1707. Diss. de vertigine. Jen. 1741.
- 31) Diss. de cephalalgia habituali cum vertigine. Regiom. 1703.
- 32) De morbis nervorum p. 480.
- 33) Opuscul. med. pract. Patav. 1751. cap. 3.
- 34) De vertiginis genesi. Hal. 1758.
- 35) Programmata de genesi vertiginis. Jen. 1759.
- 36) Nosol. method. T. III. P. I. p. 236.
- 37) Diss. de vertigine. Tub. 1783. DORRINE. l. c. p. 168.
- 38) Versuch üb. den Schwindel. Berl. 1791. Et quodammodo HUELAND's Journ. der pr. Heilk. 3. B. 3. St. p. 389.
- 39) Dissertation sur le vertige. Paris 1815.
- 40) Beiträge zur nähern Kenntniss des Schwindels aus Frank Prax. II. 1. 1.

§. LXIX.

*Symptomata. Necroscopia.*Sympto-
mata.

1. Vertiginis sub insultu, objecta, etiamsi quiescentia, celeriter vel in gyrum, vel deorsum, vel sursum, saepe sub alieno colore, viridi, coeruleo, variegato, aut adspectu duplicato, vel visu plane obfusato, vel oculis plane clausis ad tactum solummodo ¹⁾ moveri videntur. Aures saepe tintu, susurru afficiuntur. Nonnulli aegrorum nausea ipsoque vomitu laborant. Quandoque musculi impotentes sunt, aegri se sustinere posse dubitant, vacillant ideo ac lapsum timent, vel revera labuntur. Quo in casu plurimi mentis constantiam, pulsu simul silente, amittunt, ac tantumquam

heautognostischen Daten. Med. Jahrbücher des k. k. Oesterr. Staates. B. 6. St. 2. p. 79. Et: Ueber die physiologische Bedeutung des Schwindels und die Beziehung desselben zu den neuesten Versuchen über Hirnfunctionen. Rust Magaz. für die gesammte Heilk. B. 23. Heft 2. p. 284.

41) De vertiginis natura. Berol. 1823.

42) Diss. de cerebri laesi ad motum voluntarium relatione certaue vertiginis directione ex certis cerebri regionibus laesia pendente. Wratisl. 1824.

43) Diss. de vertigine. Berol. 1825.

44) *Bemerkungen über den Schwindel.* Rust l. c. B. 25. Heft 3. p. 494.

1) „Sic in leoto jacens vertiginosus lectum suum retrorsum, sinistrorsum, vel dextrorsum praecipue ruere vel inclinari imaginatur, ac ne cadat ipse, metuit.“ SAUVAGES l. c.

quam in lipothymia decumbunt. Alias symptomata apoplexiae, paralyseos aut epilepsiae ²⁾ in conspectum veniunt. Multi aegrorum vel extra paroxysmum somnolentia, moerore ³⁾, ineptitudine ad agendum et meditandum laborant. Rarissime vertigo continua est et aliquando dumtaxat nocturna ⁴⁾.

2. Cadavera vertiginosorum obtulerunt: se- ^{Necrosco-}
rum in cavitate cranii ⁵⁾, hydatides ⁶⁾ (verisimi- ^{pia-}
liter taeniam hydatigenam ⁷⁾), abscessus cerebri ⁸⁾,
vasa encephali angustata, ossificata ⁹⁾, venam ju-
gularem a massa veluti cretacea compressam; orta
inde congestionem in sinibus venosis durae ma-
tris ¹⁰⁾,

O o 2

- 2) R. LENTILIUS mira symptomata in vertigine epileptica. *Miscell. acad. nat. curios. dec. I. a. 6. 1687. p. 407.*
- 3) A. B. RANOE vertigo caduca cum tristitia alternans. *Act. R. soc. med. Hafn. Vol. 2. p. 159.*
- 4) G. CH. SCHELLHAMMER vertigo nocturna. *Miscell. acad. nat. cur. dec. II. a. 5. 1686. p. 29.* CHA. F. PAULLINI dysenteria animata cum vertigine nocturna. *Ibid. a. 7. 1688. append. p. 158.*
- 5) WEPFER obs. p. 251. BONET sepulchr. lib. I. sect. XI. obs. 1. 2. 4. BARE in *Act. R. soc. med. Hafn. Vol. I. p. 280.* MORGEN diss. exhib. observat. anatom. bigam cum epierisi. *Regiom. 1792.*
- 6) BONET l. c. obs. 9.
- 7) Cfr. BENADICT. VICT. FAVENTIN. *Tr. I. a. I. c. 4.* LESKE op. c. aliosque auctores in *esp. IV. §. XXI. No. 8. indicatos.*
- 8) BONET l. c. obs. 6. 7. 8. SOULTETUS obs. p. 78.
- 9) PLATER in libro de sensuum laesione.

tris ¹⁰⁾, vitia hepatis ¹¹⁾ et cystidis felleae ¹²⁾, nec non renum ¹³⁾).

§. LXX.

Caussae. Diagnosis.

Caussae.

1. Vertigini maxime obnoxii cernuntur, homines aetate proveci ¹⁾, monachi ²⁾, feminae, imprimis hystericae et coeci ³⁾. Excitatur a mutationibus repentinis atmosphaerae, constitutione austrina ⁴⁾, aëre montano ⁵⁾, frigore ⁶⁾, potissimum in calvis ⁷⁾, insolatione ⁸⁾, sudore suppresso ⁹⁾,

10) TONNELÉ in *FRONIER's Notizen aus dem Gebiete der Natur- und Heilk.* B. 24. No. 9. p. 141.

11) БОЖИДАНЪ de morbis nervor. p. 494.

12) Plures novi homines, diu vertigine vexatos, dein morbis hepatis et cystidis felleae demostuos.

13) МОРИУС epit. inst. med. p. 258. 1) HIPPOCRATES.

2) STOLL praefect. in diversa. morb. chron. No. 332.

3) G. W. WÄDEL de vertigine coecorum. *Miscell. acad. nat. curios.* dec. I. a. 6 et 7. 1675 et 1676. p. 159. J. L. HANNEMANN vertigo coecorum et alia de coecis. *Ibid.* dec. II. a. I. 1682. p. 172.

4) HIPPOCR. aphor. 17. sect. III.

5) HUMBOLDT über die gereizte Muskel- und Nervenfasern 2. B. p. 307.

6) RANOK op. c. Vol. IV. p. 261.

7) BLOCH *Bemerkungen* p. 105.

8) Utrum Luna, duce observatione ex Eph. nat. cur. dec. I. ann. 1. obs. 2. ad caussas vertiginis revocanda sit, non audeo determinare. Astra hic conspirare, FRIDERICUS adhuc docuit l. c. cap. 8. Placet sat ampla Vilnae est, arboribus circumdata, quam nunquam

so ⁹⁾, epistaxi, haemorrhoidibus et menstruis re-
tentis ¹⁰⁾, graviditate, haemorrhagiis, inprimis par-
turientium, venae sectionibus ¹¹⁾, eductione re-
pentina serî ope paracentheseos ¹²⁾, diarrhoea sup-
pressa ¹³⁾, purgatione violenta ¹⁴⁾, lactatione pro-
tracta ¹⁵⁾, onania ¹⁶⁾, coitu ¹⁷⁾, seminis retentio-
ne ¹⁸⁾, inedia ¹⁹⁾, somno protracto ²⁰⁾, erroribus
in diaeta ²¹⁾, mytilis ²²⁾, castaneis ²³⁾, petroselino
et

solus sine vertigine in medio transire potueram. Idem
scidit nonnullis aliis. An forte aquae vel metalla sub
terra latentia aliquando vertiginis causae?

9) W. B. NÆSEL sudoris sub utroque poplite suppressio
vertiginis at hydropis causa ejusque cura. Acta acad.
nat. curios. Vol. V. p. 398.

10) ARÆTAEUS et reliqui medici uno ore.

11) WEDEL l. c. p. 10. 12) HERZ op. c. p. 336.

13) BANG in Act. Reg. soc. med. Hafn. Vol. II. p. 47.

14) GALEN. 2. aph. 22. SIM. PAULI Quadripart. botan.
p. 455. J. M. HOFFMANN de vertigine a rhabarbaro.
Miscell. acad. nat. cur. dec. III. an. 2. 1694. p. 326.

15) STOLL l. c. 16) STOLL l. c. et quotidiana experientia.

17) GALEN. 2. aphor. 22. SINIBALDI genearthropis
(praesertim in feminis veneri non aduetsis).

18) BONET op. c. obs. 15. HERZ l. c.

19) HIPPOCRATES ait: „Si quis prandere consuetus, at-
que cui prandere conducit, non prandeat, protinus,
ubi tempus praeteriit, gravis impotentia exoritur, tre-
mor, tenebrosa vertigo.“ Quod etiam testantur ob-
servaciones apud PLATERUM lib. I. et MONTANUM
consil. 28. nec non mense in judaeis lithuanis, jejunia
strictè servantibus.

20) HIPPOCR. III. aph. 31.

21) HOFFMANNUS opp. III. p. 222. A BERGEN diss. de

et allio ²⁴), flatibus ²⁵), acidis ²⁶), aquis therma-
libus ²⁷), vermibus ²⁸), vino adulterato, sulphu-
rato, dulci ²⁹), cofea ³⁰), cerevisia valde lupu-
lata, fumo carbonum ³¹), vegetabilium, lithanthra-
cum, calcis ³²), nicotianae ³³), venenis narcoti-
cis ³⁴), imprimis lolio temulento ³⁵), ab imagina-
tione, studiis ³⁶), vigiliis ³⁷), galvanismo ³⁸), ele-
ctrici-

vertigine ex ventric. Fr. ad Viadr. 1719. RAYN diss.
mirum inter caput et viscera abdom. commerc. p. 65.
HEER op. c. p. 338.

22) TODD *med. chir. Journ.* 3. B. p. 322.

23) WEDEL l. c. p. 8.

24) SAVANAEOLA ac SAXON. apud FRIDERICI L. c.

25) *Commerc. liter.* Nor. 1774. p. 215. 26) WHYTT.

27) SEBIZIUS sect. II. diss. 15.

28) WEPFER obs. p. 230. DE LA CHEVASSE in *Journ.
de méd.* T. 26. p. 430.

29) GALEN. lib. simpl. med.

30) BÖTTICHER vertigo aatis vehemens a nimio potu
coffere aliisque in diacta commissis erroribus. *Act.
acad. nat. cur.* Vol. 6. p. 158.

31) MOELLER in *Nord. Archiv* 1. B. p. 509. Saepe ex
fumo carbonum vertigo Vilnae obvenit.

32) RAMAZZINI l. c. de morbis calcariorum.

33) WEDEL l. c. p. 8. BLOCH l. c. p. 106.

34) Ut opium, atropa belladonna (STRAUVE in HUF-
LAND's *Journ. der pr. Heilk.* 16. B. 3. St. p. 132. et
WERLE in *Beobacht. und Abhandl. aus dem Gebiete
der gesamt. pr. Heilk. Oesterr. Aerzte* B. 6. 1828).

35) M. B. VALENTINI de delirio et vertigine ex esu pul-
tis avenscae. *Miscell. acad. nat. cur. dec. III. a. 2.*
1694. p. 187. *Eph. nat. cur. dec. II, an. 8. obs.* 173.

36) Viri docti homines cum aliis morbis ob immodi-

ctricitate atmosphaerica³⁹⁾, animi pathematibus⁴⁰⁾, imprimis timore ex adspectu periculi⁴¹⁾, vel ab intuitu rerum, quae circumducuntur, ut nubium praetervolutiones, rotae, vortices aquarum; aut quae ingratae sunt, ut ranae⁴²⁾, a motu incon-
sueto et rapido⁴³⁾, navigatione⁴⁴⁾, contactu occipitis⁴⁵⁾, inclinatione vel reclinacione capitis, a longo decubitu in lecto, unde amittitur consuetudo caput in situ recto aequilibrandi, a sternutatione⁴⁶⁾, a violentiis externis e. c. a lapsu et percussione⁴⁷⁾, caussisque omnibus ex autopsia
cada-

cas et graves contentiones animi, tum vertigine potissimum tentari solent. *Elegia. Mem. de Turin Année 10 et 11. Litterat. et B. A. p. 282. PISO l. c. STOLL l. c.*

37) STOLL l. c.

38) RITTER in HUFELAND's *Journ. der pr. Heilk.* 17. B. 3. St. p. 34—52. Et mese observationes id confirmant.

39) Aliquoties vertiginem ex appropinquante tempestate cum tonitru observavi.

40) Ex ira HOFFMANN l. c. obs. 7. STOLL l. c. p. 338.

41) HANZ l. c. p. 367.

42) *Miscell. acad. nat. cur. dec. III. ann. 7 et 8 p. 103.*

43) FORNERUS lib. X. obs. 49. ENOEL spec. No. 2. de vertigine, nauses et vomitu eorum, qui curru vehuntur.

44) SKORN de vertigine post navigationem. *Miscell. acad. nat. cur. dec. I. ann. 3. 1672. p. 371.*

45) SCHENCK obs. lib. I. No. 94.

46) WEDEL l. c. Diss. 107. p. 10. Pluries vertiginem violentas sternutationes secutam esse, compertum habeo.

47) ARGIRETA lib. III. c. 12. AVICENNA lib. III. fen I. tract. 5. WEDEL l. c.

cadaverum elucetibus nec non recondito herpete ⁴⁸⁾, zostere ⁴⁹⁾, plica ⁵⁰⁾, morbisque praegressis. *Causa proxima* vertiginis quaesita erat: in spirituum animalium motu inordinato ⁵¹⁾, vel circulari ⁵²⁾, in agitatione membranarum ac vasorum cerebri ⁵³⁾, in vapore vel in cerebro generato vel ad illud transmissio ⁵⁴⁾, in mixtione spirituum sylvestrium cum spiritibus in cerebro habitantibus ⁵⁵⁾, in effervescentia ex conflictu humorum acidorum cum alcalinis ⁵⁶⁾, in humore bilioso aut in ventriculo aut alio in viscere ebulliente ac caput allidente ⁵⁷⁾, in sanguine nigram quandam fuliginem, ad obnubilandos spiritus efficacem, secum vehente ⁵⁸⁾, in spasmo fibrarum coronae ciliaris motu retrogrado cruoris in arteriis retinae, motuque bulbi oculi inconscia anima ⁵⁹⁾, in rapida nimis successione impressionum in sensus et animam ⁶⁰⁾, in defectu

48) J. P. FRANK epitome de currendis hominum morbis. Vol. IV. p. 144.

49) GULDENBRAND de vertigine periodica per zonsam soluta. in Act. R. soc. med. Hafn. Vol. I. p. 142.

50) Plicae comes frequens vertigo est. 51) GALEN l. c. 52) ALEXAND. I. probl. 67. et CASSIUS II. probl. 62.

53) HIERON. MERCURIAL.

54) BALLON. comment. in Theophr. lib. de vertigine.

55) FRIDERICI l. c. cap. VI. sententias AVICENNAE, ORIBASII afferens.

56) FRIDERICI l. c. 57) PISO l. c.

58) PETRAEUS nosol. P. I. disp. 6. §. 17.

59) SAUVAGES l. c. p. 238. 60) HERZ op. c. pessim.

defectu virium corpus humanum perpendiculariter sustentantium, ex motibus inconsuetis orto ⁶¹⁾ etc.

2. Hypothesibus, quoadusque fieri potest, ^{Diagno-} neglectis, vertiginem cum SAUVAGESIO pro ^{sia.} *hallucinationis* specie habemus, quâ impressiones et perceptiones erroneae, lapsus metum producentes, ex ignota culpa tum sensus unius alteriusve externi, tum sensorii communis ortae, efficiuntur. Hallucinatur homo in vertigine, non delirat tamen, quia errorem suum statim corrigit ope iudicii et aliorum sensuum. Ad vertiginem accedunt, ab ea tamen distinguenda sunt vitia nonnulla *visus* et *auditus* ⁶²⁾. Ipsa autem vertigo vel morbi *symptoma* ⁶³⁾, vel *morbum per se* constituit. Ista vel ab aegritudinibus praegressis, imperfecte solutis, e. c. encephalitide, hydrocephalo, apoplexia relinquitur ⁶⁴⁾, aut effectus est nunc *violentiarum externarum* (vertigo traumatica sive ab ictu ⁶⁵⁾), nunc *diathe-*

61) DARWIN *zoonom.* Vol. 1. p. 231 et sq.

62) Cfr. P. II. Vol. I. sect. II. cap. XIX. §. CXII. No. 9. cap. XXIII. §. CXXI.

63) Memoratu digna est vertigo vomitum cruentum annuncians, aut concomitans.

64) Vertiginem saepissime a febribus malignis, quae capiti inprimis sunt graves, relinqui, jam WEDDEL rito perspexit (l. c. p. 10). Vertiginem in convalescente ex febre intermittente, in clinico instituto Vilmensi curavi.

65) Idiopathica haec vertigo aliquando continua est. GALLENUM non latuit (de loc. affect. 8).

diathesium plurimarum. Proficiuntur nempe ex iis: 1) *Vertigo inflammatoria sive ex plethora*, communissima omnium, saepissime ex vitio haemorrhoidali, menstruum retentione, graviditate, abusu liquorum fermentatorum oborta, faciei plerumque rubore, capitis, praesertim ad occiput, gravedine, lumborum dolore, alvi tarditate, motibusque febrilibus stipata, corpore jejuno remittens, ceterum ex praeceptis generalibus ⁶⁶⁾ dijudicanda. 2) *Vertigo rheumatica sive catarrhalis*, haud raro cum inflammatoria complicatione, sub temperiei mutationibus repentinis, praeviis artuum doloribus, affectionibus catarrhalibus, coryza, cum evidenti visus affectione et generalibus rheumaticis notis ⁶⁷⁾ obveniens ⁶⁸⁾. 3) *Vertigo gastrica (stomachica SAUVAGESII)*, ob fallaciam symptomatum gastricorum in morbis cerebri ⁶⁹⁾ cautissime et secundum regulas generales dijudicanda, aliquando vitio verminoso, saepissime haemorrhoidali aut labi hepatis juncta, praecuntibus oris amarore, ventriculi morbo etc. — 4) *Vertigo arthritica*, gravis, plerumque periodica, et cephalaeae magnaeque virium jacturae nupta, interdum nexum cum herpete, zostere habens, ac graphice a MUSGRAVE ⁷⁰⁾, STOLLIO ⁷¹⁾, BANG ⁷²⁾, BARTHEZ ⁷³⁾ descripta.

66) Cap. I. §. IV. 14.

67) Ibid. No. 15.

68) HENR I. c. p. 836.

69) Cap. I. §. IV. 16.

70) De arthritide anomala. c. 14.

71) Rat. med. P. V. p. 435.

72) Auswahl aus d. Tagebüch. d. Krankenhause, 1785. Juli,

scripta. — 5) *Vertigo nervosa* (V. *hysterica*, *hypochondriaca*); adspectus objecti terribilis, inanitionis, animi pathematum, lucubrationum, motus inconsueti, electricitatis, narcoticorum effectus, per modicam licet alvinam evacuationem, vertiginosis aliàs tam salutarem, aucta, urinarum limpidarum profluvio, ructibus inodoris atipata, aaepe cum menstruorum a recto tramite aberratione. — 6) *Vertigo fugax* sive *accidentalis*, praecedenti affinis. Quibus singulis *vertigo scorbutica* ⁷³⁾, *venerea* ⁷⁴⁾, *mercurialis* ⁷⁵⁾ et *plicosa* addi debent. A divisione vertiginia in *vertiginem cerebri*, *v. visus*, *v. tactus* et *auditus* ⁷⁷⁾ parum utilitatis in praxi exspectamus. *Morbi gradum* designat divisio vertiginis in *simplicem* ⁷⁸⁾, *tenebricosam* ⁷⁹⁾ et

73) *Abhandl. über die Gichtkrankheiten. Berlin 1803.*
2. B. p. 352. §. 129.

74) WILLIS de anima brutor. pathol. cap. 7.

75) Astruc de morbo venereo. lib. IX. Paris. 1740.

76) Plus vice simplici sub cura mercuriali in syphiliticis, systemate nervoso admodum sensili instructis, vertiginem ortam vidi. An per actionem hydrargyri in hepar, et per consensum hujus visceris cum cerebro?

77) DARWIN (*auditory vertigo*).

78) „Dum exteriora, aut corpus nostrum, aut utraque simul circumagi ac nutre duntaxat videntur. BUNSERIUS op. c. Vol. III. cap. IX. §. 294.

79) „Quasdo praeter apparentem objectorum rotationem aut motum obscuratur etiam visio aut deficit.“ Ibid. *Synon. Scotodinia. Scotoma.*

et caducam⁸⁰⁾. Quoad vertiginis *sedem*, ea juxta diversitatem causae cerebrum vel cerebellum afficientis diversa videtur⁸¹⁾.

§. LXXI.

Prognosis. Cura.

Prognosis. 1. Vertigo ut *signum* in morbis optime a HIPPOCRATE¹⁾, GALENO²⁾, SYDENHAMO³⁾, LIEUTAUDIO⁴⁾ et VOGELIO⁵⁾ interpretata fuit. Quot morbos nervosos ea praesagiat, ex plurimis hujus libri locis palam redditur. Ut *morbis per se*, vertigo inflammatoria, gastrica, nervosa, imprimis si transitoria fuerit, minus timenda, quam reliquae species, potissimum si ad tenebricosam vel caducam pertineant. Vertigo arthritica saepe aliis comparentibus morbis⁶⁾, imprimis cutaneis⁷⁾, solvitur.

Cura.

2. Vertiginosi nunquam soli domum derelinquere, scalas percurrere, fenestris apertis incumbere

80) „Quando vertigo adeo invaluerit, ut aeger obvia quaeque apprehendere cogatur, ne corrumpat.“ Ibid.

81) PUMKINJE l. c.

1) Aph. 13. aect. VIII. Coac. No. 105. 106. 141. 144.

2) Loc. affect. lib. III. 8. p. 78.

3) Epist. ad COLE. p. 243. I.

4) *Précis de la médecine pratique* T. 1. S. 1. p. 174.

5) De cognosc. corp. humani affect. p. 517.

6) Tenebricosa vertigine, indolis aperte arthriticae, laboravit a. 1811. Comes Vilmensis T., acrius incidit in tumorem glandulae prostaticae, ac plane a vertigine liberatus est. Perit a. 1822. apoplexiâ.

7) J. W. GULDEBRAND l. c.

bere aut equitare deberent. Cura vertiginis traumaticae illi aliorum morborum cerebri, a violentiis externis ortorum, similis est ⁸⁾. Vertigini *inflammatoriae transitoriae* nil nisi regimen dieteticum ⁹⁾ opponimus. In *permanente*, *venae sectio* ¹⁰⁾, e pede et parva ac repetita ¹¹⁾, *cucurbitulae scarificantes* nuchae, aut *hirudines* capiti vel in haemorrhoidariis ano appositae, *pediluvia tepida*, *nitras potassae* et *alvum aperientia*, eminentes producunt effectus. Ipsa haec methodus et in *rheumatica vertigine* conducit, cujus tandem cura vesicatorio ad nucham, vel inter scapulas, non neglectis lenibus diapnoicis, ut *acetate ammoniae liquida* cum *nitro* et aqua florum sive sambuci nigrae, sive tiliae europaeae, cui absente omni irritatione inflammatoria et *guajaci resina* addi potest ¹²⁾, absolvitur. Calvi capillitium artificiale adhibeant, necesse est. Quodsi vertigo potius processui inflammatorio rheumatico prae-

8) Cap. II. §. XII. cap. III. §. XVIII.

9) Cap. V. §. XXIX. No. 1.

10) A. 1811 feminam Viluae conspexi, quae ad septimum graviditatis mensem perducta, lectum nullo pacto deserere potuerat, quin in vertiginem caducam incideret. Cum aegra gracilis esset, nullasque plethorae notas exhiberet, primum liquorem anodynum ac spiritum cornu cervi succinatum praescripsi, quae remedia cum malum auxissent, illico ad venae sectionem confugi, vertiginem extemplo ac perfecte auferentem.

11) Hanz op. p. 406.

12) Hanz l. c. p. 419.

praegresso originem deberet, aut aliorum cerebri morborum reliquias constitueret, praeter *setaceum* ad nucham, parvas saepeque repetitas doses *murialis hydrargyri mitis*, dummodo nulla scorbutica obstabant indicia, summo cum fructu adhibuimus. Quondam *cinnabaris* calomelanos vices egisse videtur¹³⁾. *Vertigo gastrica* raro aut nunquam sub ipso insultu *emetici* usum admittit. Tunc enim auxilium in *clysteribus*, praesertim cum *aceto*, in potu subacido, in fomentatione tepida abdominis, ac in quiete corporis quaerendum. Tempore libero cura radicalis secundum regulas generales¹⁴⁾ ita absolvitur, ut acidorum, flatuum¹⁵⁾, vermium obstructionisque hepatis summa ratio habeatur. *Clysterum visceralium*¹⁶⁾ hic non obviandum. Vertigine ex ventriculi languore *baccae albae piperis nigri*, eo jejuno ingestae, prospiciunt¹⁷⁾. Magni momenti a nonnullis habetur

radix

13) QUERCETANUS quinque exempla felicissimi usus adducit (in tetrade affect. c. 33). WEDEL ait (l. c. p. 16): Nos quoque efficacissima haec ipsa cinnabarina aemper deprehendimus, unde etiam vertiginem post febres malignas unica cinnabari abegimus non semel.

14) Cap. I. §. VI. No. 11.

15) R. Magnesiae purae. Sulphatis sodae aa drachmas duas. Seminum coriandri sativi drachmam semis. M. f. pulvis. Cap. ad vespere cochl. cocteanum unum alterumve.

16) Cap. XVII. §. LXXVII. No. 5.

17) FR. HOFFMANN de praestantia remediorum domesticorum. §. 26.

radix *doronici pardalianches* LINNAEI ad scrupulum¹⁸⁾. Praeterea maxime ad regimen diaeteticum respiciendum; comedere mane mature et ad horas somni decenter, suadet PLATER¹⁹⁾. Senibus non admodum plethoricis succolada Inda, juscula ex vino, cum mace, cardamomo et croco, nux jugulans condita, nux moschata, zingiber in India conditum prosunt. *Vertigo arthritica* uti cephalaea ejusdem indolis curatur²⁰⁾. *Resina guajaci officinalis* in vitello ovi subacta²¹⁾, ulcera artificialia ad nucham, thermae²²⁾, cura pedum, et evacuatio alvi, urinae ac transpirationis, praecipue prosunt. *Vertigo nervosa aetherem sulphuricum alcoholisatum, oleum cajeput, succinum, corticem cinchonae, martialia, gummi resinam ferulae assae foetidae, radicem valerianae, lignum quassiae amarae, cubebas, semina sinapis nigrae, aquas Pyrmontanas cum lacte tepido*²³⁾, *electricitatem, magnetem*²⁴⁾ *aliaque*²⁵⁾ postulat. Victus

ut

18) WADDE L. c. Diss. an. 1707. p. 15. ait tectorum curatores et hac radice, cum radice valerianae, cubebis et granis paradisi, pulverem adversus vertiginem munientem parare. Idem SAUVAGES (l. c. p. 248) de funambulis refert.

19) Obs. lib. I. obs. 95. 20) Cap. II. §. XII. 5.

21) HANZ l. c. p. 420.

22) HANZ praecipue Freyenwaldae fontem commendat.

23) HANZ l. c. p. 447.

24) *Memoires de la soc. royal. de méd.* an. 1779. p. 653.

25) *Stercus pavonum* siccum ad scrupulum, ut specifi-

ut supra in debilitate ventriculi. Praeterea et rebus externis, adversus cephalaeam nervosam commendatis²⁶⁾, potissimum sub paroxysmo locus est. Narratur de vertigine sono tubarum sanata²⁷⁾. *Vertigini scorbuticae* antiscorbutica, *venereae* antisymphilitica et *mercuriali* sulphur, secundum regulas ex aliis hujus operis locis eruendas, opponi debent.

CAPUT XVII.

De hypochondriasi.

§. LXXII.

Definitio. Literatura:

Definitio. 1. **H**allucinatio circa sanitatem propriam, quae multo magis perdita reputatur, quam revera est, cum scrupulosa ad corporis statum attentione, anxietate, metu, perstantibus, praeter imaginationis

cum ab antiquis et adhuc a SAUVAGESIO (l. c. p. 247) commendatur. J. AMELUNKEN secretum in vertigine (Pulvis sciuri, summe rubicundi et potius femellae, quam masculi, ad pondus scutati, quovis mane in vino seu cerevisia, sumtus). Miscell. acad. nat. cur. dec. II. a. 4. 1685. append. p. 202.

26) Cap. II. §. XII. No. 11.

27) J. LANZONI tubarum sonus remedium vertiginis. Act. acad. nat. cur. Vol. I. p. 88.

tionis vitium reliquis animi facultatibus illaesis, *Hypochondriasin* ¹⁾ constituit.

2. Scriptoribus de hypochondriasi ²⁾ selectis Literaturæ.

- 1) Α ὑπό, sub, et χόνδρος, cartilago, quasi dicas malum sub castilaginibus (mucronatae scilicet et costarum spuriarum) positum. Morbus resiccativus seu siccatorius HIPPOCRATIS (lib. II. de morbis). Πάθος ψευδές, flatuosa passio ΑΞΙΣ, teste GALENO (lib. III. loc. affect. c. 7). Morbus hypochondriacus, morbus eruditorum, hypochondriaca passio, tartarus hypochondriorum. ARAB. *Mitrachia* (mesenterium Arabibus *mirach*). GERM. *Hypochondrie*, *Milzkrankheit*, *Grillenkrankheit*. BELG. *Zwaarmoedigheid*. DAN. *Medsot*. SUEC. *Miälsinka*. ANGL. *Hypochondriac passion*, *low-spirits*, *vapours*. GALL. *Hypochondrie*; *maladie vaporeuse*, *imaginaire*. ITAL. *Ipocondria*. HISP. *Hipocondria*, *pasion ipocondriaca*. LUSIT. *Molestia ipocondriaca*. POL. *Hypochondrya*. Ross. ИПОХОНДРІЯ.
- 2) PONTANUS theses de affectu hypochondriaco. Basil. 1601. COLERUS diss. de scorbuto et hypochondriaca adfectione flatulenta. Basil. 1608. GRABA casus laborantis affectu hypochondriaco. Giesæ. 1608. JANICMIUS diss. de *Ayanth* seu passione hypochondriaca. Basil. 1614. SALANDI consilium de melancholia hypochondriaca. Veron. 1617. J. WOLFF de morbo hypochondriaco ejusque generatione. Helmst. 1621. 1622. BECKNER diss. de affectu hypochondriaco. Regiom. 1623. L. FISCHER de affectu hypochondriaco. Brunswick. 1624. De loco vero, foco adfectus prae cordialis. ibid. 1631. MOCHINGER diss. de affectu hypochondriaco. Lips. 1628. BURKHARD diss. de hypochondriaca passione. Basil. 1630. M. MARTINI affectionum hypochondriacarum historia et curatio. App. ad Tract. de morbis mesenterii abstrusioribus. Lips. 1630. LOTNIUS diss. Frank PRAX. II. I. 1. P p de

de morbo literatorum, qui vulgo affectus hypochondriacus indigitatur. Regiom. 1631. ROLFINK diss. de affectu hypochondriaco. Jen. 1631. Et Diss. de affectione hypochondriaca. Ibid. 1658. MICHAELIS de affectu hypochondriaco. Lips. 1634. BRENDL diss. de affectu hypochondriaco. Jen. 1637. HERING de melancholia in genere et affectione hypochondriaca in specie. Brem. 1638. MOEBIUS diss. de affectu hypochondriaco. Jen. 1640. SLECKL diss. de affectione hypochondriaca. Jen. 1641. BAUTZMANN diss. de affectione hypochondriaca. Leid. 1643. POLIS diss. de affectu hypochondriaco. Francf. 1645. R. NICANDRI historia memorabilis feminae bis triennio hypochondria laborantis. Paris. 1646. BANZER diss. de morbo hypochondriaco. Witteb. 1650. GRIGER Microcosmus hypochondriacus, sive de melancholia hypochondriaca. Monach. 1651. MEYER casus laborantis affectione hypochondriaca. Lugd. Bat. 1651. WORMIUS diss. de malo hypochondriaco. Hafn. 1654. LANCIUS diss. de malo literata familiari sive hypochondriaco. Lips. 1658. DOWNEY diss. de hypochondriaca affectione. Leid. 1660. WIRTHIUS diss. de affectu hypochondriaco. Basil. 1661. FAIDERICI diss. de affectus hypochondriaci genuini indole. Jen. 1662. SENIZ diss. de affectione hypochondriaca. Argent. 1662. AMMANN diss. de affectione hypochondriaca. Lips. 1664. DEXBACH diss. de affectione hypochondriaca. Basil. 1665. MARCHZ de affectione hypochondriaca. Rost. 1665. WALDSCHMIED diss. de affectione hypochondriaca. Giessen 1666. WESTHOFF diss. de affectu hypochondriaco. Argent. 1668. P. ZACCHIAS de affectionibus hypochondriacis. Aug. Vindel. 1671. De malo hypochondriaco. Romae 1679. NISIVS defensio medica necessaria de affectione hypochondriaca. Francf. 1674. RUPERTUS diss. de malo hypochondriaco. Erf. 1674. TROMBETTI
apolo-

apologia della passione hypochondriaca. Genova 1674.
 FRANCHIMOND A FRANKENFELD nexus Galenico-Hippocraticus de passione hypochondriaca. Prag. 1675.
 BECKMANN diss. de affectione hypochondriaca. Lugd. Bat. 1676. BORRICHIUS (BRAND?) diss. de malo hypochondriaco. Hafn. 1676. JANSENUS diss. de affectione hypochondriaca. Lugd. Bat. 1677. JOMRENIUS diss. de affectu hypochondriaco. Rintel. 1678. 1706. MONNIUS distrib. de affectione hypochondriaca. Franco. 1678. J. ST. BOLOONA de l'ipochondria e suoi accidenti. Vienna 1684. HELWIGIUS diss. de affectione hypochondriaca. Gryphaw. 1685. LEICHNER diss. casus matronae hypochondriacae. Erf. 1685. STORCK diss. de malo hypochondriaco. Altd. 1685. FARNA dell' ipochondria e suoi accidenti e rimedj. Venezia 1686. BRUNNER diss. de affectione hypochondriaca. Heidelb. 1688. H. JOLY discours sur une étrange maladie hypochondriaque et ventreuse, qui a duré onze ans. Paris 1689. LANON traité des vapeurs ou leurs effets et leurs remèdes. Paris 1689. VESTI diss. de malo hypochondriaco. Erf. 1694. Et: Diss. de affectione hypochondriaca. Erf. 1702. HARWENK diss. de affectu hypochondriaco. Regiom. 1696. ORTLOB diss. de Hydræ in hypochondriis nidulantis origine, indole et antidoto. Lips. 1696. ZIEGLER diss. casus viri hypochondriaci. Basil. 1697. SCHAFER diss. de malo hysterico in viris. Rostoch. 1699. VATER diss. de morbo sic dicto hypochondriaco. Witteb. 1702. CRÜCKEN diss. casus medicus de malo literatorum seu malo hypochondriaco. Zittav. 1703. VERNON diss. de passione hypochondriaca, hysterica dicta. Lugd. Bat. 1704. GRAEZ diss. de malo hypochondriaco; germanice *Milzkrankheit*. Regiom. 1708. BAIER (PENZ?) diss. de malo hypochondriaco. Altd. 1709. JACOBI diss. de malo hypochondriaco. Erf. 1713. J. A. FISCHER diss.

de malo hypochondriaco. Erf. 1722. ROBINSON *ty of the spleen, vapours and hysterical melanch* Lond. 1729. MANDEVILLE *treatise of the hypochondric and hysterical diseases.* Lond. 1730. ADON diss. de affectu mirachiali. Lips. 1734. LUTHER de malo hypochondriaco. Erf. 1737. DE LA ME diss. de malo hypochondriaco. Argent. 1738. RTER diss. de morbo hypochondriaco. Goett. 1739. STAHL diss. de malo hypochondriaco. Erf. 1739. SEVE diss. idea mali hypochondriaci ejusque præservationis. Kil. 1741. HUBER diss. compendiosa famosi, et hypochondria vexat, mali theoria et therapia. Wir. 1745. JUCH diss. de malo hypochondriaco. Erf. 1745. SCHREFFELIUS diss. de malo hypochondriaco. Gryph. 1745. STOCK diss. de malo hypochondriaco-hysterico. Jen. 1749. Et: Diss. de affectu hypochondriaci. Ibid. 1755. FRAGER diss. de morbo hypochondriaco seu hysterico. Edinb. 1750. CARTHEUSER diss. passione hypochondriaca. Fr. ad Viadr. 1751. H. BASTREIN *Beschreibung der wunderlichen hypochondriacal Krankheit oder von der Darmsucht.* Erfurt 1752. BRENDL diss. de valetudine ex hypochondriis. Go. 1752. vide opp. T. III. p. 45. CHAUFEPED diss. de malo hypochondriaco. Lugd. Bat. 1752. DELIUS de nulla ad malum hypochondriacum spectantia. Erf. 1757. Vers. German. Nürnberg. 1762. C. B. BEHR de affectione hypochondriaca, in *Ephemer. acad. curios.* cent. 3 et 4. p. 445. *Samml. der med. Soct in Budissin* p. 102 sq. LANON diss. de malo hypochondriaco. Lips. 1758. BORHMER diss. de morbo hypochondriaci. Viteb. 1760. HAY diss. de affectionibus hystericis et hypochondriacis. Lugd. Bat. 1760. ZUCCARINI diss. de hypochondria. Heidelb. 1760. BRODKORN diss. de affectione hypochondriaca et hysterica. Erf. 1772. HILL *praktische Abhandlung*

der Natur und Heilungsart der Milzkrankheit. Brem.
 1776. BAYNES diss. de hypochondriasi. Edinb. 1777.
 OKUME über die Hypochondrie. Dresd. 1777. A.
 COMPARETTI occurrus medici de vaga aegritudine in-
 firmitatis nervorum. Venet. 1780. SIESS idea pathem.
 hypochondriaco-hysterico. cum historia. Giess. 1780.
 BUCH diss. de malo hypochondriaco. Giess. 1782.
 ETZEL diss. de morbo hypochondriaco. v. ETZEL
 diss. STOLLII. T. II. STARK diss. de malo hypo-
 chondriaco. Edinb. 1783. NUNN diss. de malo hypo-
 chondriaco. Erf. 1784. J. RYMER *treatise upon the*
indigestion and hypochondriac disease. Lond. 1785.
 E. PLATNER über die Hypochondrie. App. ad DUBOUR
 über die Verrichtungen und Krankheiten des mensch-
 lichen Verstandes. Leipz. 1786. WICHTMAN diss. de
 hypochondriasi. Edinb. 1789. SIEVERS diss. hypo-
 chondriacae atque hystericae dispositionis causas non-
 nullas sistens. Helmst. 1793. H. TABOR *Anweisung*
für Hypochondristen, ihren Zustand gehörig einzusehen
und zu verbessern. Dürkheim 1793. J. K. H. ACKER-
 MANN über Blähungen und Vapours, Briefe hypo-
 chondristischen und hysterischen Personen gewidmet.
 Naumb. 1794. MÜLLER und HOFFMANN für Hypo-
 chondristen, Nervenkrankte. Frankf. 1795. WEBER diss.
 mali hypochondriaci veri ac nervosi notio et natura.
 Rostoch. 1795. Et: Morbi hypochondriaci veri signa
 et diagnosis. Ibid. 1795. J. W. L. von LUCK *Ver-*
such über Hypochondrie und Hysterie. Gotha und St.
 Petersburg. 1797. KREYSIG diss. pathologia mali hypo-
 chondriaci. Viteb. 1797. ISRAEL diss. de hypochon-
 driaco malo monita quaedam. Francf. 1798. MOHRING
 diss. de malo hypochondriaco et hysterico. Jen. 1798.
 OTTO diss. de hypochondriaco malo monita quaedam.
 Francf. 1798. Et: Diss. de hypochondriasi. Ibid.
 1805. A. THOMSON *Untersuchung der Natur, Ursa-*
 adnu-

adnumeramus: SENNERTUM ³⁾, WILLISIIUM ⁴⁾, SY-

DENHA-

chen und Heilmethode der Nervenbeschwerden. Hanov. 1798. SCHIRA commentatio sistens observationem morbi hypochondriaci. Tub. 1800. NIKISCH diss. de hypochondriasi. Francf. 1801. G. W. BECKER *guter Rath an meine Freunde die Hypochondristen.* Leipz. 1803. REICHEL diss. de hypochondria et hysteria. Jen. 1803. K. WEZEL *Steg über die Hypochondrie.* Erf. 1805. FIEDERLING diss. de hypochondria. Wurceb. 1807. *Beschreibung einer mehrere Jahre lang gedauerten Hypochondrie, wie diese ohne den Gebrauch innerer Arzneyen ist gehoben worden.* Berlin 1808. HARNER diss. de hypochondriasi et morbo Coccaesthesia. Landsh. 1808. ALBRECHT *Hülfe für alle, die an hypochondrischen und hysterischen Uebeln leiden.* Hamb. 1809. BAEHRENS diss. meletemata mali hypochondriaci pathognomonica - therapeutica. Duisb. 1810. KLETTEN de malo hypochondriaco rite cognoscendo. Viteb. 1811. G. L. W. HOHNSTOCK *über Hypochondrie und Hysterie.* Sondersh. 1816. K. J. ZIMMERMANN'S *Versuch über Hypochondrie und Hysterie.* Bamb. 1816. C. L. KLOSE *medizinisches Taschenbuch für Hypochondristen und solche die es zu werden fürchten dürfen.* Berlin 1824. C. RINGELMANN *über die Natur, das Wesen und die Behandlung der Hypochondrie und Hysterie.* Würzb. 1824. J. SCHROEDER diss. de symptomatologia et aetiologia praesertim de natura et curatione morbi hypochondriaci et hysterici. Rost. 1827. A. TH. BRÜCK *Beiträge zur Erkenntniß und Heilung der Lebensstörungen mit vorherrschend psychischen Krankheitserscheinungen.* Bevorwortet und herausgegeben von J. D. BRANDIS. Hamb.

- 3) Lib. III. prax. med. part. V. sect. I. cap. 1. et: diss. de hypochondr. affect. Wittemb. 1627.

DENHAMUM ¹⁾, HIGHMORUM ⁶⁾, CONRINGUM ⁷⁾,
 SCHENKIIUM ⁸⁾, WEDELIUM ⁹⁾, STAHLIUM ¹⁰⁾, ETT-
 MÜLLERUM ¹¹⁾, ALBERTUM ¹²⁾, FR. HOFFMANN ¹³⁾,
 VIRIDETUM ¹⁴⁾, CHEYNEUM ¹⁵⁾, FLEMINGUM ¹⁶⁾,
 J. KÄMPFIUM ¹⁷⁾, HALLERUM ¹⁸⁾, FRACASSINIUM ¹⁹⁾,

BÜCH-

- 4) *Pathologia cerebri. cap. 11. Pathol. affect. hysteric. et hypoch. vindicata. Opp. T. I.*
- 5) *The entire works. Lond. 1769. p. 603.*
- 6) *De affectione hypochondriaca. Amstel. 1660.*
- 7) *Diss. de morbo hypochondriaco. Helmat. 1662.*
- 8) *Diss. de passione hypochondr. Jen. 1666. Diss. de malo hypochondr. Ibid. 1668. Diss. aeger labor. malo hypochondr. scorbut. Jen. 1670.*
- 9) *Diss. de morbo hypochondriaco. Jen. 1676.*
- 10) *Diss. de malo hypochondr. - hyster. Hal. 1703. Diss. de vena portarum, porta malor. etc. Ibid. 1705.*
- 11) *Opp. medic. omnia. Francf. 1708. Cap. de malo hypochondriaco et scorbuto.*
- 12) *De haemorrhoid. medicina hypochondr. Hal. 1716. De morb. imaginari. hypochondr. Ibid. 1755.*
- 13) *Diss. de praecipuo studiosorum morbo, ejusque genuin. caus. Hal. 1699. Diss. de vera morbi hypochondr. aede, indole et curat. Ibid. 1719. Diss. de affectu apsamod. hypochondr. inveterato. Hal. 1734. Opp. suppl. Part. II. et med. rat. systema. T. IV. Part. 3. cap. 6. Responsa. et consultat. T. II. sect. 3. casus 29 — 39. sect. 4. cas. 143 — 146 etc.*
- 14) *Sur les vapeurs. Yverdon 1726.*
- 15) *The english maladie, or a treatise of nervous diseases of all kinds. Lond. 1739.*
- 16) *Neuropathia, seu de morbis hypochondriacis et hystericis. lib. III. Poema. Eboraci. 1740.*
- 17) *De infarctu vasorum ventriculi. Basil. 1751 (in Haz-*

BÜCHNERUM ²⁰⁾, POMMEUM ²¹⁾, GARBOEURUM ²²⁾,
 HOPPEUM ²³⁾, R. WHYTTIUM ²⁴⁾, J. U. BILGERUM ²⁵⁾,
 GATTENHOFFIUM ²⁶⁾, ZEVIANIUM ²⁷⁾, PLOUCQUE-
 TUM ²⁸⁾,

LEHR collect. disput. med. pract. T. VII). Et: *Für Aerzte u. Kranke bestimmte Abhandl. v. einer neuen Methode die hartnäckigen Krankheiten, die ihren Sitz im Unterleibe haben, besonders die Hypochondrie, sicher und glücklich zu heilen. Leipz. 1784. Edit. alter. Augsb. 1791.*

18) Diss. de malo hypochondriaco. Goett. 1752.

19) Naturae morbi hypochondriaci investigatio. V. opus. patholog. Lips. 1758.

20) Diss. de variae therapiae necessitate tam in hypochondriaco, quam hysterico malo. Hal. 1747. Diss. de singulari sensibilitate hypochondriacorum, ejusque causis. Ibid. 1749. Diss. de vero ortu mali hypochondriaci. Ibid. 1769.

21) *Essai sur les affections vaporeuses des deux sexes, Paris 1760. Vers. Germ. Bresl. 1775.*

22) Diss. sistens experimenta quaedam circa malum hypochondriacum. Hal. 1762.

23) *Hamb. Magazin. B. 8. St. 6. No. 3. B. 11. St. 4. No. 1. B. 14. St. 4. No. 3.*

24) *Beobachtungen über die Krankheiten die man gewöhnlich Nervenübel, ingleichen hypochondrische oder hysterische Zufälle nennt. A. d. E. Leipz. 1766.*

25) *Nachrichten an das Publicum in Ansehung der Hypochondrie, oder Samml. verschiedener für das ganze Publicum gehörender, medicinischer Schriften. Kopenh. 1767.*

26) Diss. de hypochondriasi. Heidelb. 1769. Continetur in J. P. FRANK delectu opuscul. T. I. p. 1.

27) *Del stato a favore degl' ipocondriaci. Verona 1775. Vers. German. cum notis KREYSIGII. Leipz. 1794.*

TUM²⁸⁾, TODEUM²⁹⁾, WEICKARDUM³⁰⁾, C. REVILLONUM³¹⁾, STORRIUM³²⁾, G. F. HILDEBRANDUM³³⁾, J. REIDIUM³⁴⁾, VILLERMAY³⁵⁾, GEORGET³⁶⁾, J. P. FALRET³⁷⁾, J. F. SEYFFERTUM³⁸⁾
et H.

28) Diss. de morb. neuricis, præcipue ea specie, quæ ex infarct. abdominal. oritur. Tübing. 1794.

29) Nöthiger Unterricht für Hypochondristen. Kopenh. 1797.

30) Vermischte Schriften B. 1. p. 174.

31) Recherches sur la cause des affections hypochondriques, appelées communément vapeurs. Paris 1779. Vers. Germ. Goth. 1781.

32) Untersuchungen über den Begriff, die Natur und Heilbedingungen der Hypochondrie. Stuttg. 1805.

33) Ueber die Hypochondrie in HUFELAND'S Journ. der pr. Heilk. B. 1. p. 87. B. 3. p. 13.

34) Essays on hypochondriacal and other nervous affections. London 1816. Versio Germ. cum additam. HAINDORFII. Essen. 1819.

35) Traité des maladies nerv. ou vapeurs, et particulièrement de l'hystérie et de l'hypochondrie. Paris 1816. Et: Diction. des sciences médicales T. 23. p. 107.

36) Traité sur la physiologie du système nerveux et spécialement du cerveau: recherches sur les maladies nerveuses et particulièrement sur le siège, la nature et le traitement de l'hystérie, de l'hypochondrie etc. Paris 1821.

37) De l'hypochondrie et du suicide. Considérations sur les causes, sur le siège et le traitement de ces maladies, sur les moyens d'en arrêter les progrès et d'en prévenir le développement. Paris 1822.

38) Diss. de hypochondriasi. Lips. 1824.

et H. SCHNAUBERTUM ³⁹⁾. Accedunt qui de tuenda
literatorum sanitate egerunt ⁴⁰⁾.

§. LXXIII.

Symptomata. Necroscopia.

Sympto-
mata.

1. In hypochondriasi incipiente aegri, v-
geti ceterum et functionibus sat bene proceden-
tibus, mala multigena, nullo evidenti princip-
invicem connexa, utplurimum solo eorum relati-
cognoscenda, quaeque alii spernerent, cum scri-
pulsosa attentione, non sine exaggeratione enu-
rant. Gravior morbus annuntiatur animi abje-
ctione ¹⁾, imbecillitate ²⁾, fluctuatione ³⁾, irrita-
bilitate

39) *Beitrag zur Erkenntniss des Wesens der Hypochon-
drie und Hysterie und deren richtige Behandlung. E-
senberg 1827.*

40) Addat. auctoribus in P. I. Vol. I. sect. I. §. IX.
§. X. 9. §. XI. 14. Edit. secundae citatis: GRATAROLI
de conservanda valetud. literatorum. FABR. Tr. de l-
terator. tuenda et restit. valetudine. GESNERUS de
praecept. tuend. sanit. HORSTIUS de sanitate studio
PICTORIUS in meth. san. FICINUS de studios. sa-
tuend. JAC. SYLVIVS de victus ratione facili ac salu-
bri pauper. scholast. GÜNTHERUS in hortulo sa-
HOLLINGIUS de salubri studios. victu. JON. SYLVIVS
de studios. et eorum, qui corporis exerceat. addic-
sunt, tuenda valetud. WEDELIUS disp. de diaeta lit-
rat. WALDSCHMIDIUS disp. med. san. studios. AL-
BERTI in hygien. c. 15. de sanitatis moderamine in
litteratis. MATTHAEI de studios. sanitate tuenda. Ha-
1721.

1) „A levi strepitu saepe pavent, ut, si vel arborum
folia levi motu se invicem atterant, gravissima saep

bilitatē inconsueta, diffidentia de se ipso aliisque ⁴⁾, impotentia proprios labores rite absolvendi, silentio ⁵⁾, tristitia, solitudinis amore, phantasia perversa, proclivitate ad somnum minime recreantem et a tristibus somniis interruptum ⁶⁾. Accedunt lucida intervalla, ubi nemo hypochondriaco lepidior. Jam vero caput obtuse dolet, aures tinnunt, oculi obnubilantur, lingua aspera evadit, sapor, praesertim matutinis horis, depravatur, saliv

mala praesto futura, et vel Hannibalem ante portas esse opinentur.“ BUCHNER diss. cit. de singulari sensibilitate etc. p. 22.

- 2) *Le son le plus léger le fait transire d'horreur ;
Et de son cerveau creux la membrane affligée,
Du moindre ébranlement se trouve dérangée.*

L'hypochondre de J. B. ROUSSEAU.

- 3) JUNKER diss. de variabili hypochondriacorum mente. Hal. 1746.

- 4) Hypochondriacus haud raro universum genus humanum, proprio excepto individuo, perversum, ac sibi infensum existimat; hoc individuum solum curans, reliquumque orbem terrarum negligens, nihilominus ut quivis desideriis suis obviam eat, exposcit, quod nisi accidat, inprimis si alter ad eosdem honores consequendos, ad quos ipse adspirat, concurrere audeat, id pro injuria, quin immo pro crimine habet, atque sic vitam infelicem ducit, ordinemque publicum perturbat.

- 5) BOERHAAVE praelect. ad institut. TISSOT l. c. p. 76.

- 6) G. FR. FRANCUS DE FRANKENAU de somnio hypochondriacae morbi imminantis nuncio. Miscell. acad. nat. cur. dec. I. a. 4 et 5. 1673 et 1674. p. 105.

liva spumosa, aliquando dulcis, rejicitur, carnes flaccidae fiunt, totum corpus languet, et saepe sub minimo motu aut animi pathemate sudore perfunditur. Interea aegri saepe voraces ex erroribus in diaeta sibi novas attrahunt aerumnas. Quocunque in casu serius ocyus tensio, inflatio ventriculi, vel ipso tactu cognoscenda, nec non sensus ligaminis, hypochondria, secundum diaphragmatis decursum perstringentis, superaccedunt. Quin immo, hypochondria, et maxime sinistrum, tument, ac in locis intestini coli flexuris respondentibus, attactum aegre ferunt. Flatus mira volubilitate intestina percurrere ac variis sub rerum positionibus explodi⁷⁾ solent. Incommoda haec plus minusve continua, et interdum in solo corporis latere sinistro obvia⁸⁾, per intervalla adhuc augentur, ac aliis malis sociis, paroxysmos terribiles efformant, praesertim autumnos, hieme, aestate fervidissima et in feminis, circa catameniorum tempus, saevientes, quorumque sequens est imago. Aegrotus percipit inquietudinem et jactationem, praecordiorum angustiam ac sensum,

7) Monachum hypochondriacum novit WEICKARD (l. c. B. 2. St. 2), qui, dum manum dextram cum sinistra per aliquod tempus fricabat, tandem ructus vehementes expellere incipiebat.

8) Hypochondriacus *pro dimidio suo corpore* consilium meum expetiit, asserens se tantum ad latus sinistrum aegrotare, altero autem optime valere. Cuncta symptomata hanc assertionem confirmarunt.

sensum, ac si conscientia a crimine commisso augetur, cordis tremorem aut palpitationem cum pulsu parvo et irregulari, respirandi difficultatem⁹⁾, sufflaminatis fere spiritibus, gutturis constrictionem, aquae horrorem voluntate tamen vincendum¹⁰⁾, pondus ventriculi, nauseam, aliquando vomitum materiae acidae, tenacis ductilis, sebaceae¹¹⁾, aestum hypochondriorum, cum pulsatione epigastrii, flatuum, prius voluti incarcerationum, evacuationem sursum et deorsum, atque hic interdum cantum aemulantium¹²⁾, calores fugaces, partiales extremitatum, audore viscido coopertarum, frigus, quandoque cadavericum¹³⁾, fornicationis sensum ad cutem, subsultus tendinum et musculorum abdominalium aliorumque, dolores ad spinam vertebralem, fletum¹⁴⁾, vertiginem et lipothymiam. Ad acmen sic perducto malo, sub copioso, aut urinarum cum crystallo claritate certantium fluxu¹⁵⁾, nonnunquam cum

stran-

9) KISNER diss. de suffocatione hypochondriaca. Lugd. Bat. 1670. WALTERUS diss. de suffocatione hypochondriaca in viro. Lugd. Bat. 1688.

10) Haud adeo rarum symptoms. Cfr. nota 39.

11) D. LUDOVICI de vomitu hypochondriacorum sebaceo. Miscell. acad. nat. cur. dec. I. a. 3. 1672. p. 456.

12) PSCHLINUS apud FR. HOFFMANN.

13) SYDENHAM l. c. p. 91.

14) Idem l. c. et quidem vel in matibus, hystericarum instar.

15) R. J. CAMERARIUS diss. de diabete (!) hypochondriacorum periodico. Tubing. 1696.

stranguria, aut comparente ad faciem hydroa, plurima mala evanescent, aliaque, aut minore gradu, manent. Morbo enim jam jam inveterat nunquam recte se habent hypochondriaci. Mala perseverantia spectant dolores, varia in loc et praecipue in caput ¹⁶⁾, irruentes, debilitas praesertim pertinax alvi obstructio, haud raro hebdomadas, menses ¹⁷⁾ protracta, cum faecibus aut ita induratis, ut digitis, vel instrumentis extrahi debeant, aut muco ductili, gelatinoso ol ductis ¹⁸⁾. Sociae crebro fiunt haemorrhoidae nunc coecae, nunc, at non semper ¹⁹⁾, cum levissime fluentes. Urina mox crassa, cum sedimento lateritio et pellicula iridis colores ludente, aliquando nigra ²⁰⁾, mox frigida ²¹⁾, mox alimentorum

come

16) B. GULLMANN cephalalgia gravis hypochondriac febre anomala pertinacissima stipata tandemque feliciter expugnata. Acta acad. nat. cur. Vol. V. p. 143.

17) SALMUTH (cent. I. obs. 24) obstructionis alvinae per dimidium annum durantis meminit.

18) KÄMPF *neue Methode*, p. 3. G. F. HILDEBRAND *Geschichte der Unreinigkeiten im Magen und den G. d.ärmen*. Braunschw. 1789. Th. 1. §. 350.

19) Sic FR. HOFFMANN (diss. c.) contra STAHLIUM judocuit.

20) J. P. EBERHARD hypochondriaci excreta omnia nigra. Miscell. acad. nat. cur. dec. I. ann. 1. obs. 6 (et semen hio nigrum fuisse fertur). Ann. 2. obs. 62 schol. S. LEDER de singulari in hypochondriasi symptomata. Ibid. Dec. III. ann. 9. 10. obs. 69. Hypo

comestorum indolem exhibens²²⁾. Haec plerumque fermentationi veluti acidae subijciuntur²³⁾. Redeuntibus pluries supra descriptis paroxysmis, aeger, jam habitum specificum, vix verbis describendum, luridum, oculis in orbitis profunde locatis, adeptus, a consideratione conditionis suae plane absorbetur, ac proprium crebro explorans pulsum, in statum omni commiseratione dignum²⁴⁾ incidit. Enimvero ab uno ad alterum medicum aut agyrtam se convertit, re vera nulli fidem tribuendo, ac nullius praeceptis diu obtemperando. Si illi reditus prosperae valetudinis praedicatur, indignatur, alias in desperationem incidit. Quamvis peculiari eloquentia medica²⁵⁾ dotatus, attamen metu quid obliviscendi percussus, schedulae ope,

chondriaci cujusdam urina nigra mihi in scribendo atramenti locum tenuit.

22) *Miscell. acad. nat. cur. dec. II. ann. 4. obs. 140.*

23) *Fouacroy élémens de chimie et d'hist. nat. T. 10. p. 99.*

24) Acida primarum viarum inter constantia hypochondriasis symptomata jure refert HILDEBRAND l. c.

25) Via malorum, quibus talis miser premitur, ex eo elucet, quod superveniente morbo aliquo acuto, hypochondriasis curriculum suspendente, etiamsi dolorifico, aeger tamen libentius illum, quam habituale malum perferre est paratus, — quod pluries observavi. Cfr. REVILLON l. c.

26) Praesertim feminae complicationem hysterae cum hypochondriasi exhibentes, eloquentia hac medica, excellere solent.

ope, observationes, quaestiones, dubia continetis, memoriae succurrit. Librorum medicorum studio deditus, morbos, de quibus legit et audire hos ipse jam possidere mox autumat. Effectum pharmacorum omnis generis vituperare est solitum a tonicis enim irritari, a refrigerantibus debilitari et ab evacuantibus exhausti fatetur. Alii cubiculum proprium multorum annorum curriculo non deserunt, fenestras aperiri nunquam permittunt vel et diu noctuque transpirationis fovendae gratia lecto incumbunt, alii faeces strictissimo examine subjiciunt, gustant²⁶⁾, medico e longinquo affertunt²⁷⁾, vel alias actiones nauseantes committunt²⁸⁾. Hallucinationes hypochondriacorum, praestante ceterum rationis usu, aliquando eum attigit

26) Commilitonem hypochondriacum habui, asserente sibi periculum febris biliosae imminere. Suscitatus, causam talis praesagii indicaret, respondit; nam faeces meae a nonnullis diebus plus solito sunt amarae.

27) Hypochondriacus, alto loco natus, ad Lithuaniae confinia habitans, medicum suum in Borussia degentem omni hebdomada cum vasis faecibus suis replere adire erat solitus. Quamvis haec vasa in curru, per liari artificio recondita fuerint, attamen ad confinia quae Lithuaniam a Borussia separant, perducta, pollicanorum, utpote mercium prohibitarum suspicionem alentium, attentionem minime aufugerunt. . .

28) Hypochondriacam Viennae novi, cibos solum rusticantem, succum extractum deglutientem ac rejectum caput mortuum medico, ut illud probe examinaret committentem.

gunt gradum, ut se habere imaginentur calculum in vesica urinaria ²⁹⁾, foetum in utero ³⁰⁾, rabiem caninam ³¹⁾, luem veneream, polypum in corde ³²⁾, viscera vacua ³³⁾ etc. Sunt qui foetorem perpetuum

29) HERN. AB HERN (observat. oppido rar. obs. 27) a tali aegro quæsit, quisnam calculosum eum judicaret? Indignabundus respondebat: egomet ipse. Nec ulla persuasione a concepta ista opinione dimoveri potuerat.

30) HOCHSTEDERUS dec. VI. consil. 4. KLEIN in HUYSLAND'S Journ. der pr. Heilk. 1815. Septbr. p. 65.

31) Autumno ann. 1815 vir nobilis, a lupo rabido morsus, hydrophobiâ in clinico meo obiit. Consanguineus illius, hypochondriacus, qui aëgroto administraverat, aquam illico abhorreere incipit, se eodem morbo laborare sine spe contendens. Opti larga porrecta dosi, somnus plurimarum horarum imaginationem placavit. OSBONVILLE infeliciorum fuisse, ex illius biographia, in *Magazin encyclopédique* (Vol. 2. 1816) recensita, apparet.

32) CH. R. HAWKES de gravi affectione hypochondriaca periculum vitæ minante, et falsa imaginatione polypi cordis. Nova acta acad. nat. cur. Vol. V. p. 64.

33) Judæa 56 annorum, mercatoris officio sagaciter fungens, ab initio anni 1816. ad proximum mensem Junii, præter symptoma consueta hysteriæ et hypochondriasis, sensum ac si nonnullæ corporis sui partes vel vasuæ essent, vel labi vellent, experitur. Mentis omnino compos, ac fallaciam perceptionis plane noscens, nihilominus continuo exclamat: caput mihi vacuum, — capite destituta sum, — dentes mihi labuntur, — (varias corporis partes indicando) — hic omnia aperta sunt. Cutis, quæ illi etiam decidere videtur,

tuum percipiant ³⁴⁾, suntque qui tactum duplicem experiantur ³⁵⁾. Ad realia mala pollutiones nocturnae, vel immodicum veneris desiderium ³⁶⁾ spectant. Accedit idea impotentiae ad coitum ³⁷⁾. Generatim hypochondriaci sub quocunque negotio, etiamsi bene procedente, haesitare solent ³⁸⁾. Aegre ferunt congregationes hominum, ut in ecclesiis ³⁹⁾, comitiis, theatris, nec non conspectum regum, principum ⁴⁰⁾. Sunt, qui nium quid sive incongrui,

sensu perfecto instructa est. Acies oculorum potius aucta, Auditus normalis. Ita sapor. Dum autem aegra comedit, sensum alimentorum ad os sacrum usque cadentium percipit.

34) MORGAGNI de sed. et caus. morb. epist. XIV. No. 28.

35) EBERHARDUS in Nov. act. acad. nat. cur. Vol. III. p. 348.

36) Hypochondriacos venere maxime gaudere, jam MANCURIALIS (lib. I. de capit. affect. c. 10) testatur.

37) Quid imaginatio in impotentia virili excitanda valeat, P. IV. Vol. II. sect. I. cap. de impotentia virili demonstrabitur.

38) E. c. sub medio orationis publicae. J. DE MURALTRO affectus mirachialis in theologo, qui timore quodam inassueto, dum cathedram conscenderet, percellabatur, et tremore membrorum afficiebatur, curatus acidulis et pulvere Bircmanni. Miscell. acad. nat. cur. dec. II. a. 8. 1689. p. 16.

39) C. SCHRÖTER de muliere pagana hypochondriscomelancholica, quae ad templi sacrae ac appropinquare non audeat. Miscell. acad. nat. cur. dec. III. a. 5 et 6. 1697 et 1698. p. 550.

40) Nonnullos noseo, qui tali oblata occasione a lipothymiae imminenti sensu corripiuntur.

grui, sive periculosi perficiendi, experiantur ⁴¹⁾. Alii a timore maniae, apoplexiae auguntur, aut mortem determinato et praedicto die expectant. „Ast! quis potest omnia ac singula hypochondriacorum symptomata recensere, quae quot adoriuntur individua, tot fere diversas ludunt tragoedias“ ⁴²⁾.

2. Cadavera hominum, saltem pro hypochon- Necro-
driasi habitorum, exhibuerunt ⁴³⁾ cerebrum ni- scopia.
grum ⁴⁴⁾, steatoma in eo ⁴⁵⁾, vitia cordis vaso-

Q q 2

rum-

41) J. A. MERCKLIN de melancholia hypochondriaca cum horrendis tentationibus et insidiis diabolicis. Miscell. acad. nat. cur. dec. III. a. 5 et 6. p. 663. REIL und HOFFBAUER *Beiträge zur Beförderung einer Kurmethode auf psychisch. Wege. Halle 1812.* 1. B. p. 586. REIL *Rhapsodien* p. 309. Coquum hypochondriaci laborantem curavi, qui aliquoties, dum maximo quodam cultro ad labores suos perficiendos utebatur, id ob metum sibi ipsi injuriam inferendi, rejiciebat. Barbitonsor Viennae consilium meum impetravit, asserens se in officio suo exercendo saepe nism experiri clientibus suis gulam rescindendi.

42) FR. HOFFMANN med. rat. syst. l. c. §. 3. LORW DE ENSFELD diss. Protens medicus, varia morborum facies efformans, seu affectio hypochondriaca. Prag. 1708.

43) NAUMBURG *Sessions-Geschichte eines Hypochondristen. Museum der Heilk. B. 4. p. 47. LINDT Krankheits-Geschichte, Tod und Leichenöffnung eines Hypochondristen. Ibid. B. 3. p. 215.*

44) PAULLINI in Miscell. acad. nat. cur. dec. II. ann. 6. append. p. 37.

45) STRAUSS diss. de aegro affectu hypochondriaco capitique steatomate laborante. Giess. 1883.

rumque majorum ⁴⁶⁾, scirrhum pylori ⁴⁷⁾, morbos hepatis ⁴⁸⁾ (rarius tamen quam credebatur ⁴⁹⁾), lienis ⁵⁰⁾, pancreatis ⁵¹⁾, intestinorum ⁵²⁾, omenti ⁵³⁾, venas portarum amplissimas ⁵⁴⁾ et meseraicas instar intestini dilatatas ⁵⁵⁾, varicosas ⁵⁶⁾ et sanguine viscido repletas ⁵⁷⁾.

§. LXXIV.

C a u s s a e.

Praedis-
p. et occa-
sion.

1. Hypochondriasi ansam porrigunt: vitium hereditarium ¹⁾, aetas inter annum vigesimum et

46) ZACCHIAS lib. III. c. 15. LIEUTAUD hist. anat. med. lib. II, obs. 795.

47) HOCHSTEDERUS dec. V. p. 502. 588. BONET sepulchr. lib. I, s. 9. obs. 18.

48) LIEUTAUD l. c. lib. I. p. 135.

49) HARTMANN diss. de liene in lienosis saepe insoute. Francf. 1791.

50) BLASIVS in Comment. in VESLINGIUM p. 67.

51) SWALWE pancrene. Amst. 1668. p. 194.

52) Eph. nat. cur. dec. I. ann. 4—5. obs. 192. dec. II. ann. 6. obs. 132. cent. I. obs. 20.

53) BONET l. c. obs. 20.

54) LIEUTAUD synop. prax. med. p. 91.

55) GAURINONIUS consil. 484. KUPFER diss. de volvulo sanguineo. In HALLERI collect. disp. med. pract. Vol. III. p. 374.

56) LUD. MERCATUS T. III. lib. 1. cap. 17.

57) RHODIUS cent. II. obs. 76. BONETUS sepulchr. T. I. p. 226.

1) CHR. M. ADOLPHI de malo hypochondriaco haereditario. Ephem. acad. nat. curios. cent. 5 et 6. p. 171.

et quinquagesimum, educatio cum nimia sanitatis sollicitudine ²⁾, morbi hypochondriaci in aliis adspectus ³⁾, diuturna in nosocomiis mora ⁴⁾, aegritudines chronicae ⁵⁾, febres intermittentes ⁶⁾, dysenteriae ⁷⁾, morbi cutanei neglecti maleque curati ⁸⁾, inprimis abusus cinchonae ⁹⁾, opii, adstrin-

FA. HOFFMANN med. rat. syst. l. c. §. 19. Observavi praeterea prolem matrum hysteriarum dispositionem ad hypochondriam agnoscere.

- 2) Dum parentes, ob minima licet infantum incommoda, tumultum max faciunt, ad querelas eos cogunt, eorumque attentionem continuo in propriae valetudinis conditionem dirigunt; talis proles vix hypochondriacum evitabit malum.
- 3) Juvenes dispositionem ad hypochondriam habentes, cognovi, qui eam amiserunt, commutato institutore hypochondriaco cum alio, serena mente praedito.
- 4) Rusticos, milites, operarios aliosque, munera prius in aëre aperto perficientes, a protracta mora in nosocomiis, e. c. ob vulnera, fracturas ossium, psoram etc. hypochondriacos redditos fuisse, plus vice simplici vidi.
- 5) Consuetudo morbum proprium diu observandi, vel eo fugato, imperium suum in corpore sanum exercet.
- 6) Legatur de hoc memorabili argumento: OETHAUS apud SCHENK lib. I. obs. 6. ETTMÜLLER de abusu praecipit. c. 3. §. 5. HORST lib. X. obs. 28. p. 189. FA. HOFFMANN l. c. obs. 1.
- 7) Praegressa dysenteriae epidemiis, hypochondriasis frequentius obvenire solet.
- 8) „Ex causis praeternaturalibus considerationem potissimum merentur praegressi morbi incongruis medicamentis adstringentibus, opiatibus, narcoticis perperam ac praepostere curati.“ HALLEN l. c. §. 21.

adstringentium ¹⁰⁾, purgantium ¹¹⁾, mercurii ¹²⁾, venena ¹³⁾, balnea frigida ¹⁴⁾, haustus aquae glacialis ¹⁵⁾, liquores fortes ¹⁶⁾, cibi flatulenti ¹⁷⁾, pingues, nimii, praesertim in convalescentia ¹⁸⁾,

mos

9) Porrige haemorrhoidario corticem, et facile fiet hypochondriacus.

10) E. c. in diarrhoeis, fluore albo.

11) SCHARFFER in HUFELAND's *Journ. der pr. Heilk.* 1816. *Mat.* p. 29.

12) Post curam mercurialem plures hypochondriacos factos vidi. Forte ex irritatione hepatis, a stimulo specifico hydrargyri? quandoque ex salivae jactura. Cfr. J. J. W. DOBRZENSKY DE NEOROPONTE illustrissimi hypochondriaci mors misera ob inunctione mercuriali, cum observat. Ros. LENTILII. *Miscell. acad. nat. cur.* dec. I. a. 1. 1670. dec. II. a. 10. 1691. append. p. 54.

13) Fere omnes, quos a deglutitia venenis mineralibus liberare potui, hypochondriaci evasere. Cfr. G. N. HILL *osservazioni sull' uso e effetti dell' arsenico preso internamente. Giornale della soc. med. chirurgica di Parma, Vol. 9. p. 289.*

14) Saltem in praedisposito, paroxysmum hypochondriacum a balneo fluviali excitatum vidi.

15) BOHNIVS lib. I. de affect. med. dupl. c. 7. p. 152.

16) Centurionem militum curavi, prius sobrium et perfecta sanitate gaudentem, qui cum ann. 1814. Carlsruhi, ad diem festivum Imperatrieis suae celebrandum, a sociis largam punch calidi copiam ingurgitare coactus fuerit, extemplo in rebellem hypochondriasin incidit.

17) BLANGARDO (P. II. *Prax.* c. 61), et cibos acidos adenti, experientia aliter edoctus, haud assentior.

18) Memorabilis FR. HOFFMANNI observat. diss. cit. §. X.

mos pravus celeriter comedendi, cibos non satis manducandi, consuetudo tempore pastus legendi, cibosque cum literis devorandi, mellea scitamenta ¹⁹⁾, jejunia ²⁰⁾, vita sedentaria, imprimis flexo anterie corpore ²¹⁾, quies repentina post motum ²²⁾, regimen claustrale ²³⁾, caelibatus ²⁴⁾, exercitium medicinae ²⁵⁾, scriptio ²⁶⁾ et lectio libro-

19) Quae dulcis fallacia, tyrannis gulae grata, sed sanitati noxia, imprimis si larga manu sumantur.

20) Jndaei Lithuani haud raro hac ex causa insultus hypochondriacos patiuntur.

21) Fm. HOFFMANN l. c. obs. 5. Hypochondriasin morbum scribarum, lasorum, sartorum, antorum etc. esse, constat. „A situ corporis antroreum incurvato et a fibulatois ad abdomen arete adplicatis, hoc valde comprimitur. Hinc constat ratio, cur litterati, aut alii, qui circa negotia sua in situ corporis incurvato deprehenduntur, hypochondriaci sunt.“ BÜCHNER diss. therap. §. 3.

22) Milites qui bellum conficiendo hibernant, aut ex officio militari ad civile transeunt, egeri, derepente divites facti, reduces ex itineribus, denique ii, qui exantatis laboribus otio cum dignitate frui optant, saepe in hypochondriasin incidunt.

23) Jsm C. PISO (de serosa colluv. p. 241) hypochondriasin pro morbo presbyterum declarat.

24) Cum hypochondriasis frequentissime inter caelibatarios obveniat, ea pro peculiari punitione egoismi nuptias avertantis haberi posset.

25) Quid miri, si notio morborum regnantium, si continua circa morbos aliorum sollicitudo, si observatio malorum maximorum ex minimis aliquando incom-

librorum argumenti medici²⁷⁾, intensio mentis²⁸⁾, taedium²⁹⁾, philautia et vita luxuriosa³⁰⁾, morsus conscientiae, animi scrupuli³¹⁾ aliaque pathemata diu

pro-

modis evolutorum, si exempla mortis repentinae, forteque ipsa sympathia, medicos hypochondriacos reddet?

26) Heud vero medicus auctor, morbum, de quo scribere intentus est, ipse hebra credit.

27) Inter multe alia medicinae popularis detrimenta et istud pertinet, quod hypochondriasi anse porrigitur.

28) Haec causa multas alias entecellere solet, imprimis si contemplatio circa objecta abstruse versetur. Sic judaei Lithuani saepius per studium *Talmudi*, imprimis *Gomarae*, hypochondriaci evadunt. Quam recte hinc dicit WENZEL (*Versuch einer Seelendiätetik*, Gräts 1801. p. 37) asserens: „Nichts schadet der Seele und dem Leibe mehr als übermäßige, regellose Anstrengung der Geisteskräfte, zumal wenn sie mit andern schwächenden Einflüssen verbunden ist, oder der Betreffende mit geringen Talenten versehen, sich dadurch mit Gewalt zum Gelehrten machen will.“

29) E. o. vita ruralis in adsuetis urbi.

30) Dum res ad vitam sustinendam sese quasi homini ultro exhibent, dumque omnis generis voluptas exhausta est, tote attentio in proprium dirigitur individuum, et hypochondriasis basis ponitur.

31) „Iidem huc pertinent, qui e teneris severioris disciplinae ac religionis praeceptis imbuti, obsque rectiore boni melique judicio, omnia tuta timent, perpetuis animum scrupulis flagellant, hominum consortie fugiunt, etque nonnisi propriae imaginationis ideis, ac aetherum vigore imaginum pascuntur, quem nec doctoris demum theologi consilii deleant.“ GATTENHOFF l. c. §. 9.

protracta³²⁾, aut superata³³⁾, venus nimia³⁴⁾, onania³⁵⁾ et tandem atmosphaerae conditio inconstans, frigida³⁶⁾, humida, qualis vere et autumno est, inprimis si plurimae allatarum causarum invicem concurrant³⁷⁾.

2. *Causa proxima* hypochondriasis quaere- Proxima.
batur in atra bile³⁸⁾, in hepate plus justo calido et liene debili³⁹⁾, in vitiis venae portae, arteriae coeli-

32) Recentiores auctores de hoc argumento pulchrius non scripserunt, quàm HORSTIUS (lib. IV. p. 194) at PACHLINUS (obs. 84. p. 71). Inter illos lege ZIMMERMANN von der Erfahrung B. 2. p. 480.

33) Qui ex violento amore convalescit, vacuum, facile a malo hypochondriaco replendum, percipere solet.

34) Adeas, quaeso, MARCAND Beschreibung von Pyrmont B. 2. p. 234.

35) Causa haec reliquas, quot quot sunt, superat.

36) FR. HOFFMANNO tamen non assentire audeo, utpote qui hypochondriasin pro morbo in Germania at septentrione frequentiore, quam in Gallia et Italia declarat. Cfr. LUDOLFF diss. de malo hypochondriaco-hysterico incolis Saxoniae inferioris proprio. Erf. 1725.

37) „Equidem experientia doctus propria mihi persuasum habeo unicam aliquam harum causarum haud facile morbum hypochondriacum producere, sed necesse esse, ut illarum plures accedant ad illius generationem.“ SEYFFERT l. c. p. 12.

38) GALENUS de locis affectis lib. III. c. 7. Cfr. SWIXTAN comment. in Aphor. BOERHAAVE T. III. de melancholia.

39) HORSTIUS op. c.

coeliacae et vasorum meseraicorum ⁴⁰⁾, in tartaro ⁴¹⁾, in ataxia spirituum animalium ⁴²⁾, in spasmo tubi alimentarii ⁴³⁾, in labefactione ventriculi ⁴⁴⁾, in vitio hypochondriorum ⁴⁵⁾, in phlogosi membranae mucosae intestinalis ⁴⁶⁾ etc. ⁴⁷⁾. Ad nos quod spectat, hypochondriasin pro morbo universi systematis nervosi, sese praecipue in gangliis abdominalibus ⁴⁸⁾, plexibus cardiacis et cerebro ⁴⁹⁾, modo cultro anatomico haud demonstrando, exserente, habemus, in quo morbo sen-

sus

40) SENNET l. c.

41) Chemicorum antiquiorum secta, unde morbum *tartarum hypochondriacum* vocarunt.

42) SYDENHAM l. c. 43) FR. HOFFMANN ll. cc.

44) HIGHMOR l. c. CORRING l. c. WEDEL l. c.

45) FERNELIUS lib. VI. de part. morb. et sympt. c. 7.

46) FR. HOFFMANN l. c. (aliquando). BROUSSAIS (semper).

47) NEGROFONTE analogia terrae motus, anno elapso in Tyrole facti, cum hypochondriacis. Miscell. acad. nat. cur. dec. I. a. 2. 1671. p. 123.

48) „Patet, malum hypochondriacum in toto equidem genere nervoso et fibratum muscularium systemate residere, maxime tamen primas vias occupare.“ BÜCHNER diss. de vero ortu . . §. 4.

49) Crederetne FALRET (l. c.) reversa se novi quid dixisse, ubi post WILLISIIUM (l. c.), BÜCHNERUM (l. c.) aliosve ait: „*Prèsque toujours le cerveau est primitivement affecté dans l'hypochondrie, très rarement la lésion d'un autre organe peut en être regardée comme la cause éloignée.*“?

sus universalis internus⁵⁰⁾ ita laeditur, ut impressiones morbosas sensorio communi committat, unde aeger de mutationibus in corpore suo contingentibus falsas accipit notiones, a perceptione ingrata concomitatas, quibus propius eruendis attentionem omnino impendit, at impedito sensuum externorum, quatenus agitur de objectis internis, auxilio, et vitiata simul imaginatione, quin falsas illas notiones corrigere valeat, quamobrem aucto potissimum in encephalo malo, viscera, quae inde nervos accipiunt, praesertim cor, hepar, lien, ventriculus et intestina, tonum amittunt, functiones perverse absolvunt, et tandem corrumpuntur, quod efficit, ut intricatissima aliunde aegritudo in mala adhuc longe graviora convertatur.

§. LXXV.

Diagnosis.

1. Si admittamus, hypochondriasin in hallucinatione sensus universalis interni (coenaesthesia) ^{Genera-} et in vitio imaginationis consistere; sequitur, ^{tim.} neminem pro hypochondriaco declarandum esse, cuius sensus universalis internus realia mala denunciat et cujus iudicium de perceptionibus suis morbosus rectum est. Quum vero haud pauci dentur morbi, quorum praesentia (inprimis dum eorum forma

50) HAFNER I. C. M. E. A. NAUMANN *einige Bemerkungen über das Gemeingefühl im gesunden und krankhaften Zustande. Leipzig, 1824.*

forma necdum ita evoluta est, uti ea in libris et scholis medicis depingi solet ¹⁾), vix aut ne vix quidem in sensus medicorum cadit, ac igitur per aegrorum tantum enarrationem cognosci potest, facile fit, ut istorum querelis nulla fides tribuatur, et res imaginationi adscribantur, quarum existentia adhibita majori diligentia aut doctrina erui potuisset. Humanitatis hinc nomine exigimus, ne hypochondriasis diagnosis oscitanter et temere instituitur ²⁾. Cavendum quoque ne recondita animi pathemata praetervideantur.

Larvae
morb.
hypo-
chondria-
cae.

2. Morbi frequentissime *sub larva hypochondriasis* obvenientes sunt vitia organica cerebri ³⁾ et

1) Vix auctorem, vixque professorem inveni medicum, qui morborum imagines vividis nimis coloribus non pingeret. Fit inde, ut morbi saepe non cognoscantur, nisi maximum illum gradum, qui oblatae imagini respondet, attingant. Hoc cum haud crebro accidat, nonnulli morbi rariores existimantur, quam revera sunt. Sic legas velim descriptionem *gastritidis*, sicuti ea in compendiis obvenit. Dic nunc, quoties in vitae tuae curriculo talem morbum vidisti? Forte bis, ter, forte semel aut nunquam! attamen inflammatio ventriculi, uti reliquiae illius testantur, haud rara est.

2) Juvenis medicus, in hypochondriasi stabilienda facillima, hunc morbum vulgatissimum reputavi. Modo quum multum studii antequam aegrotorum querelas imaginationi adscribam, impendere soleam, rarius longe in hypochondriasin incurro.

3) Cfr. STRAUSS l. c. et casus cap. II. §. X. 12 (34) allatus.

et medullae spinalis 4), morbi cordis vasorumque majorum 5), tubercula pulmonum 6), calculi biliosi 7),

4) Ecclesiasticus Vilnensis, ad aspectum floridum exhibere, et continuo de laesa valetudine conquerens, ut hypochondriacus lippis et tonsoribus notus erat. Morbo vero exactius examineto, *anyclosis vertebrarum dorsii* detecta est.

5) LANCISI (de anevrysm. prop. 55. p. 82). MACKEL (*mémoires de Berlin* 1755. p. 76). CORVISART (*sur les maladies et les lésions organ. du coeur et des gros vaisseaux. Paris* 1806. p. 34). TESTA (*Ueb. d. Krankheiten d. Herzens. A. d. I. v. K. SPRENGEL. Hall.* 1813. p. 135. 173) et KREYSIG (*die Krankh. d. Herzens. Berl.* 1814. 1. Th. p. 332). pulcherrime objectum, de quo egitur, illustrarunt. Ann. 1807. Vilnae cadaver Itali ecceui, inopinete ex ruptura anevrysmetis aortae demortui, qui miser a plurimis medicis pro importuno hypochondriaco declaratus fuerat. Ceterum cavendum quoque, ne mox omnem motum inordinatum cordis aut arteriarum, saepe ex nervorum lusu venientem, pro effectu vitii organici harum partium habeamus, in quem errorem plurimi studio morborum cordis dediti, et propria edhuc experientia destituti incidere solent.

6) Plures aegros, utriusque sexus, et praesertim juvenes, pro hypochondriacis declaratos, accuratissime cum examinauerim, de praesentia *tuberculorum pulmonis* nullum remanebat dubium. Immo SAUVAGES peculiarerem speciem *hypochondriacis*, sub nomine *phthisiens*, e FRACASSINIO stabilitam, retinuit. Mirum est, et explicatu haud difficile, quod evoluta omnino phthisi pulmonali, non eolum metus hypochondriacae evanescit, sed securitas phthisicis propria oritur, quam observa-

liosi ⁷⁾, taenia ⁸⁾, scirrhus pancreatis ⁹⁾, ventriculi ¹⁰⁾, angustationes tubi alimentarii ¹¹⁾, scrophula mesenterii ¹²⁾, calculus renalis ¹³⁾, diabetes ¹⁴⁾, ne dicamus de reconditis vitiis arthriticis ¹⁵⁾, carcinomaticis, plicosis, scorbuticis et venereis,

tionem cum RILLO (*Fieberlehre* 2. B. p. 593) communem habeo.

- 7) In viginti ultra aegrotis, pro hypochondriaciis declaratis, praesentiam calculorum bilia detexi. Huc *Hypochondriasis calculosa* FRACASSINI et SAUVAGEUSII (spec. 8) spectaret, si talem morbum hypochondriasi adscribere liceret.
- 8) Compara symptomata taeeniae cum iis hypochondriaciis, et facile de errandi occasione persuasum erit.
- 9) HIGHERUS disput. anat. p. 47. HARDERUS obs. 59. p. 242.
- 10) Cfr. §. LXXIII. No. 2 (47).
- 11) In cadaveribus eorum, qui multa symptomata hypochondriaca exhibuerant, et praesertim de pertinaci alvi tarditate conquerebantur, vel et diarrhoea chronica vexabantur, angustationem unam alteramve in tractu intestinorum inveni. Cfr. ABICHT diss. de intestinorum coarctat. diarrh. chron. causa min. vulg. Vilnae 1816.
- 12) Glandulae induratae mesenterii, plexibus nervorum mesaraicorum irritationem infarendo, facile plexum coeliacum in consensum ducunt, unde plurima symptomata hypochondriaca, ast certe non hallucinationi tribuenda, originem trahunt.
- 13) MORGAGNI de sedib. et caus. morb. Ep. XXXVI. art. 21.
- 14) CAMERARIUS diss. citat. Semel ipse diabetem sub larva hypochondriasis, in judaeo, detexi.
- 15) MORELOT *observation d'une goutte consécutive, d'une*

nereis, quae priusquam formam a propria indole praescriptam induunt, saepe systemati nervoso insidias struunt, ac eam hypochondriasis speciem constituunt, quam auctores non inepte *cum materia* appellarunt.

3. Ad genuinam hypochondriasin concludimus: dum praemisso stricto ac reiterato examine neque in familia ¹⁶⁾, neque in anamnesticiis ¹⁷⁾, neque in praesentibus symptomatibus sufficiens ratio alterius aegritudinis praesentiam admittendi invenitur; dum aeger non constanter eadem mala, sed fere quoque die alia iterumque alia accusat ¹⁸⁾; dum habitus, in recenti morbo, vix laesam valetudinem indicat; dum praeter digestionem et alvinam evacuationem, functiones reliquae rite procedunt;

Notae genuinae hypochondr.

mélancolie hypochondriaque. SEDILLON *rec. périod. de la soc. de méd. de Paris.* T. 30. p. 54. *Sammlung der med. Soc. in Budissin.* p. 444. „Nec est infrequens futuros arthriticos fieri prius hypochondriacos.“ STOLL.

16) Si quis e familia descendit, in qua morbus visceris cujusdam, inprimis cordis, hepatis, uteri communis est, duplex cautela requiritur, ne incipientem forte similem aegritudinem pro hypochondriasi declaremus.

17) Quoties hypochondriasis symptomata, post morbum acutum, etiamsi adspectu levissimum, ut e. c. febris catarrhalis, colica etc., evolvuntur, fides illis minime tribuenda, ac de reliquiis hujusmodi morborum cogitandum, inprimis quatenus a praevio processu inflammatorio pendere possunt.

18) „Signorum maximum est numerus.“ MANOXT.

cedunt; dum aegrotus, mente recreatus, malorum suorum plane obliviscitur, sub taedio autem derepente in ea relabitur; dum causae aliās hypochondriasi faventes, praesertim intensio mentis, animi pathemata et onania praecesserunt, dumque aeger medicos, sine valente causa, crebro mutat,

Distinct.
a hyst.
et mania.

4. Evitato periculo, vitia organica viscerum nonnullorum cum hypochondriasi confundendi, aliud minoris quidem momenti, at semper non spernendum se offert, scilicet *hysteriam*¹⁹⁾ et *maniam*²⁰⁾ pro hypochondriasi declarandi, aut vice versa; de quo argumento infra.

Monitum.

5. Neque credendum hypochondriasin, sibi semper plane similem esse²¹⁾. Pro varia nempe aegrorum constitutione²²⁾ diversam admodum indolem

19) P. II. Vol. I. sect. II. cap. XIV.

20) Cap. XXV. §. CVI. No. 5. Sic SAUVAORESSE tam pulchre depicta *melancholia argantis*, sive *maladie imaginative* (nosol. meth. T. III. P. I. Morb. class. 8. gen. 19. spec. 4), ad hypochondriasin, sed non ad melancholiam spectat.

21) S. A. PONTICELLI *di tre spezie d'affezione isterica o ipochondriaca*. Lucca 1739. LEIDENFROST diss. de mali hypochondriaci ad minimum sextupli specic. Opuscula phys. med. Lemgo 1797. T. I. No. 4.

22) „Vidi viros lacertosos, inquit TRALLER (tract. de usu opii sect. III. p. 37). torosos, robustos, nihilominus hypochondriacos; vidi alios tenuioris corpora habitus, teneriori solidorum omnium compage praeditos, malo hoc misere afflictos; vidi sanguine et succis plenos, aequae ac macilentos ejus tyrannidem expertos;

dolem ea exhibere solet. Maxime *status hypochondriacus in corpore plethorico* medentium attentione dignus est ²³⁾. Praeter symptomata generalia hic observantur dolores ventriculi post cibos ingestos, aestuatio hypochondriorum, pulsatio regionis epigastricae, fere anevrysmata arteriae epigastricae simulans ²⁴⁾, epistaxis, rubor faciei et malarum, calores vagi, interdum vel a parva vini degustatione excitati, nec non cruciatus haemorrhoidales.

§. LXXVI.

P r o g n o s i s.

1. Malum hypochondriacum, taediosum et Pericul.
difficillimae curationis est. Viam illud arthritidi, ischiadi, calculo renum, cachexiae, scorbuto ¹⁾,
polypo

vidi satis exercitatos mobilique vivendi generi addictos; vidi sedentariam et otiosam degentes vitam, perinde aegritudine hac odiosa laborantes.“

23) *Affectus Mirachialis*, antiquorum, de quo dissertatio ann. 1734. Lipsiae edita, auctore LEMBDEN praeside ADOLPHI legenda est. Cfr. *Fracassinii hypochondriasis inflammatoria*, egregie ab ETTMÜLLERO descripta.

24) ALBERS über Pulsationen im Unterleibe. ALLEN BURNES von einigen der häufigsten u. wichtigsten Herzkrankheiten, ferner vom Anevrysmata der Brustarterie, von Pulsationen in der obern Bauchgegend etc. A. d. E. Lemgo 1813 p. 313—316.

1) GRABA diss. de affectu hypochondriaco cum symptomatibus scorbuti. Giess. 1608.

Frank Prax. II. I. 1.

R r

polypo cordis, obstructionibus viscerum abdominalium, amnesiae et melancholiae²⁾ sternit. Interdum, at non semper³⁾, adversus varios morbos, praesertim febriles et contagiosos immunitatem impertit, aut in illis sive crisin⁴⁾ sive remedinum⁵⁾ agnoscit.

Semiotica. 2. Graviorem morbum indicant: tensio hypochondrii sinistri, alvus pertinaciter clausa, urina clara, complicatio cum hysteria et aliis aegritudinibus. Urina nigra sine febre, menses et haemorrhoides moderate fluentes, morbum solvunt. Pessimis ominis sunt, vertigo, coecitas, tabes, utpote periculum apoplexiae et mortis indicantes.

§. LXXVII.

C u r a.

**Genera-
tim.**

1. Hypochondriasis, morbi delicatioris generis¹⁾, cura bifaria est: altera enim *tempus liberum*,

2) KREY diss. de connubio inter melancholiam et malum hypochondriacum. Erf. 1797.

3) MORTON de variolis, cap. 6. opp. p. 382.

4) RITTER *neue Erfahrungen über die Heilkräfte der Thermalquellen, in Wiesbaden*. v. HUFELAND's Journ. der pr. Heilk. 20. B. 3. St. p. 143.

5) HARTMANN diss. dysenteriae malum hypochondriacum solventis exemplum. Francf. 1787.

1) Pulchre SENNERTUS (diss. c. §. 131): „Verum haec omnia expedire difficillimum est. Etenim cum indicationes dentur contrariae, et quidem ventriculus plerumque debilis ... calida requirat, contra inflammatoria dispositio ... refrigerantia requirat, caute agendum, ne, dum uni prodesse studemus, alteri noceamus.“

rum, altera *paroxysmum* respicit. Generatim, monente jam MONTANO ²⁾, „in curatione illius non licet praefinire tempus unius mensis aut anni sicuti in aliis morbis contingit, sed oportet in toto vitae tempore curationi operam dare.“ Quocunque in casu primum est causas morbi, de quibus aegri non semper conveniunt ³⁾, quoadusque fieri licet, remove, ac perpetuum sibi praefigere vitae regimen.

2. Suadendum hinc est hypochondriacis, ut Vitae re-
moderate studiis iisque selectis ⁴⁾, si liceat, in aëre ⁵⁾ gimen.
libero ⁶⁾ incumbant, — ut honestum otium ani-
mique recreationem non vilipendant ⁶⁾, — ut

R r 2

sint

2) Conseil. No. 230.

3) „La première difficulté, qu'on a à vaincre avec les gens de lettres, quand il s'agit de leur santé, c'est de les faire convenir de leurs torts.“ TISSOT l. c. p. 13.

4) LUDWIG diss. de contentione studiorum moderanda. Plurimis adaptari potest, quod TISSOT de eruditio nonnullis dicit: „espèce d'hommes, qui, attachés à l'ouvrage comme le manoeuvre à sa bêche, pourroient être comparés à quelques Fakirs des Indes; comme eux ils se séparent du genre humain, comme eux ils se macèrent de plein gré, sans que souvent il en revienne le plus léger avantage à la société.“ l. c. p. 64.

5) Ait PLINIUS junior: „animus eorum, qui in aperto aëre ambulans, attollitur.“ Et TISSOT: „Souvent même c'est au milieu des délassements, que naissent les idées les plus heureuses et c'est en se promenant à la campagne, qu'un des plus beaux génies de ce siècle a composé ses immortels ouvrages.“

6) SENECA (de tranquillitate vitae) inquit: „Enim ad-

sint contenti sorte bonisque in se collatis⁷⁾; — ut corpus debito modo exercent⁸⁾, et quidem deambulatione, vectione in curru inprimis equos gubernando, equitatione⁹⁾, quae omnia in locis amoenis¹⁰⁾, citra defatigationem¹¹⁾, absente vento¹²⁾,

modum fertiles egri perpetuo et sine intermissione agricolis inservire non possunt, ita assiduus labor animam turbat, ejusque vires justo citius exhaurit.“ Eleganter VALERIUS MAXIMUS (lib. III) ait: „Danda est remissio animis; meliores alacrioresque requieti surgunt.“ Nec minus eleganter dicit RAVINUS: „utilissimum et necessarium ad sanitatem servandam his est, non raro museum cum palaestra, pennam cum gladio aut reticulo, libros cum pila, sellam cum equo, otium cum saltu mutare“ (de agrest. vitae sanitate, disput.). Cfr. FR. HOFFMANNI tractatus: de studiis per regulas dietet. facilitand. p. 53. et TISSOT l. c. p. 133.

7) Quod sis, esse velis nihilque malis. MARTIAL.

*Statt ängstlich deine Uhr zu richten und zu putzen,
Zu späh'n, ob jedes Rad leicht in das andre greift,
Und fret am seine Spindel läuft,
Ermanntre deinen Geist, den Augenblick zu nutzen,
Der Zeit, die dir vorüberschweift,
Die schnellen Fittge zu stützen.*

THÜMMEL's Reisen in das mittägige Frankreich.

Th. 7. p. 92.

8) GALENUS de tuenda valetudine. MERCURIALIS ert. gymnastic. aliiq. infra recensendi.

9) SYDENHAM opusc. med. cap. VII.

10) Hinc GALENUS (l. c. lib. I): „omnia optima sunt exercitiis, quae non modo totum corpus exercent, verum etiam animum oblectare possint.“

to ¹²⁾, habitaque ratione pastuum ¹³⁾ peragenda sunt; — porro itineribus, maxime maritimis, item natatione ¹⁴⁾, culturâ hortorum, excursionibus botanicis, zoologicis, mineralogicis, laboribus agrariis, venatione ¹⁵⁾, sphaeromachiâ, pila, conorum lusu, decursione ad annulos, quintana ¹⁶⁾, exercitiis militaribus etc. Hiemali tempore commendanda vectio in traha, exercitium artium mechanici-

11) Recte ARISTOTELIS monet: „qui exercitio utitur, caveat lassitudinem.“ Cfr. CILIVS lib. I. c. 2. Notari etiam merentur NANTERII verba, „quies post motum fortiosem non statim suscipiatur“ (fund. med. P. I. p. 224). Quam cautelam aurigae observant, dum equos celerrimo cursu defatigatos, non stabulo illico includunt.

12) SANCTORIUS (med. stat. aph. 25. sect. V) decrevit: „exercitium violentum, ubi spirat ventus, malum.“

13) „Post coenam stabis, aut passus mille mesbis.“ Et SANCTORIUS (l. c. aph. 6): „corpora, quae a nimio exercitio illico cibantur, laeduntur.“ Cfr. Diss. PLAZII de usu med. exercit. corp. Lips. 1726.

14) Si aeger debilis et arthriticus fuerit, in aqua subcalida. v. CHR. LANG de thermis carolinis. p. 253. et PLAZ l. c. p. 72.

15) DOLANUS (encycl. med. p. 54) venationem ut efficacissimum remedium ad phantasticas imaginationes dissipandas, commendat.

16) *Traité des tournois, joutes, carrouzels et autres spectacles publiq.* — GUTSMUTHS *Gymnastiâ für die Jugend* 1793. Eiusdem: *Spiele zur Übung u. Erhol. d. Jugend.* 1796. et VIETH de eodem argumento. ELIAS'S *Anfangsgründe d. Gymnast. od. Turnirkunst.* Bern 1816.

chanicarum, corporis motum exposcentium, ut tennatoris, ludi idem efficientes, ut sphaeristerium¹⁷⁾, armorum agitatio, choreae¹⁸⁾, tandem oscillatio¹⁹⁾, lecti pensiles²⁰⁾, cantus²¹⁾, tractatio instrumentorum musicalium²²⁾, circulum sanguinis exagitantium, lusus scenici²³⁾, spectacula, imprimis comoediae²⁴⁾, lectio²⁵⁾ librorum animum exhilarantium²⁶⁾

17) *Le noble jeu du billard.*

18) „Non solum autem corpori choreae, sed et animo optimam offerunt medicinam, dum hilaritatem et oblectamentum conciliant, ita ut optimo jure iis commendari queant, qui ex phantastica imaginatione aegrotant.“ PLAZ I. c. p. 31.

19) Decumbat aeger super asserem longum, extremitatibus ambabus firmatis, ac auxilio famuli depressum propriaque vi elastica redeuntem. Possunt adulti et cunis, eorum longitudini accommodatis, uti.

20) Cfr. cap. VII. §. XXXV. 10.

21) De cantus vi in corpus humanum legantur PACHLIMUS (lib. III. obs. 29), RODERICUS A CASTRO (med. polit. lib. IV. c. 16) qui ait: „quo facilins itineris molestias ferat vistor, cantat; carceris taedium captivus musica lenit: et nauta symphonia modulatur, ut maris metum depellat.“ Unde etiam dictum: „onera portantes, si cantant, minus molestiam sentiunt,“ quod a vulgo Rossicorum, omnia fere munera cantando perficiente, probatur.

22) Musicae in hypochondriasi effectus describuntur in Miscell. acad. nat. cur. dec. II. a. 1. p. 4.

23) Optimus modus aerumnarum obliviscendi is est, alieni hominis actiones imitari, cui scopo quondam convivia regalia (*Wirthschaften*) inserviebant.

24) Auctosibus MOLIERE, REONARD, DESTOUCHES, MA-

rantium²⁶⁾ et cachinnos commoventium²⁷⁾, lusus
mode-

RIVAUX, PICARD, FAVART, FABRE D'EGLANTINE,
DUMOUSTIER, COLLIN D'HARLEVILLE, GOLDONI,
KOTZEBUS, NOTA, SCRIBE etc.

25) . . . tu solatia praebe;

Tu curae requies, tu medicina venis.

OVID. lib. IV. trist. eleg. X.

26) En elementa pro bibliotheca antihypochondriaca. Il
Decamerone del BOCCACCIO, l'Orlando fur. dell' ARIO-
STO, la sceschia rapita del TASSONI, il Riccardotto del
FORTEQUERRI, l'Orlando inamor. del BERNI, la Cic-
ceide del LAZZARELLI, Bertoldo, Bertoldino e Caca-
senno, il Malmantile racquistato del LIPPI, I raggu-
agli di Parnasso del BOCCALINI, gli Epigrammi del PA-
NANTI, la Corneide di GAMERA, le favole del PIGNOT-
TI, gli animali parl. del CATTI, — Pills to purge me-
lancholy, Tristram Shandy, Lousiad, Bozzy and
Piozzi, Pindariana, Love's vagaries, Crazy tales
for grown gentlemen, the Rivals, School for scandal,
Founding hospit. for wit, Gretna Green, the Irish-
man in Spain, Rule a wife, and have a wife, the
Dramatist, — Les essays de MONTAIGNE, les satyres
de BOILEAU, Gilblas de Santillane p. LE SAGE, les
mille et une nuit, traduit de l'arabe p. A. GALLAND,
les oeuvres de PIGAUT LE BRUN, la bibl. univers.
des romans, composée p. une société de gens de lettres. —
RABEN'S Satyren u. Briefe. WIELAND'S poet. u. pros.
Werke. Etn komisch-humoristisch satirisches Quodli-
bet. Halberst. 1825. — Jana KOCHANOWSKIEGO Pieśni
i Frazski. Antypasty matieskie. MAURYCYSZA
TEZYPRZYCKIEGO dwor mający w sobie osoby i
mózgi rozmaite. Furfanterye Polska. ACHAREGO
KMITY Spittamegeranomachia i List od żydów do mer-

moderatus latrunculorum aut alea, et quocunque in casu societas hominum mente hilari lactaque praeditorum ²⁸), praesertim epulando ²⁹). Quae singula

syssa. ZABLOCKIEGO Dzieła teatralne. X. BAKI Uwagi o śmierci niechybnej, przedrukowane w Wilnie 1807. Dzieła KRASICKIEGO. Pisma horoi - komiczne WAORIEWSKIEGO i KNIASZINA.

27) De efficacia risus in hypochondriasi legantur: ROMMELIUS in Act. nat. chr. dec. II. a. 8. obs. 176. CAMERARIUS syllog. memor. p. 63. ALBERTI diss. de risus commodo et incommodo in oeconomia vitali. Hal. 1746. PECHLIN obs. p. 464. Summus princeps, Petrus M., paroxysmis mali hypochondriaci obnoxius, illico ab iis liberabatur, dum ad risum commoveri potuerat, quo in negotio sannio aulicus, Bala-kirjew, excellebat. v. *Neue Anekdot. v. Peter dem Grossen, gesammelt v. GOLIKOW. No. 119. In Eph. germ. dec. II. ann. 1 et 2. de quodam musico gravissima hypochondria cum melancholia correpto, narratur, cui pharmaca cuncta respuenti et nihilominus anxio ea poscenti, medicus cantici illius ecclesiastici „vom Himmel kam der Engel Schaar“ clausulam, quae sic sonat: „geduldig, fröhlich allezeit“ una cum ejus usitata melodia in charta remedii loco notabat, qua formula inspecta in tantum solvebatur cachinnus aeger iste, ut perfecte restitutus, statim grabatum derelinqueret.*

28) Ait ARISTOTELIS (lib. I. c. 7): „homo natura aptus est ad coctus societatemque.“ Et SENECA: „haec morborum impetus arcuit, senectuti adminicula prospexit, solatia contra dolores dedit (de benefic. lib. IV. c. 18).“ Legitur: „Tibia et psalterium suaves edunt cantus, sed utrumque suavis lingua vincit.“ Societatem autem

singula eo magis proficiunt, quo magis animum distrahunt ac a consideratione proprii corporis avertunt, quod interdum ab ipsis obtinetur infortuniis ¹⁰), et amore ¹¹), dummodo Platonico ¹²).

Prae-

feminarum, ingenio ornatarum, illi marium (vel scopo suum hypochondriaci distrahendi), longe ob id antepono, quod mares vix aliter, quam de negotiis politiciis, oeconomicis aliisque saepe ingratis, aliquando non sine ridicula eruditionis ostentatione pertinaciter loqui sciant, feminae contra ea incomparabili polleant arte, non solum de objectis amoenis leviter disserendi, et nobis ipsis modo imperceptibili talia proponendi arguments, qualia requiruntur, ut enarrando aerumnarum obliviscamur, sed etiam (quod philautiae nostrae maxime arridet) historias nostras cum attentione suscultandi, ac languentem jam jam sermonem, verbulo debito loco dicto, excitandi.

29) Quantum proficit socialiter viciitare, quo modo multis tunc alimenta magis delectamento sint, imprimis si ex aliena inconsueta culina proveniant, proverbialia Germanis familiaria docent: „*In Gesellschaft essen, es schmeckt einem unter der Gesellschaft viel besser, fremd Brod gedulde besser, denn einheimisches* etc.“

30) Sic hypochondriacos plures sanatos vidi, a vicissitudinibus politiciis, a jactura patrimonii etc.

31) JONPANNUS (manuduct. ad vit. long. P. I. c. 12. p. 137) de amore dicit: „hic ubi temperatae moderationis limites non transgreditur, torpentem viscerum calorem excitat, languentem stomachi virtutem erigit, remorantem concoctionem adjuvat, sanguinem bonum gignit, spiritus copiosos parit, florentem faciei colorem conciliat, mentisque serenitatem affert.“
„*Ayant besoin d'une vèhèmentè diversion, pour m'en*

Praeterea curandum, ut aeger sensim sensimque fidere propriis perceptionibus morbosis desinat³²⁾. Juvat interdum, ut medicus ab initio se querelis aegrorum plenam fidem adhibere, quodammodo simulet, donec, mota prius dubitatione, tandem pro falsis, viriliter declaret³³⁾. Ad astutiam

distraire, je me fis par art amoureux, et par estade, à quoy l'âge m'aydait; l'amour me soulagea, et retira du mal qui m'étoit causé par l'amitié." MONTAIGNE *oeuvr. T. 3. L. 3. p. 73.*

32) Quamvis enim hypochondriaci aliquando temporarium levamen a seminis jactura persentiant, attamen non dubitandum, jacturam spermatis repetitam iis nocere.

33) Hypochondriacos plures sanare mihi licuit, cum eos de mendacio sensus eorum universalis interni persuadere potui. Dum scilicet novisangebantur timoribus vanis, jacturam sanitatis respicientibus, eos interrogabam, quidnam sentirent de nonnullis ephemeridibus politicis, novitates sine delectu et fide recipientibus, e. c. de *Zaschauer* Rigae, de *Constitutionnel* Parisiis, de *Morn. chron.* Londini editis? Nec verbum illis credimus, respondere solebant. Et cur quae? Quoniam nos centies et ultra in errorem duxerunt. Et fidem tamen adhibetis perceptionibus vestris morbosis, maxime fallacibus, quae vobis millies hoc et hoc annuntiarunt, quin unquam vel simile quid contigerit?

34) „Prudentia vero hic omnino opus est, verbaque duriora sic moderanda sunt, ut ea ex amore proficisci vel ipse aeger notare possit, quia prius probe perpendendum, an et quo animo aeger sit laturus, cum quosdam non nisi aegerrime ferre sat constet.“ RIEDLIN *lin. med. ann. III. Jun. obs. 30. p. 422.* Ita juxta

tiam plurimi recurrunt³⁵⁾, at plerumque sine emolumento, cum cognito errori facile alter pejor succedat³⁶⁾.

3. Ast supervacaneum foret mentem componere velle, nisi simul *victus* ratio haberetur, Generatim esto ille simplex³⁷⁾, ac magis exercitio corporis³⁸⁾, quam ventriculi viribus, literatis saepe infensis³⁹⁾, respondens. *Panis* sit triticeus et secalinus probe coctus, bene fermentatus, mediocriter salitus, seminibus anisi, carvi, foeniculi conditus, non calidus, non durus et siccus. Simila-

Conti-
nuatio.

PLATONEM (lib. I. de legibus): „medicus primum prudenter *persuadere*, non imperare debet.“ Elucet inde *necessitas eloquentiae* pro medico, de qua aurea verba protulit LANCISI de recta medicorum studiorum ratione institnenda. Opp. varia Vol. II.

35) Melancholia hypochondriaca pia fraude curata. Miscell. acad. nat. curios. dec. II. a. 1. 1682. p. 449. Cfr. cap. XXV. §. XI. No. 2.

36) Cfr. CHICOINEAU diss. an segrotantes imaginarii sola diversitate idearum sanandi sint? 1713.

37) RIVINUS (l. c.) paganorum hinc edulia suadet.

38) Praeceptum istud Hippocraticum (lib. III. de dieta) eleganter illustravit RAMAZZINI (lib. de principum valetud. cap. VI. p. 58). Spectat huc et PINICELLI praeeptum (in mundo symbol. lib. V. No. 33): „qui enim sapientiae operam daturus, eum oportet esse victum tennem.“

39) Homines vitam literatam ducentes, majorem hostem non agnoscere, quam ventriculi robur, LANCISI (de subitanea morte lib. I. c. 22) et TISSOT (l. c. p. 78) jura monnerunt.

milaginei usus non sit continuus. *Carnes* laudabiles sunt, pullastrorum, gallinarum, caponum, pullorum gallinaceorum, phasianorum, perdicum, turdorum, attagenarum, alaudarum et avium campestrium, nemoralium et montanarum, vitulina, agnina, cervicina, et juniorum animalium, bubula, lepusculi, capreoli, cervi, elixae potius quam assae. *Ova* gallinarum recentia et tremula facili coctionis sunt. *Pisces* eligendi mediocres et fluviatiles, veluti sunt trutae, lucii, percae, funduli, ac ut flatulentia eorum aliquo modo cohibeatur⁴⁰⁾, initio mensae aliis cibis praemittantur, si tamen cum carne et aliis non miscueris, rectius facies⁴¹⁾. *Legumina* et *olera*, dummodo haud flatulenta, non plauce fugienda⁴²⁾. Maxime arrident spinacia oleracea, rumex acetosus, daucus carota, lactuca sativa⁴³⁾, urtica dioica⁴⁴⁾, beta rubra⁴⁵⁾, asparagus et

40) FIZEN. de flatu. c. 7.

41) FABR. HILDANUS de tuenda valetud. p. 15. sic, determinatis saltem diebus, et religionis catholicae praecepta jubent.

42) Novi hypochondriacos, quibus victus animalis, eos roborandi gratia, cum damno praescribatur, quique longe malius victum vegetabilem ferebant, nec mirum, si ad proclivitatem hypochondriasis ad scorbutum respiciatur.

43) J. LANZONI de malo hypochondriaco lactucae usu curato. Miscell. acad. nat. cur. dec. III. a. 2. 1694. p. 41.

44) Herba junior, in Lithuania usitata, vix a spinacia, si coquatur, distingui potest.

et capares ⁴⁵⁾. Pro *acetariis* conveniunt aurantia, limonia, citria, ribes et eorum succi. Ex *fructibus* conducunt cerasa acida, pruna ungarica, uvae passae, amygdalae dulces, pistaceae, pinci, poma *Borsdorfensia*, cotonea. *Potus* sit *vinum* ⁴⁷⁾, suaveolens, rhenanum, neccaricum, de *Graves*, burdegalense rubrum (si opus debitaе aquae quantitate remixtum ⁴⁸⁾) et, nisi aeger plethoricus sit, dulce hispanicum, cyprinum, aut amarum absynthii, versus coenae finem ⁴⁹⁾. *Cerevisia* sit clara, defaecata et lupulo bene condita. *Bellaria* sunt conservae rosarum, amomi zingiberis, semina foeniculi, carvi, coriandri, cortex pomorum aurantiorum saccharo condita. Plethoricis glacies, vulgo *sorbetto*, conducit. Iis exceptis *cofea* post prandium fere omnibus salutaris, ita guttae aliquot liquoris alcoholisati dulcis, vulgo *liqueur*,

45) Herba junior Polonis et Rossicis, sub nomine *botwina* in usu est. Ita radix, reliquorum olerum instar decocta.

46) BENIVISEN, obs. 105. SENNETT l. c. §. 141.

47) J. C. FERN. hypochondriacus vino generoso curatus. *Ephem. acad. nat. cur. cent. 9 et 10. p. 275.*

48) Legatur WEICKAND *philosophischer Arzt, Frkf. a. M. 1790. p. 150.*

49) LANGHANS (*von den Krankheiten des Hofes oder der Weltleute. Bern 1770. p. 133*) aliique (HILDEBRAND l. c.) hypochondriacis suadent ut inter edendum vix aut ne vix quidem bibant, cui consilio subscribere nequeo.

liqueur, cujus vero ante pastum usus ⁵⁰⁾ damnandus est. Digestionis opere absoluto, plethoricis *aqua frigida* sat copiose hausta auxilii specifici vires exserit ⁵¹⁾. In reliquis, praesertim tempore frigido humidoque, *these* locus est. Multum enim in hypochondriasi transpirationi prospicere refert ⁵²⁾. Somnus, si consuetudo id concedit, in sinistro latere corporis capiendus, et pro re nata protrahendus ⁵³⁾. Praecedatur a *coena vespertina* modica aut nulla ⁵⁴⁾, et sequatur eum *jentaculum*,
ventri-

50) Quamvis non libenter usus nationales, utpote plerumque experientiae innixos, contemniam, attamen nullo pacto consuetudini Rossorum et Polonorum, ante pastum crematum haurientium, assentire possum.

51) THEDEN *neue Bemerkungen und Erfahrungen* 1782. p. 138. HUFELAND: *das Element des Wassers als Heilmittel*. Ejusd. *Journ. der pr. Heilk.* 1814. 1. Heft. p. 11. Interea ne quid nimis, rite animadvertente HILDEBRAND l. c.

52) MONTANUS *consil.* 131. a tempestatum scilicet injuriis munire praecordia suavit, gestando super ventriculi regionem vulturis pelle. Conducunt et extremitatum frictiones, mane et vespere susceptae.

53) Hypochondriaci praesertim plethorici, aliquando pejus se habent, ubi diutius solito somno indulgent, unde regula generalia hic statui nequit.

54) Consuetudinis potissimum ratio habenda, quae si coenam fert, in aegro plethorico maxime fructus horaei conducunt: aegro haemorrhoidario iterum brassicam acescentem crudam, et illius succum cum oleo olivarum mixtum, Lithuanorum more, suademus.

ventriculum non obruens⁵⁵⁾. Ordo hinc in omnibus naturae legibus affinis stabiliendus⁵⁶⁾; cui et alvi evacuatio submittenda.

4.* Ut MONTANI pro hypochondriaco consi-
lium: „fuge medicos et medicamenta facileque
convalesces“⁵⁷⁾, nos non attingat, *pharmacis* pa-
rum utimur, eaque haud libenter mutamus⁵⁸⁾.
Eorum enim loco hypochondriacos ad *fontes me-*
dicinales, quorum aquae saponaceae, salinae et
tandem ferrugineae sunt, mittimus⁵⁹⁾; ad usum
tum

55) Jentacula ex carnibus, piscibus, praecipue fumo induratis et acidis, cum cremato et vino composita, nisi agatur de militibus aliisque vehementi corpora exercitio addictis, cane pejus et angue fugienda. *Cioccolata, thea, cofea, las* simplex eorundem sunt loco.

56) Mos hodiernus, jentaculum prandiiforme (*déjeuner à la fourchette*), et coenam vespertinam pro prandio sumendi, quo dies in noctem, nox in diem convertuntur, sanitati, et laboribus literariis similibusque obstat; nemo enim cum successu tali jentaculo sumpto negotiis per totam diem reliquam partem operam dare potest; et qui somno nocturno non indulget, animi vires amittit.

57) I. a. Idem testantur ARTIUS tetrab. II. serm. 2. c. 10. SENNERTUS prax. lib. III. P. V. sect. I. cap. 6. WELSHIUS cent. I. cons. 100. p. 135 etc. CH. M. ADOLPHI de felici melancholiae hypochondriacae sine ullo remedio solutione. Acta acad. nat. cur. Vol. I. p. 546.

58) Jam SENECA dixerat (epist. I): „Nil sanitatem magis impedit, quam crebra medicamentorum mutatio.“

59) Edit. secundae, P. I. Vol. I. sect. II. cap. VI. §.

tum internum tum externum. Nisi id liceat, pharmacis solum studemus alvum apertam tenere, flatus expellere, vires digestionis excitare, nimiam systematis nervosi sensibilitatem compescere ac universi corporis tonum restituere. Quibus indicationibus satisfaciunt 1. *eccoprotica*, ad vesperam porrecta, e. c. *electuârium lenitivum*, *pulvis temperans* ⁶⁰⁾, *radix rhei palmati* ⁶¹⁾, *extractum aloes succotrinae* ⁶²⁾, *cucumeris colocynthidis* ⁶³⁾, *jalappae alcalinum* ⁶⁴⁾; 2. *carminativa infusa* mane,

XXXVIII. 27. 33. Et R. F. OVELLOÛN veterinus cum malo hypochondriaco junctus, per aquas medicatas Wildungenses curatus. Acta acad. nat. cur. Vol. V. p. 312. TRILENIUS *Resultate der Brunnenkur in Ems in HUFELAND's Journ. der pr. Heilk.* 1816. Jun. p. 88.

60) E. c. ex magnesia, nitro, tartaro vitriolato et elaco-saccharo foeniculi.

61) R. Pulveris radicis rhei drachmas tres. f. c. s. q. syrupi ejusdem pil. granorum trium. Conspergantur pulvere radicis irocos florentinae. S. cap. ante cubitum No. V.

62) R. Extracti aquosi aloes succotrinae drachmam unam. Pulveris rhei drachmas duas. M. divid. in sexaginta pilulas, quas, si placeat, obducantur folio aureo sive argenteo. Cap. ad noctem pil. No. III. ad VI.

63) R. Extracti colocynthidis aquosi drachmam unam. Divide in sexaginta pilulas aequales. Consap. pulvere cinnamomi. D. s. cap. ad vesperam pil. No. II — VI. *Tinctura colocynthidis* ab ODERA commendata (*Annales de la soc. de médecine pratique de Montpellier. T. 16 (hist. T. 4) p. 89*) nimis est irritans.

64) Usitatissimum mihi est hoc pharscum, nec satis commendandum.

mane, jejuno ventriculo epota, et ex seminibus illi-
 cii anisati, anethi foeniculi, coriandri sativi, her-
 bis origani, majoranae, menthae piperitae etc. ⁶⁵⁾;
 3. radix cephaelidis ipecacuanhae ⁶⁶⁾, elixiria
 stomachica et visceralia, fel tauri, extractum
 menianthes trifoliatae, cardui benedicti, decoctum
 ligni quassiae amarae ⁶⁷⁾; 4. aqua pruni lauroce-
 rasi ⁶⁸⁾, acidum Borussicum ⁶⁹⁾, oxydum zinci,
 extra-

65) R. Semen anisi stellati, coriandri àà drachmas
 tres. Herbae melissae uncias tres. Conciase D. S.
 Species pro thes.

66) Optime sub forma rotularum (pastilles), quarum sin-
 gula quartam partem grani ipecacuanhae continet, ex-
 hibetur, e. e. hora ante pastum. Opiatur, ut aeger
 nesciat se pharmacum ex classe emeticorum sumere,
 ne ex imaginatione nauseam experiatur. Enim vero
 neque nausea, neque vomitus hic requiritur, nisi pe-
 culiaris aceedat indicatio. De emeticorum in hypo-
 chondriasi usu jam dixerat ARTIUS (tetrab. 2. serm. 2.
 c. 10): „si tamen ventriculus fuerit debilis, illi
 aerumnam addere non licet.“

67) Medicis non assentio, saturatissima hujuscemodi de-
 cocta parantibus; drachma enim semis ligni ad libram
 aquae amarum reddendam sufficit.

68) THILENIUS med. chirurg. Bemerk. p. 193 (A guttis
 30 ad 40, immo a guttis 60 ad 80 ter quater de die
 propinat. Fateor me nunquam guttas decem excedere).

69) KOPF in HUYELAND's Journ. der pr. Heilk. 1821.
 December, p. 1 (guttam unam, juxta VAUQUELIN pa-
 ratum veneni ter quaterve de die exhibet). Qui egregii
 alioquin medici consilium secuturi sunt, legant prius
 SIBERGUNDI monita annexa l. c. p. 15.

extractum hyoscyami, moschus; et 3. mars ⁷⁰⁾. Plerumque *unâ formulâ*, plurimis indicationibus simul satisfacere studemus ⁷¹⁾.

Continna-
tio.

5. Vigente complicatione inflammatoria, praesertim haemorrhoidali, *venae sectione* e pede, *hirudinibus* ad anum ⁷²⁾, *acidis vegetabilibus*, potissimum

70) *Ferrum* a remotissimis temporibus hypochondriaciâ sistabat valuti sacram anchoram. Sic, aquam aut vinum, in quibus ferrum candens extinctum est, commendat PLINIUS (nat. hist. lib. 34. c. 15). Cfr. PAUL. AEGINETA de re med. lib. III. c. 49. DIOSCORIDES lib. V. c. 53. MERCATUS de recto praesid. usu. lib. II. c. 7. Qui ultimus auctor rite monet, in martialibus non posse continuari tuto, nisi faeces atrum induant coloram. Ut plurimum *tinctorum* sive *extracto martis pomato*, aut *floribus salis ammoniaci martialibus*, utor.

71) E. c. alvi libertati, flatuum evacuationi et ventriculi tonos. R. Foliorum cassiae aennae unciam dimidiam, seminum coriandri drachmas tres, herbae menianthes trifoliae, radicis calami aromatici aa unciam unam. M. D. S. Species, quarum pugillus pro infuso mana sumendo adhibetur. — E. c. alvi libertati, viribus ventriculi et sensibilitati systematis nervosi. R. Extracti rhei aquosi drachmas duas. Fallia tauri unciam semis. Florum zinci, moschi optimi aa scrupulum unum. M. f. l. a. pilul. granorum trium. Cap. tar de die No. VI—VIII. pilul. E. c. ad roborandum, loco florum zinci, drachmae duae extracti martis pomati praescribuntur.

72) J. H. SCHÖNMEYER observationes de morbo hypochondriaco at usu hirudinum in eodem. Acta medica Havniensis. Vol. II. p. 313.

num *aesto* 73), et *pediluvio* utendum. Visceribus abdominalibus jam jam obstructis, ad methodum alibi exponendam, non neglectis *clysteribus Kaempferianis* 74), deveniendum. Si suspicio de latente vitio syphilitico, carcinomatico, plicoso, arthritico etc. subsit, pharmaca illis accommodata prudenter cum remediis hucusque allatis conjungi debent 75). Generatim *gummi resina quajaci* hypochondriaci hujusmodi accommodatissima est 76). Item latente arthritide *foniculus* 77 a).

6. Sub paroxysmo hypochondriaci mali animus aegri erigendus et fiducia inspiranda 77 b). C. paroxysmi.

S s 2

mul

73) ORIBASIIUS, BORRHAAVE et LORRY v. d. *Melancholic. A. d. L. Leipzig*. 1770. 2. B. p. 380.

74) KÄMPF op. c. et FABER diss. ulter. exposit. nov. methodi Kaempferianae, curandi morib. chron. inveteratos, praecipue malum hypochondr. Tübing. 1755. En formulam: R. Radicis taraxaci, asponariae aa uncias duas. Herbae centaureae minoris, marrubii albi aa unciam unam. Florum tanaceti, chamomillae aa unciam dimidiam. Conc. f. species. Manipulus cum totidem furfurum pro clystere c. s. q. Aquae ad colat. librae coquitur.

75) Regulae hic speciales tradi nequeunt.

76) Maximi hoc pharmacum facio, a drachma una ad drachmas duas spatio nychthemeri porrectum.

77 a) De Maza de foniculi effectum in affectu hypochondriaco observatio. Societ. med. Hafniens. collectanea. Vol. II. p. 70.

77 b) Pulchras observationes de vi imaginationis et fiducia in medicamenta collegerunt: PAULLINI in Eph. germ. dec. I. ann. 2. p. 238. RIAPLIN lin. med. ann.

mul flatus expellendi, cui fini *elysteres carminativi*⁷⁵⁾, *frictiones abdominis aromaticae*⁷⁶⁾, *cucurbitulae siccæ* cum flamma regioni umbilici admotæ, aut *emplastra anodyna*⁸⁰⁾, universæ ventris superficiei admotæ, inserviunt. Usui vero interno inserviunt *aquæ* sive *menthae crispæ*, sive *anethi foeniculi*, cum *tinctura radicis rhei palmati aquosa*, pauca tamen quantitate, ne alvus vehementer moveatur⁸¹⁾, et sub magnâ angustia *aether ace-*
ticus

I. Jul. lib. 12. BARTHOLINUS hist. de paralyt. N. T. p. 42. SOLENNANDER sect. 5. cons. 15. §. 17. HELWIG obs. med. 86. SCHNOKK in adjecto schol. DEUSINGIUS in Exam. pulv. sympath. p. 65.

78) E. c. ex infuso herbae centaureæ minoris, seminum cumini, carvi, anethi, cum oleo lini. J. P. HAIN de enematum utilitate in pathematibus hypochondriacis et facili applicatione; cum addendis Ros. LENTILIS. Miscell. acad. nat. cur. dec. I. a. 3. 1672. p. 402. dec. III. a. 5 et 6. 1697. 1698. append. p. 130.

79) E. c. ope olei nucis moschatæ expressi, balsami vitæ Hoffmanni externi, spiritus lavendulae compositi, roris marini, aquæ Reginæ Hungaricæ etc.

80) E. c. Emplastrum antihystericum Sydenhami, E. anodynum Fulleri, E. de galbano crocatum cum opio et camphora; E. aromaticum Pharm. Borussicæ, E. resolvens Schmuckert, maxime vero *emplastrum saponaceum Barbetti* mihi usitatissimum. Debent autem hæc emplastra cum diligentia super alutam extendi, ac margines cum emplastro diachylon cum gummais, adhaesionis gratia, circumdari.

81) RENOUART, ergo flatulentia hypochondriacæ cathartica mitiora. Paris. 1638. LECTER, ergo hypochondriaci mollius expurgandi. Paris. 1681.

ticus, sulphuricus et libentissime nitricus alcoholicus, inprimis cum *succinate ammoniacae empyreumaticae liquido*, ipsumque demum *opium* ⁸²⁾. Praesente magna epigastricae regionis sensibilitate *emulsiones* et *res mucilaginosae* ⁸³⁾, heroicis *palmam* praeripiunt ⁸⁴⁾. *Crepitus ventris* ⁸⁵⁾ atque *eructationes* retineri non debent; neque istae vi extorquendae sunt ⁸⁶⁾.

CAPUT

82) Praeterea fertur *opium* eo in casu feliciter fuisse adhibitum, quo aeger mortem determinato die determinataque hora expectabat, cum illius ope in somnum conjiceretur, ultra tempus indicatum protractum, atque vanitatis timoris optimum testimonium.

83) *Semina malvae* jam apud *ANTIUM* in usu erant (*te-trab. II, serm. 2. c. 10*).

84) Nisi aegroti sub indicatâ medendi ratione de conaminibus nostris debita aequitate judicaverint, quaerant, qui illis melius succurrant. *LENTILIO* enim assentio, dicenti: „Magno onere liberatur medicus, liberatus a patiente moroso, immorigero, vago et obmurmurante“ (*Eteodr. med. pract. p. 559*). Legatur de eodem argumento *STANLI* *disp. de aegro moroso*.

85) *Crepitus tussi* dissimulandos esse *WILLICH* suadet (*de crep. ventr. probl. 25. 29*).

86) *G. SCHUSTER* de certis in affectibus hypochondriaco-flatulentis praesidiis. *Nova acta acad. nat. eur. T. II. p. 24*.

CAPUT XVIII.

D e a m n e s i a.

§. LXXVIII.

Definitio. Literatura.

Definitio. 1. *Amnesia*¹⁾ dicitur memoriae, seu facultatis ideas in mente antea perceptas reproducendi, aut reproductas recognoscendi, imminutio vel abolitio.

Literatura. 2. De hoc affectu legisse non poenitebit, praeter philosophos²⁾ et dissertationum inauguralium auctores³⁾, GALENUM⁴⁾, GRATAROLUM⁵⁾,
SCHEN-

1) Ab α negat. et μνήμη, memoria. LAT. Oblivio, memoriae debilitas, deperditio, defectus, lathiphrasie. GERM. Verlust des Gedächtnisses, Vergessenheit. GALL. L'oubli, perte de mémoire. ANGL. Loss of memory. POL. Niepamięć. Ross. Забвение.

2) ARISTOTELES c. II. lib. de memoria et reminiscencia. CICERO lib. I. ad HERENN. PLINIUS hist. nat. lib. VII. c. 24. SCALIGER exercit. 307. CANCELLIERI *dissertatione intorno agl'uomini dotati di gran memoria ed a quelli divenuti smemorati*, Roma 1815. DUGALD STUART *elements of the philosophy of the human mind*, chap. 6. §. 1—3.

3) HARTUNG diss. de memoria et oblivione. Lips. 1622. ITTIGIUS diss. de memoria et oblivione. Lips. 1644. FRIDERICIUS diss. de memoriae lacione, seu obliu. Jen. 1668. MEIER diss. de memoria laesa seu

SCHENKIIUM⁶⁾, TULPIUM⁷⁾, HORSTIUM⁸⁾, VOGLE-
RUM⁹⁾, LINNAEUM¹⁰⁾, PLATNERUM¹¹⁾, BRUCK-
MANN¹²⁾ et maxime LOUYER-VILLERMAÏ¹³⁾.

§. LXXIX.

oblivione. Basil. 1687. VATER diss. de natura et cura
memoriae. Witemb. 1686. CRAUSIUS diss. de memoria
ejusque remediorum natura, usu et abusu. Jen. 1696.
WEDIGIUS diss. de memoria praesertim labili. Wittemb.
1694. VAN ZYL diss. de memoria ejusque vitiis. Lugd.
Bat. 1694. WEDLIUS diss. exhibens aegrum debilitate
memoriae laborantem. Jen. 1696. Idem: de oblivione.
Jen. 1704. WINTER diss. de memoriae statu naturali et
praeternaturali. Rintel. 1698. PEZOLD diss. de oblivio-
ne memorabili. Lips. 1703. JANTEN diss. de memo-
riae laesione. Altdorf. 1735. RICHTER diss. de na-
tura, lae et praesidiis memoriae humanae. Goetting.
1752. BAUMER diss. de memoria, ejusque lae et
praesidio. Erford. 1760.

4) Cap. I. de differ. sympt. Cap. 6. de motu muscul.
lib. III. cap. 4 et 5. de locis effect.

5) De memoria reparanda, augenda, servanda. v. opus-
cul. p. 405.

6) Obs. lib. I. obs. 128. 7) Obs. medicinal. lib. IV. c. 15.

8) Disput. de memoria conservanda.

9) Mnemosynologia. Jen. 1676.

10) *Schwedische akad. Abhandl. J.* 1745. p. 117.

11) De vi corp. in memor. Lips. 1767. Specimen. Pa-
thologie ad cognoscendas memoriae vicissitudines ne-
cessaria. v. BALDINO. sylloge. T. III.

12) *Horn's Archiv für med. Erfahr.* 1825, July. August.
p. 38.

13) *Essai sur les maladies de la mémoire. Mém. de la
soc. de médecine de Paris T. I. p. 68. SEDILLOT rec.
period. de la soc. de méd. de Paris T. 64 (Série 2.*

§. LXXIX.

*Symptomata. Causae.*Sympto-
mata.

1. Memoria (animi facultatum pretiosissima¹⁾ aequae ac humilissima²⁾, nunc res nuncque verba magis adtingens³⁾), tam sana tam labefactata, varia offert phaenomena: alii enim rerum imagines facile recipiunt, receptas vero cito dant oblivioni, e. c. infantes; — alii ad recipiendas rerum imagines tardi sunt, iisdem vero diu conservandis sunt tenacissimi, e. c. homines levi imaginatione praediti; — alii leviora tantum custodiunt, quae vero maiore indigent consideratione, ne apprehendant unquam, e. c. feminae; — alii contrario plane modo se habent, e. c. viri seriis occupationibus adsueta; — alii certa dumtaxat vocabula retinere nequeunt⁴⁾; — alii vix, ac non nisi

T.3) p. 271. Et *Dictionnaire des sciences médicales* T. 32. p. 278 (quo utor).

1) „Memoria certe non modo philosophiam, sed omnem vitae usum omnesque artes, una maxime continet.“

2) „... faculté toute passive, humble greffière de tous les actes de la vie humaine et des événements du monde: chacun accuse sa servante de négligence ou d'oubli:

Nul n'est content de sa mémoire,

Ni mécontent de son esprit.“

VILLERMAY l. c.

3) „Lucullus habuit divinam quandam memoriam rerum, verborum maiorem Hortensius.“ CICERO acad. quaest. lib. IV.

4) LINNAEUS l. c. „MARRET dans ses cours de botanique, tenant sous ses yeux la pimprenelle, ne pouvoit

nisi post longum temporis intervallum paucarum rerum aut nominum recordantur (*amnesia levis*); — alii quidem recordantur, sed alio modo, inverso ordine, non recto tempore ac loco ⁵⁾ (*amnesia*); — alii facultatem legendi amittunt illam scribendi retinent ⁶⁾; — alii commutationem litterarum verbi experiuntur ⁷⁾; — alii tandem nihil, ne proprio quidem excepto nomine ⁸⁾, recordantur

(*amnesia*

qu'avec une peine infinie en trouver le nom, quoiqu'il se ressouvint facilement de celui de beaucoup d'autres plantes d'un usage moins journalier: le même embarras se représentait à lui chaque année dans ses cours." VILLERMAY l. c. „Broussonnet ... (après un léger coup d'apoplexie) ... ne put jamais prononcer ni décrire correctement les noms substantifs et les noms propres, soit en français, soit en latin, quoique tout le reste de ces deux langues fût demeuré à son commandement." VILLERMAY l. c.

5) Comes Bennigsen, exercitus Rossici supremus dux, vir in aeternum venerandus, mihi de praefecto quodam militum narravit, qui recordabatur quidem, se obsessioni urbis cujusdam munitae interfuisse, ast oblitus est, num ipse inter obsessos, num inter obsidentes fuerit.

6) J. SCHMID in Ephem. acad. nat. cur. dec. I. an. 3 et 4. obs. 154.

7) „Mr. D. . . à la suite d'une attaque de paralysie, ne pouvoit plus prononcer un mot sans altérer l'ordre des lettres qui le composent: par exemple, pour dire flûte, il prononçoit tufle." VILLERMAY l. c.

8) MESSALA CORVINUS, referente PLINIO (l. c.), integris licet sensibus, proprii nominis oblitus est. Spectant huc versus LUCRETII (lib. VI):

(*amnesia perfecta*). Nec peculiarem memoriae jacturam, quae ad quosdam vitae periodos restringitur, ac cum sic dicto *somno magnetico duplicato* magnam similitudinem alit⁹⁾, silentio praeteribimus¹⁰⁾. Amnesia modo extemplo ingruit¹¹⁾, modo

„*Cepte oblivio rerum*

enunctarum, neque possent cognoscere ut ipsi.“

9) *HEINECKE* (op. c. p. 59) et *KLUGER* (op. c. p. 177), cum quibus cfr. *DARWIN* (*zoonomis* etc. *A. d. E. übers. von BRANDIS*, Hannov. 1795. 2. *Abth.* p. 327) et *REIL* (*Rhapsodian* etc. p. 81—83).

10) *Diarium Americanum, med. repository*, ann. 1816, mense Januario, observationem continet a Doctoribus *MITCHELL* et *NOTT* traditam, virginis scilicet, mediae aetatis, ingenio et notionibus haud communibus praeditae, quae antea semper sana, sine nota causa et derepente in somnum profundum ad plurimas horas ultra tempus solitum protractum incidit, ex quo memoria tam verborum, quam rerum orbata, expers facta est. Studia iterum ab *ABC*, celeri tamen passu, incepit. Elapsis nonnullis mensibus, ex nova sopor, ex quo suscitata, iterum eum in statum incidit, in quo ante primum somnum versabatur, nullam nunc memoriam de rebus, quae postea, inter primum scilicet et secundum somnum, acciderant, conservans. Accessit et tertius soporis paroxysmus, post quem illam de novo acquisivit memoriae conditionem, in quam post secundum accessum inciderat, ubi scilicet omnium, quae ante morbum addidicerat, oblita erat, et sic dein, ita ut *duplicem existentiam* habuerit, post quemvis soporis paroxysmum mutata. Enimvero post 3. 5. 7 etc. accessum soporis nil plane de rebus, quas a juventute didicerat, sciebat, et eas

modo pedetentim. Exstat nunc ut malum per se ¹²⁾, nunc jacturam aliarum facultatum animi sociam agnoscit ¹³⁾.

2. Nil

solum possidebat notiones, modicas admodum, quas in brevi spatio, quod inter primum et secundum paroxysmum locum obtinuit, addiscere potuerat. Post 2. autem, 4. 6 etc. somni paroxysmum, in pristinum statum, uti inter netivitatem et primum peroxysmum erat, de novo incidebat, notionibus permultis insignitum. Aegra in uno statu de altero nil sciebat, ac sibi met ipsi plane aliene fiebat! „Une jeune dame fort spirituelle et fort respectable, après des longues traverses et des contrariétés de la part de sa famille, épouse un homme qu'elle aimait passionnément: lors de sa première couche, il survint un accident, accompagné d'une longue faiblesse, au sortir de laquelle elle avoit tout à fait perdu la mémoire du temps qui s'étoit écoulé depuis son mariage inclusivement; elle se rappelait fort exactement tout le reste de sa vie jusque-là; mais depuis cet instant tout lui étoit parfaitement inconnu. Elle reponoit même avec effroi, dans les premiers instans, son mari, et son enfant qu'il lui présentait. Depuis elle n'a jamais pu recouvrer la mémoire de cette période de la vie, ni des événemens qui l'ont accompagnée.“ VILLERMAX l. c.

11) BRUCKMANN l. c. S. JACKSON *american journal of the medical sciences*. Febr. 1829.

12) J. B. GRÜNDEL ex casu omnimoda memoriae abolitio, remanente tamen intellectu in suo vigore. *Miscell. acad. nat. cur. dec. II. e. 6.* 1687. p. 308.

13) D. NEBEL de judicii et memoriae imbecillitate post lethargum, tandem eecedente epilapsia lethali. *Miscell. acad. nat. cur. dec. III. n. 9 et 10.* 1701—1705. p. 232.

Causae.

2. Nil aliud tam fragile est in homine quam memoria, cui, praeter causas ignotas ¹⁴⁾, insidias struunt: vitium haereditarium ¹⁵⁾, cranii peculiaris conformatio ¹⁶⁾, ejusdem et praecipue loborum anteriorum cerebri ¹⁷⁾ laesiones ¹⁸⁾, e. c. a lapsu ¹⁹⁾,

14) G. SENGER de memoria a nulla manifesta causa abolita. Miscell. acad. nat. cur. dec. I. a. 3. 1672, p. 372.

15) FARNERICI l. c. cap. 5.

16) Qui acuminato sunt capite et fastigato, memoria non pollere, est observatio HOMERI (Iliad. ubi Thersites describitur). Arabes, teste imprimis AVICENNA (lib. I. can. fen 1. Tr. 6. c. 5 et 3. can. fen 1. Tr. 2. 6), in occipite sedem memoriae quaerentes, illam calvariae partem quatenus non satis evolutam, pro causa amnesiae agnoscebant, quam sententiam amplexi sunt SENNERIUS (inst. l. c.), TULPIUS (lib. I. c. 24), FERNELIUS (physiol. lib. VI. c. 15), FREDERICI (l. c. c. 3) aliique. GALL sedem variarum specierum memoriae in oppositam plane cranii partem locavit, nec facta opinionem suam, praesertim relate ad memoriam localem, comprobantia, desiderantur. Interea valcant verba VILLERMAY ubi ait (l. c.): „*Au reste plusieurs auteurs ont prouvé, par diverses observations pathologiques* (CESALPINUS quaestiones peripateticae p. 116. et CLAUDINUS de memoria), *qu'aucune région spéciale du cerveau ne pouvait être le siège exclusif, soit de la mémoire, soit de l'imagination.*“

17) BOUILLAUD (*traité clinique et physiologique de l'encéphalite etc. 2. partie. 3. chap.*) plures casus refert, ubi sermonis et memoriae verborum jactura ex affectione loborum anteriorum cerebri oriebatur.

18) PALANGUS *med. Jahrgänge* 3. B. p. 68. MEYER *anat. Abhandl. vom Gehirn, Berl.* 1779. p. 4.

lapsu¹⁹⁾, a contusione occipitis²⁰⁾ et ab ossiculis inter meninges²¹⁾; porro imbecillitas infantilis²²⁾, vel ænilis²³⁾, clima²⁴⁾, frigus²⁵⁾, ventus²⁶⁾, calor²⁷⁾, aquarum ignota adhuc conditio²⁸⁾,

19) FLIK. l. c. SEMENI obs. lib. I. No. 136.

20) TULPIUS obs. 4. ZACUTUS LUSITAN. curat. 32. E. CAMERUS memoria gravi occipitis percussione singulariter laesa. Ephemer. acad. nat. cur. cent. 3 et 4. p. 183.

21) DE LA MOTTE *observation anatomique sur la perte subite de la mémoire, causée par une quantité de petite os dans la duplication des deux meninges, et qui occasionnent des fréquentes attaques d'épilepsie. Mém. de Paris a. 1711. hist. p. 27.*

22) Opinio QUINTILIANI pueros memoria excellere, a RHODIGINO (lib. XX. c. 8. antiq. lect.), SENNARTO et PLATERO (l. c.) in dubium vocatur, et quidem jure, si agitur de memoria rerum et non verborum.

23) ISOCRATES (in Panathenæico) de se ipso dicit: „Nihil nunc restat, nisi ut petita venia senectuti meae oblivionis et loquacitatis, quæ vitia nostram ænilem ætatem comitari solent, ad locum istum redeam...“ Cfr. ARISTOTELES sect. 30. probl. 5.

24) Teste GALENO (6. epidem. com. 6. §. 8), Athenienses erant sagaces et ingeniosi, contra ea Thracæ segnes et obliuisci.

25) MARCATUS (lib. de intern. morb. curat. c. 19) asserit, milites per montes nivosos iter instituentes memoria orbari. JACKSON l. c.

26) TULPIUS l. c. (occiput allidens).

27) D. DODART *observation d'un enfant de huit ans, qui perdit la mémoire pendant les grandes chaleurs de 1705. Mém. de Paris a. 1705. p. 58.*

tio²⁸⁾, ebriositas²⁹⁾, inprimis ex cerevisiae potu³⁰⁾, inedia³¹⁾, esus ceparum, allii, raphani³²⁾, venus³³⁾, puerperium³⁴⁾, defatigatio³⁵⁾, vita seden-

28) Id poetarum de *flavio Lethae* figmentum designare videtur. Quid quod refert *PLINIVS* in Boeotia ad Trophonii specum juxta flumen Orchomenon duos esse fontes, quorum alter memoriam, alter oblivionem adducit. . . .

29) Ait *PLINIVS* (l. c. cap. 22): „Praemium summum ebrietatis, rerum omnium oblivio, mora quoque memoriae.“

30) „Unde enim, nescis, ducat cerevisia nomen? quod cerebrum visat.“

31) *GALEN*, l. c. *ZACUT. LUSIT. PRAX.* mirab. lib. II. hist. 43.

32) Sic *FONESTUS* lib. X. obs. 32, et *WENZEL* l. c. p. 8. Verum judaei Lithuani, qui tali victu fere exclusive vescuntur, ac nihilominus tria quatuorve idiomata loqui solent, contrarium testantur.

33) Haec ut pestis ingenii inter praecipuos studiosorum hostes jura meritoque numeratur a *MARSILIO FICINO* (lib. de studiosor. valetud. tuenda. c. 8), a *RODERICO A CASTRO* (tract. de affect. mulier. lib. I. c. 15), et a *OSLOIO* (diss. de memoriae laes. ex nim. veneris usu oriunda. Altdorf. 1691).

34) *J. L. HANNEMANN* de memoriae imbecillis cura in puerpera. Miscell. acad. nat. cur. dec. II. a. 4. 1685. p. 128. *CAROURON cours théorique et pratique d'accouchement*, p. 38. „*Madame Fl . . . âgée de vingt ans, éprouve à l'issue d'une première couche très-douloureuse, une vive affection morale qui entraîne une syncope fort prolongée. Revenue à elle au bout de trois jours, cette dame ne se rappelloit aucunement être*

sedentaria ³⁶⁾, otium ³⁷⁾, lucubrationes ³⁸⁾, metus ³⁹⁾, terror ⁴⁰⁾, ira ⁴¹⁾, gaudium ⁴²⁾, venena ⁴³⁾,

potis-

reusement accouchée. Cette amnésie persista pendant plusieurs mois. VILLERMAY l. c.

35) „Mirum dictu est quantum nox interposita adferat firmitatis, sive quiescit labor ille, cujus sibi ipsa fatigatio obstabat, sive maturatur ac coquitur, seu firmissima ejus pars est recordatio. Quae statim referri non poterant, contextuntur postero die, confirmatque memoriam idem illud tempus quod esse in causâ solet oblivionis.“ QUINTILIAN. *Inst. orat.* libr. XI. c. 2.

36) ROLPHINKIUS in *med. medend. spec. comm.* lib. II. sect. 8. c. 53.

37) Hinc CATO major: „Otium imminuit memoriam“ — et SENECA: „Memoria nil perdidit, nisi quod saepe non respicit.“

38) Hinc dictum: „Studeo, studui, habet in supino stultum.“ Cfr. SCHENK *obs.* lib. I. No. 130.

39) Ex metu, turbine facto repentino, milites oblivione praegressorum affectos fuisse, tradit. CAEL. AURELIAN. c. 5. lib. V. Cfr. MARCELLUS DONATUS lib. III. c. 13. p. 285. Et examina academica idem confirmare solent.

40) Artemidorum grammaticum, quod inopinate crocodilum conspexerat, literarum oblivionem cepisse narrant. SCHENK l. c. CH. F. PAULLINI memoria abolita ex terrore et frigore. *Miscell. acad. nat. cur.* dec. II. a. 5. 1686. *append.* p. 63. J. G. BÖTTICHER gravia memoriae laesio, ex vehementi terrore, feliciter sublata. *Acta acad. nat. cur.* Vol. 6. p. 154.

41) VILLERMAY in *Dictionnaire* etc. p. 316.

42) VILLERMAY *ibid.*

43) FRIDERICI (l. c.) ad exemplum Bambae Regis Gothorum provocat. *Arsenicum* in specie accusatur in BALDINGERI *novem Magazin* 11. B.

potissimum narcotica⁴⁴⁾, philtro⁴⁵⁾, purgantia⁴⁶⁾, venaesectio⁴⁷⁾, vitia abdominalia⁴⁸⁾, praesertim haemorrhoidalia⁴⁹⁾, menstrua aberrantia⁵⁰⁾, quammaxime vero morbi praegressi, ut febres⁵¹⁾, praecipue pestilenciales⁵²⁾, cephalaeae⁵³⁾, encephalitis⁵⁴⁾,

44) E. c. conium maculatum observantibus PLATERO (obs. lib. I. p. 5) et POUTEAU (*oeuvres posth.*, T. I). In infantibus memoria inprimis a remediis, somnum conciliandi gratia exhibitis, laefactatur.

45) R. LENTILIUS paralysis et oblitio a philtro. *Miscell. acad. nat. cur.* dec. II, a. 8. 1689. p. 547.

46) SALMUTH c. 2. obs. 45. PAULLINI lanx est, D. V. obs. 2.

47) F. ROMMEL loquelse, *memoriae* et rationis imbecillitas a venae sectione. *Miscell. acad. nat. cur.* dec. II. ann. 5. 1686. p. 280.

48) *Consilis Italorum quorundam.* consil. 18.

49) *Primitiae physico-medicae.* Vol. III.

50) BARTHOLINUS in *Act. Hafn.* T. II. obs. 78.

51) PAULLINI cent. IV. obs. 79. JUCH diss. sistens cas. de singul. imbecill. ex febre maligna. Erf. 1731. *Perfectam amnesiam post typhum ann. 1806, Vilnae observavi, in viro quadraginta annorum. „On les a surtout remarqués (les phénomènes de l'amnésie) dans les maladies qui ont fait périr un si grand nombre de Français à Vilna, après le désastre de Moscou: chez la plupart des soldats qui échappèrent, la mémoire étoit presque entièrement perdue.“* VILLERMAT l. c. Cfr. GASC *histoire de l'épidémie de Vilna, Paris* 1815.

52) THUCYDIDES lib. II. de bello Peloponensi. DIODORUS SICULUS lib. XII. HIPPOCRATES lib. III. epidem. SCHENK l. c. obs. 132. ZACUT. LUSITAN. l. c. hist. 44.

tis ⁵⁴), hydrocephalus ⁵⁵), apoplexia ⁵⁶), cataphora ⁵⁷), hypochondriasis ⁵⁸), mania ⁵⁹), epilepsia ⁶⁰), colica ⁶¹), cholera ⁶²) aliique ⁶³). *Causam amnesiae proximam* (quae modo in *debilitate* ⁶⁴), modo in *plethora* cerebrum comprimente quaeri potest) quondam in *defectu caloris* ⁶⁵), aut in *humidi-*

53) Cap. II. §. 11. 1. et FORESTUS lib. IX. obs. 63.

54) Cap. III. §. XVII. 5. 55) Cap. IV. §. XXII. 4 (88).

56) Cap. V. §. XXV. 2 (36. 37). PLATER obs. 16.

FORESTUS lib. X. obs. 1. 32. *Journ. général de médecine* T. 20. 1764.

57) *Ephem. nat. cur.* dec. III. ann. IX et X. obs. 124.

BLANCARD collect. med. phys. cent. IV. No. 83. Ex cap. VI. §. XXXI (52).

58) Cap. XVII. §. LXXVI. No. 1. PLATER lib. I. obs. 1.

59) Cap. XXV.

60) GALENUS lib. III. de loc. affect. c. 6. et quotidiana experientia.

61) VATER diss. de memoriae laesione ex colica spasmodica. Vittemb. 1722. F. J. DOUBLE *observation sur une colique néphrétique spasmodique, remarquable par un symptôme insolite, la perte de la mémoire dont cette colique a été suivie. SEDILLOT recueil périod. de la société de méd. de Paris* T. 39. p. 264.

62) J. G. HOYER de hemiplexia cum aphonia et totali rerum omnium oblivione, a cholera tridana felicitè curata. *Ephem. acad. nat. cur.* cent. 3 et 4. p. 5.

63) A VEGA de arte medend. lib. III. c. 10. BENIVENTUS de abditis morborum causis.

64) GROOTE in HUFELAND's *Journ. der pr. Heilk.* 1824. Mai. p. 124.

65) „Manifestum est, inquit GALENUS, fatuitatem et oblivionem ex refrigeratione cerebri fieri“ (l. c. cap. 5).

Frank Prax. II. I. 1.

T t

miditate cerebri ⁶⁶⁾, vel etiam in vitiis plane oppositis quaerebatur, quae hypotheses, quum imperium in praxin exercuerint, memorabiles sunt.

§. LXXX.

Diagnosis. Prognosis. Cura.

Diagnosis. 1. Quemadmodum indoles apoplexiae et cataphorae eruitur, ita et illa amnesiae. Inquirendum nimirum quam hoc in affectu excitando sibi vindicarunt partem vel causae traumaticae, vel diatheses inflammatoria, rheumatica, arthritica, gastrica, atonica et nervea.

Prognosis. 2. Qualiscunque autem fuerit indoles amnesiae, ingruentis ejus vel minima signa non sunt spernenda. Nisi enim grave aliquod malum annuntiant, jam per se morbum omni commiscratione dignum designant ¹⁾. Sola enim injuriarum obliuia laudanda. Graviora, quae ab amnesia

Cfr. ARGENTÆ (lib. III, c. 2) et FORESTUS (lib. X. obs. 32): a GALENO non dissentientes.

66) „Itāne Antipho est immemoris; Itāne est madida memoria.“ CASCIL in Epiclero.

1) Sicuti exempla hominum stupenda memoria praedictorum a CRICHTONIO (l. c. p. 203) et CANCELLIERIO (l. c.) allata, legitimae invidiae excitant sensum; ita exempla jacturae facultatis hujusmodi, non immerito pro sapientiae fonte et scientiarum matre, declaratae, a BONETO (medic. septentr. lib. I. sect. 9. c. 2) et BOERHAAVIO (praelect. ac. in inst. med. ex ed. HALLER. Vol. IV. p. 463) descripta, praesertim si in hominibus doctis obveniant, lachrymas eliciunt.

sia annuntiari solent, mala sunt apoplexia ²⁾ et epilepsia ³⁾. Quae cum febre ⁴⁾, levi delirio ⁵⁾ aut diarrhoea ⁶⁾ obvenit amnesia, haec minoris plerumque est momenti. Contrarium valet de oblivione, effectu senectutis, febrium ⁷⁾, inveteratae apoplexiae aut epilepsiae.

3. Memoria roboratur exercitio ⁸⁾, scriptio- Cura.
ne ⁹⁾, mutuo sensuum auxilio ¹⁰⁾, aliisque regu-
lis a scriptoribus de memoria artificiali, seu *arte*
mnemoneutica ¹¹⁾ traditis. Interea ne quid ni-

T t 2

mis ^{*)}!

2) Cap. V. §. XXV. 1.

3) „Si homini, reliqua salvo, subito deficit memoria, timendum, ne *comitialis morbus* supervenist, aut sideratio, vel resolutio, aut aliud quoddam cerebri malum.“ ARTIUS l. c.

4) MORBIUS (institut. p. 400) febrem arthriticam amnesiam sanasse ex WEBER (obs. med. Fasc. II. p. 67) observationibus comprobat.

5) MORBIUS l. c.

6) Amnesiae a superveniente diarrhoea fugatae exemplum DODONAEUS (obs. cap. 47) habet.

7) Attamen aeger, de quo supra (§. praeec. (51)), sanus evasit.

8) „Utique maximum est memoriae beneficium, ita at conservandum merito, eoque utendum; sin secus fiat, instar privilegiorum, non utendo, amittitur.“ WÄDEL.

9) Maximum memoriae adminiculum esse scriptionem, BACO testatur (lib. V. de augment. scient. c. 5).

10) Versus, quos memoriae committere studemus, non solum legendi, sed recitandi sunt, ut visus ab auditu sustineatur.

11) Haec ars a SIMONIDE CRO detecta et per METRONO-

mis *)! Auxiliis physicis memoriae labefactatae, pro re nata occurrimus: *venae sectione* ¹²⁾, *curbi-*

rum scepticum perfecta, sequentibus illustrata est operibus: MATTHAEOLUS de memoria augenda per regulas et medicin. 1486. PERUSINUS artis memorativae s. de praeceptis artificial. et regulis med. ad augend. memor. tractat. Argent. 1498. RYFF de memoria artific. opusc. Argent. 1541. BLONDUS libell. de memor. Venet. 1545. ROOANI de memoria reparanda, augenda, servanda. Romae 1558. MONSIEO artificium memoriae. Neap. 1567. MENZINGER de memoria confirm. praecepta. Argent. 1568. ROSELLIUS thesaur. artificios. memoriae. Venet. 1579. *Discours pour conserver et augmenter la mémoire. Lyon* 1586. RAVENNATI Phoenix s. artificiosa memoria. Vicent. 1600. BRAUXII Simonides redivivus, seu ars memoriae et oblivionis. Lips. 1610. MEYSSONERI pentagonum philosophico-medicum, seu ars novae reminiscen. Lugd. 1639. SCHENKEL ars memorandi. WILLISIUS de memoria naturali fovenda, in collect. de arte memoriae. Lips. 1674. JOH. CRM. Freyh. v. ARSTIN system. Anleit. s. Theorie und Prax. der Mnemonik. Mit 3 Kupfern. Münch. 1810. 8. Cfr. HERVIEUX *l'art d'élever les cervins*. p. 361.

*) De memoria artificiosa dicit BACO (l. c.), posse per eam nonnulla portentosa et mirabilia perfici, sed similem esse funambulorum et mimorum agilitatibus et ludicris: etenim eadem ferme res sunt: cum haec corporis, illa animi viribus abutantur et admirationis forte aliquid habeant, dignitatis parum.

12) Veteres amnesiam a defectu caloris cerebri repetentes, ex hypothesi venae sectionem hic proscripserunt. Locum tamen eadem habere debet, si oblitio apoplexiam in plethoricis annuntiat.

curbitulis cum scarificatione ¹³⁾, *vesicatoriis* ¹⁴⁾,
fonticulis ¹⁵⁾, *setaceis* ¹⁶⁾, *cauterio actuali* ¹⁷⁾, *lo-*
tionibus ¹⁸⁾ et *unctionibus capitis* ¹⁹⁾, *eucuphis* ²⁰⁾,
 apo-

13) SOLEWANDER *consil. med.* p. 126. Applicantur occipiti, inter scapulas, ad brachia, et crurum internam superficiem.

14) Retro aures poni solent.

15) Ad basin cranii. Sic habuit aeger, de quo supra (Cap. V. §. XXV. 2 (36)) quique plene convaleuit.

16) ROLVINKIUS *method. med. spec. com. lib. IV. sect. 5. P. I. c. 3.*

17) SEVERINUS *pyrotechn. chir. lib. II. P. I. c. 10.*

18) WEDDELIO in usu erat lotio capitis cum *herbis majoranae, melissae, foliis lauri*, in vino decoctis. Celebratum erat *lixivium sapientiae* Mynsichtii ex specie lavendulae, floribus rosarum, herba rosis marini, radicibus ireos florentinae, concisis in sacculo lineo inclusis et in *lixivo* per unam alteramve horam ante lotionem capitis infusus. Absente vitio arthritico sive rheumatico, *lotionibus frigidis* capitis locus est. v. DAUTER v. *Gebrauche d. kalt. Wassers.* p. 33. GROO-
TE L. c.

19) Instituuntur vel ope *essentiae lavendulae*, vel ope unguenti ex oleo amygdalarum, albumine ovi et lacte muliebri, vel ope *balsami mnemocephalici* (VOGEL *Formel- u. Recept- Lex.* p. 137) a SENNERTO admodum laudati, ad magnitudinem pisi navibus et meatibus auditoriis quotidie, et elapso duorum mensium spatio, alternis diebus, illinunt. Suscitur et sequens *balsamus* nuchae illiniendus (cur non regioni supra-orbitali, quam involuntarie, si quid ad memoriam revocare desideramus, perfricare solemus?). R. Olei nucis moschatae expressi drachmas duas. Olei essen-

apophlegmatismis ²¹⁾, *odoramentis* ²²⁾, *balneis* ²³⁾,
clysteribus ²⁴⁾, *eccoproticis* ²⁵⁾, *emeticis* ²⁶⁾, *radi-*
cibus aeori calami ²⁷⁾, *anthemis pyrethri* ²⁸⁾, *her-*
bis dracocephali moldavici ²⁹⁾, *origani majora-*
nae ³⁰⁾, *rutae graveolentis* ³¹⁾, *boraginis officina-*
lis ³²⁾, *seminibus sinapis nigrae* ³³⁾, *urticae dioi-*
cae ³⁴⁾,

talis lavendulae et rutae aa guttas decem. Moschi et
 ambrae aa grana quatuor.

20) E. o. herbarum melissae, lavendulae, mari veri, ba-
 silici aa drachmas duas; florum rosarum pugillos tres,
 radices ireos florentinae drachmam unam, benzoës,
 succini albi aa drachmam semis. Moschi grana tria,
 olei rosarum essentialis guttas duas. M.

21) E. o. globus ex pulvere radices zingiberis, pyrethri
 et massiches cum melle paratus.

22) R. Storcia, moschi, ambrae, benzoës, olei cinamo-
 mi, lavendulae et balsami peruviani quantum arridet;
 fiat inde bolus. Involvatur bombaci et thecis argen-
 teis perforatis et habeatur ad manus. Cfr. GROOT-
 ER L. O.

23) Cum herbis aromaticis.

24) E. c. ex infuso radicum paeoniae, herbis betonicae,
 florum chamomillae, seminibus foeniculi cum sale.

25) Suadatur *electuarium lenitivum*.

26) Dummodo plethora ad caput non urgeat.

27) AVICENNA L. C.

28) „Memoriam valde juvat“ PLATER L. O.

29) *Melissam* mire ingenium acquare et hilaritatem pro-
 ducere creditum est.

30) Uti de melissa, ita de majorana cogitabant.

31) Succus recenter expressus a DONATO AB ALTOMARE
 commendatur, teste FRIDERICI L. C.

32) A HORATIO L. C. multisque aliis laudatur, imprimis

cae³⁴⁾, floribus arnicæ montanæ³⁵⁾, corticibus lauri cinamomi et sassafras, ligno quajaci officinalis³⁶⁾, thure³⁷⁾, nuce moschata³⁸⁾, cubebis³⁹⁾, ebore et cornu cervi⁴⁰⁾, castoreo, moscho, ambra, muriate hydrargyri miti⁴¹⁾ et vino⁴²⁾. Regimen diæticum, præter fugam caussarum, consistit in motu corporis⁴³⁾, præsertim in aëre libero montano, in cibis ex regno animali petitis⁴⁴⁾, in somno modico, in pectinatione⁴⁵⁾,
in

si flores et folia vino et cerevisia infundantur (quibus ultimis forte magis quam boragini virtus tribuenda est).

33) De actione sinapis in cerebrum pluries jam monui.

34) DONATUS AB ALTOMARE l. c.

35) Aegrum, de quo supra, uno hoc remedio sanavi.

36) JUNCKER tract. de ligno sancto. Cap. de memoria. HILDESHEIM spicileg. 3.

37) PLATER l. c.

38) HORSTIUS l. c. HERCULES SAXONIA in usu habuit rotulas factas ex nucis moschatae No. duo. Caryophyllis No. 6. Ligno aloes uncia una. Saccharo finissimo soluto in aqua rosarum.

39) Maxime ab AMATO LUSITANO celebrantur.

40) ARTII arcanum fuerat.

41) Dum serosam effluviem in encephalo suspicamur.

42) Praestantia hujus auxilii neque HOMÆRUM (Iliad. X) latuit.

43) Agitationem in curru profuisse Ephem. nat. cur. dec. II. ann. VI. obs. 147. docet.

44) Cerebra leporum, perdicum, passerum, præconceptae opinionis causa, in usu fuerant; cur potius non elegerint cerebra avium migrantium, utpote stupenda memoria locali præditarum, non video!!!

in moderamine animi pathematum, concessa quodammodo ira ⁴⁵⁾, in exercitio memoriae ⁴⁷⁾ omissa omni philautia ⁴⁸⁾ adhibitoque summo ordine ⁴⁹⁾. Quondam et amuleta in usu fuerant ⁵⁰⁾.

CAPUT

45) Forte electricitas aut magnetismus animalis de sequenti paragrapho ex opere FRIDERICII (c. XI) rationem reddere possent: „*Pectinationibus* imprimis opera danda. Et possunt haec fieri vel pectine eburneo diligenter a fronte cervicem versus, quadragesies pectine versò, autore MARSILIO FIGINO (l. c.); vel *ferreo* peculiari modo fabrefacto, ut super carbones calefieri queat, quo dein caput pectinari hebdomatim semel vel pluries potest. Vel instituitur etiam *phalange digitorum*, in morem fere eorum, qui in densis sylvis venantur bis quinquæ catellia.“

46) „Ira interdum ad excandescentiam neque locum habere suo modo potest“ FRIDERICII. Ac re vera linguas extraneas nunquam melius loquimur, quam sub iras levioris insultu.

47) „Saepe recordari medicamine fortius omni.“ WANDERL l. c. p. 17.

48) Nosse morbum, pars curationis.

49) Ordine nil ad studia proficuum magis, nil confusione exitiosius.

50) RHASES, upupae linguam suspensam oblivionem tollere, existimat, alii amethystum.

CAPUT XIX.

De moerore in genere deque nostalgia in specie.

§. LXXXI.

Definitiones. Literatura.

1. **D**olor, vel a praesentia mali alicujus, vel Definitio-
nes. a bono, quod habuimus, amisso, vel a bono, quod expetimus, denegato, oriens, cum virium languore, animique abjectione, *moerorem* constituit, qui, utpote ex desiderio reditus ad domum pullulans, *nostalgia* ¹⁾ audit.

2. De *moerore*, praeter auctores, qui genera- Literatu-
ra. tim de animi pathematibus scripserunt ²⁾, legantur VOGHTER ³⁾ et J. STAHL ⁴⁾, deque *nostalgia* in

1) A Graec. Νόστος, reditus, et ἄλγος, moeror. Syn. Nostomania, nostrassia. GERM. Heimwehe, Schweizerkrankheit. BELG. Heimwee. DAN. Hjemvee, Hjem-syge. SUEC. Hemsjuka. ISLAND. Heimsótt. Ross. Тоска по родинѣ. POL. Tęsknota do swoich. ANGLO. Longing for home, broken heart. GALL. Maladie du pays, mal du pays, nostalgie. ITAL. Malattia del paese. HISP. Mal de país. LUSIT. Doença do país.

2) Cap. I. §. III. No. 2.

3) Diss. de morbis moerentium. Alsdorf. 1703.

4) De immoderato anxio moerore, morbi mortisque auctore, Erf. 1732.

in specie: HARDERUS¹⁾, TAKIUS⁵⁾, ZWINGERUS⁷⁾, HOYER⁸⁾, SCHEUCHZER⁹⁾, HEUBER¹⁰⁾, ZIMMERMANN¹¹⁾, VERHOVITZ¹²⁾, MORICHEAU-BEAUCHAMP¹³⁾, GERBOIS¹⁴⁾, CASTELNAU¹⁵⁾, PELLEGRINI¹⁶⁾, THERRIN¹⁷⁾, PAUQUET¹⁸⁾, POLINIÈRE¹⁹⁾, MOREAU DE LA SARTHE²⁰⁾, PERCY ET LAURENT²¹⁾, ZANGERL²²⁾, LARREY²³⁾, ANDRESSE²⁴⁾ etc.²⁵⁾.

§. LXXXII.

- 5) De nostalgia. Basil. 1678. in HALLEMI coll. diss. pr. T. I. No. 2.
- 6) Diss. exhib. aegrum nostalgia laborant. Giess. 1707.
- 7) Diss. de pathopatriidalgia. v. Fasc. med. sel. Basil. 1710.
- 8) De nostalgia. Acta acad. nat. cur. Vol. 3. p. 74.
- 9) De nostalgia (*Heimwehe*; *maladie du pays*), qui morbus est Helvetorum proprius. Comment. Bononienses. T. I. C. p. 85. O. p. 307.
- 10) Diss. de nostalgia. Wirceb. 1755.
- 11) *Von der Erfahrung in d. Arzneykunst Th. 2.* p. 483.
- 12) Diss. de nostalgia. v. EYERL coll. diss. STOLLII.
- 13) *Réflexions sur les modifications que l'éducation et les habitudes ont apportées dans le développement de la nostalgie, pendant la dernière guerre. Mém. de la soc. méd. d'émulation an. 5.* p. 66.
- 14) *Essai sur la nostalgie.* Paris 1803.
- 15) *Diss. considérations sur sa nostalgie.* Paris 1806.
- 16) De nostalgia in ORTESCHI diar. med. T. 4, p. 372.
- 17) *Essai sur la nostalgie.* Paris 1810.
- 18) *Dissertation sur la nostalgie.* Paris 1815.
- 19) *Diarrhée chronique, compliquée de nostalgie. Annales de la soc. de méd. prat. de Montpellier. T. 4.* p. 142.
- 20) *Un nostalgique promptement guéri par quelques entretiens avec un de ses compatriotes. Mém. de la soc. méd. d'émulation. an. 6.* p. 178.

§. LXXXII.

Symptomata. Necroscopia. Causae.

1. *Moeror* profundus et, acutissimus illius ^{Sympto-} status, *desperatio*, pro re nata sequentia exhibent ^{mata.} symptomata, debilitatem videlicet, tremorem extremitatum inferiorum, flexionem genuum, cutim rugosam, siccam, asperam, vel et sudore profuso viscido coopertam, capillos flaccidos, faciem pallidam, collapsam, subflavam, oculos concavos, nitore destitutos, rubros, exsiccatos, vel lacrymis innatantes, lucem aegre ferentes, aures rumorem respuentes, amorem solitudinis, animum nunc stupidum et attonitum, nunc irritabilem ¹⁾ et ad injustitiam pronum ²⁾, delirium, sub quo aut visiones objecti amissi, aut exclamatio illius nominis ³⁾

21) *Dictionnaire des scienc. médicales*. T. 36. p. 265—281.

22) *Ueber das Heimweh*. Wien 1820.

23) *Recueil de mém. de chirurgie*. Paris 1821. p. 161. et in FR. NASSE *Zeitschrift für psychische Aerzte*. Jahrg. 1822. Heft 2. p. 153.

24) *Nostalgiae adumbratio pathologica*. Berol. 1826.

25) *Pensées d'un allemand sur la nostalgie*. Jen. 1714. BLUMENBACH *med. Biblioth.* B. 1. St. 1. p. 732. BALDINGER *neues Magaz.* B. 10. p. 405. DELLAPORTE *Reisen eines Franzosen*. Th. 7. p. 184. PIDERIT'S *prakt. Annal.* B. 2. HAMILTON in *Med. Comment. von Edinb.* B. 2. St. 1. p. 251.

1) *Observante jam PLUTARCHO.*

2) *Medici, moeroris effectus hujusmodi memores, familiaris defunctorum plurima ob id condonabunt.*

nis ¹⁾ occurrunt, agrypuam, somnum profundum, sive subultibus, somniisque terrificis perturbatum, risum sardonicum, trisum ⁴⁾, paralysis ⁵⁾, lipothymiam, cordis oppressionem ⁶⁾, palpitationem, angustiam, suspiria, gemitus, pulsum parvum irregularem, saepe lentum ⁷⁾, frigus concutiens, calores fugaces, os amarum, halitum foetentem, sitim, ciborum aversionem, aliquando voracitatem ⁸⁾, cardialgiam, colicam, alvi obstructionem, diarrhoeam, urinam copiosam, peculiari odore instructam ⁹⁾, evacuationes consuetas, inprimis menstrua et haemorrhoides suppressas, maciem ¹⁰⁾ aliaque infra tradenda.

Necro-
scopia.

2. Moerentium *cadavera* obtulerunt: vasa
cerebri

- 3) E. c. in nostalgia. O mater mea! Aut: *Ich will heim, ich will heim!* HARDEN l. c. §. 6.
- 4) TISSOT op. c. p. 381.
- 5) CAMERARIUS de efficacia animi pathemat. p. 17. Pater meus in Principa C. C. a moerore ob mortem uxoris, paralysis musculorum dimidii lateris faciei vidit.
- 6) „Tristitia cordi nocet et exsiccat ossa“ SALOMON. prov. 12.
- 7) Ad 36 in minuto primo hic numeravi.
- 8) Sunt qui quo graviore laborant moerore, eo majori etiam ciborum desiderio instruantur.
- 9) ELLIOT de urina moerentis violarum odore instructa refert (de med. stimul. p. 46).
- 10) Quantum sit imperium moeroris in processum nutritionis MORREAU (*Mém. de la soc. méd. d'émul. T. 2. p. 178*), REIL (*Rhaps. p. 269*) aliique docuerunt.

cerebri cruore turgida ¹¹⁾, meninges phlogosi tentatas ¹²⁾, pulmones et cor sanguine obrutos ¹³⁾, pleuram inflammata ¹⁴⁾, cor praemagnum ¹⁵⁾, venam cavam dilatata ¹⁶⁾, ventriculum et intestina aëre distenta ¹⁷⁾ et calculos vesicae felleae ¹⁸⁾.

3. Moeroris praecipuae causae sunt: *factura Causae.* sanitatis, mors parentum, alterutrius conjugum, prolium, amicorum, amissio patrimonii, bonorum, potestatis et patriae maximeque *nostalgia*. Tali morbo (aliquando ad habitationem circumscripto ¹⁹⁾) subjiciuntur praesertim cives reipublicae, nativi Alpium ²⁰⁾, ut Helveti, generatim populi, qui illum culturae gradum, quo homo cosmopolita redditur, se necdum attigisse gloriari possunt, milites et nautae in aeternum a laribus abrepti, ad longinquas regiones missi, juvenes, praesertim

11) BARCOX obs. anatom. No. 1. 12) LARREY l. c.

13) BOWEN sepulchr. T. I. p. 899. LARREY l. c.

14) AUBERBUCHER inventum novum ex percussione thoracis etc. Vienn. 1761.

15) VIRIDET *traité du bon chyle*. T. I. p. 29. LARREY l. c.

16) LIEUTAUD hist. anat. med. T. I. p. 135.

17) LARREY l. c. 18) VIRIDET op. c. T. II. p. 631.

19) ARNTZ (Art. med. principes ex rec. HALLER. Lausan. 1769. T. V. p. 60) de fabro lignario narrat, qui, quoties propriam officinam derelinquebat, toties anxietate, suspiriis et delirio prehendebatur, quae domum eo reduce cessabant.

20) Quantum aëris conditio ad nostalgiam excitandam valeat, docere conatus est SCHNEUCHER l. c. p. 307.

sertim il, qui blandius a matribus pertractabantur²¹⁾, doctrinarum universitates extraneas adeuntes etc. Quae rerum positiones quum rarius sexum sequiorem adtingere soleant; cur feminae minus quam mares nostalgiae obnoxiae sint facile intelligitur²²⁾. Haud raro nostalgiae malum veluti ignis sub cineribus latet, donec fortuito a cantilena nationali²³⁾ ac adspectu eorum, qui ejusdem sunt civitatis, a morbis²⁴⁾, ab epistolis etc. excitatur.

§. LXXXIII.

Diagnosis. Prognosis.

Diagnosis. 1. *Diagnosis moeroris occulti ex praesentia symptomatum allatorum, praesertim ex physiognomia, suspiriis, lacrimatione, frigore corporis, sudoribus et pulsu, nec non ex absentia signorum morbum alterius generis indicantium, deducitur. Adjuvant perscrutatio affinium, famulorum, ipsique*

21) GRAM. *Mutter-Söhnlein, die Mamen-Kindlein.* v. WILLIUS in diss. II. de philistrorum Germanorum itineribus.

22) Sic jure sentiunt PRACY et LAURENT, ZANGERL alique, quorum argumenta cur ANDRESSÉ (l. c. p. 54) satisfacere nequeant, haud intelligo.

23) E. c. cantilena helvetica: *der Kuhreihen, le rang des vaches.* V. *Bresl. Sammlung.* 1778. p. 832. et BALDINGER's *n. Magazin* 10. B. p. 405.

24) MORREAU l. c. p. 192. Jure COSTE (*observations sur la campagne d'Espagne en 1823. Paris 1825*) nostalgiam saepe pro aliorum morborum effectu agnoscit.

que vulgi blaterantia. *Simulatus moeror* ex nisu aese patefaciendi et ex magnis jactationibus cognoscitur¹⁾. Realis enim et profundus moeror, mutus est, ut ait SENECA: „citrae leves loquuntur, ingentes stupent.“ *Nostalgia* saepe sub forma *febris nervosae lentae* latet²⁾ et cum aliis morbis complicatur³⁾. Extat praeterea malum nostalgiae oppositum, desiderio felicitatis imaginariae tribuendum, quod nomine *impatientiae loci* designavimus⁴⁾, quodque perspicaciam HOYERi minime aufugit⁵⁾.

2. A

1) „Simulant milites nostalgiam variosque alios morbos ad effugienda exercitia, et confictus belli; qui dolus facile detegitur pulsus robore, aequalitate, colore sano, aversatione disetae tenuis et setaceorum. Dant chirurgi hia pulverem quotidie saepius sumendum, compositum ex aloë, chamaepiti et absinthio. Quam medicinam aversantes milites, ipsimet petunt dimitti ex hospitali, sanos se esse affirmantes, ad suam centuriam.“
SAGAN syst. morbor.

2) Edit. secundae P. I. Vol. I. sect. II. cap. V. §. XXL No. 2.

3) Sic phaenomena in cadaveribus moerentium reperta, vix a moerore ipso, sed potius a morbis fortuitis repeterem.

4) Sunt homines, qui nulla in regione, urbe aut domo diu morari queunt. Quorum alii candide fatentur, se de tali, *situm mutandi nisu*, rationem reddere non posse; alii molestias ubique inevitabiles, ut causam adducunt. Homines hujusmodi praesertim inter professores doctrinarum universitatum obvenire solent. Spectabant ad eos quoque PETRARCA et ALFIERI, qui

Prognosis.

2. A moerore et desperatione, imprimis si terroris sint effectus, haud pauca exempla mortis improvisae numerantur ⁶⁾. Plerumque tamen moeror morbis lente decurrentibus ansam porrigit, ut vitiis cordis et venarum ⁷⁾, pneumonorrhagiae et phthisi pulmonali ⁸⁾, obstructionibus viscerum abdo-

de se ipso dicitur „Io già di bel nuovo mi sentiva innalzato dal furore dell' andare (Vita di V. ALFIERI DA ASTI, scritta da esso. Lucca 1814).

- 5) l. c. observavit juvenes, discendi cupidos, aut solutioris vitae amantes, quibus patria omnium mentis delectamentorum inops videbatur, tanta imaginationis violentia abripi, ut recusata proficiendi potestate, aegrotarent, in tristitiam febremque hecticam inciderent, imo morerentur, paene confecti autem confestim valetudinem reciperarent, si votorum compotes redderentur. Huncce morbum vir cl. *apodemalgiae* nomine denotat. Annuens illum potius *apodemantiam* nuncupare vult (l. c. p. 15), quum desiderium exterius visendi, non patriae fastidium illos homines teneat. Unum et alterum malum plebem germanicam ad alienas regiones, ut colonos, migrantem infestare, facile necum convenies. Miseranda stultities!
- 6) STAHL de passion. animi Th. 23. *École milt.* T. 1. p. 6. GAUBIUS serm. ac. alter. p. 27. HENAUULT *abr. chron.* T. I. p. 363 et 383. BONET sepulchr. T. III. p. 220. TISSOT l. c. p. 377. RUMLER obs. 6. MARCELLUS DONATUS lib. III. c. 13. p. 182.
- 7) TISSOT (l. c. p. 373) ait; ALBERTINI *avait déjà observé, que le chagrin produit plutôt des dilatations dans les veines, que dans les artères.*
- 8) Virgines plures novi, signa evidentia tuberculorum pulmonis exhibentes, ast ceterum vitam sat incolu-

abdominalium, scirrhus mammarum uterique, abortui etc. Qualiscunque autem morbus a moerore excitatus fuerit; is semper solito gravior observatur⁹⁾. Immo nostalgia, nisi cito tolli queat, ut plurimum mortem properat. Notandum etiam, moerorem curam aliorum morborum impedire, ac virtutem pharmacorum eludere.

§. LXXXIV.

C u r a.

1. Moeroris cura bifaria est; quarum altera *Genera-*
consolationem, altera *auxilia chirurgica, pharma-*
ceutica et diaetetica respicit. Per illam morbum
ipsum aggredimur, per hanc illius temperamus
effectus.

2. Consolatio¹⁾ causae moeroris adaptan- *Consola-*
da²⁾. *tio.*

mem ducentes, donec profundus moeror accessit, quo facto, praevia plerumque pneumorrhagia phthisis cursu citato evolvebatur.

9) AVERSBACH apud ENNTZL Varsov. phys. illustr. p. 168. TISSOT (l. c. p. 379) inquit: „*je me suis plaint, il y a plus de vingt ans, que les maladies, occasionnées par le chagrin, étoient presque toujours fâcheuses.*“

1) Utinam CICERO¹⁾ liber, quem ob amantissimae Tulliae obitum *de consolatione* inscripsit, ante nostra haec tempora non intercidisset. Interim quod in CICERONE fuit amissum, in BOETHIO nobis fuit restitutum (JUL. MARTIANUS ROTA in vita Boethii). Accessit LIPSIIUS in libr. duob. de *Constantia*, et EDLMANN in diss. philos. de officio consolandi, sive luctum erecta rat. minuendi. Lips. 1689. edita. Haud dudum

da *). *Si haec in morbo dolorifico, taediosae curationis locata sit*, medici assiduitas duplicata, sollicitudo in minimis incommodis leniendis, enarratio casuum similium ab aliis patientiâ superatorum, et alia hujus generis optimam consolationem afferunt; *Moerore ex interitu objecti amati oborto*, in primo limine nec verbum consolationis, quoniam semper importunum, proferendum. Curari solum debet, ut moerens ab amicis aliisque luctum percipientibus circumdetur. Lacrymae enim a lacrymis optime eliciuntur, ad quas obtinendas maximum impendendum est studium. Quamobrem si elapso uno alterove nychthemero ab infortunii tempore oculi adhuc arescant, ad moerorem consulto impellimus tum qualitates objecti amissi enarrando, tum illius extollendo pretium. Mos cadaveri valedicendi, si fieri licet, reprimendus, ne loco unius duo occidant funera³⁾. Inter ea hic quoque exceptiones occurrunt, vidimusque miseros a tali ultimo frigidoque amplexu quietiores evasisse. Quaestio saepe instituitur, num domus, infortunii testis, a superstitibus derelinquenda

DESMOUTIER idem argumentum eleganter pertractavit (*occuras*).

2) „Nam ut medici, causa morbi inventa, curationem esse inventam putant; sic nos, causa aegritudinis seu doloris reperta, medendi facultatem reperiemus.“ Cicer. tusc. quaest. lib. III.

3) Apud auctores supra allatos nonnulla exempla hominum sic demortuorum occurrunt.

quenda sit, nec ne? Non derelinquenda, ne red-
cundo, semisanatum vulnus iterum saucietur.
Neque res, per adassociationis leges ideam defuncti
revocantes, removendae sunt; cum harum rerum
inconsueta absentia longe magis quam ipsa earum
praesentia tristes excitare soleat ideas. Commutata
desperatione in chronicum moerorem, quaedam
solitudo, imprimis rustica *) non impedienda.
Aet ne quid nimis, ne simplex hominum evitatio
in fugam, atque fuga in misanthropiam degene-
rent. Cum vero infortunnium unum adveniat, alia
mala, e. c. curae domesticae et similia, plerumque
attentionem moerentis magis magisque ab objecto
amisso distrahunt. Idem itinera, socio amico,
efficiunt. *Nostalgiae* spes patriam revisendi, com-
mercium cum iis, qui ejusdem sunt civitatis, aut
saltem idem loquuntur idioma, victus nationalis
et bona hospitum officia opponenda sunt. Si ea
effectu destituerentur, reditus in patriam, etiamsi
debilitas aegri itineri obstare videatur, sine mora
properandus. Ad medici officium rarius spectat,
moerentes ex jactura patrimonii, bonorum, pote-
statis, spei frustratae, philantiae laesae consolandi;
interea tali sese exhibente opportunitate et
quocunque demum in casu, ad mentem revocan-
dum: nil in natura dari stabile, praeter ipsem
rerum inconstantiam, — omnia fluxui et refluxui

U n 2

sub-

4) „L'homme profondément affligé ne se console qu'avec
la nature.“ DESMOUTIER L. c.

subjecta et infirma 5) atque humana esse, ideoque tolerabilia, quod et tulerint caeteri et adhuc alii ferant; — multa bona proprie ad hominem non pertinere, ita ut homo, qui in illis suam quaerit felicitatem, nubem pro Junone amplectatur; — mortem omnes sub leges suas atras vocare; — multa non esse mala, quae videantur 6); — mala praebere occasionem virtutes exercendi; — dolore malum minui non posse, immo dolorem malum malo addere; — felicitatem in animi tranquillitate consistere, non gemmis et auro emi; — bona, quae vel habemus vel speramus, amissis non esse postponenda et similia. Quibus singulis fides in DEUM, submitio illius voluntati, vitae melioris certitudo aliaque ex sancta religione Christiana petita argumenta, caeteris palmam longe praeripiunt.

Anxil.
chirurg.
aliaq. ex-
terna.

3. Si moeror derepente, praesertim ex terrore ingruat, si aeger plethoricus sit, si de gravida agatur, si cerebrum, cor, ventriculus aut hepar doleant,

5) HIPPOCRAT. aph. 3. Mente tenendum est illud NA-
ZIANZENI carmen praec. ad VIROIL:

— Terram properamus ad unam,

Quoscirca nec te praesentis commoda vitae

Immodice oblectent, nec rursus tristitia frangant,

Tristitia namque simul et jucunda necesse est

Linquere cuncta brevi.

6) „Il n'y a point de malheur, auquel on ne puisse trouver quelque consolation; et il y en a plusieurs, que l'on peut, par une conduite judicieuse, faire tourner à son avantage.“ DESMOUTIEN l. c.

doleant, sique fluens cum emolumento cruor retineatur, *venae sectio* nunquam negligenda. Hujus enim neglectio, ob praeconceptam opinionem, animi pathemati deprimenti auxilium debilitans, non esse opponendum, gravissimis morbis liberum saepe concessit aditum. Circa loca maxime affecta, aut ex quibus antea cruor cum levamine fluebat, *hirudines* applicandae. Alvus *clysters antiphlogistico* sollicitanda. Ad noctem *pediluvium tepidum*. Profecto jam malo, praesertim agrypnia et cuti sicca stipato, *balneum amoenae calidum* levamen adducit.

4. Moerore confectos pharmacis obruere vel- Pharma-
ca.
le, absurdum foret. Interea, sub iisdem rerum positionibus, sub quibus venae sectionem commendavimus et *emulsio ex quatuor sic dictis seminibus frigidis majoribus et minoribus* aut alia quaedam, addita *nitratiss potassae* modica dosi, utiliter praescribitur. Perstante vasorum sanguiferorum, irrita methodo antiphlogistica, turba, ad *acida vegetabilia* et si haec nil efficerent, ad *acidum sulphuricum alcoholisatum*, nec non ad ipsum *foliorum digitalis purpureae infusum* confugiendum foret. In minori moeroris gradu, et absente plethora, *pulvis antispasmodicus ruber Stahliani* cum *aqua quadam aromatica* 7) egregie conducit. A remediis

7) Sequens formula mihi familiaris hic est: R. Aquae melissae uncias sex. Pulveris antispasmodici rubri Stahliani drachmam unam. Spiritus nitri dulcis scrup-

diis spirituosius, calidis, excepto solo *aethere nitrico alcoholisato*, abstinendum. In moerore chronico et nostalgia pharmaca amara, leniter tonica, et praesente jam febre lenta, methodus alibi indicata *) adhibenda.

Auxil. 5. In gravi et repentino moerore nil pejus
diaetetica. quam si aeger ad cibos, imprimis carneos, sumendos adigatur. Exhibeatur illi solum *potus multus, subacidulus*, vel *aqua frigidiuscula cum saccharo*, ac cibi tenues, praesertim *fructus horaci*. *Vinum*, nisi aeger sit exhaustus valdeque debilis, non concedendum, in moerente nempe mentem non exhilarat, sed contrarium potius gignit effectum. Idem efficit *musica*, hic non nisi ad lacrymas eliciendas commendanda. Contra ea solatium in motu corporis et in studiis *) quaerendum.

CAPUT

pulum unum. Syrupi papaveris rhoeados unciam unam. M.

8) Edit. secundae. P. I. Vol. I. sect. II. c. V. §. XXXI. No. 12—43.

9) „Quae quidem ego non ferrem, nisi me in philosophiae portum contulissem.“ CICERO ad Curionem. lib. VII. ep. 30.

CAPUT XX.

D e i r a .

§. LXXXV.

Definitio. Literatura.

1. **A**ppetitus vindictæ ex apprehensione Definitio.
mali illati, *ira* ¹⁾ dicitur.

2. De ira scripsere: HIPPOCRATES ²⁾, ARI- Literatp-
STOTELES ³⁾, GALENUS ⁴⁾, SENECA ⁵⁾, WIERIUS ⁶⁾,
CHARRON ⁷⁾, HANNKIUS ⁸⁾, GOECKEL ⁹⁾, HUNDES-
HAGEN ¹⁰⁾, WILLIUS ¹¹⁾, ZWINGER ¹²⁾, ETTMÜL-
LER ¹³⁾,

1) Gr. θυμός, ira, χολή, χόλος, bilis. GERM. Der Zorn.
GALL. La colère. ITAL. La collera. POL. Gniew.
ROSS. Гнѣвъ.

2) Epidem. II. sect. 5. Th. 8. sect. 6.

3) Lib. II. Rhetor. cap. II. et lib. I. De anima. c. I.

4) De placit. Hipp. et PLAT. lib. III. De temperament.
lib. II.

5) De ira libri tres. Opp. Vol. I. Amstel. 1672.

6) Libellus de iræ morbo et ejus curatione philosophi-
ca, medica et theologica. Basil. 1577.

7) De la colère, chap. 25. du livr. 1. et chap. 31. du
livr. 3. de son ouvrage intitulé: Les trois livr. de la
sagesse. Paris 1604.

8) Diss. de ira. Jen. 1653.

9) Betrachtungen des Zorns und der daraus entspringen-
den Krankheiten. Hall, 1665.

10) Diss. de ira. Jen. 1666.

11) Diss. de ira. Argent. 1671.

LER ¹³⁾, FICKIUS ¹⁴⁾, ALBERTI ¹⁵⁾, MONTAIGNE ¹⁶⁾, CLAVILLART ¹⁷⁾, RUGEMER ¹⁸⁾, BÜCHNER ¹⁹⁾, VANDERBELEN ²⁰⁾, PLATNER ²¹⁾ et FOURNIER ²²⁾.

§. LXXXVI.

Symptomata. Necroscopia. Causae.

Symptomata.

1. Irati de consilio, de ratione, de mente et de potestate exeunt ¹⁾. Furentium instar insigne habent robur et magnam audaciam, ad omne scelus prompti. Reverentia, verecundia, omniaque rerum externarum respectus extinguuntur. Quidquod ira excandefacti, licet vulnerentur, id tamen non illico sentiunt ²⁾. Facile alios interimunt, vel

12) De irae nat., effect. et remed. Basil. 1699.

13) Diss. de ira. Lips. 1705.

14) Diss. de irae efficacia et remediis. Jen. 1718.

15) Diss. de irae energia ad morbos producendum. Hal. 1720.

16) Chap. 31. du livr. 2. de ses essais. Londr. 1724.

17) De ira, noxa, atque ejus utilitate. Monspell. 1744.

18) Diss. de effect. irae med. considerat. Würceb. 1752.

19) Diss. de irae noxio et salutari effectui in corpore humanum. Hal. 1757.

20) Diss. de praecipuis ab ira in corpore humano productis effectibus. Lovan. 1788.

21) Diss. de excandescencia furibunda. Lips. 1800.

22) *Diction. des scienc. méd.* T. 6. p. 3—9.

1) CICERO IV. Tusc. c. 23.

2) WEDDEL pathol. p. 142. Quondam et mihi in Italia homines clandestine sub rixis vulneratos videre contigit, qui multum gradiebantur, antequam proprium statum cognoscerent.

vel sibi ipsis violentas quandoque inferunt manus ³⁾, vel res circumpositas, ut specula, vasa vitrea sive fictilia, horologia cum proprio damno confringunt. Facies immanis, rubra, pallida, sub-nigra ⁴⁾, supercilia rigida, frons rugosa, oculi ignei, intuitus trux ⁵⁾, lacrymatio ⁶⁾, aliquando cruenta ⁷⁾, vertigo, labia inflata, alba, tremula, fissa ⁸⁾, os amarum, aridum, spuma virulenta ⁹⁾
cooper-

3) ZACUT. LUSITAN. de med. princip. hist. lib. II. obs.

3. JON. LANGIUS apist. 38. lib. I.

4) OVIDIUS lib. III. de arte amandi. „Ora tument ira, nigrescunt sanguinea venae.“ V. diss. de erubescens, et subitan. capit. venarum tumore. Auct. MÜLLER. Lips. 1739. p. 23.

5) FICHTUS l. c. cap. III. Creditum quondam fuit, tor-tum iratorum intuitum alitis noxam inferre, quod cum magnetismi animalis phaenomenis nonnullis comparandum esset,

6) Constat feminas et infantes saepe iram fletu manifestare.

7) PETR. BORELLI obs. 56. cent. II. p. 155.

8) Scanderbegio praeliatus cum Turcis prae fervore et ira, a fissis labiis sanguis effusus est. V. ANDR. LINNAEUS de cruent. cadav. Thes. 205.

9) De morsu iratorum hydrophobias ansam porrigentia habentur exempla: in Eph. nat. cur. dec. III. ann. 9 et 10. Opp. No. 249. Act. erud. Lips. ann. 1702. p. 147. 1706. p. 456. 1707. p. 147. Hist. de la soc. R. de méd. de l'an. 1782—83. T. 2. p. 57. 60. Mé-moire de l'ac. de Dijon. I. hist. p. 110. Berliner Samml. 1. B. p. 334. BLOCH med. Bemerk. p. 138. SCARAMUCCI lettera sopra un idrofobo. Macerata, 1702.

coopertum, stridor dentium, mordendi desiderium, screatio frequens, halitus foetens, sitis, lingua balbutiens, epistaxis, vox intersecta, stridula, aphonia ¹⁰), anhelatio, angustia pectoris, respiratio difficilis ¹¹), sputa cruenta ¹²), cordis palpitatio aut tremor, pulsus frequens, plenus, intermittens ¹³), febris ¹⁴), ardor ventriculi, ructus acidi ¹⁵), vomitus ¹⁶), haematemesis ¹⁷), diarrhoea ¹⁸), cholera ¹⁹), colica ²⁰), maxime in herniosis ²¹),

DAYWANSKI diss. hist. aegri hydrophob. exhib. Vilnae 1815. De *ulcere putrido* difficilis medelae a morsu irati v. HILDANUM obs. I. obs. 85. GLANDORF spec. chir. obs. 49. ETTMÜLLERUM pathol. p. 37.

10) In matre quadam, quae filii filiaeque stupro interveniebat, apud VALERIUM MAXIMUM dict. Fab. memorab. lib. I. p. 57.

11) Monet HIPPOCRATES (epidem. VI) difficultate spirandi laborantes, clamore et *iracundia* abstinere debere.

12) HIGHMORUS disquisit. anatom. p. 172.

13) BELLINUS opusc. p. 627. TIMAEUS A GULDENKLEB lib. II, cas. 16. p. 104. PECHLINUS obs. lib. III, obs. 25.

14) HILDANUS lib. I, obs. 18. „ira non excitat febrem, sed est ipsa febris.“ ETTMÜLLER L. c. ex CAMPANELLO.

15) ETTMÜLLER prax. med. P. I. c. 6. p. 59.

16) RIEDLINUS (lin. med. ann. IV. p. 912) de muliere nonagenaria refert, quae cum ex improvise filia lintea quaedam pretiosa combussisset, inde furere incepit, succedente copioso vomitu.

17) ROLVINGIUS (ex HIERONYMO L. c. p. 145) exemplum Imperatoris VALENTINIANI referens.

18) WINSLOW diss. de solenni alvi solutione ex ira et

sis²¹⁾, urina tincta, transpiratio aucta, suppressio menstruorum²²⁾, lochiorum, haemorrhagiae uteri²³⁾, hepatis²⁴⁾, abortus²⁵⁾, lactis depravatio²⁶⁾, pedum pulsatio²⁷⁾, tremores²⁸⁾, convulsionones²⁹⁾, lipothymiae³⁰⁾ et mors³¹⁾ — en irae phaenomena!

2. Ca-

moerore. Hafniae 1695. 1898. In app. ad ephem. germ. dec. II. an. 5. p. 57. observatio ludi moderatoris legitur, qui quamprimum discipuli vel domestici peccarunt erga eum, subito excrementa alvi egerebat.

19) ETTMÜLLER l. c. in colleg. consult. cas. 41. RIEDLIN an. IV. p. 912.

20) TULPIUS lib. V. c. 41. WALDSCHMIDT prax. cas. 30.

21) HOFFMANN comment. in Poter. p. 247.

22) KÖLICHEN in Act. med. Hafn. Vol. II. p. 288.

23) RIEDLIN l. c. p. 611. PRICHLINUS lib. III. obs. 25.

24) *A dissertation on the influence of the passions in the production and modification of disease. By P. TOWNSEND, New-York 1816.*

25) GALEN lib. V. aph. comment. 45 et 53. Miscell. nat. cur. dec. II. ann. I. p. 252. Ann. 1811. in gravida septem mensium nubili, cum amasius de origine infantis dubium moveret, sub affreni ira illico partus secutus est Vilnae.

26) Lac nutricum post iram, infantibus ubera angentibus nocivum esse, nemo ignorat, qui ex hac causa colicas, convulsionones observavit. Cfr. ALBINUS de atherapeus. morb. et J. G. SOMMERUS in Misc. nat. cur. dec. II. ann. 2. obs. 172.

27) „Nescit vestra mens ira referta pedem.“ PROPERT. Cfr. Diss. de pediloq. auct. KESSLER. Altorf. 1702.

28) PELARGUS med. Jahrgänge. 4. p. 207.

29) PLATERUS obs. lib. I. p. 34 et 504.

30) WELSCH obs. med. cent. I. obs. 30.

Necro-
scopia.

2. *Cadavera* praeter reliquias apoplexiae obtulerunt: pericardium exsuccum et squalidum, carneamque cordis substantiam plane consumptam instar loculi vacui corrugatam ³¹⁾ et haemorrhagias ex aorta in pericardium rupta ³²⁾.

Causae.

3. Disponunt ad iram temperamentum cholericum, cholericum-sanguineum ³³⁾, peculiaris cranii forma ³⁴⁾, corpus pusillum, tenue, macilentum, infantia ³⁵⁾, senectus, sexus femineus ³⁷⁾, men-
strua-

31) CAMERARIUS memorab. cent. X. No. 52. 53. FABR. HILDAN. cent. I. obr. 18. ep. I. HANNES in Act. Mogunt. 1776. No. 21. Falso hinc dixit GALENUS: „ab ira nemo interit“ (De sympt. caus. lib. II. c. 5).

32) BOWEN anat. pract. lib. IV. c. 12. p. 552.

33) Ephem. nat. cur. dec. I. ann. 1. obs. 69. ann. IV et V. app. p. 54.

34) „Qui venae in cubito conspicuum pulsum habet, is furibundus in acerbam iracundiam praeceps facile est.“ Item: „qui calido ventriculo praediti sunt, frigidas habent carnes, tenuesque existunt, conspicuas denique eminentesque venas obtinent.“ HIPPOCR. epid. lib. VI. partic. 4. aph. 23.

35) „Quibus caput magnum, oculi parvi et balbutiens lingua est“ — item — „qui inconviventibus oculis intuentur“ — ad iram dispositi sunt.“ HIPPOCR. epid. 2. sect. 6.

36) „Pueri, mulieres et infirmi saepius irascuntur.“ SORANIUS sect. 4. aph. 78.

37) „Non est ira supra iram mulieris.“ ECCLESIASTES. c. 25. „Muliebre est furere in ira“ SENECA lib. I. — „nullum malum adeo infestat femineum sexum, quam amoris aut irae excessus: amor earum est insatiabilis

struatio³⁸⁾, graviditas, peculiaris regionum conditio³⁹⁾, civitatumque positio⁴⁰⁾, indoles nationalis⁴¹⁾, consuetudo⁴²⁾, fames et sitis⁴³⁾, potus
liquor-

et ira irreconciliabilis“ KOZAK de haemorrhag. lib. II. c. 20. p. 635.

38) Mansuetas alias feminas cognovi, quae tempore menstruationis perquam irascibiles evadebant.

39) „Ubi regio nuda est, non munita, aspera, quaeque hinc premitur, et sole exuratur, ibi duros, graciles etc. cernas homines, qui mores habent superbos, ad iram proclives et pertinaces, magisque feritatis quam lenitatis participes.“ HIPPOCR. de aëre, locis et aquis.

40) „Civitates, quae quidem soli orienti sunt expositae, eas salubriores esse par est his, quae ad septentrionem obversae sunt etc. Hominea clara voce sunt praediti, et ad iram et prudentiam magis sunt comparati, quam septentrionales.“ HIPPOCR. l. c.

41) Italos et Rossicos longe magis irascibiles inveni, quam Germanos et Polonos.

42) „Ubi semel ad iram non commoveri passim sumus, paratiore evadimus ad alta vicia, similem ob causam, irascendum.“ CLAUDIUS de corp. et anim. conjunct. cap. 36. „Non ergo mirum, milites, qui nil aliud quam caedem et sanguinem cogitant aut patrant, attonitu vultu effaratoque, ob leves quoque injurias, saevire statim, vehementerque excandescere: consuetudo enim, prout temperamentum, animi mores confirmant.“ FISCHER l. c. §. 8.

43) „Si quis prandere consuetus, non prandeat, ei os amarulentum evadit, vehementer irascitur et moeret.“ HIPPOCR. de priaca med. „Fames et sitis exasperet animos et incendit.“ SENECA de ira, c. 9 et 10.

liquorum fermentatorum ⁴⁴⁾, opium ⁴⁵⁾, motus corporis et vigiliae ⁴⁶⁾, musica militaris ⁴⁷⁾, terror ⁴⁸⁾, amor ⁴⁹⁾, morbi chronici ⁵⁰⁾, potissimum icterus, podagra ⁵¹⁾, phthisis ⁵²⁾ et syphilis ⁵³⁾.

Praeter

44) DODONAEUS stirp. hist. Pemptad. III. c. 31. p. 421. Rixae cruentas in Italia plerumque vino et lusu adscribendae sunt. Interea SCHULZIUS (aph. med. sect. 6. aph. 126) pulcre dicit: „vinum alios facit *iracundos*, alios humanos.“ Sic vulgus in Polonia abrius non ferit, sed osculatur.

45) WADLIUS de opio. p. 168.

46) „Sic in lassitudine, siti, inedia, *intempestiva vigilia* prouior quisque ad iram, sic fames et mora ex PLAUTI sententia, bilem in nares concient.“ LAMMIUS de occult. natur. mirac. lib. I. c. 16. p. 116.

47) PLUTARCHUS refert, quod cum *Alexander* audisset Antigenidem tibia modos incinentem, qui vocantur harmatici, adeo exarserit, ut simul cum armis surgens, manus injiceret in proximo sedentes.

48) Vehementem iram facile magno terrori succedere monet SYLVIVS in prax. med. lib. III. c. 3. §. 283.

49) Irasci facile amantes testatur, praeter quotidianam experientiam, BARICELLUS in hortul. genial. p. 225.

50) „Adeo invalidum omne natura querulum est.“ SENECA l. c.

51) Ex proclivitate solito majori ad iracundiam plurimos podagricos futurum ejusdem mali paroxysmum praedicere audivi.

52) „Qui phthisi laborant, ad impatientiam et *iracundiam* valde prouisi ac proclives sunt.“ FR. HOFFMANN med. rat. syst. T. I. sect. II. c. 2. §. 18. p. 517. Scholion.

53) Cap. XVII. §. LXXIV. 1 (12).

Praeter injurias, ira excitari solet ab oppositione culpa tum ex alterius iguorantia ⁵⁴⁾, tum ex diversitate opinionum orta, ab impotentia quod injustum, etiamsi alios tangat, tolerandi, a cognitione priorum errorum ⁵⁵⁾, atque haec singula eo facilius in philautis et superbis, in suspicacibus et credulis, in curiosis et invidis, in zelotypis et avaris, in ambitiosis et luxuriae deditis, aliisque animi vel corporis dotibus antecellentibus ⁵⁶⁾.

§. LXXXVII.

Diagnosis. Prognosis.

1. Ira, animi pathema est, conservationi proprii individui destinatum ¹⁾. Varii illius gradus ^{Diagnosis.} statui

54) E. c. in regione extranea, incolarum idioma ignorando; aut animalibus domesticis irascendo.

55) *Dictionnaire des sciences médicales*, l. c. p. 4.

56) „In multa sapientia multa est indignatio; et qui addit scientiam, addit et laborem.“ Ecclesiastes. cap. 1.
„Gravissima est probi hominis ira.“ PUBLIUS SYRUS.

1) Quemadmodum omnis natura, acribente CICERO (de fin. lib. IV. c. 7), vult esse conservatrix sui, ut et salva sit et in genere conservetur auct; ita omni animantium generi, ut idem TULLIUS (de officiis lib. I. c. 4) loquitur, principio a natura tributum est, ut se, vitam, corpusque tueatur, declinetque ea, quae nocitura videantur.

Formicae sua bilis inest et maribus ira,

Nil adeo vile est, quod se non vindictae laesum

Utatur.

Fatetur quoque SENECA (lib. I. de ira cap. 11): „Utilis est ira, quae contemptum effingit, quin malos ter-

statui aolent. Dicitur nempe *excandescencia*, ira subita, *amaritudo*, ira perseverans, et *furor*, cum iratus non acquiescit, donec ultus fuerit ²⁾. Dividi quoque potest ira in *apertam* et *occultam* ³⁾. Illa, cum vultus rubore, benigna est, facile excitanda et sedanda, minus metuenda ⁴⁾; haec, cum pallore, longe peior, periculosa et pertinax. Qui iram in *simplicem* et *compositam* dividunt, ignorant omnem iram *compositam* esse. Enimvero iram semper comitatur *dolor*, quem accepta parit injuria, *odium* hominis, qui intulit injuriam, et *voluptas*, quae nascitur ex spe futurae ultionis ⁵⁾. Irae accessus similitudinem habet cum *delirio* ⁶⁾ et *epilepsia* ⁷⁾.

Prognosis. 2. Ira saepius repetita physiognomiae peculiarem characterem imprimit ⁸⁾. Praeterea defraudatur

ret.⁴ Talem iram neque *scriptura sacra* improbare videtur, dum ait: „irascimini, et nolite peccare.“

2) PLATER de excandescencia furibunda. Lips. 1800.

3) CARTESIUS de passion. anim. art. 201.

4) SEBIZIUS exerc. patholog. T. I. p. 127.

5) ROLFINCKIUS O. et. M. spec. comment. lib. III, sect. 3. c. 103. p. 114.

6) „An est quicquam similis insaniae quam ira?“ CICERO IV. Tusc. c. 23. HORATIUS (lib. I. epist. 2) iram, furorem brevem vocat; et ERICURUS interrogatus, quid efficeret ira, eam, si immodica sit, parere insaniam respondit.

7) Apud PRACHLINUM (lib. 3. obs. 25) ira, *epilepsiae umbra* vocatur.

8) LAVATER *essai sur la physionom. II. partie. 8. fragm. III.*

datur inde nutritio corporis ⁹⁾, ac via plurimis periculis et morbis sternitur, inter quos erysipelas, hepatitis, icterus, podagra ¹⁰⁾, contracturae et tremores artuum ¹¹⁾, apoplexia ¹²⁾, paralysis ¹³⁾, epilepsia ¹⁴⁾, mania ^{*}) et febres ¹⁵⁾, contagiosis non exceptis ¹⁶⁾, creberrime obveniunt. *Crisi* tamen sua ira non destituitur, imprimis per vomitum ¹⁷⁾ et alvi profluvium ¹⁸⁾, quae, nisi superveniant febris ¹⁹⁾ aut icterus, expectanda. Maxime ira fatalis est menstruantibus, gravidis et puerperis ²⁰⁾,
contra

9) LICETUS de his, qui diu viv. sine aliment. lib. II. c. 110.

10) LAUR. SCHULZIUS consil. med. III. p. 300.

11) ETTMÜLLER Pr. P. II. p. 291. FEL. PLATER lib. I. p. 50.

12) Cap. V. §. XXVI. No. 2 (62).

13) TULPIUS obs. med. lib. II. c. 20. De aphonía ex paralyssi musculorum laryngis. v. VALERIUS MAXIMUS dict. fact. memor. lib. I. p. 57.

14) JOH. MATTHAEUS in quæst. med. p. 27. RIEDLIN. lin. med. ann. VI. p. 14.

*) AMELUNG apud NASSI Jahrb. für Anthropologie und zur Pathologie etc. des Irreseyns. B. 1. p. 267.

15) GALENUS lib. VI. BALLONIUS epid. p. 209. FORESTUS de feb. ephem. lib. I. obs. 2.

16) SENNERT cent. II. epist. 72. p. 681.

17) Plurima talia exempla observavi.

18) HILDANUS cent. I. obs. 18. FRANKENAU satyr. med. 3. p. 67.

19) BAGLIV. prax. med.

20) TULPIUS lib. II. c. 20. BAUMES observation sur une mort causée par un accès de colère, à la fin de

Frank Prax. II. I. 1.

contra ea *salutaris* visa fuit in senibus²¹⁾, cachexia²²⁾, apoplexia²³⁾, paralyti²⁴⁾, tremore²⁵⁾, retentione menstruorum²⁶⁾, obstructione hepatis²⁷⁾, et febris²⁸⁾, quin tamen ob id consulto excitanda sit, rite monente RIEDLINO²⁹⁾.

§. LXXXVIII.

C u r a.

Prophy-
laxis.

1. Arduum est animi pathemati, homini in incunabulis adhuc jacenti, et animalibus communi occurrere. Interea religionem et educationem hic multum efficere posse, inter alia docet hominum tremu-

la résolution heureuse d'un dépôt lacteux. Journ. génér. de méd. chir. et pharmac. Paris 1780. p. 513.

21) HUBAULT ergo irasci senibus salubre. Paris. 1646.

22) HIPPOCRATES lib. II. epid. sect. 4. AETIUS tetrab. I. term. 4. c. 33. BACO DE VERULAM. (hist. vit. et mort. p. 249) ait: „ira sibi permissa et foras prodiens, juvat tanquam medicamenta illa, quae robustum inducunt calorem.“

23) ETTMÜLLER l. c.

24) HORST. lib. III. consil. epist. 12. SCHULZ consil. m. 50. VALLERIOLE lib. II. c. 4. Act. Hafn. Vol. I. obs. 71.

25) PRECHLINUS lib. II. obs. 31.

26) ETTMÜLLER (inst. Part. II. cap. 3) fatetur: „ira moderata convenit mulieribus, quibus non adeo commode fluunt menses.“

27) PRECHLIN l. c. obs. 26. p. 460.

28) Misc. nat. cur. dec. I. ann. 3. obs. 238. BIERLING thes. pract. obs. 11. in schol. p. 105.

29) Lin. med. ann. II. mens. Mart. hist. 20. p. 184.

tremulorum secta ¹⁾. Institutio vero a primo hominis ortu locum habere debet. Qua de causa opera danda, ut matres, quae gerunt utero, et nutrices, quae tenellos alunt, ab iracundia sint immunes. Recens natorum ira blanditiis et uberibus sedanda. Quo primum autem infantes ideas connectere jam incipiunt, virgarum unus alterve ictus reditui iracundiae saepe obstat. Debet autem punitio placate infligi. Oportet hinc, ut dentur iustitiores non truces et feri, sed mites atque placidi. Porro ne infantes sint testes irae parentum. Opus enim est, ut mature juvenes *moderationem* addiscant, et eorum animus tali *generositate* imbuatur, qualis requiritur, ut vilipendantur omnia bona, quae possunt auferri, et contra maximi fiat libertas et imperium absolutum in semetipsum, utque contemptu solo, aut ad summum indignatione ulciscamur eas injurias, ex quibus alii solent offendi ²⁾. Succedit *patientia*, qua homo versus irac feroces motus robustior redditur, eo ipso palmae respondens, quae quo magis premittur,

X x 2

tur,

1) W. PENN in epist. ad uxorem sic ait: „Si ceux, qui te serrent, s'acquittent mal de leur devoir, évites de te fâcher, cela pourroit te nuire; il vaut mieux, de les congédier, s'ils résistent à des simples avis. Le mieux est toujours, de s'abstenir de vaines paroles, qui troublent l'âme et offensent le Seigneur.“ (*Memoirs of the private and publ. life of W. Penn. By TH. CLARKSON, Lond. 1813. ex Biblioth. univers. 1816. Mars. p. 260*).

2) CARTESIUS de passionibus. sit. 283.

tur, eo fortior attollitur³⁾. Obfirmandus ergo animus contra iram, et constituendum firmiter, ei nos non velle locum dare, quicquid etiam molesti et adversi acciderit. Quod facilius obtinebimus assidua meditatione, et consideratione foedissimae turpitudinis atque deformitatis vultus atque gestuum, quibus mentis alienato similis evadit iratus⁴⁾, nec non malorum funestissimorum, quae per iram ingeruntur; et fructuum contra ea mansuetudinis, quolibet vitae tempore suavissimorum⁵⁾. Juvabunt haec promptius, quando per aliquod tempus *irae voveamus abstinentioniam*, ut veluti desuescamus ei gradatim, viventes semper cum placidis, minime morosis, ferocibus et rixosis, a quibus et prava exempla et irascendi causae praebentur⁶⁾. Praeterea causae physicae irae sunt evitan-

3) QUERCETANUS dietet. polyhistor. sect. I. c. 6. p. 28.

4) Ad repraesentandam melius irae deformitatem veteres ejus aetum per *furias* adumbrant, venenatis serpentibus crinitas, flagellum itidem ex serpentibus confectum, et faciem manibus gestantes. Quae etiam TIM. A GULDENKLEE (lib. II. cap. 16) ait: „irae deditus oculos sibi ponat, megeram illam infernalem a PLUTARCHO et SENECA vivis coloribus depictam, ut in hanc intuens, deformitate tam atrocis furiae perempta, mansuetudinem exoscularetur, quemadmodum speculo quosdam ab ira deterritos refert SEXTUS, perturbatos nimirum tanta sui mutatione.“

5) Quae schola salernitana:

„Si vis incolumem, si vis te reddere sanum,
Curas pelle graves, irasci creda profanum.“

6) FICKIUS l. c. cap. V. §. 4.

evitandae. Cibi sunt tales, ut animi asperitatem dulciori succo mitigent 7). Vinum bibendum est parce, multumque aquae 8). Postremo ut corpus optimis succis alendum, ita in molliter subacta culcitra placido somno fovendum, non neglecta licita venere 9).

2. Hisce non obstantibus, fieri tamen potest, ut aliquando irae impetus animum nostrum occupet. Tunc autem proderit initiis mali obsistere et ad *moram* atque *cunctationem* confugere, ut scilicet nihil decernamus, dicamus, aut faciamus, donec ira deferbuerit et ratio rursus probe judicet. Quod veteres innuerunt, quando viginti quatuor alphabeti literas aut dominicam orationem recitare prius praeceperunt. Subsidio sunt *contrariae ratio-*

C. mor-
lis paro-
xysmi.

7) PLINIUS.

8) Ex elogio *Andreas Tiraquelli* a SCAEVOLA SAMMARTHANO conscripto (p. 3) apparet, obiisse illum celebrem aquae potatorem plane senem et animo semper placido et sereno, tranquillitatem quandam ac benignam temperiem in omni vita constantissime retinuisse, neque temere aut ira, aut quavis alia graviore perturbatione visum commoveri, quadragiuta quinque liberorum et totidem librorum fuit sutor, quod sequentis epigramatis condendi occasionem dedit:

„*Fecundus facundus aquae Tiraquellus amator,
Ter quindecim librorum et liberum parens.
Qui nisi restinxisset aquis abstemius ignes,
Implesset orbem prole animi atque corporis.*“

9) PAULUS AEGINETA (p. 9) et AETIUS, *venerem* ut certum contra iram extollunt auxilium.

racionales commotiones, blanda consolatio, promissa securitas, facta fiducia, et musici lenes concentus ¹⁰⁾. Proderunt vix amicorum admonitiones. Potentior approbetur, quoad sensim defervescit aut componitur ad jocum et hilaritatem, ut sensim sensimque sedetur animus, nec ira subito supprimatur, aut ei superveniant alia contraria. Cum vero alii, ex naturali inclinatione, facile, alii difficulter irascantur et placentur; alii precibus vincuntur, exacerbentur alii, alii terrore incusso componantur, objurgatione et increpatione pacificentur, alii saeviente ira non sunt perturbandi; hoc modo omnes pro cujusvis naturae indole atque moribus tractandi sunt, aperte et palam, vel occulte, molliter et acrius, et animi non minor, quam *corporis sic cura* est habenda ¹¹⁾.

C.physica. 3. Varia autem est haec cura, pro varia aegri constitutione. In genere ab auxiliis violentis abstinen-

10) „PYTHAGORAM animo pacando sedandoque ab affectibus et perturbationibus vehementioribus *musicam* adhibere solitum, auctor est PLUTARCHUS, ideoque ut animum suus semper divinitate imbueret, priusquam se somno daret et ex somno expectatus ad citharam cantare consueverat. Cfr. SENECA lib. III, l. c. *Timotheus* musicus, quoties libueret, Phrygio sono *Alexandri* animum ita accendebat, ut efferatus ad arma curreret, et cum aliter voluisset, mutato tono, mentis ferociam suppresserat; emollitumque animum ad epulas trahebat et ad convivium." Sic ETTMÜLLER in disp. de effect. music. in hom. p. 7.

11) FICKIUS l. c. §. 3.

stinendum. Attamen deflagrata ira *venae sectioni* locus est in gravidis, plethoricisque hominibus, praeterea si cor et arteriae cum vi pulsant, venae turgeant, sanguis vehementer ad caput impellatur, hypochondria tensa et dolentia sint, aut menstrua sive lochia suppressa. Ab *emetiis* et *purgantibus* abstinendum ¹²⁾. Contra ea *clysteres antiphlogistici*, et *ecceprotica* commendanda. Laudem et applausum per experientiam obtinere *terrea, testacea*, ut *magnesia*, *lapides cancerorum* et similia, additis granis nonnullis *cinnabaris factitii*. *Potus* sub excandescencia qualiscunque, eoque magis quo calidior ¹³⁾, nocuus. Pace composita, *emulsiones* variae, *aqua selterana saccharata*, aut alia *Jucco vegetabili* mixta conducunt. Sic et *balneum tepidum* ¹⁴⁾. *Opium* solum ingruente alio morbo, illius usum exposcente, exhibendum. Enim vero si ira, absente plethora et febre, spasmos socios habet, praesertim in hystericis et hypochondriacis, guttis nonnullis *aetheris sulphuris alcoholisati* succurrendum.

CAPUT

12) FR. HOFFMANN diss. de medicina emetica et purgante post iram veneno. Opp. T. VI.

13) „Vidimus multos ineffabilem fecisse sanitatis jacturam, qui gravi iracundia incensi infusum herbae theae copiose et calidissime potarunt.“ FR. HOFFMANN med. rat. syst. l. c. §. 16. Scholia. Attamen theam quondam adversus iram in usu fuisse, ex RIEDLINGO video, in Liu. med. ann. II. obs. 2. 26.

14) Balneum enim *calidum* pessime egisse testatur FR. HOFFMANN l. c.

CAPUT XXI.

De amore effreno.

§. LXXXIX.

Definitio. Scriptores.

Definitio. 1. **D**esiderium intensum individuum alterius sexus consequendi, periclitante ratione, *amorem effrenum* constituit ¹⁾.

Scriptores. 2. Praeter magnum illum amoris magistrum ²⁾, de hoc argumento consulendi sunt: GALENUS ³⁾, FERRAND ⁴⁾, FELIX PLATERUS ⁵⁾, SENNERTUS ⁶⁾, FORESTUS ⁷⁾, SCHENKIUS ⁸⁾, BACKHAUS ⁹⁾, VETTER ¹⁰⁾, DU CHATERET ¹¹⁾, ESQUIROL ¹²⁾ aliique ¹³⁾.

§. XC.

1) LAT. Cupido, cupiditas (OVIDIUS), ignis (VIRGIL), ardor (SENECA). GERM. Die tolle Liebe, die unsinnige Liebe, die rasende Liebe. GALL. Une grande passion, aimer à la passion.

2) OVIDIUS lib. de remediis amoris.

3) Opp. 4) *Traité d'amour*. 1623.

5) Prax. med. op. lib. I. c. 3. De mentis alienatione.

6) Institut. lib. III. part. 3. sect. 2. c. 4.

7) Lib. X. obs. 29. 8) Lib. I. obs. 268.

9) Diss. de amore insano. Jen. 1686.

10) Diss. de morbis amatoriis. Erlang. 1787.

11) Diss. de affectibus eroticis. Montisipes. 1776.

12) *Dict. des sciences méd.* T. 13. Voc. *Erotomanie*.

13) *Histoire des Troubadours* (sparsim). *Des causes et*

§. XC.

Symptomata. Causae.

1. Amor nunc furtim sese insinuat, ac gra- Sympto-
mata.
datim evolvitur, nunc aperte ingruit rapideque
flagrat ¹⁾). Primo in casu, si occultari vult, aliter
cognosci nequit, quam habita ratione minimorum
indiciorum. De latente amoris germine suspi-
camur: si quis nomen individui sexus diversi solito
aut crebrius aut rarius, nunc sine necessitate, nunc
alterius loco pronunciet; — si, tali nomine ab aliis
pronunciato, erubescencia sequatur; — si manus,
inscia quasi mente, qualibet porrecta occasione,
ejusdem nominis literas initiales in charta, aut
arena inscribat; — si proprii corporis ornatui ma-
gis, quam consuetudo ferebat, studeat, hocque in
opere peculiare colores prae aliis eligat; — si ge-
stus proprii immutentur et ad similitudinem alte-
rius componantur; — si idem respectu ad verbo-
rum delectum contingat; — si homines, qui prius
indifferentes, cari, qui antea cari erant, indiffe-
rentes evadant; — si occupationes solitae oscitan-
ter aut perverse perficiantur; — si animalia do-
mestica omnem antea sollicitudinem attrahentia,
taedi-

*remèdes de l'amour, considéré comme maladie, par J.
F. médecin anglois. Paris.*

1) „Mars videt hanc, visamque cupit.“

OVID.

Nec THEOCRITUM ab his aliena sentire, verba ipsius
probant: „ut vidit, ut insaniit, ut in profundum in-
cidit amorem.“

taedium nunc afferant; — si in cubiculorum dispositione mutationes, a vitae commodis minui suggestae, instituantur; — si in deambulatio et negotiis externis, a via et hora consueta idem recedat; — si propria indoles ita mutetur, ut hilaris tristis, tristis hilaris evadat; — si physiognomiae, praesertim oculorum status et intuitus ratio mutationem istam confirmet; — si quaedam imago continuo in somnio obveniat; — suspiria, cordis palpitatio et spontanea lacrymat frequenter locum obtineant, — et maxime si jaelotypiae percipiantur motus. Confirmati amoris effreni signa sunt: macies ²⁾, pallor ³⁾, oculi cavi intra supercilia conditi, pulsus, absente objecto amato, inaequalis, parvus, debilis, quo primum autem ipsius recordatio vel visu, vel auditu vel epistolarum lectione repente subierit, perturbatus, fortis; proclivitas ad haemorrhagias, e.

epistu

- 2) Hinc OVIDIUS: „facit amor *maciem* et longa in te nodia cinxerunt.“ Cui sententiae adstripiatur VIRGILIUS: „Illic quos durus amor *crudeli tabe* peremit Et THEOCRITUS. „Ubi tandem fuistis, o Nymphae, cum Daphnis amore *tabesceret*?“ Quare Poeta:

„Fugerat ore color, *maciesque obduxerat artus*
Sumebant minimos ora coacta cibos.
Nec somni faciles et nox erat annua nobis,
Et gemitum nullo laeta dolore dabam.“

- 3) Hoc morbo atroci et fero oppressi, — „decolor sunt, exanimis, *pallidi*, graciles, excarnes“ GALENUS PLATER ait: „Pallor omnis amans.“ l. c.

epistaxin, pneumonorrhagiam ⁴⁾, metrorrhagiam, rupturam venarum ⁵⁾, motus inordinati cordis, dolor regionis epigastricae angorem inducens, inquietudo continua ⁶⁾, febricula ⁷⁾, inconstantia mentis, ab omnibus reliquis animi pathematibus, ut gaudio (si spes in amore aliquid obtinendi afulgeat), tristitiâ (dum de mutuo amore spes nulla), irâ (dum zelotypia adest), agitatae, spes chimerica, timor vanus, mox demissio et timor, mox superbia, meditatio continua, neglectus rerum ad conservationem corporis necessariarum, qualia sunt cibum capere, dormire, vestes a climate petitas induere, contemptio divitiarum, honorum, opinionis publicae, omissio negotiorum, extinctio observantiae erga parentes, officiorumque erga liberos, iudicii corruptio, neque consilia utilia, neque

4) Novi virginem ex adspectu improvise emissii, nec non receptis diu desideratis literis, sanguinem copiosum apuentem.

5) SCHENK (lib. I. obs. 270) de nobili quodam narrat, insano prae amore nobilis et honestae cujusdam viduae, cujus nuptias ambiebat. Illic cum in prandio ad mensam colloqueretur, ecce vena in temporibus prope aures sponte aperta est, et profluxit copiosus sanguis, quem atrophelo compescere conatus est. V. et DONAX consult. med. lib. I. c. 3.

6) „Haerens nempe, ut pulchre efficitur VIKORLIUS (lib. IV. Aeneid.) *infixi pectore vultus*

Verbaque, nec placidam membris dat cura quietem.“

7) Erotica dicta. LOHRY.

que amicam consolationem admittens ⁸⁾, celeritas puerilis se totum ad nutum objecti amati, etiamsi scelus, vel nugas imperantis, fingendi, vitae periculi spretio, quae singula graphice a PLAUTO descripta sunt ⁹⁾.

2. Ad

8) „Meliora probant, deteriora sequuntur amantes.“

9) In Cistell. Act. I. Sc. 1.

„Credo ego amorem primum apud homines carnis-
cinam, commentum;

Hanc ego de me conjecturam domi facio, ne foris
quaeram,

Qui omnes homines supero atque antedecruciabili-
tatibus animi

Jactor, crucior, agitor, stimulator, versor in amoris
rotâ miser;

Exanimor, feror, differor, distrahor, decipitor: ita
nubilam mentem

Animi habeo: ubi sum, ibi non sum; ubi non sum,
ibi est animus.

Ita mihi omnia ingenia sunt: quod lubet, non lubet
jam id continuo.

Ita me amor lapsus animi ludificat, fugat, agit, appetit,
Raptat, retinet, jactat, largitur: quod dat, non
dat, deludit:

Modo, quod suavit, dissuasit: quod dissuasit, id
ostentat.

Maritimis moribus mecum experitur: ita meum fran-
git amantem

Animum; neque, nisi quia miser non eo peccum,
mihi ulla abest

Perdido perniciem.“

Et amoris effreni vestigia clare elucent ex opusculo
sub titulo: *Lettres de JULIE LESPINASSE*,

2. Ad amorem disponunt aetas juvenilis ¹⁰⁾, Causae, sexus inprimis sequior, temperamentum sensile, sanguineo-cholericum, educatio effeminata, studium poëseos, musica ¹¹⁾, artium liberalium in genere, fabulae milesiae ¹²⁾, cibi succulenti, aromatibus conditi, vinum meracum, otium ¹³⁾, tedium,

10) Quod Poëta innuere videtur, quando canit:

„Aut Deus, aut lapis est, qui non juveniliter ardet.“

11) Ad conciliandum amorem quid valeat musica, res in propatulo est. Apud HOMERUM, *Hector* illudit *Parridi*, quod ad arma ineptus, libidinosus cantibus *Helenaë* animum ad se trahere gestiat. Ad amplificandum amorem conjugalem pastores Aegyptiorum musica usos fuisse, testatur ARTURUS BEDFORD in tractatu: *The great abuse of music*, p. 4. ST. HIRONYMUS ad *Letam* scribens, jubet, ut filia ejus surda sit ad organa; tibia, lyra, cithara, ad quid facta sint, nesciat.

12) Quamvis hujusmodi librorum auctores scopum moralem semper in ore gerant, attamen animi perturbationem, de qua agitur, coloribus nimis attrahentibus pingunt, quam ut juvenum manibus secure tradi possint.

13) Contenderat DIOGENES amorem otiosorum esse negotium. Unde OVIDIUS:

„Otia si tollas, perdere cupidinis areus

Despectaque jacent et sine luce facies.“

Et MARTIALIS:

„Quæritur, *Aegysthus* quare sit factus adulter?

In promptu causa est: desidiosus erat.“

ANTON. DE QUEVARA (lib. II. cap. 12. *Horol. Principum*) inquit: „per otium deses et supervacaneas cogitationes oculi aberrare, mens perturbari, voluntas depravari solent.“ — „Patrum negligentia matrumque indulgentia facit, ut laborem misellae honestum fagiant et inhonesta amplectantur oblectamenta.“

dium, castitas ¹⁴⁾ et philantia. Excitatur amor a peculiari vix explicanda sympathia ¹⁵⁾, quandoque similitudini formae, aliàs transpirationis qualitatibus forte adscribenda, a formositate incomparabili ¹⁶⁾, a conversatione quotidiana ¹⁷⁾, a choreis imprimis per

14) Quo major morum puritas, eo majus amoris effreni concipiendi periculum.

15) Sicuti antipathia, sic sympathia in amore explicari nequit, unde Poëta:

*„Liria, non amo te, nec possum dicere quare,
Hoc saltem possum dicere, non amo te.“*

Et sibi:

*„Odi et amo: quare id faciam, fortasse requiris,
Nescio, sed fieri sentio et excrucior.“*

CATULL. ad Lesbiam.

*„Il est des noeuds secrets, il est des sympathies,
Dont, par le doux rapport les ames assorties
S'attachent l'une à l'autre, et se laissent plier
Par ce je ne sais quoi, qu'on ne peut expliquer.“*

P. CORNEILLE, Rodogune, act. I. sc. 7.

16) THEOPHRASTUS pulchritudinem silentem fraudem appellabat. De Olympia Philippi Macedonum Regis conjuge fertur, cui cum Rege, marito ingenti puellae alicujus amore ardente, persuasum ab aliis esset, *philtum* amoris hujus existere causam, a puella Regi propinatum, adduci eandem jussit. visâque formae elegantia morumque suavitate, missâ philari suspicionem, exclamasse dicitur; „*T'aleant calumniae, tu enim in te philtum habes.*“

17) Sapienter SOCRATES apud STOBAEUM (serm. 6): „ignem quidem ventus, amorem vero consuetudo accendit.“ Memores hujus dicti sunt parentes, filios

per saltationem volutabundam ¹⁸⁾, a frequentatione theatrorum ¹⁹⁾, a spectaculis domesticis ²⁰⁾, a fociis socialibus ²¹⁾ etc. *Philtra* ²²⁾ quondam accusabantur; quae quidem ad venerem indiscriminatim excitare posse concedimus, nunquam autem amorem in definitum individuum accendere, nisi forte de auro et argento quaestio sit ²³⁾. Nec sexus differentia ad amorem effrenum, insanum, et criminalem excitandum absolute requiritur, quod testantur tribadum et sodomitarum infamiae ²⁴⁾. Nec spadonum cordi parcat amor, quos

haud

universitates adeuntes aino delectu passim collocentes, filiasque novis *Abellard* et *St. Preux* confidentes.

18) *GERM. Das Walzen*, modus saltandi, urvis accommodatus, moribus aequae ac sanitati adversus, uti pulchre monitum est in *Oesterreich. Beobachter* 1816. No. 214.

19) Sirenes praeternavigare, tentationibus saltetricum resistere, pauci meliore inter juvenes valent.

20) Quae hodie fictae in sic dietis: *théâtres de société* agitanter scenae, hae saepe nimis postridie reales evadunt.

21) Germani potissimum libere nimis hoc sub respectu incedere et oscula profundere solent, ac si ignorarent, quanta in iis et bacillis insit vis philtri.

22) Quondam inter *philtra* recensebantur: cor hircinis, cerebrum felis vel asini, uterus hyaenae, virga et cauda lupi, urina hirei, sanguis menstruus, abortivi foetus aut ante baptismum mortui, aliaeque absurda, tum intus tum extra adhibenda.

23) „Quae prudentiae, potentiae, astutiae facta sunt impossibilia, auri parent atque obediunt fulgori.“

24) Tam abominandum scelus ne verbo quidem tetigis-

haud raro feminae deperire solent. Quin immo, pictae imagines ²⁵⁾ et statuæ ²⁶⁾ id effecisse sunt visae. Ex his satis superque apparet, miram esse vim, quam oculi in affectus amatorios exercent ²⁷⁾.

§. XCI.

Diagnosis. Prognosis.

Diagnosis. 1. Non ex contemptu, sed ex commiseratione ¹⁾, amori locum inter morbos tribuimus; quod vero nec de *conjugali* nec de *sociali*, sed de *lascivo* intelligendum est. Ad hunc cognoscendum, si signa recensita suspicionem excitaverint, exemplis ERASISTRATI ²⁾, HIPPOCRATIS ³⁾, GALENI ⁴⁾,
FER-

sem, nisi medici illud, ut languoris haud raro causam, cognoscere deberent.

25) De *Paride*, qui hoc modo *Helenam* concupivisse dicitur, ait Poëta:

„Et nunquam visas flagrat amore puellae.“

26) Exemplo sit *Alkiadas* pro statua Cupidinis auctore *Praxitele* amore captus.

27) PLATO (lib. 6. stromat.) ait; „amoris initium visus;“ et PLUTARCHUS (lib. de amore): „capiendi amoris visus est ausu.“ Cfr. ZACUT. LUSITAN. lib. I. Prax. hist.

1) „Nescis, quid sit amor? Furor est, et post omnia mentem

Eripit et damnis pascitur suis.“

2) *Antiochus*, *Seleuci* Regis filius, vehementissimo *Stratonice* amore flagrans, in supremam incidere faciem, atque in lecto, mox e vita discessuro jacebat similis. Et medico et patri universaeque amicorum cohorti causa hujus mali erat occulta, atque certe de aegro actum fuisset, nisi *Erasistrati* prudentia de-

FERRANDI ¹⁾ etc. ad varia *stratagemata*, tamen cum debitis cautelis, ne medicus sive pro denunciatore sive pro conciliatore habeatur, confugere licet. *Amorem*, de quo agimus, neque cum *chlo-rosi*, neque cum *mania erotica* confundendum esse, debitis locis palam fiet. Potius similitudinem ille habet cum *philautia*, *cupiditate insana* *lusum chartarum prosequendi* et *avaritie*.

2. „Quot bella tam publica, quam privata ^{Prognosis.} insanientis produxit vehementia amoris? Quantae clades, quantae strages exinde ortae? Quot civitates dehinc eversae? Quot hominum millia misere mactata?“ ⁶⁾. Terminus amoris, nisi cito saepe cum desperatione deflagret, est *odium*, *tabes*, *febris*, ut diximus, *lenta nervosa* ⁷⁾, *convulsio-*

tecto morbi fonte, parens genuino atque unico, quod aderat, remedio filio succurrisset; dictus quippe medicus magnam advertens pulsus mutationem, nunc praesente, nunc absente contingentem *Stratonice*, veramprehendit morbi originem eademque patri aperuit, qui, cessa filio conjuge, sanitatem eidem reddidit.

3) PLUTARCHUS de modis, ab HIPPOCRATE ad amorem *Perdiccae* Macedonise Regis erga *Phrynen* detegendum usurpatis, loquitur. Cfr. BEVEROVICIUS idea med. vet. P. II. lib. VI. c. 2. p. 148.

4) Rite judicavit de *Orestis* erga *Pyladem* amore.

5) Narrat se juvenis amorem ex vultus rubore et pulsum majori frequentia, dum ancilla quaedam facem in cubiculum afferret, detexisse l. c.

6) EURIPIDES in *Hippolyto*.

7) Memorabilis hujusmodi observatio ab ESQUIROL traditur. l. c. p. 189.

vulsiones, epilepsia, mania et suicidium. Quae omnia non impediunt, quominus amor aliquando effectus salutare exserat ⁸⁾, animum emendet ⁹⁾ et ingenium acuat ¹⁰⁾.

§. XCII.

C u r a.

Prophylaxis
et c.
moralis.

1. Nisi spes non dubia matrimonii contrahendi adsit, parentum et conjugum est, indicatas amoris causas sive praedisponentes sive excitantes fugare. Educatio hodierna per universam Europam, Anglia et Italia quodammodo exceptis, vulgata, quatenus effeminata et vana, non satis religiosa, musicam attem, saltatoriam plus, quam par foret, extollens, lectionem fabularum milesiarum vix, ut decet, prohibens, in selectu institutorum utriusque sexus minus ad mores respiciens, juve-

8) Cap. XVII. §. LXXVII. 2 (31). Cfr. KAMPF de osculis cap. 18. De osculo salutari.

9) „*Chîmon aime, puis devint honnête homme.*“

10) TISSOT juvenis sat stupidi meminit, qui erga Hispanam sermonis gallici ignaram amore captus fuit, qui-que spatio triginta quinque dierum idioma Hispanicum ita didicit, ut cum amasia libere conversari potuerit (l. c.). Exercitus extranei variis in Europae provinciis nuper plurima hujusmodi exempla obtulere. Celebr. ALFIERI de se ipso ait: „*Io non mi sentiva mai ridestare in mente e nel cuore un certo desiderio di studj ed un certo impeto ed effervescenza d'idee eretiche, se non se in questi tempi, in cui mi trovava il cuore fortemente occupato d'amore.*“ (l. c.).

juvenibus libertatem nimiam concedens et ferè semper supra natales, et familiarum conditionem, allatas causas potius intendit, quam relaxat. Ut amor illicitus arceatur, ejiciantur inprimis e familiarum sanctuariis otiosi, adulescentes, hominesque vano splendore circumdati, et ordinis superioris ¹⁾. Quodam haec praecepta ad malum anteverendum non sufficiant, saltem initio illius resistendum ²⁾. Optima id efficiendi ratio in objecti periculosi praecipite fuga consistit ³⁾. Maxime hinc, praesertim maribus, itinera suadenda. Feminis potius receptio in alienam familiam, a perturbationibus animi haud agitatam placideque vi-

Y y 2

ventem

- 1) Censit OVIDIUS: „apte nubere, nube pari,“ quod pariter PITTACI MITYLENAEI est consilium, citatum a PLUTARCHO (tract. de lib. educ. c. 19).

- 2) „Dum novus est, coepto potius pugnemus amoris:
Flamma recens parvâ sparsa residet aqua.“

OVID. lib. XVI. Her.

Et libr. I. de remedio amoris:

„Dum licet, et modici tangunt praecordia motus,

Si piget, in primo limine siste pedem.

Opprime, dum nova sunt, subiti mala semina morbi

Et tuas incipiens ire resistat equus.

Nam mora dat vires.“

- 3) Audi PROPERT. lib. III. eleg. ad Cynthiam ita canentem:

„Crescit enim assidue spectando cura puellae,

Ipsa alimenta sibi maxima praebet amor.

Unum erit auxilium mutatis, Cynthia, terris,

Quantum oculis, animo tam procul ibit amor.“

ventem conducit. Utrisque *amicus* *) fiduciam aequae ac venerationem concilians necessarius est. Placeat illi primum reciprocis amantium querelis patientem praebere aurem, easque ut genuinas et reales accipere. Immo servitio licito eorum captare tentet benevolentiam. Rebus huc perductis, illi quandoque verbum prudens quasi fortuito, cadat, e. c. dubitatio aut animadversio circa res amori pro basi inservientes. Tali enim ratione amantibus veluti pabulum pro contemplatione instillatur, cujus effectus ocyus serius sponte comparent. Nunquam amantium unum pro bono alterius calumniatur oportet; satius enim est vitia realia, quibus nemo mortalium caret, revelare †). Si amantium unus contra ipsas amoris leges, e. c. philautiam, aut alienum quendam scopum manifestando, peccaverit, talis revelatio nunquam in alio sine effectu accidit. *Zelotypiam* accendere semper nocet: enim vero aut amor magis adhuc intenditur, aut *odium*, turpissimum omnium animi pathematum, excitatur. Excipi solum meretur odium momentaneum, viam ad indifferentiam, realis curae certissimum indicium, secure sternens ‡).

4) „Fidus amicus salutaris medicina est.“ SIRAC. VI. v. 16.

5) „*Exige quod cantet, si qua est sine voce puella.
Non didicit chordas tangere, posce lyram.
Turgida, si plena est, si fusca est, nigra vocetur,
Et poteris dici rustica, si qua proba est.*“

OVID.

nens⁶⁾. Verumtamen libentissime hostem propriis suis armis debellamus; amor enim optime vincitur amore. De amore parentum, affinium amicorumque loquimur, adversus effrenum illum in auxilium deducendo, quod ut fieri possit, amanti- bus non est, cur irascamur, sed potius blandiamur. Nunquam enim obliviscendum, amorem effrenum, veluti febrem, esse morbum, a quo nemini licet se jussu illico liberare. Quare et sodalium requiritur indulgentia. In ea nempe versamur opinio- ne, legibus moralibus strictissime obtemperandum esse, potius ad mala praepedienda, quam ad prae- sentia crudeliter extirpanda. Hic enim severitas nimia, homines in perpetuum praecipitat, qui indulgentiâ facile ad veram viam reduci potuis- sent. Rei videlicet naturae consonum est, quod homo a societate contemptus et rejectus perturba- tionis suae magis praeda fiat et animo exaspere- tur. Quamobrem optamus etiam, ut matronae, quae societatibus exemplo sunt, virgines feminas- que juvenes, amore insanas, non repudient fa- mamque earum, ut fieri solet, sine misericordia dilacerent, sed consiliis potius alant earumque partes foveant. Ad curam amoris in sexu sequiori absolvendam, haud raro prodest *vanitatem* in auxilium deducere. Accidit nempe, ut feminae,

quae

6) „Et qui amore gravi premuntur, si in odium per-
sonae, quam amant, adigi queant, certissime liberan-
tur.“ PLATER I. C. p. 114.

quae amoris gratia mortem vilipendunt, a periculo formositatem, per protractum nimis moerorem, amittendi terrifiant. Consolationem quoque amanti infelici affert, non ignorare, eum aliorum attentionem ad se trahere⁷⁾. In maribus amore effrenodomitis, *ambitionem* accendere juvat, ostendendo simul quantum fatalis perturbatio honoribus acquirendis obstat, quantumque inde aemulatoribus lucrum affertur.

Continuatio.

2. Cura ista morali ad nutum procedente, contingit haud raro, ut fructus plurium mensium laboris, per casum fortuitum uno temporis puncto amittantur, e. c. per receptionem epistolae, conspectum objecti amati, aut imaginis ipsius depictae etc. Tali in casu non desperandum, sed immo illico ex contrarietate profectus capiendus. Recidiva enim in amore non, uti aliis in morbis, primo accessu pejora observantur. Contra ea saepissime veluti crisin illius constituit. Qua de causa et objectum amatum post aliquod tempus revisere, quod hallucinationis reliquum erat, securissime auferre solet. Eo securius obtinetur id, quo major rationi amantis tribuitur fides. Rebus huc perductis saepe perturbationem irridere eamque observationibus satyricis insectari juvat. Quoniam autem homines plurimum ita constituti sunt, ut
magis

7) „Hortor et, ut pariter binas habeatis amicos,
Alterius vires subtrahit alter amor.“

OVID.

magis necessitate aliquid colendi adorandique, quam amore a peculiari individuo excitato, laborant, illorum affectus ad libitum in varia objecta dirigi queunt, sic eligatur ex tot orphanis derelictisque infantibus unus, formâ gratus, ac educetur, ne de aliis nonnullis auxiliis, jam adversus hypochondriasin commendatis (excepta tamen musica *)), loquamur. Quorum autem auxiliorum nullum certe exstat, quod consolationi e *religione christiana* petitaæ æquiparari posset, inprimis si offensæ DEI futurique supplicii peccatis alligati ratio habeatur, ac preces fervidae, peculiare voluptatis genus in fidelibus excitantes, effundantur.

3. *Auxilia physica*, amantium corporis constitutionibus accommodanda. *Cibis* facilis digestionis, non, ut suasum fuit 9), jejunio indulgendum, vinum et reliqui liquores fermentati evitanda 10), eorumque loco limonada, emulsiones, aqua selterana 11), lac, serum lactis et similia usurpanda. *Motus* corpus concutiens 12), et venatio

Auxil.
physica.

ad

8) „Amstorii detentorum compedibus sures obturandæ sunt, ne Sirenium cantus audiant et offendatur animus.“

9) HIERONYMUS in vita Hillarionis Abbatis.

10) „Sine Cerere et Baccho friget Venus.“

11) Optandum, ut adhuc undaret aqua illa fluminis *Selmonii*, de qua PAUSANIAS (in Achaicis) tradit, ejus aquam viris et feminis ex amore invicem mederi, eamque vim habere, ut, qui eo flumine loti fuerint, illos amoris capiat oblitio.

12) Forte quid veri in fabula de *Saltu Leucadae* jacet.

ad summam defatigationem usque, quo *somno*, utpote maxime necessario, prospicitur, commendanda. Nec aliis iisque gravibus laboribus parcendum¹³⁾, fugato quocunque in casu otio. Temperaturo esto frigidiuscula. In plethoricis et succi plenis ex chirurgia generosissimum remedium, *venae sectionem*, depromimus¹⁴⁾. Inter *pharmaca* varia, partim absurda¹⁵⁾, ut *anti-erotica* proposita fuere, quorum ingentem catalogum SCHÖNBORNIUS¹⁶⁾ et MACASIUS¹⁷⁾ conscribere. Jactabantur praecipue *herba rutae graveolentis*¹⁸⁾, *folia salicis*¹⁹⁾ et *acetabulum saturni*²⁰⁾. Postremo *matrimonium* juxta tritum illud: „*melius est conjugis uti et nubere, quam uri*“ ut specificum adversus amorem commendatur — ac omni sane jure! —

13) „Manibus enim exercitio laudabili occupatis, vacua sunt a vagabundis cogitationibus animi.“ QUEVARA Op. c. lib. II. c. 12.

14) FORSTUS l. c.

15) E. c. *pulvis secundinae humanae* cum essentia artemisiae, melissae aut croci mixtus (MICHAEL in Annot. ad chimiam in artis formam redactam). Ut *amuletum* proponebatur *stercus amatae* in amantis calcem positum, unde OVIDIUS:

„*Illa tuas redolent Phineo medicamina mensas,
Non semel est stomacho nausea facta meo.*“

16) MANUAL. pract. 17) PROMPTUAR. mat. med.

18) PLUTARCH. in symposiac. probl. — quare etiam OVIDIUS:

„*Utilius sumes acuentes lumina rutae.*“

19) SENBERT l. c. 20) FASCHIUS l. c.

jure! — Generatim enim nil magis amorem extollit quam spermatis retentio; nihilque magis deprimat, quam *temporis curriculum* 21).

CAPUT XXII.

De taedio vitae et suicidio.

§. XCHL.

Definitio. Scriptores.

1. **P**rivatio voluptatis, quae ex conscientia Definitio.
propriae existentiae oritur, sine spe aut voluntate
illam recuperandi, saepe cum impulsu ad destru-
ctionem sui ipsius, *taedium vitae* 1) nuncupatur.

2. De taedio vitae et suicidio scripsere, prae- Scripto-
ter auctores dissertationum inauguralium 2), et res.
com-

21) CRATES THEBANUS amore laborantibus haec offert
remedia: „amori, inquit, medetur *fames*; sin aliter
tempus, quod si nec his uti possis, *laqueus*.“ Italo-
rum Poeta adversus eundem morbum commendat:
„*poco pane, molt' acqua e bastonate*.“

1) Melancholia anglica SAUVAGESII, Misopyschia SWED-
DIAUR (a Gr. *Μίσος*, odisse, et *ψυχή*, vita). GERM.
Ueberdruß des Lebens, Selbstvernichtungsmuth. GALL.
Désir du suicide, monomane homicide. AROL.
Weariness of life. POL. *Obrzydzenie życia*. RUSSIC.
Несносная тоска съ отращеніемъ къ жизни.

2) ROBECK exercitatio de morte voluntaria. Marb. 1753.
POINER diss. περί τῆς αὐτοκτονίας. Jen. 1657. WEISEN

commentationum academicarum ³⁾, CAMPER ⁴⁾,

AUEN-

diss. περί αυτοχειρίας. Giess. 1668. HOFFMANN diss. de αυτοχειρία. Hal. 1681. FASCH diss. de autochiria. Jen. 1681. ROHMENSEE diss. de autochiria subtili. Wittemb. 1702. WILLEBEN diss. de autochiria. Lips. 1702. SLEVOOT Pr. de autochiria medica in gen. Jen. 1707. Diss. αυτοχειρίας med. nonnulla specim. Jen. 1708. GROSSEN diss. de hom. suem. vit. destruct. Erf. 1727. ALBERTI diss. de autochiria literatorum. Hal. 1727. Diss. de autochiria occulta. Hal. 1744. STRUCKER diss. de vitae ac necis jure circa se ipsum. Erf. 1755. GROEDECK Comment. de morte voluntaria ab ordine Theolog. praemio ornata. Goett. 1785. GRUNER diss. de suicidio in foro med. non semper culp. Jen. 1792. Diss. de suicidii notia in foro fere dub. Jen. 1793. Programmata de imputat. suicidii dubia, casu singulari illustr. Jen. 1797. IMMISCH diss. suicidium dubium casu singulari illustratum. Jen. 1808.

- 8) A. LÖW autochiria ex delirio melancholico. Miscell. acad. nat. cur. dec. II. a. 8. 1689. p. 282. J. H. FÜRSTENAU autochiriae singularia. Acta acad. nat. cur. Vol. VI. p. 372. J. A. GÖRITZ de autochiria quater tentata. Ibid. Vol. IV. p. 223. S. LEDER tristissimum melancholiae fatum, infantem et se ipsam occidentis. Miscell. acad. nat. cur. dec. II. a. 10. 1691. p. 39. N. ACKERMANN *Frtvillig svält-död*. Svenska Läkare Sällsk. Handl. B. 2. H. 2. 3. p. 117. G. PARKMANN *du suicide in SEDILLOT rec. périod. de la soc. de méd. de Paris T. 64 (serie 2. T. 3) p. 376 (Ex Lond. med. phys. Journal No. 234)*. FUCHS anatome laqueo voluntarie suffocati. Nova act. acad. nat. cur. Vol. VI. p. 264 et 267. L. D. LE ROY *geneeskundige Waarnemingen over het beteugelen van den lust tot zelf-*

AUENBRÜGGER ⁵⁾, ELVERT ⁶⁾, MÜLLER ⁷⁾, BISCHOFF ⁸⁾, ROWLEY ⁹⁾, OSIANDER ¹⁰⁾, STAËL HOLSTEIN ¹¹⁾, SCHULZ ¹²⁾, CHEVREY ¹³⁾, ESQUIROL ¹⁴⁾, FALRET ¹⁵⁾, GROHMANN ¹⁶⁾, HINZ ¹⁷⁾, CASPER ¹⁸⁾,

SCHLE-

moord. *Verhandel. van het Genootsch. — te Antwerp. Deel I. Bl. 250. Observations médicales sur la guérison du penchant au suicide, suivant la méthode D'AUENBRÜGGER in GRAFERON bulletin des sciences médicales. T. 2. p. 198. Py sur le suicide in Annales de la soc. de médecine prat. de Montpellier. T. 37. p. 35. 149. 172.*

4) *Gedagten over de Kindermoord en Zelfmoord. Leuwaarden 1774.*

5) *Von der stillen Wuth oder dem Triebe zum Selbstmorde. Dessau 1783.*

6) *Ueber den Selbstmord in Bezug auf gerichtliche Arzneykunde. Tübing. 1794.*

7) *Selbstmord, nach medicinischen und moralischen Ursachen betrachtet. Frankf. 1796.*

8) *Versuch über den freiwilligen Tod. Nürnberg. 1797.*

9) *Treatise on madness and suicide. Lond. 1804.*

10) *Ueber den Selbstmord. Hannov. 1813.*

11) *Réflexions sur le suicide. 1813.*

12) *Der natürliche Selbstmord, eine psychologische Abhandlung. Berlin 1815.*

13) *Essai médical sur le suicide. Paris 1816.*

14) *Dictionnaire des sciences méd. T. 53. p. 213 — 283. Note sur la monomanie. Paris 1827.*

15) *De l'hypochondrie et du suicide. Paris 1821.*

16) *Vorschlag zu einer vergleichenden Liste der Selbstmörder. HUFELAND Journ. der pr. Heilk. 1823. Aug. p. 79.*

17) *Fragments über den Tod des Erhängens. HANNA*

SCHLEGEL ¹⁹⁾, HEYFELDER ²⁰⁾, PIAANTANIDA
aliique ²¹⁾.

§. XCIV.

Symptomata. Necroscopia. Causae.

Sympto-
mata.

1. Odium vitae saepe *taedium simplex* praecedit. Qui hoc malo tentatur, a contin-
agitur inquietudine, oscitationes crebrae illi
suspendunt respirationem, brachia convulsive di-
tenduntur, locum continuo mutare cogitur, oc-
los nulli objecto, mentem nulli ideae affige
potest, laborem aequae ac quietem respuit, verb
vacuum nullo pacto adimplendum percipit. Ja
vero haud pauci, *odio hominum* ²⁾ correpti, urb

Zeitschrift für die Staatsarzneykunde. 4. Jahrg. 1821.
1. Vierteljahrheft. p. 116.

18) *Der Selbstmord und seine Zunahme in unserer Zeit*
in *Beiträge zur med. Statistik und Staatsarznei*
Berlin 1825.

19) *Ueber den Selbstmord überhaupt und mehrere Fälle*
desselben insbesondere. HENKE 1. c. Jahrg. 182
Heft 3. No. 12. *Ergänzungsband 7. No. 1. B.*
No. 8.

20) *Der Selbstmord in arzneilicher und med. polizeil-
cher Beziehung.* Berlin 1828.

21) *Del suicidio.* Milano 1828.

22) In capite de mania citando.

1) Pulchre describitur a clarissima EDOWORTH in fi-
bula milesia sub titulo: *L'ennui.*

2) *Apathropia* SWEDIAURI a GR. «privat, et ἀσθένεια
homo. Aversio a societate hominum. GRAM. *Mei-*
schenkass.

et societates fugiunt, abhorrent et in locis desertis, montibus, sylvis etc., vitam solitariam degere praeferunt. Alii languidi, moesti, omnium remedium pertaesi, res suas componunt, testamenta scribunt, amicis per epistolas dein transmittendas valedicunt et postremo filum vitae, quod perquam tenue et breve natura homini largita est ³⁾, vi maxima corpori illata, et nunc adacto in pectus ense, nunc rapidis concredito corpore undis, vel sumto clam viscera humoresque depascente veneno, vel via aëri per laqueum interclusa, vel pulvere pyrio cerebrum adurendo, vel alimenta recusando ⁴⁾, modo clam modo tumultum ciendo ⁵⁾, abrumpere non verentur.

2. Cadavera sic peremtorum, praeter laesiones, a mortis peculiari genere pendentes, exhibuerunt: cranium vix a norma abludens ⁶⁾, dilatationes vasorum sanguiferorum durae matris ⁷⁾,
corpus

Necroscopia.

3) „Mille modis morimur mortales, nascimur uno,
Una via est vitae, moriendi mille figurae.“

4) *Freiwilliger Hungertod von dem Verhungerten selbst beschrieben.* HUFELAND's Journ. der pr. Heilk. 1819. März. p. 95.

5) „*Quelques suicides cherchent à dérober jusqu' aux traces de leur mort, tandis que d'autres se tuent avec éclat.*“ ESQUIROL l. c.

6) „*M. GALL pense que le crâne des suicides est épais, dense: je possède dans ma collection beaucoup des crânes qui démentent cette opinion.*“ ESQUIROL l. c.

7) HOME observations on the functions of brain. Read

corpus callosum solito mollius ⁸⁾, os longitudine pollicis et latitudine trium linearum, in fossa super ventriculum cerebri dextrum locatum ⁹⁾, vicia cordis et inflammationes chronicas intestinorum ¹⁰⁾, colon e situ normali deorsum tractum ¹¹⁾, concrementa biliosa in cystide fellea ¹²⁾, saepeque nil, quod in sensus caderet, morbo ¹³⁾.

Causae.

3. Causae taedii vitae et praesertim suicidii quaerendae sunt: in educatione depravata ¹⁴⁾, in populorum luxuriante cultura ¹⁵⁾, in fanatismo poli-

the 26. Mai 1824. *Philosoph. transact.* p. 255—257.
FRÉTAU *traité des émissions sanguines*.

8) LODER's *Journ. f. d. Chir.* 4. B. 1. St. p. 162. 167.

9) *Merkwürdige, nach dem Tode entdeckte, Ursache einer Schwermuth, welche mit dem Selbstmorde endigte*, in HUFELAND's u. HIMLY's *Journ. d. pr. Heilk.* 1813. April. p. 31. Simile exemplum obvenit in eodem diario a. 1812. April.

10) OSIANDER l. c. Cfr. RUST's *Magaz. der gesammten Heilk.* B. 18. p. 468.

11) *Annalen für die gesammte Heilk., unter der Redaction der Mitglieder der Grossherzogl. Badischen Sanitäts-Commission.* 1. Jahrg. 1824. Heft 1. p. 142.

12) FOURCROY discours prononcé à la séance de l'Ecole de médecine de Paris du 23. Vendémiaire. Ann. IX.

13) Cadaver carnificis sui ipsius aperui, in quo omnia viscera optime constituta inveni. Accedit ESQUIROL testimonium in *Dict.* l. c. p. 270.

14) E. c. apud Romanos eliosque populos bellicosos, et in rapinis sustentationem quaerentes, utpote qui indiscriminatim vitae contemptum extollunt.

15) „Es ist eine betrübende Erfahrung, dass die Zahl

politico ¹⁵⁾ et militari ¹⁷⁾, in lectione librorum pseudo-philosophicorum ¹⁸⁾ et fabularum miliarum ¹⁹⁾, in vacuitate animi ob complementum omnium votorum ²⁰⁾, in solitudine ²¹⁾, in opificiis taediosis ²²⁾, in malo exemplo ²³⁾, in verecundia ²⁴⁾,

der Selbstmorde mit der Verfeinerung und den größeren Verwickelungen der gesellschaftlichen Verhältnisse gleichen Schritte hält, und dadurch am augenscheinlichsten die Gebrechen offenbart, an welchen die fortschreitende Cultur des Menschengeschlechts je länger je mehr erkrankt." IDELER in HECKER's lit. *Annal. der gesamt. Heilk.* 1829. Febr. p. 226.

- 16) Historici et poetae pagani cum saepe autochiriam celebrant, mirum non est juventutem studiis classicis intentam, saepe ideas perversas de qualitatibus boni civis acquirere.
- 17) „*L'esprit militaire, qui inspire l'indifférence pour la vie, qui n'attache pas une grande importance à un bien qu'on est prêt à sacrifier à l'ambition du maître; l'esprit militaire dit-je, doit être favorable au suicide.*“ EAQUIROL l. c.
- 18) OPP. HELVETII et sociorum. „*Un enfant de treize ans se pend, et laisse un écrit qui commence par ces mots: Je lègue mon ame à ROUSSEAU, mon corps à la terre.*“ EAQUIROL l. c.
- 19) E. c. pessimus liber: *Werthers Leiden* v. GÖTTE.
- 20) ENGEL *Philosoph für die Welt*. 3. B. p. 20.
- 21) Jactant solitudinem ALBERTI (diss. de solitud. med. util. Hal. 1737) et ZIMMERMANN (v. d. *Einsamkeit*), ut certe non perfectam, sed eam, de qua PETRARCA dicit: „*Volo solitudinem non solem*“ (De vita solitaria).
- 22) „*Nichts befördert so sehr ... die Neigung zum Selbst-*

cundia ²⁴⁾, desperatione ²⁵⁾, amore ²⁶⁾, ira ²⁷⁾,
nostalgia ²⁸⁾ et maxime in defectu Religionis ²⁹⁾.

Con-

*mord, als die einförmige aller erheiternnden Abwechslung entbehrende Beschäftigung der Fieberlei.*²⁴ HENZ 1. c. Cfr. KLEIN's *Annalen der Gesetzgebung* B. 7. p. 19.

23) Qua de re testatur factum puellarum Milesiarum, quae tantâ mortis cupiditate ardebant, ut turmatim ae laqueo suspenderent, nec motivum quisquam agnoscebat: tandem sapientis civis consilio senatus edicto jussit, ut quae prima suicida reperta foret, ea mortua omnino nuda in media platea exponeretur: quo decreto illico puellarum furori finis factus est (PLUTARCHUS *des vertueux faits des femmes*. T. I. Cfr. BENKOE in Eph. meteor. Vol. 3). Miror hinc censes librorum permisisse, ut nefandum opusculum: *Biographien der Selbstmörder* vendatur.

24) E. c. nobiles graviditati eelandae imparas.

25) Apud aethiopes ad servitutem damnatos et victimas fidem fallentium rixarum domesticarum, depertitionis muneris, lusus chartarum et aleae sortium (DELESSERT in *Supplément au Journal de Paris* du 16. Juillet 1821) etc. Cfr. CHABROL *recherches statistiques sur la ville de Paris et le département de la Seine*. Paris 1821. 1823. 1826. *Tableaux des suicides. Détail concernant les suicides. Et Rapport général sur les travaux du conseil de salubrité pendant les années* 1823 24.

26) Csp. XXI. §. XCI. 2.

27) Extant autochiriae exempla vindictae causae peractae, scilicet ut praepositis et parentibus severis injuria fieret.

28) ESQUIROZ 1. c.

29) Facta loquantur: „Nach eingegangenen polizeilichen

Concurrunt dispositio haereditaria ¹⁰⁾, aetas inter annum vigesimum et trigesimum ¹¹⁾, sexus masculin-

Berichten sind im Verlauf von neun Monaten blos in sechs der südlichen Provinzen der Niederlande 37 Selbstmörder bekannt geworden. Ueberhaupt hat man seit der französischen Revolution unter allen Ständen eine systematische fortachreitende Verwilderung und Irreligiosität bemerkt, welche natürlich, wenn äusseres Unglück hinzutritt, kaum anders zu enden vermag.“ Oestreich. Beobachter. 1816. No. 215. In Dania, teste eodem folio publico (No. 201) numerabantur carnifices sui ipsius ab ann. 1785. ad 1790. No. 181. ab 1790. ad 1795. No. 209. ab 1795. ad 1800. No. 261. et ab 1800. ad 1805. No. 319. Berolini ann. 1814. inter 5474. mortuos, 70 suicidae inveniuntur! (Hamburger Correspond. 1817. No. 25). Petropoli ann. 1815, demortuorum 11829. solum 15. autochiros exhibuerunt (Ibid. No. 27). A. 1827. universum Rossiae Imperium suicidii 1176. exempla obtulit (Wiener Zeitung. 1828. No. 37).

30) „Le sieur G. . . propriétaire, laisse sept enfans, avec une fortune de deux millions; ses enfans restent à Paris ou dans les environs, conservent leur fortune paternelle; quelques-uns l'augmentent; aucun n'éprouve des malheurs; tous jouissent d'une bonne santé, d'une existence honorable, de la considération générale; tous sept frères, dans l'espace de trente à quarante ans, se sont suicidés (GALL Physiol. T. 3). Le même auteur a connu une famille dont la grande mère, la soeur, la mère se sont suicidés; la fille de cette dernière a été sur le point de se précipiter, et le fils s'est pendu.“ ESQUIROL l. c. Similia narrantur in Bibliothèque médicale Octobr. 1818. p. 48.

31) ESQUIROL l. c. Novi in Lithuania exulem Gallum
Frank Prax. II. 1. 1. Z z

culinus³²), aequinoctium vernale³³), calores aestivi³⁴), aer densus nebulosus³⁵), abusus liquorum fermentatorum³⁶), coelibatus³⁷), menstruatio³⁸),

(*Mr. Aubry*) qui, etsi octogenarius, vitae terminum naturalem expectare noluit.

32) Inter 317 tentamina suicidii erant mares 206 et feminae 111 atque inter illa 390, mares 262, feminae 128 teste CHABROL l. c. ann. 1822 et 1823. Cfr. G. PARMAN in *London medic. and physic. Journ.* No. 234. et GERSON's *Magaz. der ausl. Litterat. der gesamt. Heilk.* 1827. *Mat.* Juni, p. 490.

33) Die 20. Martii a. 1824 mihi duo suicidia obven-
runt Vilnae, alterum in comite P., alterum in nobili
Z. . . Ille multorum infantum pater, seseque prae-
sente propria uxore ictn pistolae interfecit; hic coe-
lebs erat.

34) „CABANIS avait observé qu' après un été très-sec,
l'automne étant pluvieux, les suicides étaient plus fré-
quents en automne. J'ai fait la même observation en
1818.“ ESQUIROL l. c. In genere tamen suicidium
frequentius summa aestate obvenit, qua in re mese cum
observationibus GROHMANNI, ESQUIROLI aliorumque
conveniunt.

35) E. c. Angliae quid quid dicat BURROWS (*Inquiry
relative to insanity.* 1820).

36) OSIANDER, CASPER, HEYFELDER ll. cc. Attamen
vulgus in Russia et Polonia liquoribus fermentatis ma-
xime abuitur, et rata est autochiria.

37) CHASMOND in *Journ. encyclop.* 1771. *Juin.* Inter
317 tentamina suicidii, locum obtinere 161 in nuptis,
156 in coelibibus; interque illarum 390, in nuptis 286,
inque coelibibus 164, sic apud CHABROL l. c. ann.
1822 et 1823. Atque hic animadvertere juvat, effecina

tio³⁸⁾, graviditas³⁹⁾, onania⁴⁰⁾, morbi febriles accidentales⁴¹⁾, pellagra et mania⁴²⁾. Suicidas id genus mortis eligere, ad quod a peculiari corporis constitutione impelluntur, e. c. ita ut, qui ardore interno excruciantur, se in aquam frigidam conjiciant, qui pectoris angustiam experiuntur, gulam rescindant⁴³⁾, necdum ab experientia confirmatum habemus. Constat solum mares potius sclopeto, feminas veneno uti⁴⁴⁾, sin-

Z z 2

gulos-

denegatae veneris (in feminis respectu ad suicidium evidentissimi), juxta calculum matrimoniorum vix erui posse. Sunt enim matrimonio junctae, quae inde plus quam plurimae caelibum patiuntur.

38) „Il est fréquent à la salpêtrière de voir des femmes qui, pendant l'écoulement menstruel, désirent avidement se détruire, qui font des tentatives pour cela, et qui n'y pensent plus dès que les menstrues ont cessé.“ ESQUIROL l. c.

39) „Il a donné des soins à plusieurs femmes qui, pendant leur grossesse, étoient tourmentées du désir de se tuer.“ ESQUIROL l. c.

40) TISSOT l'onanisme. Oeuvres T. I. p. 40.

41) „Dans le délire fébrile l'on se tue beaucoup plus souvent qu'on le pense communément.“ ESQUIROL l. c.

42) In nosocomio civico Vindobonensi curriculo octo annorum quo ibi medicus primarius constitutus eram, constanter observavi, numerum suicidarum in magna illa urbe constanter rationem rectam copiae maniacorum ad dictum nosodochium perductorum tenuisse.

43) OSLANDER l. c.

44) KLEIN in HUFELAND's Journ. der pr. Heilk. 1816. November p. 39. „Voici dans quels rapports se trou-

gulosque instrumenta sibi maxime familiaria ad nefandum scopum adtingendum eligere 45).

§. XCV.

Diagnosis. Prognosis. Cura.

Diagnosis. 1. Ne *taedium simplex*, quale homines laute et otiose viventes, praesertim vero feminae urbium majorum incolae experiri solent, pro gravi quodam morbo a medicis fidei bonae habeatur! *Diagnosis taedii vitae* magis ex aegri actionibus, quam verbis desumitur. Cavendum, ne temere de praegresso *suicidio*, utpote cum peracto ab aliis *homicidio* confundi potest, judicemus 1). Haberi illud

vent les instruments employés par 198 femmes qui ont attenté à leurs jours: suspension ou strangulation 49, précipitation 45, armes à feu 2, instruments tranchants 18, poison 7, asphyxie 5, abstinence 48, immersion 31." ESQUIROL l. c.

45) „Ordinairement les instruments que ces infortunés employent sont analogues à leurs professions. Ainsi, les militaires, les chasseurs, se brûlent la cervelle. Les perruquiers se coupent la gorge avec le rasoir. Les cordonniers s'ouvrent le ventre avec le tranшет, les graveurs avec le burin. Les blanchisseuses s'empoisonnent avec la potasse, le bleu de Prusse, ou s'asphyxient avec le charbon." ESQUIROL l. c.

1) De diagnosi suicidii sub respectu medicinae forensis lectu admodum digna KLEIN protulit l. c. p. 21. Item HEYFELDER l. c. et W. FR. SCHAEUFELIEN über die physischen Zeichen, woraus auf die absichtliche Selbsttödtung durch Erschiessen geschlossen werden kann. Stuttgart 1827.

illud solet nostro aevo indiscriminatim *pro morbi effectu*; quae opinio a sectione cadaverum quodammodo confirmari videtur. Verum si perpendamus: vitia in cadaveribus post autochiriam reperta et in cadaveribus hominum morte naturali defunctorum inveniri, et fortuito existere posse, — plurima cadavera autochiriâ peremptorum plane nil morbosî ostendere, — suicidium neque apud omnes gentes, neque in omnibus civium classibus, quamvis non minus morbis cerebri, cordis et cystidis felleae subditis obvenire, sed obvenire potissimum, ut diximus, inter homines irregulariter viventes, praecepta Religionis et moralis flocci pendentes, et impulsui destructionis sui ipsius, ut appetitus depravati speciei, cedentes, haec omnia si perpendamus, suicidium, nisi signa maniae aut delirii (cui et vehementia et improvisa animi pathemata quodammodo adnumerare licebit ²⁾) revera adfuerint, potius *pro effectu oblivionis criminalis officiorum erga DEUM et rempublicam*, quam pro constante effectu morbi habemus ³⁾. Qua de causa

2) „Lorsque l'âme est fortement ébranlée par une affection violente et imprévue, les fonctions organiques sont bouleversées, la raison troublée, l'homme perd la connoissance du moi, il est dans un vrai délire.“
ESQUIROL l. c.

3) „Man zieht offenbar einen Schleier über die Kehrseite unseres geselligen Zustandes, wenn man die Veranlassung zum Selbstmorde grösstentheils in physischen Bedingungen sucht, gleich als wollte man der Natur eine

caussa si nostra quidem in foro auctoritas admitteretur, id solum impetrare vellemus, ut petitione principii non semper peccetur, qua, quivis sui ipsius carnifex, ob id ipsum, quod sibi violentas intulerit manus, pro maniaco, quod inprimis esset demonstrandum, declaratur, utque quovis in casu rerum circumstantiae, ex quibus defunctum aut pro mente prius capto aut pro criminis reo habere licet, exacte eruantur, ne leges in suicidas, quas sapientiae veterum debemus, pueriliter eludantur⁴⁾. Per se intelligitur, conatus eorum, qui propriam vitam religioni, reipublicae singulisque civibus devovent, cum suicidio haud esse confundendos⁵⁾. Scias tandem autochiriam simulari posse.

Prognosis. 2. *Taedium simplex*, si negligatur, in graviores morbos nervosos, ut hypochondriasin, convulsiones, maniam et odium vitae transire potest. Aliquando accidentibus infortuniis aut aliis animi pathematibus malum sponte evanescit. Taedium vitae,

*Schuld aufbürden, deren der Mensch allein sich theilhaftig gemacht hat.*⁴⁾ IDELER l. c.

4) „Le suicide est plus fréquent depuis que les lois qui le condamnent sont sans vigueur.“ ESQUIROL l. c.

5) „Il n'est pas homicide de lui même, celui qui, n'écon- tant que des sentimens nobles et généreux, se jette dans un péril certain, s'expose à une mort inévitable, et sacrifie volontairement sa vie, pour obéir aux lois, pour garder la foi jurée.“ ESQUIROL l. c.

vitae, utpote periculum autochiriae minitans 6), nunquam speruendum. Autochiriae conatus aliquando repetiti 7).

3. Taedio, pro varia illius origine et gradu, Cura. cura tum moralis tum physica, adversus moerorem profundum commendata, adaptari debet. *Ulcerata artificialia* ad hepatis regionem et *potus aquae frigidae* praecipue laudata fuere 8). Item *radix atropae mandragorae* 9). Qui sua cadit manu, saepe uti asphycticus curandus. Ut leges severae adversus suicidas olim stabilitae, casu maniae et delirii excepto, executioni mandentur, optamus. Enimvero cadaveri consuetam sepulturam denegando, ut sapientissime canones ecclesiastici sanxerunt, agnati taedio vitae affectorum, tale opprobrium timentes, majorem eorum curam habebunt, et infamiae nota, quae autochiriâ necatis inuri-

6) „Il est des individus portés au suicide qui sont d'une race, d'une adresse capables de déjouer les soins de la surveillance la mieux entendue, et de déconcerter l'homme le plus expérimenté; ils provoquent ou saisissent les occasions avec une préméditation et une astuce dont on ne peut trop se méfier.“ ESQUIROL l. c.

7) Plura exempla narrantur ab egregio ESQUIROL l. c.

8) AUBENBROGER l. c. CHEVREY l. c. ESQUIROL (l. c.) indicatam methodum effectui destitutam vidit.

9) „Moerore confectis et male habentibus, mortemque laqueo sibi consciscere volentibus, *mandragorae* radicem mane propinato, minore tamen pondere, quam quod furorem excitat.“ HIPPOCRATES de locis in homine.

inuritur, imaginationem hominum impulsam ad suicidium percipientium salutari modo feriet, ut supra allatum puellarum Milesiarum exemplum abunde docet. Quae singula ne severa nimis appareant, aut crudelia! A communi enim hic recedimus nostri aevi opinione, intime persuasi, genus humanum non tam facile gubernari posse, ac desiderandum foret, bonum publicum universum ex-
poscere, ut vita humana maximi habeatur momenti, homines autem, qui propriam non curant vitam, nec aliorum vitam aestimare, unde non mirum, si suicidium cum criminibus omnis generis pari passu incedat, saepeque copuletur.

CAPUT XXIII.

De deliriis.

§. XCVI.

Definitio. Scriptores. Divisio.

Definitio. 1. **I**deae objectis minime respondentes ac perturbatae, cum privatione usus rationis, ai malum acutè decurrat, *delirium* ¹⁾ efficiunt.

2. Deli-

- 1) *Etymologia.* *Lira*, fossa recta vocabatur, quae in agris ducebatur, ut terrae uliginem reciperet, unde *delirus* dicebatur homo, quod a recto ordine et lira quasi aberret. Alii maluerunt vocabuli hujus originem deducere ἀπὸ τοῦ λῆψιν, quod a λῆρος, nugae, ineptiae

2. Delirii varios modos antiquitas docte statu-
 tuit, uti videre est ex HIPPOCRATE ²⁾, GALENO ³⁾
 aliisque ⁴⁾. Nec HELMONTIUM ⁵⁾ hic sine laude
 praeterimus. Legantur et BOERHAAVE ⁶⁾, SWIE-
 TEN ⁷⁾, ESQUIROL ⁸⁾ ac ii, qui speciatim de de-
 lirio scripserunt ⁹⁾.

3. De-

derivatur. *Synon.* Paraphrosyne, aut paraphronia, a
 GR. *παρά*, e contra, et *φρόσις*, sapio, intelligo. Para-
 cope SWEDIAUR. GERM. *Irrereden*. GALJ. *Délire*
 ANGL. *Delirium*. POL. *Obłąkanie*. ROSS. *Бредъ*.

2) Praedict. lib. I. Text. 24. CHART. T. VUL. p. 215. et
 alibi saepius, v. c. aph. 53. sect. 6. CHART. T. IX.
 p. 285. Cfr. DOERINGO diss. Hippocrat. doctrina de de-
 lirio, opt. semiot. exemplar. Marb. 1790.

3a) Ibid.

3b) E. c. CELAUS lib. III. c. 18.

4) De febris. cap. XI. No. 13.

5) Institut. §. 566, 568 etc. 6) Commentar. Vol. II. §. 700.

7) *Diet. des sciences méd.* T. 8. *articl. Délire*.

8) FABRICIUS diss. de delirio et phrenitide. Rost. 1619.

DEUSINGO diss. de delir. simpl. et phrenet. Groen. 1658.

DONCKERUS diss. de delirio. Lugd. Bat. 1662. MEN-

JOT diss. de delirio in genere. V. diss. pathol. 1662.

VAN DER BUSCH diss. de delirio. Leid. 1668. HERN-

DIA de natura delirii et ejus causis. Op. T. III.

CRAUSIUS de delirio in genere. Jen. 1686. VATER

diss. de deliriis. Wittemb. 1716. LUTHER diss. de de-

lirio. Erf. 1731. TEICHMEYER diss. de delirant. furore

et dement. Jen. 1733. TROTZ diss. de deliriis. Argent.

1740. WEDDEL diss. de deliriis. Jen. 1744. BÜCHNER

diss. de delir. vitam et mort. praesag. Hal. 1757.

PLEININGER diss. de praecip. delir. causis. Stuttgard.

1779. MANGOLD diss. de delirio. Erf. 1781. STA-

Divisio.

3. *Delirium* dividitur in *symptomaticum* et *primarium*. Utrumque probe a *somniatione* et quodammodo a *mania* distinguendum est. Distinguitur a *somniatione*, cum qua pluries confusum fuit ⁹⁾, quod delirium somni imaginem haud refert, periodicis tam stricte non alligatur, et ordine in rebus peractis minime insignitur. De delirio aliorum morborum symptomate in sequenti paragrapho quaestio erit. Delirio primario duo specialia capita dicamus, quorum alterum *delirium a vino* aliisque *liquoribus fermentatis*, alterum *paraphrosynen a venenis narcoticis* amplectetur.

§. XCVII.

De delirio symptomatico.

Generatim.

1. Sunt qui in levissimis morbis delirare consuescunt, ut hypochondriaci, hystericæ et ebriosi; sunt contra ea quorum mens neque sub vehementissima febre perturbatur, ut rustici, hominesque fortes et sobrie viventes. Delirium symptomaticum frequentissime sub febrium curriculo obvenit ac *febrile* dicitur ¹⁾. Aeger eo prebensus plerumque

VAN diss. de deliriis. Goett. 1782. BELEN diss. de delirio in genere, Lovan. 1782.

9) Cfr. DODDRIEGER in *Philos. transact.* No. 4. LAMBERG *Abh.* 3. B. p. 244. *Ephem. nat. cur.* dec. II. ann. 6. append. p. 14.

1) LOVATZ diss. de febre delira seu delirio. Leid. 1673. BINO diss. de delir. febrili. Hal. 1733. DODDRIEGER T. I. p. 144. SCHNEFFEL diss. de Pyromania. Gryphisw.

rumque omnes cerebri functiones perturbatas exhibet; etenim nec percipit, nec objectum ullum praesens, e. c. lectum, cubile etc. cognoscit, adstantes non videt, nec audit eos loquentes. Praesagiunt tale delirium³⁾: decubitus in ventrem⁴⁾, stridor dentium⁵⁾, magna et longo tempore facta respiratio⁶⁾, pulsatio hypochondriorum⁶⁾, oculorum motus creber⁷⁾, vigiliae⁸⁾, fuga abscessus critici⁹⁾, dolor auris acutus¹⁰⁾, lingua aspera, arida aut tremula¹¹⁾, facies bene colorata cum aspectu torvo¹²⁾, motus inconsueti¹³⁾, ferox re-

sponsum

1750. XELL diss. deliria febrilia. Giesæ. 1784. MATYR diss. de delirio febrili meletemata. Hal. 1797.

2) Cfr. Comment. in libr. I. Praedict. HIPPOCRATIA. Text. I. CHART. T. VIII. p. 6. et HIPPOCR. in Prognosticis sentent. 3. CHART. l. c. p. 584.

3) „Pronum in ventrem cubare, cui non assuetum est, etiam sano sic decumbere, *delirium* significat aut dolorem locorum circa ventrem.“ Ibid. p. 603.

4) „Dentibus stridere, quibus non consuetum est a pueritia, *insaniam* et mortem portendit.“ Ibid. p. 604.

5) Ibid. p. 607.

6) „Si in hypochondrio pulsus insit, perturbationem significat, vel *delirium*; verum oculos eorum intueri oportet.“

7) „Si enim (oculi) crebro moveantur, expectanda *insania* est.“ Ibid.

8) „Vigilia futurum delirium praesagit.“ Ibid. p. 625.

9) Ibid. p. 657.

10) Ibid. p. 670.

11) Ibid. p. 713. et in Coacis 234. ubi instat dubii proponitur hoc signum (p. 865), mihi saepe nullo subsequente delirio visum.

12) Ibid. p. 864. Coacis No. 214.

sponsum in homine moderato ¹⁴⁾, gesta indecora in aegro verecundo ¹⁵⁾, manus ante faciem attollere, muscas quasi venari inani opera, floceos carpere de vestibus, vel pariete ¹⁶⁾ et arteriarum carotidum, temporalium etc. pulsatio inconsuetas ¹⁷⁾. Ad morbos febriles, quae frequenter delirio stipari solent, spectant:

Del. in
feb. inter.

2. *Febres intermittentes.* Delirium hic oriri potest, vel ob latentem encephalidem, vel ob irritationem verminosam, vel ob affectionem hepatis, vel ob peculiarem systematis nervosi sensibilitatem, vel ob ignotam annuam constitutionem. Quandoque delirium totum febris intermittens paroxysmum efficit ac sic dictam *febrem intermittentem larvatam perniciosam maniacam* constituit. A tali morbo delirium fugax, sub stadio caloris obvium, plerumque benignum aut accidentale distinguere debet. Cura febrium intermittentium delirio stipatarum principiis generalibus innititur. Ast maxima *complicationum* ratio habenda est. Qua de causa saepe vigente paroxysmo locum obtinent, vel *hirudines* ad caput, vel *clysteres assae foetidae*, vel *cucurbitulae scarificantes* ad hypochondrion-

13) „Praeter consuetudinem aliquid facere, vel aliquid magno studio curare pius non consuetum, aut contrarium, primum ac delirio proximum.“ Ibid. p. 855. No. 48.

14) In Prophet. lib. I. CHARTER. T. VIII. p. 730.

15) In Prognost. Ibid. p. 630. 631.

16) Ibid. p. 606. 17) SAUVAGES l. c. p. 371.

chondrium dextrum, vel *opium*, vel alia genio epidemico accommodata.

3. *Febres continuæ*. Jam monuimus delirium Del in feb. cont. saepe comitem sistere febrium continuarum, praecipue nervosarum, *pestis*, *febris flavae Americanorum*. Rerum positiones delirio in febribus intermittentibus faventes, et ei in febribus continuis favent. Praeter cerebrum hic ad conditionem viscerum abdominalium respiciendum esse, omni jure monuerunt STOLL¹⁸⁾ et RAHN¹⁹⁾. Ac re quidem vera quot deliria non sedantur in febribus continuis per *clysteres cum aceto*, per *fotum emollientem tepidum* hypochondriorum, per *lenia evacuantia* et *anthelminthica*, ne iterum de praeceptis adversus delirium in febre nervosa quaestio fiat²⁰⁾. Et *convalescentia* suum habet delirium, interdum *inanitionis* progeniem²¹⁾.

4. Morbi

18) Ratio medend. T. III.

19) Mirum caput inter et viscera abdominalia commercium. Goett. 1771. cap. 5.

20) Edit. secundae, P. I. Vol. I. sect. II. cap. V. §. XXXI.

No. 23. Addi debet *musica*, de cujus virtute ad compescendum delirium febrile legantur: *Académie des sciences* *Par.* 1707. *hist.* p. 8. *Par.* 1708. *hist.* p. 27. SWARTEN comment. T. II. 702. p. 334. ERMÜLLER disp. effect. mus. in hom. Lips. 1714.

21) „Post pleuritidem sanatam, ait GILBERT, vidi hominem ob inanitionem delirantem, quod probatum fuit curatione delirii, quae tota consistebat in nutritione appropriata. Quando enim comedebat, cessavit

D. in
morb.
exanth.
aliisque.

4. *Morbi exanthematici aliqui.* Spectare huc praecipue *scarlatinam* jam dictum est ²²⁾. De delirio symptomate *encephalitidis*, *hydrocephali* et *apoplexiae* vix egimus. Reliquorum deliriorum, *ophthalmitidem*, *otitidem*, *inflammationes diaphragmatis*, *morbos pulmonum* tum *acutos* ²³⁾, tum *chronicos*, *suppurationes viscerum* ²⁴⁾, *vulnera* ²⁵⁾, *puerperium*, *haemorrhoides* etc. comitantium, sparsim in curriculo praesentis operis mentio injicietur.

CAPUT

delirium, peracta digestionem iterum delirabat; manducando sapiens fiebat" (*Advers. med. obs.* 5).

22) Edit. secundae. P. I, Vol. III. sect. I. cap. I. §. II. No. 2.

23) LAMOIX, *quels sont les moyens les plus propres à combattre le délire, qui survient dans les maladies aiguës de la poitrine?* Diss. inaug. Paris 1818.

24) Diss. de hecticorum deliriis, malo omine oriundis. Hal. 1765. ESQUIROL l. c.

25) HELLER *observations sur une espèce particulière de délire traumatique. Répertoire d'anatomie. T. 4. cah. 2. Bulletin des scienc. médic. 1828. No. 9.*

CAPUT XXIV.

*De ebrietate et ebriositate, deque
ejus effectu delirio tremente.*

§. XCVIII.

Definitio. Scriptores.

1. Delirium ex abusu vini, alcohol alio- Defini-
tiones.
rumque liquorum fermentatorum, dicitur *ebrie-
tas* ¹⁾, cujus habituales vel periodici reditus *ebrio-
sitate* ²⁾, frequentem *delirii* sic dicti *tremetis* ³⁾
causam, constituunt.

2. Objurgatio, quae medicos, utpote prolixè Scripto-
res.
satis alios morbos enarrantes et vix de *ebrietate*
loquentes, paucis concessis exceptionibus ⁴⁾, diu
adtingit,

1) *Syn.* Delirium temulentum. Temulentia PLATERI.
Paraphrosyne temulenta SAUVAGES (temulentia a prisca
voce *temulentum*, quod vinum est, derivatur). GERM.
Der Rausch, die Trunkenheit. GALL. *L'ivresse.*
ANGL. *Drunkenness, intoxication.* ITAL. *Ubbriacchezza,*
ebbrietà. POL. *Pijaństwo.* ROSA. ПЛАНЧЕНО.

2) GERM. *Trunksucht.* GALL. *Ivrognerie.*

3) *Synonymia* passim infra tradetur.

4) STRÖMER decreta medica de ebrietate. Lips. 1531.
WILLICHIUS Problem. de ebrior. affect. et morib. Fr.
1543. SEIDEL de ebrietate, Lips. 1594. MAGNUS de
violentia ejusque malis. Francf. 1618. WALDSCHMIDT
diss. de ebrietate et insolentibus aliquot ejus affectibus.
Gies. 1677. BECK exper. circa natural. rerum princip.

adigit, 'aevo nostro abunde vindicata est a TH. SUTTON ⁵⁾, CH. PERRY ⁶⁾, PIDWELL ⁷⁾, BRÜHL-CRA-

ETTMÜLLER diss. de temulentia. Lips. 1678. HARNEMANN diss. de usu et abusu inebriantium. Kiel. 1679. RAST ebrietas medicè considerata. Regiom. 1682. RONDELET M. M. cap. 13. WEDEL diss. de vini dulcis plenit. Jen. 1692. MALLENKROT diss. ebrietatis *наболога*. Traj. ad Rh. 1723. PICTOR serm. convivial. ebrietatis in exilium relegate threnodia. v. HALLER bibl. med. pract. Vol. II. p. 89. JUCH de ebrietate ejusque noxis praecavendis et tollendis. Erf. 1741. HON *Abhandlung von der Trunkenheit*. Stralsund 1747. DARWIN *zoonomia*. Vol. I. sect. 21. TROTTER *essay medical, philosophical and chemical on drunkenness and its effects on the human body*. Lond. 1804. Versio Germanica juxta quartam editionem: *Mit physiologischen Bemerkungen verwandten Inhalts begleitet* von J. C. HOFFBAUER. Lemgo 1821. B. RUSH *inquiry into the effects of ardent spirits upon the human body and mind*. Philadelphia 1805 (4. edit. exstat). Cfr. RUST *Dispertorium* B. 16. Heft I p. 117. SZYMKEWICZ *Dzieło o Pijaństwie*. Wilm. 1817. RENARD *der Brantwein in diätetischer und medicin. polizeilicher Hinsicht*. Mainz 1817. PERCY et LAURENT *artiel. Ivresse* in *Dictionnaire des scienc. médicales* T. 26. p. 232—257. FRIEDLÄNDER *artiel. Ivrogne, Ivrognerte* *ibid.* p. 257—273.

5) *On delirium tremens*. Lond. 1843. Vers. Germ. auct. PH. HEINECKEN. *Mit einer Vorrede von Dr. S. A. ALBERS*. Bremen 1820.

6) In *The medical and physical journal*. Lond. 1814.

7) In *The London medical repository*. Vol. 4.

CRAMER ⁸⁾, WALTER CHANNING ⁹⁾, P. RAYER ¹⁰⁾,
 BEHR ¹¹⁾, GRAFF ¹²⁾, J. BEGBIE ¹³⁾, SALVATORI ¹⁴⁾,
 TENDERING ¹⁵⁾, EICHELBERG ¹⁶⁾, KOPP ¹⁷⁾, J. G.
 LIND ¹⁸⁾, WITTEVEEN ¹⁹⁾, HEINECKEN ²⁰⁾, BERNDT ²¹⁾,
 TÖPKEN ²²⁾, E. BLAKE ²³⁾, J. CH. A. FITZSCH-
 KAU ²⁴⁾, HUFELAND ²⁵⁾, KRIEBEL ²⁶⁾, ANDREAE ²⁷⁾,

C. R.

8) *Ueber die Trunksucht*. Berlin 1819.

9) In *The new England journal of med. surgery*. Vol.
 8. 1819. No. 2.

10) *Mémoire sur le delirium tremens*. Paris 1819.

11) In HUFELAND's *Journ. der pr. Heilk.* 1820. *Septbr.*

12) In *Zeitschrift für psych. Aerzte von NASSE*. 1. *Viertel-*
jahrs-Heft 1820.

13) *Diss. de delirio tremente*. Edinb. 1821.

*) *Commentatio pathologica et therapeutica de ebriosi-*
tate continua remittente et intermittente. *Comment.*
societ. phys. med. Mosquensis. P. 2. 1821.

14) In NASSE l. c. 1. *Vierteljahr* 1821.

15) In HUFELAND l. c. 1821. *September*.

16) *Beobachtungen im Gebiete der ausübenden Heilk.*
Frankf. 1821.

17) *De delirio tremente sic dicto observationum series*.
Cum epicrisi de morbi indole ac natura. Havniae 1822.

18) *Diss. de delirio tremente*. Gröning 1822.

19) In HUFELAND l. c. 1822. *April*.

20) In HUFELAND l. c. 1822. *November*.

21) In HUFELAND l. c. 1822. *December*.

22) In *London medical and physical journal* 1823. *No-*
vember.

23) *Diss. delirium tremens*. Berol. 1823.

24) l. c. 1824. *April*.

25) In HUFELAND l. c. 1824. *April*.

26) In HUFELAND l. c. 1824. *Mai*.

Frank Prax. II. I. 1.

A a a

C. R. RADECK DE RADECKI ²⁷⁾, L. GUSTORF ²⁸⁾,
FR. G. JUDERGEBEN ²⁹⁾, C. R. SCHMIDT ³⁰⁾, N.
C. MÖHL ³¹⁾, HERHOLD ³²⁾, FARENHOST ³³⁾, GRÜTZ-
NER ³⁴⁾, H. A. GÜDEN ³⁵⁾, J. R. BISCHOFF ³⁶⁾,
GÜNTHER ³⁷⁾, STEINMIG ³⁸⁾, C. J. WEIGEL ³⁹⁾,
C. STREMPFEL ⁴⁰⁾, EBERMAIER ⁴¹⁾, JACOBY ⁴²⁾, G.
J. BRUBERGER ^{*)}, HENKE ⁴³⁾, W. ELVERT ⁴⁴⁾, R.

MAC-

27) Diss. de delirio tremente. Dorpat. 1821.

28) Diss. nonnulla ad delirii dicti tremementis historiam
momenta. Gött. 1824.

29) Diss. de delirio tremente. Jen. 1825.

30) Diss. de delirio tremente. Wurceb. 1825.

31) *Behandlung des delirium tremens in dem Friedrichs-
Hospital zu Kopenhagen.* In FRORIER's Notizen aus
dem Gebiete der Natur- und Heilk. 1825. Sept.

32) In FRORIER l. c.

33) In RUST's Magazin für die gesammte Heilk. B. 20.
Heft 2. 1825.

34) In RUST l. c. B. 20. Heft 3.

35) *Von dem delirium tremens.* Berlin 1825.

36) *Grundsätze der pr. Heilkunde durch Krankheitsfälle
erläutert.* B. 3. Prag 1825. Ctr. RUST Repertorium.
B. 15. Heft 1. p. 83.

37) In Zeitschrift für Anthropologie 1825. Heft 1.

38) In Annalen für die gesammte Heilkunde unter der
Redaction der Grossh. Badischen Sanitäts- Commission.
3. Jahrg. Heft 1.

39) Diss. de delirii tremementis pathologia. Lips. 1826.

40) Diss. observationes de morbo qui delirium tremens
vocatur. Rostoch. 1826.

41) In Heidelberger klinischen Annalen B. 3. Heft 4.

42) Diss. de natura delirii tremementis. Regiom. 1827.

*) Diss. quaedam de ebrietate ejusque causis. Berol. 1827.

MACNISH ⁴⁵⁾, WITTCKE ⁴⁶⁾, G. BACKHAUSEN ⁴⁷⁾,
SCHIRLITZ ⁴⁸⁾, A. DE MOULON ⁴⁹⁾, LENZ ⁵⁰⁾,
RYAN ⁵¹⁾, PAULI ⁵²⁾, JUNGHANEL ⁵³⁾, P. SCHMIDT ⁵⁴⁾.

§. XCIX.

Symptomata. Necroscopia. Causae.

1. In prima ebrietatis periodo observantur ex-
hilaratio mentis, fuga curarum, laetitia cordis,
sensus jucunditatis amoenaeque vertiginis, oculi
fulgentes, facies splendens, os garrulum, cutis
rubra, transpiratio aucta, sitis, cum frequenti

Sympto-
mata.

Aaa 2

urinam

43) In Eiusdem Zeitschrift für Staatsarzneykunde. 8. Er-
gänzungsheft 1827. No. 7.

44) Medicinische Beobachtungen, nebst Bemerkungen
über einige besondere Heilmethoden. Hildesheim 1827.

45) The anatomy of drunkenness. Glasgow 1827.

46) In HUFELAND l. c. 1828. April.

47) Beobachtungen über den Säuferwahnsinn oder das
delirium tremens. Bremen 1828.

48) Rust Magazin. B. 28. 1829. Heft 3.

49) Delirium tremens potatorum methodus cognoscendi
et medendi. Patavii 1829.

50) Ueber Trunksucht. Rust Magazin. B. 29. 1829.
Heft 1. p. 125.

51) GERSON'S Magaz. der ausl. Literat. der Heilk. 1829.
Sept. Oct. p. 315.

52) Rust l. c. B. 30. Heft 3. p. 387.

53) Neue Zeitschrift für Natur- und Heilk. Dresden. B.
1. Heft 1. p. 114.

54) Beiträge zu e. Monographie ab. d. delirium tremens
in Mittheilungen aus dem Gebiete d. gesamt. Heilk.
Hamb. 1830. B. 1.

urinam non sine levamine deponendi nisu, pulsusque plenus, fortis. Jam vero major vertigo, aurium tinnitus, visus duplex ac ideae sine nexu atque citra voluntatis imperium sibi invicem inordinate succedentes, occurrunt. Quivis tunc mores et ingenium talia, qualia sunt, candide recteque, omni simulatione remotâ, exhibet, unde dictum: *in vino veritas*; iracundus etenim exardescit, verberat mordetque, amasius suspirat, osculatur, factus in cachinnationem prorumpit donaue nolitibus obtrudit, tristis lacrymas profundit ac de religione et morte loquitur, alii peculiari modo hallucinantur ¹⁾, donec exhaustis quasi viribus balbutire incipiant ²⁾, subsequentibus facie pallida, sputatione tenace, vomitu, sphincterum officio deleta, artuum tremore, corporis vacillatione et statu febrili. Quae abominanda scena per cataphoram ³⁾, saepe nychthemeron ⁴⁾ et ultra duran-

tem,

1) Sic referente PLATERO (obs. lib. I. p. 37) quidam ebrius in platea lunae splendorem in terra intuens existimavit se videre fluvium profundum, et quo natare posset, unde vestimenta deposuit etc. Cfr. PROSP. ALPINUS med. Aegypt. lib. IV. c. 2. p. 122.

2) *Their feeble tongues,
Unable to take up the cumbersome word,
Lie quite dissolv'd. Before their maudlin eyes,
Seen dim and blue, the double tapers dance
Like the sun wading the misty sky.*

THOMPSON.

3) Cap. VI.

4) GALENUS, HERRIGUS AB HEER, et DARWIN de con-

tem, aliquando per convulsiones⁵⁾, apoplexiam⁶⁾ aut mortem⁷⁾ terminatur. *Ebriositas* ubi *delirio trementi* ansam porrigit, aeger primum de debilitate, anorexia, pondere ad epigastrium, tensione hypochondrii dextri, ructibus, dolore capitis, aurium tinnitu, anxietate et inquietudine conqueritur. Corporis positionem continuo mutare conatur. Habitus inconsueti quid exhibet. Interdum desideratur, alias alcohol modo adversatur. Aliquando diarrhoea, haemorrhoides, mictusve cruentus in conspectum veniunt. Maxime autem vigiliae et somnia terribilia molestant. Oculi subrubri, flavi, pupilla contracta⁸⁾, lingua muco flavo obducta, tremula. Tremunt praeterea maxilla et extremitates, praesertim manus et (si aeger sedeat) pedes. Tremor ille, tendinum subtilibus junctus, explorationem impedit pulsus, modo normalis, modo frequentioris, plerumque mollis, irregularis et vacillantis. In plurimis epistaxis, et in quibusdam carotidum vibratio animadvertuntur. Item singultus et eclampsia. Pro-

gredi-

sueta ebrietate rite monent eam non omnino fugari, nisi postridie eadem circiter hora, qua die praecedente contracta est.

5) PEARX in *Journ. de médecine* T. 91. p. 349.

6) Cap. V. §. XXVI.

7) *Ephem. nat. cur. dec. I. ann. 3. obs. 313. ann. 4 et 5. obs. 17.*

8) *London medical gazette. No. 5. Frohler Notizen B. 21. No. 12. p. 192.*

grediente morbo vigiliae, anxietas, tremores augentur, accedentibus jam sensuum, potissimum visus hallucinationibus. Aeger diu noctuque cubiculum, quid quod totam domum pervagat, et negotiorum propriorum absolvendorum causâ, foras petere conatur, ceterum siue vi retinetur. Inconcinne loquitur, objecta interdum inversa cernit, asepissime spectra larvas, fures, mures, felles, corvos, scarabeos, muscas, strucas vel harum filamenta videre sut aves zinzulantes audire, aut infantes in ventre gerere, existimat. Quae singula sub continuo eoque frigido viscidoque sudore, modo remittunt modo invalescunt. Ibi aeger hallucinationis gnarus sibi met ipsi irridet, hic in delirium prorumpit, quo vigente manus quidem proprias mordere, partibus genitalibus admove, adstantibus autem (quos vix unquam dignoscere cessat) minime vim inferre solet. Memoria generatim labefactata adparet, magnaue desideriorum volubilitas. Morbus nunc spatio hebdomadis absolvitur, nunc, quod tamen non vidimus, ad tres adeo menses protrahitur ⁸⁾).

Necroscopia.

2. Feruntur *cadavera ebriorum* exhibuisse ventriculi expansionem ⁹⁾, distensionem vasorum cerebri ¹⁰⁾, aërem in iis ¹¹⁾ et in ventriculis encephali

8) BACKHAUSEN l. c.

9) Ephemer. nat. cur. cent. X. obs. 85.

10) WEBER obs. med. Fasc. 2.

11) MÜLLER *Einführung zu dem Entwurfe einer neuen Methode*. Erf. 1754. p. 162.

phali serum, odorem vini¹²⁾, vel alcoholi¹³⁾ referens. *Delirio tremente defuncti* nobis aliisve¹⁴⁾ obtulerunt nisi semper phlogosin meningum, cerebri et cerebelli, saltem extravasatum seri copiosum, praecipue ad basin cranii. In specie notata sunt: sanguis sicuti in apoplexia in varias encephali partes effusus¹⁵⁾; serum copiosum non solum in cranio, sed et in specu vertebrali¹⁶⁾, latitans: phlogosis durae matris¹⁷⁾ ejusque sinus ernore repleti¹⁸⁾; rubor arachnoideae¹⁹⁾; cordis emphysema²⁰⁾, hepar magnum²¹⁾. Sunt adeo qui contendant sanguinem hic alcohol continere²²⁾.

3. *Ebrietatem* inducunt *vina* antiqua, acido Causae. expertia, vix diuretica, gaz acidum carbonicum continentia, sulphure aut ambra²³⁾ imbuta, — alcohol aromatibus, sinapi, lauro ceraso nuptus, —
potus

12) WEFFER obs. p. 7. 13) SCHNADEN obs. anat. med.

14) ANDREAE L. C. ROMBERG in *Zeitschrift für psychische Aerzte*. 1822. Heft 1.

15) EDERMAIER L. C.

16) RUST *Magazin B.* 21. Heft 2. p. 264.

17) SCHIRLITZ L. C. p. 542. 18) BACKHAUSEN L. C.

19) BACKHAUSEN L. C.

20) NASSE *Leichenöffnungen zur Diagnostik und pathologischen Anatomie*. Bonn 1821. Erste Reihe.

21) ANDREAE L. C.

22) WASSERFUHR in RUST's *Magazin B.* 27. Heft 2. p. 298. SEGALA in GERSON's *Magazin der ausländ. Liter. der gesamt. Heilk.* 1826. Mai, Jun. p. 488.

23) MATTHIOL. ad DIOSCORIDEM. lib. I. cap. 20.

potus ex fructibus, melle ²⁴⁾, aut *lacte* ²⁵⁾ per fermentationem parati, — *cerevisia* cum duplici humuli lupuli additamento, vel cum venenis narcoticis (ut *helleborus albus*, *lycoperdon bovista*, *ledum palustre*, *byoscyamus niger*, *lolium temulentum*) confecta, *aqua gaz acido carbonico* imbuta ²⁶⁾, haecque omnia non solum epota, sed et sub forma vaporis, balnei, fots ²⁷⁾, clysterum ²⁸⁾ adhibita. A protracta ejusmodi caussarum (maxime autem *potus alcoholis* ²⁹⁾), actione, concurrenti-

24) Ex melle apum floribus *tiliae europaeae* nutritarum Lithuani, praesertim urbis *Kowno* incolae, liquorem parant, vulgo *Liptec*, vino Hungarico aequiparandum et, dum antiquum, valde inebriantem.

25) *Sæmmentus* prax. lib. IV. P. II. de lof. morb. c. 7.

26) *Ovidius* (lib. XV. metamorph.) de *amne Lyncesti* dicit:

„Hunc quicumque parum moderato guttare trahit,
Haud aliter titubat ac si mera vina bibisset.“

Cfr. *Plinius* (hist. nat. lib. II. c. 103) et effectus aquae nostrae *Selteranae*.

27) *Loubet* *traité des playes d'armes à feu*.

28) *Borellus* Cent. I. obs. 56. *Paullini* Cent. III. obs. 8.

29) Quamvis *Heinecke* (l. c. p. 6) dicenti: „*Bemerkenswerth ist es, dass dieses Uebel nur bei Brantweintrinkern, nicht bei Weintrinkern bemerkt worden*“ sine restrictione assentiri nequeam, fateri tamen adigor, delirium tremens mihi in Lithuania, ubi vulgus potui cremati addictum est, sine comparatione frequentius quam in Austria et in Insubria, ubi vini abusus facile locum obtinet, obvenisse. Nec id mirum, si perpendamus alcohol corpus humanum

rentibus simul moerore, desperatione, ira, zelytypia, verbo animi pathematibus³⁰⁾, vigiliis³¹⁾, peculiarique annua constitutione³²⁾, saepius *delirium*

tremens

veneni in istar aggredi (ORFILA *allgemeine Toxicologie oder Gifskunde. Nach dem Französischen mit Anmerkungen begleitet von HERMSTÄDT. Berlin 1819. p. 82*). Num spiritus ex solano tuberoso paratus, propter principium zooticum, illo ex frumento, perniciosior sit (RUST's *Repertorium B. 17. Heft 2. p. 197*) non determinabo.

30) Vim animi pathematum delirium tremens producendi, nemo praetervisit. Immo in ea versor opinio-
na, potum alcohol, sine illis pathematibus, vix aut ne vix quidem ad morbum ejusmodi excitandum valere. Et quis animi pathematum magis ludibrio foret homina ebrioso, nunquam non aerumnoso? Raro sane fortuna prospera ei adrides, etiamsi causis ebriositatis adscripta fuerit (REID *on hypochondriacal and others nervous affections. Lond. 1816*).

31) BACKHAUSEN vigilias pro *symptomate* delirii tremen-
tis agnoscens, improbat, illas *causis* ejus morbi a KRAIBELIO adscriptas fuisse. Mihi autem videtur unum alterum minime excludare. Et quid? ex eo quod icterici valde ad iram proclives sunt, ira ex numero causarum icteri excludenda foret? In ebriosia sicuti in aliis hominibus ex aerumnis nascuntur animi pathemata, ex animi pathematibus insomnia, et ex insomniis morbi cum vigiliis.

32) GOEDEN et BACKHAUSEN imperium constitutionis annuae in delirium tremens jura extulerunt. Cohors enim ebriosorum continuo praesto est, et nihilominus ille morbus certis dumtaxat temporibus (aliquando in plurimis simul) obvenire solet, quod Villae inprimis varno ineunta accidisse, recordor.

tremens oritur, cui praecipue obnoxii sunt mares³³⁾, aetatis mediae³⁴⁾, vitamque alternatim graves inter labores et otium ducentes³⁵⁾, taenia laborantes³⁶⁾, atque a parentibus ebriosis descendentes³⁷⁾.

§. C.

Diagnosis. Prognosis.

Diagnosis. 1. *Ebrietas*, saepe a furibus aliisque hominibus fraudulentis *simulata*, cum *apoplexia* aliisque *delirii speciebus* confundi potest. Notio vitae generis aegri, suspicio adstantium, vomitus et conditio materiei rejectae, praesentia sive absentia halitus vinosi, diagnosin plerumque¹⁾ adjuvare solent.

33) Ratio quidem mores inter et feminas delirio tremente laborantes, difficulter erui potest, quum feminae generatim minus ebriosae sint. Interea etsi a sat conspicuo earum numero quondam circumdatus vixerim, nec unius delirio tremente gennino affectae recorder (Nisus explicandi nunc et me attingit!), Forentine menstrua, utpote in ebriosis larga plerumque copia fluentia, quae istam illis plus minus conciliarent immunitatem?

34) BACKHAUSEN delirium tremens nonnisi inter annum vitae trigesimum et sexagesimum observavit. Cum ejus observationibus et mese conveniunt.

35) Ut caementarii, fabri lignarii, nautae, vecturarii (BACKHAUSEN.).

36) SALVATORI l. c.

37) „The children of drunkards are generally idiotic or born with evil propensities.“ BURTON *anatomy of melancholy*.

1) Certo non semper, praecipue in nosocomiis, ad quae

solent. Illa *delirii tremantis* ex hallucinatione sensuum, tremorum et vigiliarum deducitur. Ex istiusmodi enim syndrome TH. SUTTON novum hunc morbum eodem jure statuit, quo medici antiquitatis usi sunt, ex cutis flavedine, faecum albedine, et urinarum qualitate tingente *icterum* stabiliendo. Quemadmodum autem sub forma icteri plurimi diversique morbi latent; ita etiam sub forma delirii tremantis. Vae ideo juxta morborum nomina curantibus! Periculo inde emergente cl. viri occurrere sategerunt, morbos juxta connubium nonnullorum symptomatum definitos, rursus in *species* subdividendo ²⁾. Esto quoad morbos qui jam diu civitatis jure gaudent! Sed cur vitium, morbos plane diversos pro speciebus unius ejusdemque generis definiendi, perpetuare? — *Delirium tremens* (sit venia nomini absurdo ³⁾) aequantes morbos pro re nata amplecti credimus: 1. *encephalitidem tremefacientem* ⁴⁾; — 2. *febrem cepha-*

aegri saepe ignoti, noctu in plateis iuveni, adportantur. Advocato tunc medico juvene somnolento saepe vesicatoria et arnica illi praescribuntur, qui postridie debellata per somnum ebrietate, sat bene se habens, gratiasque agens, domum festinat. Cfr. HERR. AB HERR. obs. 19.

2) Delirium tremens a BACKHAUSEN divisum est in acutum et chronicum, in idiopathicum et symptomaticum, ac in athenicum et asthenicum.

3) Rectius sane: delirium cum tremore.

4) Nomina *Phrenosie der Säuffer* ab ALBERS et Hirnent-

cephalicam ⁵⁾; — 3. *rhachialgitidem tremefacientem* ⁶⁾; — 4. *febrem lentam nervosam* ⁷⁾; — *maniam* ⁸⁾; — *conditionem phlogisticam hepatis, ven-*

zündung der Säuser ab ANDRAE delirio trementi imposita, encephalitidem a viris claris praetervisam minime fuisse docent. Aecedunt testimonia aliorum medicorum, inter quae maxime facio illa NEUMANNI (*Rust Magaz. B. 8. St. 2. p. 356*) et BRANDTII (*Rust Repertorium B. 15. Heft 1. p. 87*). Nec meherele obliviscor quod propriis oculis in nonnullis cadaveribus conspexi!

5) Monui (cap. III. §. XVI. No. 4) dari morbos, ubi quidem encephalum absolute inflammatum admitti nequit, sed tamen graviter affectum concedi debet. Loquor de *febris cephalicis*; ad quas delirii tremantis casus PEARSON et ARMSTRONG revocarunt (*Brain-fever following intoxication*).

6) P. II. Vol. I. sect. II. cap. III. §. XII. No. 1. cap. IX. §. XLIV. No. 1. 3.

7) HUFELAND delirium tremens *febrem nervosam lentam potatorum* vocavit, ac revera illius morbi exempla vidi, ubi delirium, sine furente iusania, cum aversione lecti, vigiliis, tremore manuum et linguae, subsultibus tendinum atque audoribus frigidis (antequam virium dejectio summa subintrasset) tantam cum febre nervosa Huxhami similitudinem ac gutta aquae cum altera exhibebant.

8) BACKHAUSEN delirium tremens, sine ambagibus et limites a SUTTON stabilitas excedendo, *maniam potatorum* (*Säuserwahnsinn*) nuncupat; acque sententiam meam ultra comprobabat. Ultra, inquam, nam longe abest quominus mania potatorum (de qua experientia

ventriculi, pancreatis et lienis, saepe plexui nervorum solari infensam ⁹⁾; — *atque labefactionem systematis nervosi universi* ¹⁰⁾. — Tui erit delirii trementis forma sese exhibente, illam analysi submittere, et juxta praecepta tradita et tradenda,

ampla fretus loqui possum, quum eâ Rossiae Gyrgathi scatent) semper tremoribus stipeatur.

- 9) Quamvis in delirio tremente scenam ludant *ventriculus* et imprimis *hepar*, GÜNTHER, GRÖTZNER, SCHNITZER. prope adnotarunt. Ac re quidem vera nonnulla illius morbi exempla mihi suspicionem latentis hepatitis moverunt. Ut ut sit, visceribus abdominalibus a potu alcoholi irritatis, mirum non est *plexum solare* seu *coeliacum* in consensum trahi, quin ideo morbi essentiam iatum in plexum locarem ut GORDEN ubi ait (l. c. Kap. 4): „*Das Wesen des delirium trementis ist darin begründet, dass der unendliche, elementarische Pol des sensiblen Lebens den ordnenden und bindenden, den basischen beherrscht, dass jener das Maas überschritten hat und die organische Gesetzmässigkeit innerhalb einer bestimmten organischen Grenze, innerhalb des plexus coeliacus.*“ Dubito aegrum delirio tremente laborantem similes nugae unquam edixisse.

- 10) Libenter concedo delirium trementis interdum ex labefactione universi systematis nervosi, modo inflammatoria, modo ad debilitatem indirectam BRUNNIS spectante, proficisci. Cui ultimae opinioni addictus jam annis 1798 — 1804. plures aegros delirio tremente affectos, aethere, ammonia et opio, veluti per incautum sanitati restitui. Deerat febris, atque aegrorum aspectus, sudores frigidi, pulsus tremulus, proximam virium vitalium resolutionem indicabant.

denda, sineque praeconcepta opinione, unicuique morbo quod suum est, dare.

Prognosis. 2. *Ebrietatem* poena comes premit et phalanx morborum ipsam insequitur: enimvero caput foedis exhalationibus dirumpitur, cerebrum vertigine tentatur, oculi torquentur, aures undoso spiritu crepant, lingua vacillat, sermo futilis, oris halitus teter, stomachus subvertitur, cordis palpitatio, manuum inepta et insana gesticulatio; pedum incertus lubricusque gressus, inquietas nocturna, turpes rhonchi, furiales somni, alvi et vesicae spurcissima solutio, ut in hac eluvie (quemadmodum in coeno lutulentae sues) persaepe volutantur¹¹⁾. *Ebriositatem* specifica physiognomia¹²⁾ et habitus¹³⁾ atque tussis gravissimae insultus, matutinis horis cum lacrymarum expressione, secretionem, vomituritionem, vomitu, quasi suffocativo, consequuntur. Inde quoque via ad erythema guttam roseam, ad combustionem spontaneam et ad morbos nomine *delirii tremantis* comprehensos, parare dictum est. Quivis porro morbus in ebrioso gravius decurrit. Tandem ebrietatis effectus non solum ad ebriosos circumscribuntur, sed generationes futuras attingunt. Ex stirpe enim ebria procreari solent male morati¹⁴⁾, stupidi¹⁵⁾, mania-

11) JASON PRATENS. tract. de curand. cerebr. morb.

12) LAVATER *essai sur la physionomie. Première partie* 16. fragment. 3. addition.

13) Ibid. 4. addition. 14) LANGIUS epist. II. No. 9.

15) BEHRENS, select. diast. sect. 3. c. I. §. 7.

maniaci ¹⁶⁾, et epileptici ¹⁷⁾, unde ebriosarum sterilitatem ¹⁸⁾, vel ad abortum proclivitatem ¹⁹⁾, veluti pro numinis beneficio habemus. Ceterum sicuti alia mala, ita et ebrietas aliquando salutaris ²⁰⁾. *Delirii trementis prognosis* ex morbis ei ansam porrigentibus repetenda. Generatim alea inest malo idque quo magis repetuntur ejus accessus ²¹⁾.

§. CI.

C u r a.

1. Arduum quidem est abusus vini et alcohol, utpote liquorum, quibus homines gravibus laboribus, praesertim in climate frigido sive humido, obrutis indigent, e civitate eradicare. Attamen
malum

Prophy-
lactic.

16) RIEDLIN lin. med. ann. 1688. August, obs. 26. Cfr. Cap. XXV.

17) BEVERWYK thesaur. sanitat. P. II. c. 2.

18) RIEDLIN l. c. Julius. obs. 23. SCHNEYZER scrutin. med. curiosa. de natura aquae, vini et cerevis. p. 123. J. P. FRANK *System e. vollst. med. Politez.* 1. B. et quotidiana experientia.

19) BEHRENS l. c. ac permultae mearum observationum.

20) HOMMETS. non ergo singul. mensib. semel repet. ebrietas salubr. Paris. 1643. LANGLOIS diss. non ergo unquam ebrietas salutaris. Paris. 1665. SWALWE querel. vent. p. 181. Eph. nat. cur. dec. I. ann. 3 p. 693.

21) Sic et GORDEN asserit. Contra primum mali insultum pro periculosiore habet BACHHAUSEN. Diversitas ista opinionum novum de diversitate morborum nomine delirii trementis comprehensorum testimonium largitur.

malum saltem imminui et ad inferiores civium classes restringi posset, si illud religionis, legum et educationis ope satis oppugnaretur. Praeterea bono exemplo, praecipue sacerdotes ¹⁾, medici ²⁾, magistri ³⁾ et parentes esse deberent ⁴⁾. Sequeretur inspectio cauponarum ⁵⁾, reclusio ebriorum vias publicas infestantium, ommissio poe-
nae

- 1) Clerus est veluti anima reipublicae. Frustra hinc civilitatis habetur sollicitudo, nisi Religionis ministri e crapula, in qua praesertim apud populos nonnullos septentrionales vivunt, avellantur.
- 2) Nescio, quo fato contingat, ut classis civium, quae maxime de terribilibus ebrietatis effectibus persuasa esse deberet, medici scilicet, tot individua ebriosa (praesertim in regionibus septentrionalibus) exhibere possit!
- 3) Miror, quo pacto in universitatibus et gymnasiis gremio, homines tolerari possunt, abusu liquorum fermentatorum dediti! Utinam in alumnos eundem effectum exacererent, qui de Spartanis narratur, quatenus servos consulto inebriarunt, ut liberi inde exemplum desumerent! Sed cheu? alumni non unius universitatis jam ita ebriosi sunt, ut qualiacunque illis oblata exempla discernere nequeant!
- 4) Pulchre de hoc argumento egit anonymus: *Some inquiries into the effects of fermented liquors*, Lond. 1814. V. *Bibliothèque Brit.* n. 1815. Avril. No. 463—464.
- 5) Possessores Lithuani lucri gratia nullaque obstante lege cauponarum copiam quotidie adaugent, easque fudaeorum manibus tradunt, qui, rusticos servos alioquin (quod facile condonandum) ebriosos, variis artificijs adhuc allectant, iisque ultimum sic extorquent obolum.

nae mitigationis adversus crimina in ebrietate commissa (cum homo volens in ebrietatem incidisse judicetur *)), intermissio moris immoderate adbibendi 6), extensio potus coeae 7), aliaque peculiaribus rerum positionibus accommodata 8). Ad prophylacticam specialem quod spectat, nisi ratio ebriosum abstemium reddat potui liquorum fermentatorum, idea rei cujusdam nauseantis adso-cianda est. Quondam (vel ob praeconceptas opi-niones, abunde a BRÜCKMANNO 9), PLATNERO 10), et LENTINIO 11) refutatas) scopus ille attingi stu-deba-

*) HITZIO *Zeitschrift für Criminal-Rechtspflege*. 1826. ,
Heft 5. et HORN's *Archiv für med. Erfahr.* 1826. *Mat*,
Junius. P. 483.

6) KESLER exercit. academ. de immoderata adbibendi
consuet. (*Vom Zutrinken*). 1668. Quae elegans disser-
tatio leges continet, quibus potissimum debetur, quod
vitium ebriositatis, Germanis quondam familiare, ma-
gna parte expulsum sit. Cfr. TH. HENTZELL *an ex-
pose of the causes of intemperate drinking and the
means, by which it may be obviated*. Newyork 1819.

7) Systema nefandum commercii terrae continentis, qua-
tenus potum coeae restrinxit, ad ebriositatem divulgan-
dam multum contribuisse puto. Nec secus ejus infe-
licissimi temporis perpetua bella, moribus civilibus
militares substituendo.

8) In Scotia institutum emendationi morali ebriosorum
dicatum, locum habuisse, ex *Edinburgh med. and
surg. Journ.* 1805. *April*, elucet.

9) *Braunschweiger Intelligenzblätter* 1747.

10) *Diss. de ebriositate*. Lips. 1799.

11) *Beobachtungen der epidem. Krankheit*. p. 100.

debatur aquâ, quâ mortuus lavatus erat ¹²⁾, vino, in quo anguilla ¹³⁾, sive rana ¹⁴⁾ suffocata fuit, ovis noctuae ¹⁵⁾, lacertis vivis vel testudinibus ¹⁶⁾, stercore leonis ¹⁷⁾ etc. Aliquando *tartratis stibii et potassae* modica dosis potui inebrianti addita, nauseam et vomitum excitando, ulteriori illius desiderio frenum injicit. Aliàs gravis morbus perpeusus ebrios ad sobrietatem reducit. Quo pacto *adulterationi* liquorum fermentatorum prospiciendum sit, ad praesentis operis scopum minime spectat.

C. accessus.

2. Sub ebrietatis insultu profuisse visa sunt: immersio in aquam frigidam ¹⁸⁾, terror ¹⁹⁾, dolor ²⁰⁾, lapsus ²¹⁾, epithema scroti cum aceto ²²⁾, scarificationes ²³⁾, musica ²⁴⁾ et antlia stomachi ²⁵⁾.

Satius

12) Ephem. nat. cur. dec. II. ann. 4. obs. 156. dec. III. ann. I. obs. 15.

13) ZACUT. LUSITANUS prax. admirab. lib. III. obs. 127.

14) SACHSIUS in ampelograph. sect. 6. membr. 2. cap. 2. de vini abusu. p. 214.

15) FR. SCACCHIUS de salubri potu. c. 20. p. 215.

16) CAPIVACC. lib. III. de affect. ventricul. c. 8. de siti.

17) ALBERTUS M. L. 22. de animal.

18) Ephem. nat. cur. dec. I. ann. 2. obs. 217. TROTTER med. nautica.

19) RIEDLIN l. c. 1695. p. 283. Ephem. nat. cur. l. c. LANGIUS opp. T. III. p. 30.

20) LANGIUS l. c.

21) MAUCHARTS *Repertorium für die empirische Psychologie*. Nürnberg. 1792. 1. Th. p. 108.

22) AN HERR obs. No. 19.

23) PAULLINI cent. III. obs. 7.

Satius existimamus, curam a somno expectare ac interea quietem, silentium, capitis denudati erectam positionem, debitamque custodiam, porro *clysteres* cum aqua et aceto, potum *limonadae* aut aquae saccharatae²⁵⁾ et, elapsa irritationis periodo, infusum *cofeae* tostae, ipsumque liquorum fermentatorum modicum usum²⁶⁾ commendare. *Delirii trementis cura* secundum naturam morbi ordinanda est, habito simul respectu proprietatum ebriosorum. Hi quum cruoris conspicuam jacturam aegre ferre soleant; indicata alioquin *phlebotomia* (et ipsa adeo *evacuatio sanguinis localis*) non nisi circumspecte administrari debent. Capiti aestuanti, quo minus a sudoris percussione timendum est, eo securius *fomenta frigida* (ex aqua et aceto) admoveri possunt. *Vesicatoria*

B b b 2

tunc

24) PLUTARCHUS asserit, Scythas, quoties plus satis vino indulsissent, instrumenta musici generis pulsare consuevisse, ut discussis voluptatibus animum ad pristinam continentiam et moderationem revocarent. Cfr. ETTMÜLLERI diss. c. de effect. music.

*) *Application der Magenpumpe in einem Falle von Trunkenheit.* Ex *London medic. and phys. journal.* January 1827. in *FRONIER's Notizen* B. 18. No. 4. 1827. Aug.

25) HUYELAND's *Journ. d. pr. Heilk.* 11. B. 1. St. p. 190.

26) HORATIUS opp. T. III. p. 19. Sic schola *Salernitana*:

*Si nocturna tibi noceat potatio vini,
Hoc tu mane bibes iterum et fuerit medicina.*

tunc evitanda esse per se patet²⁷⁾. Secus autem in malo provento, inprimis vigente suspitione efformati in cavitate cranii extravasati²⁸⁾. — *Eccoprotica* ut *decoctum tamarindorum* et *potio RIVERII*²⁹⁾ plerumque ad potiora curationis momenta spectant. *Calomel* propter hepatis affectionem forte indicatum³⁰⁾, potatorum complexionibus minime quadrat. Contra, unico casu conditionis inflammatoriae ipsius ventriculi excepto, vix unquam poenitebit, jure celebratum hic *tartarum emeticum* ita exhibuisse ut levis inde vomituritio, sine profusa diarrhoea, oriatur³¹⁾. Systematis nervorum universi irritationem *pulveres temperantes cum cinnabare*³²⁾ optime compescunt.

Sunt

27) Sic ad SUTTONII opinionem, quatenus vesicatoria in delirio tremente avertantur, accedo.

28) Sic ad GRAFFII opinionem, quatenus vesicatoria in delirio tremente laudat, accedo.

29) R. Subcarbonatis potassae drachmam semis. Saturatur c. s. q. succi citri recentis. Adde aquae fontis uncias novem. Syrupi rubi idaei unciam. Misc. D. S. Secunda quoque hora unciam sumat.

30) ARMSTRONG aliique Anglorum *calomel* nostro in morbo commendant.

31) Certe non ad insanas doses, quae pustulas in tubo intestinali uti in cute provocant; sed c. gr. R. Tartari emetici grana duo. Solve in aquae destillatae libra una. M. D. S. Capiat cochleatim spatio nychthemeri.

32) R. Pulveris cremoris tartari unciam unam. Nitri puri drachmam unam. Cinnabaris factitiae grana viginti quatuor. Misc. divide in partes aequales N°.

Sunt qui *elixirium acidum Halleri* hic commend³³⁾, a quo, vim acidorum mineralium in potatorum labefactatos ventriculos timentes, hucusque abstinuimus. Vires systematis nervosi collapsas non quidem *phosphoro* ³⁴⁾ et *cremato* ³⁵⁾, sed *vino* atque *remediis* sic dictis *nervinis* instaurare conamur. Inter haec praecipue laudem promeruerunt *valeriana*, *imperatoria* ^{*)}, *ammonia* ³⁶⁾, *aether* ³⁷⁾, *moschus* ³⁸⁾ et *camphora* ³⁹⁾. Profli-

gata

duodecim. D. S. Secunda vel tertia quaque hora pulverem capiat.

33) GORDEN, BACKHAUSEN etc.

34) Ac si aegri in delirio tremente necdum satis adusti essent, GORDEN adhuc usum phosphori proponit!

35) Cum successu tamen adhibitum fuit, in ebrioso utpote carceribus damnato, et ex potu unius aquae aegrotante (RUST's *Magazin* B. 21. Heft 2. p. 252).

*) SPITTA in HECKER's *Annalen der gesamt. Heilk.* 1830. März (Radix imperatoriae gegen delirium tremens).

36) Ammonium carbonicum VELSEN adhibuit (HOHN's *Archiv für med. Erfahrung* 1822. July, August. p. 54). et GIRARD (*Journ. de méd. Française et étrangère*. T. 73. 1820. Nov. p. 166. Cfr. *Revue médicale* 1823. p. 290. et FROBIEF *Notizen*, B. 20. No. 4. 1828. p. 56—59).

37) Sic in meis aegrotis nosocomii Vindobonensis praescripseram: R. Aquae menthae uncias sex. Aetheris vitriolici, spiritus cornu cervi ʒʒ drachmam unam. Laudani liquidi Sydenhami scrupulum unum. Misc. D. S. Omni hora uncia dimidia exhibeatur.

38) GRÖTZNER l. c. p. 546.

gata conditione corporis inflammatoria, vel gastrica, nihil certius nervorum turbas compescit vigiliasque profligat, *opio*, dumtaxat quoad absum ⁴⁰⁾ novum hic auxilium ⁴¹⁾. Conducit maxime in substantia additaque *radice ipecacuanhae* ⁴²⁾. Ne vero pharmacia abutamini! Quo primum enim indicationibus urgentibus satisfeceris;

tem-

39) Pro aegrotantibus, remedia calefacientia, ceterum indicata, respicientibus: R. Camphorae s. q. aceti subactae granum unum. Aquae fontis libram. Syrupi acetici unciam. M. Vel R. Camphorae mucilaginis gummi arabici subacti granum unum. Nitri drachmam unam. Aquae fontis libram. Syrupi Althaeae unciam. M.

40) Gloristur GORDEN (l. c. Kap. 6) se singulo aegrotato octo dierum spatio *tercenta opii grana* exhibuisse. Similia de aliis medicis petauristis enarrant ALBENS (in Praefat. ad opus SUTTONII) et FRORIER (Notizen aus dem Gebiete der Natur- und Heilk. B. 5. 1823. p. 137).

41) „Omnibus vero sic affectis somnus et difficilis et praecipue necessarius est, sub hoc enim plerique aenescunt“ (Celsus de med. lib. III. cap. 18. De tribus insaniae speciebus). — „Ubi vero nihil tuis medicamentis (venae sectiones, hirudines, fomenta frigida etc.) efficitur, ad *narcoticum* intrepide accedendum est“ (R. A. VOGLER praelect. ad cognosc. et curand. c. h. affect.).

42) R. Opii puri granum unum. Radicis Ipecacuanhae granum semis. Sacchari grana octo. M. fiat pulvis. Exhibeatur secunda quaque hora talis, donec vel somnus ingruat, vel meliorum augmentum ulteriorem opii usum impendant.

tempus quoque naturae ad reliquum opus absolvendum concedas. Phui perpetuis illis scribis formularum medicinalium. In genere delirium tremens, ut medicus haud tumultuarie incedat, utque omnia placide et quietissime fiant, exposcit. Quamobrem aegrotus quidem custodiendus est, ast, quousque licet, non coercendus⁴³⁾. Gubernari plerumque se sinit exhibitione pulveris foliorum nicotianae naribus attrahendi. Inprimis adstantium numerus et blateratus, lux nimia, mora in cubiculo picturis ornato, ejusque aestus, evitari debent. Quum ebriosus abstinentioniam a cibis diu sustinere nequeat, victus non esto nimis severus.

CAPUT XXV.

De paraphrosyne a venenis.

§. CII.

De argumento in genere.

1. Venena delirium excitantia, a *papavere* Quae venena.
somnifero, *hyoscyamo nigro*, *atropa belladonna*,
datura stramonio, *agarico muscario*, aliisque narcoticis largiuntur. De singulis in specie; additis ad calcem diagnosi, prognosi et therapia in genere.

2. Do-

43) HEROLD l. c. (ceterum regimini psychico plus quam par est tribuens).

Scriptores. 2. Doctrina de venenis narcoticis tradita est: a CAMERARIO ¹⁾, LINDENSTOLPIO ²⁾, SPIELMANNO ³⁾, KNOLLIO ⁴⁾, GMELINIO ⁵⁾, WILLMERO ⁶⁾, PÜHNIO ⁷⁾, WILKEO ⁸⁾, GARNIO ⁹⁾, LUTHERO ¹⁰⁾, ORFILAO ¹¹⁾ aliisque ¹²⁾.

§. CIII.

De argumento in specie.

Delirium
ab opio.

1. *Opii effectus deliri in populis, quos Muhamedis religio tenet, praecipue obvi sunt.* „Post captum

- 1) Memorabilia cent. III. 2) De venenis. Lips. 1739.
- 3) De vegetabilibus venenatis Alsat. Argent. 1766.
- 4) Diss. sistens plantas umbelliferas. Lips. 1771.
- 5) *Gesch. der Pflanzengifte.* Leipz. 1777. Nürnberg. 1803.
- 6) *On the poisonous vegetables.* Lond. 1780.
- 7) Diss. de venenis vegetabilibus generat. Erlang. 1784.
- 8) *Ueber die Giftpflanzen der Kräutergärten.* 1787.
- 9) *Beschreibung der häufigsten deutschen Pflanzengifte.* Wittenb. 1792.
- 10) De venen. vegetabil. in genere et in specie de plantis venenatis in territorio Erford. sponte crescentibus. Erford. 1792.
- 11) *Traité des poisons.* 3. édit. Paris 1826.
- 12) Ne dicam de meo opusculo: *Handb. d. Toxicologie.* 2. Aufl. Wien 1802. legantur FÄRGE *Anleitung zur Kenntniss d. schädli. u. gift. Pflanzen f. Stadt- u. Land-schulen.* Kopenh. 1796. *Giftpflanzenbuch.* Berlin 1801. *Des plantes vénéneus, et suspectes de la France.* L'an. VI. E. MONTMAYON *manuel médico-légal des poisons.* Paris 1824. GUÉRIN *nouvelle Toxicologie.* Paris 1826. J. A. BUCHNER *Toxicologie.* 2. Aufl. Nürnberg. 1826.

captum opium hi ipsi hilaritatis sensu afficiuntur gratissimo, ad omnia munia aptiores sese existimant, quidam inebriati in nugas et petulantiam erumpunt, imagines gratas varias observantes oculis mente conspiciunt, omnem mortis timorem deponunt, ferociore ad pugnas subeundas evadunt, nec minori impetu ad veneris castra sequenda impelluntur. Defervescit autem intra quatuor vel quinque horas haec virtus, citius serius pro copia ingesta, hancque excipit languor, morositas, fastidium omnium rerum, somnolentia, donec redeant ad pristinum delictum. Quod successu temporis res tantae necessitatis fit, ut opii defectus ipsam adeo mortem post se traxerit. Ex largiori tamen diuque continuato opii usu multa mala nascuntur, emaciatur corpus, vires conteruntur, taciturni, tristes, stupidi, somnolenti sedent, nec vix in publicum locum prodire audent, nisi viribus nova opii portione restauratis¹³⁾. Qui opii deliros effectus experiuntur, perceptionem æc si in aëre suspensi essent¹⁴⁾ et pupillam contractam¹⁵⁾ habent.

13) MURRAY apparat. medic. Vol. II. p. 233. Cfr. KARSTENI amoenitat. Fasc. 3. MADDEN travels in Turkey etc. P. E. BOTTA in FRONIER's Notizen aus dem Gebiete der Natur- und Heilk. B. 26. No. 11.

14) SAUVAGES l. c. p. 368.

15) JONES in Medical and physical Journal published by FOTHERGILL and WANT. 1815. Mai. CRAMPTON in Transact. of the association of Fellows and Licentiates of the King's and Queen's college of physicians in Ireland, Vol. 4.

habent. Apparet inde opium maxime nervos sensuum et facultatem attendendi perturbare, imaginationem extollere, memoriae vero saepe parcere. In *cadaveribus* nil nisi turgorem vasorum sanguiferorum cerebri, nonnunquam cum ecchymomatibus ventriculi et intestinorum invenimus.

D. a hyoscyam.

2. *Hyoscyamus niger*, stirps hominī jam solo halitu infensa¹⁶⁾, plerumque *rizosa deliria* et *furorem* cum risu sardonico, facie pallida, pervigilio, pulsu debilissimo, sudore frigido, lipothymiis, convulsionibus excitare solet, relicto sat constanter visu admodum debilitato¹⁷⁾. *Cadavera* vasa meningum tumida et ventriculū maculis nigris notatum exhibuerunt¹⁸⁾. Infortunia cum hyoscyamo praecipue contigisse sunt visa: in effodiendis *radicibus*¹⁹⁾, loco *radicum cichorei*²⁰⁾ *pastinacae*²¹⁾ comestis; vel dum *semina* consulto²²⁾, aut pro *anetho*²³⁾, aut ut medicamentum²⁴⁾, vel *folia* cum jusculis decocta²⁵⁾, assumpta fuere.

3. *Atro-*

16) GARDANE *Gazette de santé* 1773 et 74. p. 294.

17) REYSERUS in WEFFERI hist. cicut. aquat. p. 230.

18) BARRÈRE apud HALLER. V. MURRAY op. c. T. I. p. 448.

19) Eph. nat. cur. dec. III. ann. 8. obs. 66.

20) REYSERUS l. c. et GMELIN l. c. p. 232.

21) POTOVILLAT in *Philosoph. transact.* Vol. 40. p. 446.

BLOM in *vetensk. ac. Handl.* 1774. p. 52.

22) HALLER hist. stirp. Helvet. No. 580.

23) HELMONT ort. med. p. 306.

24) Ab emulsione seminum hyoscyami nigri, qua aliquando in phthisi pulmonali utor, delirium vidi.

3. *Atropa belladonna* delirio inebriationi si- D. ab
mili ²⁶⁾, in furorem desinenti, sopore terminato, ^{atropa.}
cum pupillis dilatatis, immobilibus, facie profun-
de rubra, siti, vomitu, stridore dentium, trismo
et convulsionibus, aliquando choream St. Viti
aemulantibus ²⁷⁾, ansam porrigit. Infortunia ple-
rumque cum *baccis* contingunt, utpote cerasis si-
milibus. Obveniunt mense Augusto, in montibus
nemorosis. In extinctis intestina inflata et in-
flammata, phlogosis mesenterii et hepatis ²⁸⁾, atque
erosiones ventriculi ²⁹⁾ detecta sunt.

4. *Datura stramonium* aliaeque species ³⁰⁾, D. a da-
tura.
praecipue illius *semina*, nunc primum soporem
et dein delirium ³¹⁾, nunc vice versa ³²⁾, gignunt.
Utroque in casu delirium istud ebrietati simile est,
ac demens millenis minime injucundis imaginibus
agitatur, itaque ridet, et saepe gestibus lascivis
veneris desiderium patefacit. Socias sunt facies
rubra,

25) MURRAY l. c. p. 447.

26) GIRAUDY *le délire causé par la belladonne, a-t-il un caractère, qui lui est propre?* Paris 1802. THOMASSEN A THUESSEN, diss. de *atropa belladonna*. Groening. 1803.

27) J. FRANK *Toxicologie*. §. CXI. not. 94. p. 196.

28) Commerce. Norimb. 1743. p. 61.

29) BOULDUK *histoire de l'académ. des sciences de Paris*. 1703. p. 56.

30) D. METEL, D. FERROX, D. TATULA.

31) SAUVAGES l. c. p. 365.

32) J. FRANK l. c. §. CXXIII. not. 104. p. 201.

rubra, stridor dentium, tremores et excretionum suppressio. Quatenus venenum, datura stramonium in usum deduci solet a latronibus, ut sub somno miseros spoliare possint³³⁾, a lenonibus³⁴⁾ et ganeonibus³⁵⁾, ut feminas castas ad venerem excitent, ab aliis demum, ut ulciscendi libidini satisfaciant³⁶⁾, cerevisiam inebriantem reddant³⁷⁾ etc. Et loco seminum *nigellae*³⁸⁾, aut per alium errorem³⁹⁾, semina et capsulae stramonii sumta fuere.

D. ab
agarico.

5. *Agaricus muscarius comesus* ita inebriat, „ut homo exhilaretur, exultet, cantet, vociferetur versiculos de rebus venereis, venatione, heroibus, effutiat, vaticinetur, augmentum virium valde insuetum sentiat, manus hostiles vel aliis vel sibi injiciat, tremore vel et convulsionibus tentetur. Furor post duodecim vel sedecim circiter horas defervescit, huncque excipit virium dejectio, vel jactura perfecta, tandem somnus, ex quo dum expergiscitur sensim absque alia mala sequela ad pristinam animi serenitatem redit“⁴⁰⁾.

6. Si-

33) SAUVAGES l. c. p. 365.

34) Ibid.

35) LINDESTOLPE l. c. p. 531.

36) LINDESTOLPE l. c. et KRAMER in COMM. NOR. B. 1733. p. 251.

37) GMELIN *Reise durch Russland*. 1. Th. p. 43. SPRAAT *hist. of R. soc.* p. 162.

38) BÜCHNER *misc. phys. math. med.* 1727. p. 122. HAL-
LER *hist. stirp. Helvet.* P. 1. p. 259.

39) SWAINE in *Ess. et obs. phys. et lit.* T. 2. p. 247.

40) MURRAY op. c. T. V.

6. Silentio praeterimus *alia narcotica* utpote D. ab aliis narcot.
 rarius delirium excitantia, nempe *aconitum napel-*
lum, jatropham manihot, taxum baccatam, strych-
nos nucem vomicam, ignatiam amaram etc.

7. Varia narcotica invicem conjungendo D. a composit. secretis.
compositiones aliquando emergunt, specimen mi-
 randi delirii excitantes, ideoque a SAUVAGESIO
magicum dicti ⁴¹⁾. Sic apud Indos frequens est
 usus *electuarii magici*, quod ipse KAEMPFER ⁴²⁾
 cum amicis accepit; hoc hausto omnes repleti sunt
 et perfusi incredibili gaudio, risu, cachinnis, am-
 plexibus solum explicando, nocte accedente equos
 conscendunt, et tunc sibi visi sunt cum Pegaso
 volatu per nubes ferri, iridibus circumdari; apud
 se perventi, lupino appetitu oblata voravere, po-
 stridie sanissimi mente et corpore fuere. Huc
 quoque medicamentum quoddam masticatorium
 spectat, in universa India usitatissimum, vulgo
Betel, quod praeter oris correctionem, cerebrum
 leviter inebriando spiritus demulcet et exhila-
 rat ⁴³⁾. Nec alienum erit hic de *delirio ex philtris*
 mentionem injicere, quae inter manus hominum
 hand expertorum, e. c. Tartarorum, Judaeorum
 nostrorum et vetularum, quandoque amoris loco,
 quem excitare debuissent, rationis usum perturbare
 feruntur. Legantur de hoc pro reliqua Europa jam
 obso-

41) l. c. p. 370. Cfr. HAUCHER diss. vegetabilia ma-
 gica. Witemb. 1700. Opp. T. I. p. 766.

42) Amoenitat. fasc. 3. p. 651. 43) SAUVAGES l. c. p. 371.

obsoleto argumento, RULAND ⁴⁴⁾, STALPARTUS VAN DER WIEL ⁴⁵⁾, BORELLUS ⁴⁶⁾, et RIEDLINUS ⁴⁷⁾, quorum testimonia collegerunt WOLFF ⁴⁸⁾ et ROESER ⁴⁹⁾.

§. CIV.

Diagnosis. Prognosis. Cura.

Diagnosis. 1. *Diagnosis* delirii a venenis saepe ardua est. Generatim ea potius ex rerum positionibus extrinsecis, ut anni tempora varia vegetabilia venenosa largientia, qualitates ciborum comestorum, remanentium etc., quam ex symptomatibus morbi deducitur. Inter haec tamen majoris ponderis, praeter morbi repentinum adventum, habentur, species ebrietatis, multiplex nervorum affectio, sensuum perturbatio et inprimis pupillae sive contractio sive dilatatio.

Prognosis. 2. Si aeger venenum deglutitum vomitu sive spontaneo sive artificiali rejiciat, antequam delirium in gravem soporem transeat, prognosis sat laeta.

Cura. 3. Quamobrem, nisi aeger sponte vomat, quo in casu emesis tantum ope aquae tepidae cum aceto

44) Cur. empir. p. 32.

45) Obs. med. rar. cent. post. part. prior. obs. 19.

46) Obs. med. physio. cent. I. obs. 65. p. 67.

47) Obs. med. 52. p. 111.

48) Diss. de philtis rite examinandis et dijudicandis. Witt. 1727.

49) Diss. de philtorum agendi modo et nox. Alt. 1701.

aceto et melle promovenda foret, sine temporis jectura nisi ad *antliam* sic dictam *stomachicam*, saltem ad *emeticum* confugiendum. *Sulphas Zinci* reliqua emetica virtute hic antecellit. Præterea, in recenti inprimis malo, congestionibus sanguinis et inflammationibus viscerum, maxime cerebri, ventriculi et intestinorum, *venae sectione*, inprimis e jugulari ¹⁾, occurrendum. Tutissime *hirudines* et *cucurbitulae scarificantes* adhibentur; non neglectis *pediluvii tepidis*, et *clysteribus* ex aqua et aceto. *Aceti* nempe usui interno, nisi ventriculus forte inflammatus sit, quammaxime insistendum est. Sunt qui *acidum sulphuricum dilutum* anteponant ²⁾. Sustinetur illius actio a *frigore* extus applicito, corpus scilicet aquâ frigida adspargendo, lavando ³⁾, capitique glaciem

1) „La saignée de la veine jugulaire doit être comptée parmi les moyens les plus propres à combattre les effets produits par le poison dont il s'agit (la morphine).“ ORFILA mém. sur la morphine in *Nouveau Journal de médec. chir. et pharmac.* 1818. Janvier. p. 13.

2) ORFILA l. c.

3) Nihil saepe novi dixit. WEDERKIND über den Nutzen des kalten Wassers bei Vergiftungen durch Mohnsaft. HUFELAND's Journ. der pr. Heilk. 1824. Febr. p. 84. Cfr. A. KENNEDY, S. WRAT, J. COPELAND, J. HAMMER SPRAQUE und E. JUKES, über die Fälle von Mohnsaft-Vergiftungen und das dagegen anzuwendende Verfahren. Ex *Edinburgh méd. surg. Journal* 1822. July. *London medical repository* 1822. July, Aug. et *London medical and physical journal* 1822.

glaciem aut nivem apponendo. Reliqua corporis superficies, praesertim extremitates inferiores, scopo sanguinem a capite revellendi irritari potest. *Sinapismos* hoc sub respectu maxime idoneos invenimus; alia proponunt alii⁴⁾. Praesente gastritide sive enteritide *remedia mucilaginosa*, et *lac*, acidorum loco porrigenda. Simul ad eliminationem veneni forte ad intestina perducti cogitari debet, cui scopo *serum lactis tamarindinatum* et *supertartras potassae* inserviunt. Periclitante jam jam vi vitali, ad methodum, adversus apoplexiam spasmodicam commendatam, et adversus asphyxias commendandam, confugiendum, et praecipue *ammoniac* et *cofeae* insistendum.

CAPUT XXVI.

D e m a n i i s.

§. CV.

Definitio. Literatura.

Definitio. 1. **M**orbos chronicos, in privatione usus rationis circa unum vel plura objecta consistentes, qui

Novembr. in GERSON Magaz. der ausländ. Literatur der gesamt. Heilk. B. 4. p. 541.

4) DESGRANGES in *Nouv. Annales de la société de méd. pratique de Montpellier* 1822. SUCHET in *FRORIEP's Notizen aus dem Gebiete der Heilk. B. 5. No. 14. p. 221.*

qui aegrotos officia in civitate obire prohibent eodemque a conversatione cum aliis excludunt, *manias* ¹⁾ nuncupamus.

2. HIPPOCRATES quamvis casus maniae magistraliter descripserat ²⁾, attamen hujus morbi doctrinam specialem silentio praeteriit. Fundarunt eam GALENUS ³⁾, ARETAeus ⁴⁾, CELSUS ⁵⁾, ALEXANDER TRALLIANUS ⁶⁾ et maxime CAELIUS AURELIANUS ⁷⁾. Secuti sunt Arabes ⁸⁾, instauratores medicinae ⁹⁾ et auctores dissertationum inauguralium

Literatur.
^{1a}.

1) Etymologia verbi *maniae* doctissime, in egregia Moxonii de mania et insania dissertat. Jen. 1603. edita, illustratur. Nonnulli maniae vocem a *Μῆνις*, *luna*, deducunt, alii a *Μανία*, quod rarum et laxum significat etc. Verum ipse CICERO (Tusc. quaest. lib. III) ignorantiam suam hoc sub respectu fateetur. GERM. *Wahnsinn*, *Narrheit*. GALL. *Folie*, *altération mentale*. ANGL. *Insanity*, *madness*. ITAL. *Pazzia*. POL. *Śzałeniśtwo*. ROSS. *Сумасшествіе*, *Сумасбродство*.

2) Epidem. lib. II. opp.

3) De melancholia L. de loc. affect. lib. III. c. 7.

4) Chronic. lib. I. c. 5. 6. 5) Lib. III. c. 18.

6) Lib. I. c. 22. 7) Morb. chronic. lib. I. c. 5. 6.

8) Canon. lib. III. fen. 1. tract. 4. c. 15.

9) VASQUEZ de melancholia etc. Hispal. 1583. MARCELLUS DONATUS hist. med. lib. II. c. 1. p. 106. BRIGHT *treatise on melancholia*. Lond. 1586. TRINOVELLI consil. I. No. 12. 13. III. 8. HEURNIUS de morbis qui singulis partibus corporis humani insidere consueverunt. Lugd. Bat. 1594. ERASTUS disp. et epist. medicin. Tigur. 1596. SOHNEN obs. lib. I. obs. 253. IV. obs. 240. FORESTUS obs. lib. X. MERCURIALIS com-

Frank Prax. II. I. 1.

C c c

ralium seculi XVI ac XVII¹⁰⁾. Substitit quidem maniac

sil. I. No. 25. 53. 86. III. 53. 122. V. 3. 49. FABR. HILDANUS cent. III. obs. 13. IV. obs. 8. 9. 21. HERC. SAXONIA tract. de melancholia. Venet. 1610. CARDANUS contrad. medic. lib. II. Tr. 2. No. 2. F. PLATER prax. lib. I. c. 1. de mentia imbecillitate. c. 2. de mentis consternatione. c. 3. de mentis alienatione. c. 4. de mentis defatigatione. CURTIUS MARINELLI de morbis nobiliores animi facultates obsidentibus. lib. III. Venet. 1615 (citatur in PAULI JOVIS Episc. Nucern. de humano victu, epistola ad Felicem Trophinum, antistitem Theatinum. Novocom. 1808. p. 61). AN HEER observ. No. 27. BURTON *the anatomy of melancholy*. Oxford 1624. PONCE DE ST. CRUCE dignotio et cura affect. melancholicorum. Madrid 1624. DE LA MESNADERIE *traité de la melancholie. La Fleche* 1635. ZACUTUS LUSITANUS med. pr. histor. lib. I. No. 30. Prax. hist. T. II. lib. I. c. 8. BARTHOLINUS hist. anatom. cent. I. No. 79. 85. II. 69. III. 18. 30 epist. I. p. 207. De morbis biblicis. p. 62. RIVERIUS cent. III. obs. 13. IV. obs. 8. 9. 21. WEPFER obs. p. 324. 332. BELLINI de morbis capitis. p. 501. 514. SYDENHAM de mania communi. Miscell. acad. nat. cur. dec. II. a. 10. 1691. append. p. 190. RIEDLINGUS lin. med. 1695. p. 66. a. 1696. p. 406.

10) MASMACH diss. de melancholia. Lips. 1583. EPISCH diss. de melancholia. Viteb. 1585. BORNEMANN diss. de melancholia. Basil. 1594. PARCOVIUS (LIDDEL?) diss. de melancholia. Helms. 1596. ZEIBIUS diss. de melancholia. Basil. 1600. VARUS diss. de melancholis. Jen. 1606. Ejus. Diss. de mania et desipientia. ibid. 1606. OLTHERMANN diss. de melancholia. Rost. 1607. STORFID diss. de melancholia. Helms. 1607. LUCH-

maniae doctrina seculo XVIII ineunte¹¹⁾, ast tem-

· C c c 2

pus

TENIUS diss. de melancholia primaria. Helmst. 1608.
 WOLFF diss. de melancholia. Helmst. 1614. HORSTIUS
 diss. de melancholia in genere. Giess. 1616. Diss. de
 mania 1677. BRENDZL diss. de melancholia. Viteb.
 1618. WESTENBERG diss. de melancholia. Basil. 1618.
 SCHOENLIN diss. de melancholia. Aug. Vindel. 1620.
 SENNARTUS diss. de mania. Viteb. 1620. HOANI-
 OCAUS diss. de melancholiae natura, differentiis et cu-
 ratione. Giess. 1625. WEISIUS diss. de melancholia.
 Viteb. 1629. ZÄIDLER diss. de mania. Lips. 1630.
 ROTPINK diss. de mania. Jen. 1630. Ejusd. Diss. de
 melancholia et mania. ibid. 1635. Ejusd. Diss. ordo
 et method. cognosc. et curandi maniam. ibid. 1666.
 HARINO microcosmus melancholicus. Brem. 1638.
 TAPPIUS diss. de mania. Helmst. 1644. Ejusd. diss.
 de melancholia et desipientia. ibid. 1652. BAUTEL
 diss. de insania. Jen. 1648. MORBIUS diss. de mania
 seu insania. Jen. 1648. FARUS (OTHEFARUS?) diss. de
 melancholia. Lugd. Bat. 1653. MUELLER diss. de ma-
 nia seu insania. Argent. 1654. VOLLHARDT diss. de
 melancholia. Argent. 1654. CONRINO diss. de melan-
 cholia. Helmst. 1659. BURCHHARD diss. de melancho-
 lia. Basil. 1660. HOENROECK diss. de melancholia.
 Lugd. Bat. 1660. SCHENK diss. de melancholiae dia-
 gnosi. Jen. 1662. SCHNEIDER diss. de melancholia.
 Viteb. 1666. Ejusd. diss. de melancholia seu delirio
 tristi. ibid. 1680. FRIDERICI diss. de melancholia. Jen.
 1671. MELIUS diss. de maniae theoria et praxi. Giess.
 1672. STAYKE diss. de dementia et melancholia. Fr.
 ad Viadr. 1672. WEDER diss. de mania. Jen. 1673.
 1693. Ejusd. diss. juvenis melancholia laborans. Jen.
 1675. Ejusd. diss. de melancholia. Jen. 1685. Ejusd.

pus amissum lucrata est, circa illius medietatem et finem maxime autem quo vivimus aevo, operâ inprimis SWIETEN ¹²), LORRY ¹³), DUFOUR ¹⁴),
An-

diss. de mania ex epitome praxeos clinic. Jen. 1708. in exercitist. med. philos. dec. I. De Saulo emergumeno. LANNON diss. de mania. Lugd. Bat. 1674. CRAAMER diss. de melancholia. Lugd. Bat. 1676. OWMANN diss. de melancholia. Lugd. Bat. 1677. BEX diss. de melancholia. Ultraj. 1680. FRANCK DE FRANCHENAU diss. demens idea, seu mania. Heidelb. 1680. BERGER diss. de mania. Viteb. 1685. COFFUYT diss. de melancholia. Lugd. Bat. 1685. CAMERARIUS diss. de aegritudine animi. Tub. 1688. ALBINUS diss. de mania. Fr. ad Viadr. 1692. Diss. de melancholia. ibid. 1692. NOTTELMANN diss. de mania. Traj. ad Rhen. 1693. EYSELIIUS aeger affectu maniaco laborans. Erford. 1695.

- 11) Totam literaturam maniae illius temporis ad sequentia opuscula circumscriptam invenio: SIMAPIUS diss. de mania. Harderov. 1701. VERN diss. de mania. Francf. ad Viadr. 1701. VATER diss. de melancholia. Viteb. 1702. HOFFMANN diss. explicatio affectus animi levioris. Hal. 1734. БОЖИНСКИЙ diss. de melancholia. Erf. 1748. Et: Bigae casuum medicorum ἀπὸ τῆς μανίας νοσηματώδους observationum. Acta acad. nat. cur. Vol. 8. append. p. 1. SCHULZE et BRUNKE casus aliquot mente alienatorum et perversorum. Hal. 1737.
- 12) Commentaria in Herm. Boerhaave aphoriam. T. III. §. 1089 — 1127.
- 13) De melancholia et morbis melancholicis. Lips. 1765. Versio Germanica suctore CH. A. WICHMANN cum praefatione KRAUSE. Francf. 1769. T. 2.
- 14) Versuch über die Verrichtungen und Krankheiten des

ARNOLD¹⁵⁾, PERFECT¹⁶⁾, GREDING¹⁷⁾, PH. PINEL¹⁸⁾, CHIARUGI¹⁹⁾, HASLAM²⁰⁾, CRICHTON²¹⁾,

MASON

menschlichen Verstandes. A. d. Franz. (1769): nebst Betrachtungen über die Hypochondrie. Leipz. 1786.

15) *Observations on the nature, kinds, causes and prevention of insanity, lunacy, or madness. Leycestr. 1782. Versio Germanica auctore ACKERMANN. Leipz. 1784—88. T. 2.*

16) *Select cases in the different species of insanity, lunacy or madness. Lond. 1787. Vers. Germ. cum notis auctore MICHAELIS. Leipz. 1789. A remarkable case of madness, with the diet and medicines used in the cure. Lond. 1791. Versio Germanica ab eodem, ibid. 1794. Annals of insanity. Vers. Germanica 3. editionis auctore HEINECKE. Hannov. 1804.*

17) *Sämmtliche medicinische Schriften. Graiz 1790.*

18) *Traité médico-philosophique sur l'aliénation mentale. Paris 1791. 1801. 1809. Vers. German. cum notis auctore WAGNER. Wien 1801. Untersuchungen über die moralische Behandlung der Wahnsinnigen. Ex Memoires de la soc. méd. d'émulation. Ann. 8. Paris 1799. p. 215—255. in Sammlung auserl. Abhandlungen für pr. Aerzte. B. 19. p. 412.*

19) *Della pazzia in genere, ed in ispecie, trattato medico-analitico con una centuria d'osservazioni. Firenze 1794. Torino 1808. Vers. Germanica libera cum notis. Leipz. 1795.*

20) *Observations on insanity, with particular remarks on that disease. Lond. 1798. Versio Germanica. Stendal 1800. Observations on madness and melancholy. Lond. 1809. Inquiry into the causes producing the extraordinary addition to the number of insane. Lond. 1810. Illustration of madness. Lond. 1811. Obser-*

MASON COX ²²⁾, ESQUIROL ²³⁾, J. G. WINDBÜCHLER ^{*)}, A. HALIDAY ^{**)} et J. CONOLLY ^{***)}. Quo-
rum

vations on insanity with practical remarks on the disease and an account of the morbid appearances on dissections. Lond. 1811. Considerations on the moral management of insane persons. Lond. 1817.

21) *Inquiry into the nature and origin of mental derangement, comprehending a concise system of physiology and pathology of the human mind and a history of the passions and their effects. Lond. 1798 et 1799. Versio German. Lips. 1798. et editio secunda cum notis HOFFBAUERI. ibid. 1810.*

22) *Practical observations of insanity and suggestions towards a mode of treating disease of the mind. Lond. 1804. 1808. 1818. Versio Gallica auctore ODIER, Genève 1806. Versio Germanica. Halle 1811.*

23) *Des passions considérées comme cause, symptômes et moyens curatifs de la manie. Paris 1803. 1805. Observations sur l'application du traitement moral à la manie. SEDILLOT rec. périod. de la soc. de médéc. de Paris. T. 17. p. 281. Observations pour servir à l'histoire du traitement moral de la manie. Ibid. T. 19. p. 129. Dictionnaire des sciences médicales. T. 161. p. 151—240. art. manie. ESQUIROL's allgemeine und specielle Pathologie und Therapie der Seelenstörungen. Frei bearbeitet von Dr. HILLE, nebst einem Anhang kritischer und erläuternder Zusätze von HEIMMOTH. Leipz. 1827. ESQUIROL della alienazione mentale o della pazzia in genere e in specie. Versione di L. CALVETTI. Milano T. 1. 1827. T. 2. 1829.*

*) *Versuch einer Diagnose und Aetiologie der psych. Krankheiten. Wien 1829.*

**) *A letter to Lord Rob. Seymour, with a report of*

rum libris integra coronam facit ejusdem argumenti bibliotheca ²⁴).

the number of lunatics and idiots in England and Wales. Lond. 1829.

***) *An inquiry concern, the indicat. of insanity, with suggest for the better protect. and cure of the insanas. Lond. 1830.*

24) GOERNER diss. de insaniam. Erford. 1753. ENGELMANN diss. de melancholia. Argent. 1754. JUNKER diss. de chronico delirio rite curando, Hal. 1754. DE MARQ diss. de melancholia. Lugd. Bat. 1754. ARRICONI della mania, della frenesia, e della rabbia, Verona 1758. CORNACCHINI dissertazione della pazzia. Sten. 1758. MÜLLER diss. de dieta et curatione imbecillium. Magdeb. 1758. E. A. NICOLAI Gedanken von der Verwirrung des Verstandes, dem Rasen und Fantasiren. Kopenh. 1758. HARTMANN Bericht von verschiedenen Wahnsinnigen und Versuchen ihnen zu helfen. Schwedische akad. Abhandl. 1762. p. 275. LOCHNER observationes practicae circa luem venereum, epilepsiam et maniam. Viennae 1762. VOGEL diss. de insaniam longa. Goett. 1763. CAMUS la médecine de l'esprit. Paris 1769. BEAUSOBRE réflexions sur la nature et la cause de la folie. Paris 1770. et Mém. de l'acad. des sciences de Berlin T. 15. 16. HEIDSK Abhandlungen von den Ursachen der jetziger Zeit so oft entstehenden Verrückungen, und wie dieselben zu beurtheilen (Mindensch. Anzeig. 1773). Versuch einer Theorie der Verrückung (Lippisch. Intelligenzblatt 1774). Von dem rechtmässigen Verhalten gegen Verrückte (Mind. Anzeig. 1775). FAWCATT observations on the nature, causes and cure of the melancholy. Shrewsbury 1780. ANDRY recherches sur la mélancholie. Paris 1782. SEGAUD rapport des mémoires envoyés

au

an concours du prix, proposé par la soc. de méd. de Marseille en 1783. sur les aliénations mentales. In *Annales de la soc. de méd. prat. de Montpellier*. T. 33. p. 390. VAN ROMUM diss. de melancholia. Lovan. T. 1785. TRUCKENMÜLLER diss. historia affectus melanchol. Erlang. 1786. DUCAN tentam. med. de insensia. Edinb. 1787. LANDIS diss. de melancholia ex mente. Goett. 1788. FAULKNER *observations on the general and improper treatment of insanity*. Lond. 1789. HANPER *treatise of the real cause and cure of insanity*. Lond. 1789. Vers. Germanica, Marburg 1798. FORESTIER diss. de melancholia. Francf. ad Viadr. 1790. ROWLEY *truth vindicated, or the specific differences of mental diseases ascertained*. Lond. 1790. *A treatise on madness and suicide*. Lond. 1804. MOURRE *observations sur les insensés*. Toulon 1791. DACQUIN *la philosophie de la folie; ou essai philosophique des personnes attaquées de la folie*. Paris 1792. FERRAR *medic. histor. and reflect*. Vol. 2. 1792 No. 2. LIND diss. de melancholia. Lngd. Bat. 1792. PARCETER *observations on maniac disorders* 1792. Versio Germanica. Lips. 1793. MASSIUS comment. de vesaniis in genere et præsertim de insania universalis. Goett. 1796. COLLADON diss. de mania et melancholia. Goett. 1797. LANGERMANN diss. de methodo cognoscendi curandique animi morbos stabilienda. Jen. 1797. J. JO. SCHMIDT'S *Versuch über die psycholog. Behandlungsart der Krankheiten des Organs der Seele*. Hamb. 1797. EJSND. *Blicke in das Gebiet der Heilkunde überhaupt, und der Seelenheilk. insbesond.* Altenb. 1799—1800. THOMANN comment. de mania et amentia. Würceb. 1798. BOISRAÇON diss. de melancholia. Edinb. 1799. WEICKARD *philosophische Arzneykunst, oder von den Gebrechen der Sensationen, des Verstandes und des Willens*. Frankf. 1799. TH. A. RULAND *med. physiol.*
Bisob-

Beobacht. über die Begriffe von Gemüths-Krankheiten und die Einflüsse des Gemüths auf den menschlichen Körper. Würzb. 1801. J. SIMS pathological remarks upon various kinds of alienation of mind, Mem. of the medical soc. of London Vol. 5. p. 372. Et Samml. anierl. Abhandl. für pr. Aerzte B. 19. p. 586. CAMPDEK dias, de intellectus facultate, conditione, in mente alienationis diversis generibus, Edinb. 1802. J. C. HOFFBAUER Untersuchungen über die Krankheiten der Seele. Hannov. 1802—3. B. 2. Psychologische Untersuchungen über den Wahnsinn und die übrigen Arten der Verrückung und ihre Behandlung. Halle 1807. RIENSCHNEIDER diss. de mania, praecipue de ejus causis. Goett. 1802. MEYLER diss. de melancholia, Edinb. 1803. REIL Fieberlehre B. 4. Rhapsodien über die Anwendung der psychischen Cur- Methode auf Geistes- Zerrüttung. Halle 1803 (2. Edit. 1818). Ejusd. et KAISLER's Magazin für die psychische Heilkunde. Berl. 1805. Ejusd. et HOFFBAUER Beyträge zur Beförderung einer Cur- Methode auf psych. Wege. Halle 1808—1810. GR. SCHMIDT einige Worte über den Seelenreiz und eine neue Behandlungsart des Wahnsinns. Berl. 1803. CHEMNITZ diss. ad theoriæ alienatæ mentis symbola, Kilon. 1804. G. GIRI storia ragionata d'una magia. V. opuscoli della soc. medico-chirurgica di Bologna. Vol. 3. fasc. 6. A. WINKELMANN Archiv für Gemüths- und Nervenkrankheiten. Berl. 1806. AMARD traité analytique de la folie et des moyens de la guérir. Lyon 1807. PROUST trois coups d'oeil physiologiques sur la folie. Paris 1807. BLACK a dissertation on insanity illustrated with tables and extracted from between two and three thousand cases in Bedlam. 1810. SAUNDERS HALLAM an inquiry into the causes producing the extraord. addition to the number of insane, together with extended observa-

observations on the cure of insanity. Cork 1810. BRYAN CROWTHER *practical remarks on insanity, to which is added a commentary on the dissertation of the brains of maniacs.* Lond. 1811. ALEX. HAINDORF *Versuch einer Pathologie und Therapie der Geistes- und Gemüthskrankheiten.* Heidelberg 1811. J. CH. RASMANN *diss. de mentis aegritudinibus rite distinguendis et nominandis.* Hall. 1811. JACQUELIN-DUBUISSON *dissertation sur la manie.* Paris 1812. *Des Vésanies ou maladies mentales.* Paris 1816. LINGUITI *ricerche sopra le alienazioni della mente umana.* Napoli 1812. WAHLSTADT *diss. de causis morborum mentalium a medicis observatis et memoratis.* Rostoch. 1812. CROU *essai sur la susceptibilité nerveuse et les affections mélancoliques.* Paris 1814. HILL *essai on the prevention and cure of insanity.* Lond. 1814. B. RUSH *medical inquiries and observations upon the diseases of the mind.* Vers. Germanica juxta secundam editionem auctore KÖNIG, Leipz. 1825. A. MATTHEY *nouvelles recherches sur les maladies de l'esprit précédées de considérations sur les difficultés de les guérir.* Paris 1816. MAYO *remarks on insanity.* Lond. 1817. G. PARRMAN *management of lunatics, with illustrations of insanity.* Boston 1817. *Ex London medical and physical journal* No. 234. HUFELAND'S *Journ. der pr. Heilk.* 1820. Mai. p. 98. RUEAUD-LUCE *recherches médico-philosophiques sur la mélancolie.* Paris 1817. J. G. SPURZHEIM *observations on the deranged manifestations of the mind, or the insanity.* Lond. 1817. Versio libera Germanica cum notis auctore EMDEN. Hamb. 1818. Versio Italica: auctore C. PORTA. Roma 1819. A. M. VERING *psychische Heilkunde* B. 1. 1817. B. 2. 1821. ANCEAUMES *de la mélancolie.* Paris 1818. CAILLAU *réflexions sur les vésanies et sur quelques auteurs, qui ont traité des affections mentales.*

mentales. Bordeaux 1818. J. CH. A. HEINROTH *Lehrbuch der Störungen des Seelenlebens, oder die Seelenstörungen und ihre Behandlung vom rationellen Standpunkte*. Leipz. 1818. B. 3. Ejusd. *Anweisung für angehende Irrenärzte zur richtigen Behandlung ihrer Kranken. Als Anhang zu seinem Lehrbuche über Seelenstörung*. Leipz. 1825. F. NASSE *Zeitschrift für psychische Aerzte*. Leipz. 1818 sq. Ejusd. *Jahrbücher für Anthropologie und zur Pathologie und Therapie des Irrethums*. Leipz. 1830. SAUNDERS HALLARAN *practical observations on the causes and cure of insanity*. Lond. 1818. DANNE *de l'homme considéré dans l'état d'aliénation mentale, ouvrage divisé en trois livres*. Paris et Bruxelles 1819. G. M. BURROWS *an inquiry into certain errors relative to insanity, and their consequences, physical, moral, civil*. Lond. 1820. Ejusd. *commentaries on the causes, forms, symptoms and treatment moral and medical of insanity*. Lond. 1828. (Hujus operis exemplare epitome continetur in GESSON und JULIUS *Magazin der ausländ. Literatur der gesammten Heilk.* 1828. Nov, Decembr. p. 357—418). M. GEORGET *de la folie. Considérations sur cette maladie, son siège et ses symptômes*. Paris 1820. Versio Germanica cum additam. auctore HEINROTH. Leipz. 1821. SCIPION PINEL *thèse sur l'aliénation mentale*. Paris 1820. FRANZ WILLIS *über Geisteszerrüttung*. A. d. E. von AMELUNG. Darmst. 1823. C. G. NEUMANN *die Krankheiten des Vorstellungsvermögens systematisch bearbeitet*. Leipz. 1822. L. DUXORINI *Untersuchungen über die körperlichen Bedingungen der verschiedenen Formen von Geisteskrankheiten*. Ulm 1824. E. MARTINI *de la folie, considérée dans sa source, ses formes et ses développemens*. Paris 1824. A. MÜLLER *die Irrenanstalt in dem k. Julius-Hospital zu Würzburg und die sechs und zwanzigjährige*
Dienst-

Dienstverrichtung an demselben. Mit einem Anhang von Krankheitsgeschichten u. Sectionsberichten. W'arzö.
 1824. BAYLE *nouvelle doctrine des maladies mentales.* Paris 1825. M. JACOBI *Sammlungen für die Heil-
 künde von Gemüthskrankheiten.* Elberfeld 1825. A. MORISON *outlines of lectures on mental diseases.* Edinb.
 1825. J. FRIEDLÄNDER *Versuch über die innern Sinne und ihre Anomalien, Starrsicht, Entzückung, Schlaf-
 sucht und Intelligenzerrüttung.* Leipz. 1826. J. GUIZ-
 LAIN *traité sur l'aliénation mentale et sur les hospices des aliénés.* Amsterd. 1826. FR. GROSS *Untersuchungen über die moralischen und organischen Bedingungen des Irrenseyns und der Lasterhaftigkeit.* Heidelberg 1826. Ejusd. *Psychiatrische Fragmente.* Ibid. 1828. LICHTENSTÄDT *über den Begriff, die Benennung und die Beurtheilung der Geisteskrankheiten.* HUFELAND's Journ. der pr. Heilk. 1826. Supplementheft. p. 3. W. KRAMER *kritische Untersuchungen über HEIMROTH's System psychischer Krankheiten.* HORN's Archiv für med. Erfahrung. 1826. Septembr. p. 190. FR. AMELUNG *allgemeine Vorschriften zur Behandlung der Irren und zur Verhütung der Geisteserrüttung überhaupt.* Frankf. a. M. 1827. A. TH. BRÜCK *Beiträge zur Kenntniss und Heilung der Lebensstörungen mit vorherrschend psychischen Krankheitserscheinungen.* Hamb. 1827. GUARIN DE MAMERS *de l'aliénation mentale et de ses accidens, sous le rapport de l'étiologie et de la thérapeutique.* Journ. complémentaire du dictionnaire des sciences médicales, Cahier 109. p. 3. Cah. 112. p. 289. Cah. 114. p. 97. PAUL SLADE KNIGHT *observations on derangement of the mind.* Lond. 1827. Versio Germanica, cum praefat. NASSE. Köln 1829. BROUSSAIS *de l'irritation et de la folie.* Paris 1828. J. H. FEUERSTEIN *die sensitiven Krankheiten, oder die Krankheiten der Nerven u. d. Geistes.* Leipz. 1828.

§. CVI.

§. CVI.

Symptomata.

1. Maniarum multiplicia symptomata ut *Genera-*
 quodam ordine exponi possint, *varias* hujus morbi *tim.*
species statuere juvabit 1). Quarum specierum
 descri-

G. LOSTRATTO *sopra le malattie mentali. Osservazioni raccolte a Aversa, Esculapio Vol. 1. fasc. 3. p. 129. fasc. 4. p. 193. fasc. 5. p. 257.* Vid. *Bulletin des sciences médicales.* 1828. No. 8. p. 332. G. SEKULITZ *diss. de mania.* Budae 1828. J. L. ZACCARELLI *sull' educazione de' pazzi.* OMODAI *annali universali di medicina.* 1828. *Magglo.* C. A. DIAZ *diss. de ment. alienat. sede et causa proxima.* Friburg. 1828. J. B. FRIEDREICH *Skizze einer allgemeinen Diagnostik der psychischen Krankheiten.* W'ürzb. 1829. H. NASSE *comment. de insania secundum libros Hippocratis.* Lips. 1830. G. B. FANTONETTI *della pazzia saggio teoretico-pratico.* Milano 1830.

- 1) Tentamina manias classificandi hucusque frustra fuere (TANDLER *diss. de melancholia ejusque speciebus.* Vitemb. 1644. SALTSMANN *diss. de mania ejusque speciebus;* SAUVAGES *nosolog. method. morb. classis octava;* SIMS l. c.; J. B. FRÖHLICH *über Begriff und Eintheilung der psychischen Krankheitszustände.* HENKE *Zeitschrift für die Staatsarzneih. Zehntes Ergänzungsheft* p. 120. v. REIL *Fieberlehre* l. c.), nec aliter expectari potest, quum natura angustos systematum cancellos respuit. Quoniam autem ordo in rebus tradendis requiritur, quivis talem sibi eligit, qualem naturae proximiorum et instructioni tyronum magis accommodatum existimat; quo ultimo praesertim sub respectu ordinem a me receptum primum locum tenere arbitror.

descriptioni enumerationem signorum, quae in genere *dispositionem* ad manias indicare solent, praemitemus. Signa ista a *symptomatibus prodromis*, utpote quae morbi quasi initium sistunt, distinguenda sunt.

Signa dispositiva.
indicantia.

2. *Dispositionem ad manias* indicant: cranii et physiognomiae ²⁾ peculiaris conditio, attentionis volubilitas et difficilis stabilitas, inclinationes extraordinariae, sympathiae et antipathiae frequentes, fiducia et suspicio nullo fundamento instructae, transitus rapidus a moerore ad gaudium, a gaudio ad moerorem, inertia, laboribus supervacaneis saepeque noctu susceptis illico succedens, modus incedendi aut sedendi nimiam timiditatem vel audaciam designans, gestus abnormes ³⁾, soliloquia crebra, inclinatio ad res mirabiles, molimina mercatoria falsa et in genere neglectus rerum praesentium certarum pro futuris incertis ⁴⁾.

Prodromata.

3. *Symptomata maniarum prodroma* pro varia, quae a morbo assumenda erit, forma differunt. Generatim, praeterque signorum allatorum augmentum, observatur: horror lucis, antipathia adversus determinatos colores, spectra visum, praesertim ante cubitum molestantia, aurium susurrus, sibilus, bombus, perceptio sonorum vocumque

2) LAVATER *essai sur la physiognomie*. 4. Part. 1. *Fragm. chap. 1*. ESQUIROL l. c. in *Dict. des scienc. méd.*

3) M. B. VALENTINI admirandi maniacorum gestus. *Miscell. acad. nat. cur. dec. II. a. 5. 1686. p. 190.*

4) GERM. *Projekte machen*. GALL, *Faire des projets*.

que non existentium, desiderium pulverem tabaci continuo naribus attrahendi, voracitas, anorexia, pica, liquorum fermentatorum aut aquae effrena cupiditas, libido et pollutiones nocturnae, sensus caloris universalis, impulsus ad corpus denudandum, fenestras et januas, quacunque tempestate, aperiendas, fuga culcitrarum, deambulationes nocturnae, vigiliae contumaces, somnus levis et brevis, somnia terrifica, cum protractis et vagis cogitationibus diurnis cohaerentia, meditationes, quibus aegri praesertim solitarii immorantur, terrores ex levi causa, praecepta et frequens iracundia ex minima vel nulla occasione, tentamina aliquid furtive auferendi⁵⁾, cachinnationes absque ulla ratione in conventibus sacris et publicis, expensae redditibus nullo pacto convenientes, vexatio innocentium⁶⁾, facies rubra, dolor capitis assiduus, vertigo, cruciatus lumborum, angor, palpitatio

5) ESQUIROL *Dkt.* l. c. p. 159.

6) Quare THOMASIVS (diss. de praesumptione furoris et dementiae. Hal. 1719): „Experientia testatur, quod avari, dum sunt divites et potentes, saepe soleant maxima cum jactantia admixtis multis palpabilibus mendaciis, laudes suas decantare et gloriam capere; adversarios item suos etsi alias probos et innocentes crudeliter prosequi, aut certe inimicitiam dissimulantes, sub praetextu, quod mere passive se gerant, per insidias et literas occulte iis nocere. Tales autem affectus ex classe stultitiae moralis, saepe sunt praeludia furoris et morbi cerebri.“

pitatio cordis, arteriarum in flexuris cubiti pulsatio ⁷⁾, in feminis sanguinis e mammis compressis fluor ⁸⁾, evacuationes solitae cruentae suppressae, alvus tarda, cutis sicca, crines oleosi ⁹⁾ et morbo jam jam magis evoluto, specificus transpirationis odor ¹⁰⁾.

Variae
formae.

4. Formae, sub quibus maniae omnibus numeris absolutae, nunc *continuo* nunc *periodice*, prorumpere et decurrere solent, ad *decem* reduci possunt *species*.

M. hypochon-
driaca.

5. *Mania hypochondriaca* ¹¹⁾. Forma ista perceptionibus erroneis gravibus relate ad statum proprii corporis insiguitur; putant nempe aegri: se habere

7) HIPPOCRATES epid. lib. V.

8) HIPPOCRATES l. c. HARDOUIN diss. Ergo ex sanguine in mammis collecta mania. Paris. 1615. Cfr. MORBIS citat. dissertat. §. 36. SCHENK obs. lib. IV. obs. 239. SANTACRUZ l. c. p. 32. Nonnisi bis in puerperis vidi.

9) DÜRR in HUFELAND's Journ. der pr. Heilk. 25. B. 2. St. p. 43.

10) SIMES (v. Samml. auserl. Abh. f. pr. Aerzte. 19. B. p. 600). ERHARD (v. WAGNER's Beytr. z. philos. Anthropologie. 1. Th. p. 111). Res nulli dubio subjicitur, et odorem, de quo agitur, apud purissimos licet maniacos pluries percepi.

11) Syn. Melancholia hypochondriaca. J. SCHMIDT de falsa imaginatione melancholicæ. Miscell. acad. nat. cur. dec. I. a. 9 et 10. 1678 et 1679. p. 112. KNER diss. de connub. inter melanchol. et mal. hypochondriac. Erf. 1797.

habere corpus ex butyro ¹²), vel luto ¹³) compactum, duplicatum ¹⁴), caput amputatum ¹⁵), per dimidium amissum ¹⁶), bibliis repletum ¹⁷), nasum ulnae magnitudinis ¹⁸), cornua super frontem ¹⁹), arboris ramum scapulis annexum ²⁰), nates

12) SCHRÖTTER diss. de melancholia hypochondriaca Wittenb. 1645 (Aeger ignem et fornacem ob timorem liquefactionis fugiebat).

13) ARETAEUS scribit, quod quidam non bibebat, existimans se esse *latum*, pertimescens igitur, ne humore dissolveretur.

14) MAUCHART (*allgem. Repertor. f. d. empir. Psychologie*. 2. B. p. 121) de convalescente ex febre narrat, cui videbatur unum suum individuum in lecto jacere, aliud in cubiculo deambulare. Quamvis appetitu destitutus, cum vi comodebat, asserens, se duo nutrienda habere individua. Cfr. REIL's *Fieberlehre* l. c. p. 562, et HERZ in MORITZ *Magaz. zur Erfahrungs- Seelenkunde. Berl.* 1783. 1. B. 2. St. p. 70.

15) SCHRÖTTER l. c. aph. 4.

16) MURATORI *della forza della fantasia umana. Venez.* 1745. Parma 1770. T. 2.

17) FORESTUS l. c. obs. 13. Indesinenter haec verba belgico idiomate protulit: „biblia sunt in capite, caput est in bibliis!“

18) QUERCETANUS diet. et polyhistor. p. 225. BARTHOLINUS recenset de viro plebejo, qui nasum sibi in eam magnitudinem excrevisse imaginabatur, ut publico abstineret, ne nasus a transcurrentibus conculcaretur (FUCHS disp. de melancholia. Jen. 1671).

19) SENNEAT lib. I. c. 7.

20) ARNOLD l. c. T. I. p. 129—140.

FRANK PRAX. II. l. 1.

D d d

tes ex vitro conflatas²¹⁾ pedesque ex cera²²⁾, serpentem in ventriculo²³⁾, ranam in ventre²⁴⁾ etc. quod laborent mollitie ossium²⁵⁾, coecitate²⁶⁾, reliquiis veneni²⁷⁾, periculo lapsus ventriculi in scrotum²⁸⁾, congelatione²⁹⁾, luce nimia³⁰⁾, urina adeo copiosa, ut emissa diluvium minaretur³¹⁾, quod sint morti proximi³²⁾, aut jam mortui³³⁾,
vel

21) LEMNIUS lib. II. de complex. c. 6 (Aeger omnia sua negotia stando perficiebat, metuens ne, si in sedile se inclinaret, nates confringeret). Cfr. PERFECT l. c. obs. 53.

22) J. C. GRIMM Act. nat. chr. Vol. I. p. 61.

23) SCHENK lib. I. obs. 253.

24) FEL. PLATER lib. obs. GATINARIA lib. de cognitione et curat. notatum.

25) TULPIUS obs. lib. I. c. 18.

26) TULPIUS lib. IV. c. 53.

27) PINEL *traité* cit. Versione German. p. 168. SAUVAGES l. c. Plurimos aegros curavi, qui singula, quae patiebantur, mala a veneno quondam accepto derivabant, quin tamen vel suspicio hujus causae adfuerit.

28) HENR. AB HEER l. c.

29) Ex ZACUT. LUSITAN. SAUVAGES l. c. p. 291.

30) Vid. infra §. CXL No. 2.

31) MARC. DONAT. l. c. SENNERT. inst. med. l. c. p. 3.

32) Haec maniae hypochondriacae species *Necrophobia* (*crainte de mort*) audit. Illam pulcherrime Delplé descripsit (*Dictionnaire des sciences médicales* T. 35. p. 337—345). Bina quoque stupenda ejus exempla mihi obvenerunt, alterum Vindobonae in judaico, mense Septembri 1819; alterum Mediolani in uxore commissarii commectus, hieme 1828—1829. Vir ille 28 annos natus, an-

vel in animalia (quorum mores imitari solent) transfigurati, e. c. in gallinas ³⁴), canes ³⁵), felles ³⁶), equos ³⁷), boves ³⁸) et lupos. Hoc ultimo

D d d 2 in

tes sanissimus et lepidus, mortis timore dumtaxat a decem diebus post vehementem iram excruciaci incoepit. Femina 23 annorum, post rixas domesticas, melancholica evasit. Mortem sute portas esse continuo asserbat. Argumentis quidem adversus talem timorem allatis, attentas praebebat aurea, atque inde persuasa videbatur; ast mox iterum exclamabat: „itaque proxime sum moritura!“ Passim nisus accedebant, adstutes (nec dilecta aliâ sorore excepta) acriter impugnandi.

33) HOLLER. de morb. inter. lib. I. c. 17. BRUCKMANN in HORN's *Archiv für med. Erfahrung* 1812.

34) SCHREFFER diss. de melancholia desipient. Helmst. 1642 (Aeger, ut galli alarum ante cantum, sic ille brachiorum plausu latera quatiens, animantium sonum imitatus est).

35) Sic DUCLOS (*mém. secr. sur le règne de Louis XIV*) de filio magni Condé narrat.

36) Referente RAULIN (de vaporibus mulierum) domi cujusdam religiosae omnes puellae singulari laborabant melancholiâ, qua percitae quavis die determinata hora se feles esse putabant et folium vocem imitando concentum efformabant..

37) Hippanthropia. Vide *Annalen für die gesammte Heilk. unter der Redaction der Mitglied. der Grossh. Badischen Sanitäts-Commission* 3. Jahrg. 1. Heft. p. 51 — 60.

38) HENR. PETRAEUS lib. I. diss. Harmonion. 3. ubi refert, decoctum quoddam helleboratum, a *Melampo* Regis Argivorum Procti filiabus, quae se boves esse

in casu maniae nomen *Lycanthropiae* ³⁹⁾ tribuitur ⁴⁰⁾. Aegri hoc in morbo facie pallida, oculis concavis, corpore squalido, subnigro, latrant, per deserta, sylvas ⁴¹⁾ et montes ⁴²⁾, praesertim noctu divagantur, alios insiliunt ⁴³⁾, sepulcra violant ⁴⁴⁾,

credebant, porrectum, conduxisse, medicinam illam dein Melampodium dictam fuisse.

39) A Gr. λύκος, lupus, et ἄνθρωπος, homo. *Synon. Cynanthropia.*

40) De quo memorabili affectu, nobis nunquam viso, scripsere: MARCELLUS, EUDOUA apud VILLOISON anecd. graec. p. 299. PLINIUS nat. histor. p. 364. PAULUS AEGINETA lib. III, c. 16. AVICENNA lib. III. Tract. 4. c. 16. MAJOLUS T. II. colloq. 3. FINCELIIUS mirac. lib. II. AURELIUS PERUSINUS ad ann. 790 (De Rege Poloniae *Boleslao* refert, qui ob Episcopum Cracoviensem *Stanislaum* in altari trucidatum, a *Gregorio* Papa excommunicatus, emotâ statim mente, hominum consortium exhorruit, et ad bestias se contulit). WIERUS de praestigiis daemonum. lib. IV. c. 23. MERCURIALIS lib. I. c. 12. MASSARIA lib. I. c. 13. RONDELETUS lib. I. c. 43. HERCULES SAXONIA lib. I. c. 17. FORESTUS l. c. obs. 25. 26. SCHENK obs. med. lib. I. obs. 260, et PINEL op. c. p. 114. in nota.

41) RONDELET l. c.

42) Sic SCHENK de nobili Hispano, se in ursum conversum existimante, refert l. c.

43) Aeger FINCELII (l. c.), agricola, ann. 1544. Lycanthropicus, multos in agris insiliit, trucidavitque. Tandem non sine multa difficultate captus, confidenter asseveraverat, se verum esse lupum, discrimen solum existere in pelle cum pilis inversis.

lant⁴⁴⁾, cadavera erodunt⁴⁵⁾, crura, vel propter morsus canum vel alios casus perpetuis ulceribus referta habent⁴⁶⁾. Ad maniam hypochondriacam tandem pertinet morbus antiquissimus quo vigente *mares sese in feminas commutatos existimant* *).

6. Ma-

44) SCHENK (l. c.) de lycanthropico dicit: „ille cum prius me novisset, quadam die, cum detentus hoc malo esset, obviam mihi factus, ipse vero timens recessit: at ille modicum me adspiciens, abiit. Erat autem cum eo multitudo quaedam hominum, ipse quidem ferebat humeris crus integrum ac tibiam defuncti cujusdam. Hic demum curatus liber evasit. Qui cum iterum mihi occurreret, num quid timuissem, interrogavit, cum in tali loco, dum insanus erat, eum offendissem? Ex quibus constat, memoriam in eo non fuisse oblaesam.“

45) MERCURIALIS l. c.

46) „Rusticus quidam, FORESTUS (l. c.) narrat, subinde verno tempore Alemariae visus est, adpectu torvo ac insanus, et circa coemeterium haerere, mox et ecclesiam intrare, qui et super scamna furore percitus saltabat, modo ascendendo, modo descendendo et nunquam in eodem loco quietus. Baculum vero oblongum manu tenebat, neminem percutiebat, sed canes eo a se depellebat, nam ex canum morsu crura nigra et ulcerata cum crustis nigris habebat.“

*) *Θήλεια νόσος* HERODOTI (lib. I. cap. 105. lib. IV. cap. 67). Cfr. SPÄHNEL *Apologie des Hippocrates* 2. St. p. 609. MERCURIALIS var. lect. lib. III. c. 7. BOUHIER *diss. sur l'histoire d'Hérodote*, c. 20. GUKLIN *Reise durch Sibirien*. Gött. 1751. Th. 1. p. 320. WITTWER *Archiv f. d. Geschichte der Arzneyk*. B. 1. St. 1. p. 217. NEBEL *de morbis veterum obscuris*.

M. chi-
maera.

6. *Mania chimæra*. Aegri nimirum chimærâ, plerumque existentiam propriam respiciente, pascuntur. Credit nempe ille, se esse creatorem mundi ⁴⁷⁾, hic se esse Christum ⁴⁸⁾, alter spiritum sanctum, monarcham orbis terrarum ⁴⁹⁾, Imperatorem ⁵⁰⁾,

GISS. 1784. sect. 1. GRAAF morbus feminens Scytharum, Wurecb. HAYNE de maribus inter Scythas morbo effeminatis (Comment. societ. Goett. 1778. Class. philolog. T. I. p. 28). STARK de νόσῳ θυλάτῃ apud Herodotum prolusio. Jen. 1827. J. B. FRIEDRICH Θήλου Νόσος. in *Magazin für die philosophische und gerichtliche Seelenk. Heft 1. IV'rtzb. 1829.*

47) Qui se Jovem existimarent, inventi sunt, ut *Salmonus*, curru supra pontem aeneum agitato, tonitrua imitans. VIRGIL. *Aeneid.* lib. VI.

48) PINEL op. c. p. 164.

49) HUANTUS (Scrutini sui ingenior. c. 7) juvenem recenset, qui in eo tantum deliravit, imaginando se esse totius mundi monarcham; quæ ratione autem reipublica posset administrari, summa eum prudentia disserebat. WIERUS (l. c.) de aegroto narrat, qui titulum ferebat sequentem: *Rex regum, Dominus Dominantium, Monarchus mundi*. In nosocomio Londinensi, *Bedlam*, a. 1803. aegrum vidi sese Archi-Imperistorem (*Archy-Emperor*) existimentem. Imperatores et Reges ut *Proconsules* suos agnoscebat. In chartis geographiæis ubique delineandis continuo occupatus erat. Notum quoque est, *Alexandrum* adulatorum encomiis delusum, se *Deum* putavisse; verum accepto vulnere ex cruoris effusione suum errorem agnovit, quippe Deos non eruorem, sed alterum liquidum habere, pronuntiarent HOMERUS.

torem ⁵⁰⁾, Regem ⁵¹⁾, Cardinalem ⁵²⁾, Principem ⁵³⁾, constitutionem republicanam ⁵⁴⁾, ditissimum ⁵⁵⁾, pauperrimum ⁵⁶⁾, miraculorum auctorem ⁵⁷⁾ etc. Alii demum chimaeram prosequuntur ⁵⁸⁾

50) WAGNER's *Beyträge* 1. B. p. 114.

51) PINEL l. c. p. 116, aliique multi.

52) MURATORI l. c.

53) HEDRICH *Untersuchungen und ärztliches Gutachten über den Gemüthszustand des F. G. K.* In HENKE *Zeitschrift f. d. Staatsarzneyk.* 8. Jahrg. 1828. 1. Vierteljahrheft, No. 5.

54) FRORIEP *Notizen aus dem Gebiete der Natur- und Heilk.* No. 200. März 1825.

55) Aeger, de quo supra locutus sum (cap. V. §. XXIX. No. 1 (4)) quique propria bona chartis ludendo amiserat, Iro pauperior, se omnium divitiarum possessorem aestimavit. Mibi dicebat: „elige e stabulo meo equum anglicanum pro usu tuo, timeo enim, quod otium, in quo vivunt, istis bestiis noceat.“ Spectat huc et *Thrasylaus Axonensis*, qui, auctore HENACLIDE PONTICO apud ATHENARUM, naves omnes in Piraeum appellentes suas esse certo certius sibi persuaserat.

56) *Athymia pleonsetica*, s. *avara* SWEDIAURI. FORESTUS l. c. obs. 15. SAUVAGES (l. c.) de parcho narrat, qui divitiis affluens se paupertate pressum existimabat. Lecto affixus, ut vestibus parceret, omnia sua munia intermittebat, de cetero recte ratiocinans. Similem segrum vidi, qui uxori suae omnia furto auferebat.

57) ALEX. TRALLIANUS (l. c. c. 17) de muliere refert, quae imaginabatur, se totum terrarum orbem super digitum gestare, simulque plorans verebatur, ne, quando digitum inflecteret, totus orbis corrueret.

tur ⁵⁸⁾ ac studiis et operibus inauibus insudant ⁵⁹⁾, aliique opinionem sanæ rationi oppositam defendunt ⁶⁰⁾. Quibus singulis in casibus aegroti ita a chimæra sua gubernantur, ut omnes actiones ad nutum illius perficiant ⁶¹⁾. Sanitatis ceterum vix sequitur detrimentum. Quia immo citra res ad ideam fixam spectantes cunctæ sæpe animi facultates illacæ sunt ⁶²⁾, et quandoque partim excellent ⁶³⁾.

7. Ma-

58) Sic quadraturæ circuli inveniendæ diu nocturne operam dabat juvenis in nosocomio Viennensi, omnibus irascens, qui enim tam gravi in opere perturbabant.

59) E. c. ut vidi, in thesauris effodiendis.

60) MONTANUS (consil. 23) de aegro mentionem injicit credente, totam mundi superficiem esse ex subtilissimo vitro, et subtus esse serpentes, sese in lecto tanquam in insula detineri, unde si egrederetur, metuendum, ne frangeret vitrum et incideret in serpentes, ideoque noluisse ex lecto egredi. PINEL (l. c. p. 477) de femina testatur, quæ persuasa erat, se ope fluidi electrici ab aliis, maxima quamvis in distantia, dominari.

61) Sæpe miratus sum maniacos, partes Regum agentes in minimis licet rebus, non errasse. Sic feminam in gyrgascho Vindobonensi sæpius vidi, quæ putans se esse *Mariam Theresiam*, scrutis corpus suum ita exornare intellexerat, ut revera imaginibus depictis illius Reginae similis evaserit.

62) PAULUS ZACCHIAS (quæst. med. leg. lib. II. T. I. p. 3) de aegro quodam loquitur, qui intrantibus in gyrgaschum de omnium aegrotantium conditione rite et in ordine exponebat, nec ullum læsse mentis indicium ostendebat, donec ad aliquem eorum perventum

7. *Mania moria* ⁶³). Gaudent aegri ea de- M. moria.
tenti perpetua hilaritate animi, vacant turbulento
animi motu, vacant terrore mortis, vacant consci-
entiae stimulis, non expavescent mala futura, non
anguntur bonorum cupidine; unde continuo fer-
me rident, ludunt, cantillant, tanquam omnium
mortalium felicissimi. Plurimi non solum ipsi sa-
gaciter satis loquuntur, sed et errores ratiocinii
ab aliis commissos corrigunt. Vestiendi ratio, ut-
plurimum peculiaris et elegans, cum animi tenore
cohaeret.

8. *Mania melancholica* ⁶⁴). Superiori toto M. me-
coelo lancho-
lica.

esset, de quo dicebat: hic falso imaginatur se spiri-
tum esse sanctum, cum tamen ego vere sim spiritus
sanctus. Tales maniaci multis in nosocomiis mihi
obvenerunt.

63) Initio revolutionis Gallicae plebejus in gyrgatho Vin-
dobonensi aderat, qui imaginabatur se esse infelicem
Ludovicum XVI. Cum vero illi, omnium ignaro,
objiceretur, Reges ad minimum legere et scribere, se
tales quidem artes haud possidere consensit, ast illico
iis se totum dedit, ac en, tribus vix elapsis hebdo-
madibus sat bene legebat et scribebat. Socius aeger
illi erat magister.

64) Chaeraphrosyne SWEDIAUR. a χαλῶ, laetor, et
ἄγροσύνη, insania. Stultitia hilaris, laetitia aut hila-
ritas simla auctorum. V. ENHARD in WAGNERS *Be-
träge zur philos. Anthropol.* No. 4.

65) In sacris paginis לֵב רָע. malum cordis dicitur,
NEH. 2. V. 2. GRAEC. *Mélasra* χολή, atra bilis. LAT.
Melancholia, sollicitudo, aegritudo animi. GERM.
Tiefsinnigkeit, Schwermuth (Judaei Lithuani appel-

coelo opposita est. Apparent nempe aegri tristes, morosi, meditabundi, mente circa unum potissimum objectum versante. Observantur alii ita silentiosi et defixi, ut, quaestionibus ⁶⁶⁾, citius ex pumice aquam, quam ex iis verbum extorqueas ⁶⁷⁾; — alii adeo immobiles et stativi, ut

non

lant böse Gedanken). GALL. *Melaneolis*. ANGL. *Melancholy*, gloomy madness, sadness of the mind. ITAL. *Malinconia*, *maninconia*. HISP. *Melancolia*, *zangarriana*. POL. *Melancholia*. ROSA. МЕЛАНХОЛІА ИЛИ ЗАДУМЧИВОСТЬ. DAN. *Tungsindighed*, *Tungmodighed*, *Sorgmodighed*, *Sindsyge*. SUEC. *Swärmodighet*, *Hjertänglan*. ISLAND. *Gedveiki*. VIEUSSESA *sur le délire mélancolique. Mémoires de Paris* a. 1709. hist. p. 11. ANDRY *recherches sur la mélancolie. Hist. et mén. de la soc. R. de médecine.* a. 1782 et 1783. mém. p. 89. CHA. HELWICH de notatia in viro quodam melancholico. Act. acad. nat. curios. Vol. II. p. 143.

66) HERZ (*Versuch über den Schwindel*. p. 141) de melancholica quaestionibus mutà refert, quae vero, si illi literae aut liber exhiberetur, illico alta voce legebat.

67) *Melancholia attonita quoad sensum*. Sic laborabat femina in nosocomio Vindobonensi, quam per sex menses quotidie visitavi, quin unquam sive blanditiis, sive donis, sive minis, sive castigatione vel vocis sonum elicere potuerim. Cfr. G. T. DÜNA de melancholia cum taciturnitate ultra medium annum. Miscell. acad. nat. cur. dec. III. a. 1. 1694. p. 279. S. REISER de muto hora quavis prima meridiana loquente. Ibid. dec. I. a. 9 et 10. 1678 et 1679. p. 425. M. B. VALENTINI de muto quavis hora prima meridiana loquente. Ibid. dec. II. a. 3. 1684. p. 114.

non nisi adhibita vi e loco moveri aut ad actionem quandam adigi possint ⁶⁸); — alii loquaces, garruli, et poëtae ⁶⁹), quin tamen facile ab uno ad aliud objectum divagentur ac electam jam idearum catenationem derelinquant; — alii errabundi, quasi anima criminis conscia angeretur, nec per horulae momentum quiescentes ⁷⁰); — alii unum idem-

que

P. ROMMEL de aphonia. Ibid. dec. II. a. 1. 1682. p. 222. ROSSI *melancholia complicata con asfonia, curata col canterio attuale. Repertor. med. chir. farmac. di Torino. 1827. Gennajo p. 6.*

68) *Melancholia attonita quoad motum. Athymia attonita* SWED. TEICHMEYER diss. de melancholia attonita raro literatorum affectu. Jen. 1741.

69) PERFECT l. c. No. 13 (nisi lateat, ut suspicor, error in diagnosi).

70) *Melancholia errabunda.* CH. F. PAULINI *Antubeith* seu melancholia errabunda. Miscell. acad. nat. cur. dec. II. a. 5. 1686. append. p. 52. Feminam juvenem formosam ad talem melancholiam proclivem curavi. Respuebat hominum consortium, et timebat solitudinem. Angebatur domi, exibat, et, foras adhuc pejus se habens desperabunda redibat. Labores feminei tedium afferebant. Prehensus liber mox rejiciebatur, asserendo, nil inde concipi posse. De propria salute sciscitata aegra, in fletum prorumpere et aufugere solebat. Maxime a timore futurae maniae, qua mater periit, angebatur. Cunctae corporis functiones rite perficiebantur. Praeter dispositionem haereditariam nulla detegi potuerat causa. Iter et balnea maris tantum profligarunt morbum spatio quinque mensium, omnibus pharmacis rebellem. Utinam radicitus!

que verbum continuo repetentes ⁷¹⁾, aut uno tantum delectati gestu ⁷²⁾, interdum proprio corpori infenso ⁷³⁾. Fere omnes solitudinem quaerunt, ac ad suspiciones proni sunt. Nonnulli mortem, licet optatam, formidant ⁷⁴⁾, ac aliis potius vim clandestine inferunt ⁷⁵⁾. Sunt, qui se delirare non ignorent ⁷⁶⁾, quique de variis rebus recte iudicant ⁷⁷⁾, memoria gaudeant et futura praesagire satagant ⁷⁸⁾, risuque involuntario tententur ⁷⁹⁾.

Vigi-

71) RAIL *Rhapsod.* p. 127.

72) TULPIUS *observ. med. lib. I. c. 16 et 17.* HASLAM *op. c. vers. germ. Stend. 1800. edit. p. 17.*

73) Propriam manum depascebat aeger THOMII (*Erfahr. u. Bemerk. aus d. Arzney-, Wundarzney- und Entbindungskunst.* p. 78). Ann. 1815. Judaeco doctissimo melancholico adstiti, qui nil aliud peragebat, quam ut sibi pilos e barba unum post alium evelleret.

74) S. SCHULTZ de melancholico mortem metuente, cum *observ. R. LENTILII Miscell. acad. nat. cur. dec. I. n. 3. 1672. p. 270. dec. III. a. 5 et 6. 1697 et 1698. append. p. 121.*

75) Sic medicus nosocomii fratrum misericordiae quod Viennae est, anno, ni fallor, 1797, trucidatus fuit. Aeger adpectu insons ac diu jam reclusus erat, cum illi inopinate cultrum abdomini infligeret.

76) BLEIGNY *zodiac. med. gall. ann. 4. mens. Mart. obs. I. L. KLOSE Beyträge zur Klinik und Staatsarzneywiss. Leipz. 1823.*

77) Teste ARISTOTELE (lib. XXX. probl. 1) melancholici ingeniosi et sapientes declarantur; quod quidem potius de moerentibus, citra maniae confinia, valere videtur.

78) Item ARISTOTELIS (l. c.) addit, melancholicos ha-

Vigiliae saepe, et saepius somnia terribilia; quae quandoque ipsum delirium formaliter exprimunt, obvenire solent. Facies utplurimum lurida, aspectus torvus, caput demissum, haud raro pyalismus⁸⁰⁾, cutis sicca, pulsus lentus, alvus tarda, vestiendi ratio neglecta, ciborum desiderium paucum, imprimis si alimenta obtrudantur et aeger coram aliis comedere cogatur. Vidimus qui, non sine periculo vitae, potum⁸¹⁾ et cibum sumere recusabant⁸²⁾.

9. *Ma-*

bere aliquid *praestigiis* atque *divinum*. Cfr. CICERO de divin. c. 87. Tali opinioni innititur verisimiliter mos a melancholicis numeros pro sortitione schedularum lucrum (aut damnum) afferentium (*Lotterie*) expetendi, ex quo melancholici gyrgathi Viennensis sibi fontem lucri excogitarunt. Legi quoque meretur casus melancholiae, somniationis fere characteres exhibentis, apud GMELIN (*Material. f. d. Anthropologie*. 1. B. p. 3) et REIL (*Rhapsod.* p. 74).

79) G. DETMANNING ephem. acad. nat. cur. cent. 9 et 10. p. 189.

80) G. CH. MATERNUS DE CILIANO de salivatione chronica spontanea, sub melaucholia et mensium suppressione pertinaciter continuante. Act. acad. nat. cur. Vol. 10. p. 98.

81) G. A. MERCKLIN de hydrophobico affectu sine morso canis rabidi. Miscell. acad. nat. cur. dec. II. a. 6. 1687. p. 455.

82) Binis in feminis absolutum jejanium ad novem nycthemera protractum vidi, quarum una morti proxima inde erat. J. L. BUXTORF inedia decem dierum in melancholico. Acta Helvetica. Vol. VI. p. 230. RUST

M. phan-
tastica.

9. *Mania phantastica*⁸³⁾ delirio ad objecta religiosa versante insignitur. Diversae illius extant varietates. Nunc enim aegri diu noctuque indesinenter preces fundunt, hymnos cantant⁸⁴⁾, negotia mundana, quin immo res ad vitam necessarias negligunt, ceterum humiles optimam prae se ferunt indolem⁸⁵⁾, nunc impie plane se gerunt, impre-

Magaz. der gesamt. Heilk. B. 19. Heft 2. p. 301. Annal. für die gesammte Heilk. unter der Redaction der Grossh. Badisch. Sanitäts-Commission. 3. Jahrg. 2. Heft. Karlsruhe 1828.

83) *Mania*, indecenter dicta, *religiosa*, *Athymia religiosa* SWEDIAUR. *Melancholia superstitiosa*. GERH. SCHWÄRMERY. FAWCETT *üb. d. Melancholia*, vorzügl. *religiöse Manie*. A. d. E. (1780). Leipz. 1785. *Beobachtungen u. Erfahrungen üb. d. melancholische, besond. aber religiöse Manie. V. einem Prediger, Leipz. 1799.* J. K. METZGER *eine Vorlesung über religiöse Schwärmery. Aarau 1819.*

84) FORRESTUS (l. c. obs. 19) de rustica narrat, quae paroxysmi maniaci tempore, hymnos latinos cecinerat, quos nunquam didicit, nisi forte saepius eos in templo audiverit. Cfr. ROCHLITZ in *D. musikal. Zeitung. No. 39—40. VI. Jahrg.*

85) Puella plebeja quatuordecim annorum, constitutionis scrophulosae, cum vere ann. 1815 (quo tempore Vilmæ in ecclesia St. Casimiri missiones celebrantur) crebro exercitiis et praecipue precibus sacris interfuerit, integros dies orare, noctu surgere et genibus flexis, quamcunque imaginem sacram obsecrare incoepit. Moerebat interea et hominum fugiebat consortium. In clinicum suscepta, ex aegra gracili cum extremita-

imprecationes evomunt et Deo maledicunt ⁸⁶⁾, nunc idolum aliquod colunt ⁸⁷⁾, nunc de futura beatitudine propria desperant, ac se in aeternum damnatos credunt ⁸⁸⁾, nunc cum angelis, daemonibus ⁸⁹⁾,

tibus frigidis et lividis pulsanque debili, vix verbum obtinere possumus, nisi cum de sacris quaestio institueretur, tunc enim puellulae vultus ex tristi fiebat serenus, oculi prius languidi scintillabant, ac physiognomia quid coelestis induebat. Nec astis! De rebus aëris ita disquirebat, ut eam theologiae operam dedisse credidisses. Concionatoris instar de Deo, de officiis christianis, sermocinabatur, ac objectiones experiundi gratia factas, indignato vultu, sagaciter diluebat. Blanditiis demissa respondere erat solita. In genere data ecclesiam adeundi venia, omnia ab ea obtinere licebat. Eo ipso tempore alium aegrum, ex nobili stirpe natum, socio *D. Liboschitz* visitavi, qui sat similem rem aetatem exhibebat. Adeo erat humilis, ut, dum illi nicotiana exhiberetur, vel rogarctur, ut sederet, constanter respondebat — „non sum dignus.“ —

86) MORBIUS ex FRANC. HILDEBRANDI privileg. 2. p. 186.

87) PINEL p. 118. v. infra.

88) Vir quadragenarius nosocomio Viennensi traditus se auum esse peccatorem affirmabat, unde ut poenae merita infernorum citius quam fieri posset, subijceretur, Deum diu nocturne rogabat. Vix custos vespertinis horis momentulo sberat, ecce seger januam cubientli, clave intus locatâ, clausit, ac candelam ardentem lecto suo admovebat, mox undique a flammis circumdatus, ejulabat, o me felicem! nunc debitum ob tot crimina a me peracta tributum solvo! Cum janua illa admodum crassa, et fenestrae clathratae fuissent, illico succurrere non licuit. Jam incendium do-

nibus⁸⁹⁾, sagis, spectris, sibi commercium esse existimant⁹⁰⁾, nunc quidquid in alienis regionibus contingit, videre credunt⁹¹⁾, nunc proprium corpus cruciant⁹²⁾.

10. *Ma-*

mui imminebat, jamque foetor aegrum comburi testabatur, cum Centurio quidam ob vulnus brachii dextri in eodem nosocomio degens, advenit, ac hercules prorsus virtute, manu tantum laeva revulsit claustra. Prosiliit ex cubiculo furiosus semique tostus aeger, veluti furia liberatorem aggrediendo. Verum iste eadem manu eademque mirabili vi aegrum humi stravit, et dein adstantes facile eum cohibuerunt. Ad ossa usque combustus, praevio sopore, post dimidium horae periit.

89) Pictor SPINELLO se a diabolo circumdari credebatur, ad opprobrium, quod nimis atro illum depinxisset, colore (ARNOLD l. c.). Vide quoque J. G. HOFER de melancholico desperato *αλτρονία* affectante et pactum cum cacodaemone se fecisse asseverante. Acta acad. nat. cur. dec. I. a. 6 et 7. 1675 et 1676. p. 87. J. WEISMANN melancholia satanica a concubitu diabolico. Ephem. acad. nat. cur. cent. 3 et 4. p. 294. BERTHOLLET *démonomane, observé à Sessa, dans le royaume de Naples dans les premiers jours de Février 1812*. SEDILLOT *recueil périod. de la soc. de méd. de Paris* T. 53. p. 110.

90) *Daemonomania, incantatio, fascinatio, obsessio diabolica, morbi magici*, de quibus nunquam in posterum quaestio amplius non fiet!

91) Apud CAMERARIUM exemplum Hispani alicujus refertur, qui in Europa, quae in Africa gerebantur, videre credebatur. Similia apud GASSENDI in vita Tychonis Braheii lib. VI. leguntur.

10. *Mania erotica* ⁹¹⁾ cogitationibus amatoriiis M. eroti-
ca.
aut

92) Aeger in nosocomio sororum misericordiae Vilnae jacebat, qui, ut se a tentationibus venereis illicitis liberaret, testiculos rudissima manu sibi evulsit. Similem casum ZETTERMANN observavit (*Ärs - Berättelser om Svenska Läkare - Sällskapets arbeten* 1815), alteriusve meminit BUISSON (*observation d'une castration volontaire et d'une amputation totale de la verge faites dans deux accès de folie, et de leur guérison par le bain froid. Annuaire de la société de médec. du département de l'Eure. a. 1810. p. 136*). Quid quod in Russia hominum secta invenitur, qui ex causis religionis et politicis partes genitales viriles sibi rescindunt. Incomparabilis autem est historia viri, qui semetipsum cruci suffixit (*Hist. du crucifiement exécuté sur sa propre personne par M. LOVAT, communiqué au public par C. RUGGIERI. Venise 1807. et REIL et HOFFBAUER's Beyträge. 2. Th. p. 157*). Vir, de quo agitur, suor, die 19. Julii 1805. Venetiis ad fenestram tertiae contignationis cruci appensus, capite ad Christi imaginem, corona spinosa circumdato, dextro latere vulnerato, manu sinistrâ et pedibus, clavorum ope ad crucem jam firmatis, manu dextrâ solum clavo perforatâ, vulnere hypochondrio sinistro iussito etc, ceterum corpore funibus et rete firmato, inventus est. Enodatus et de causa tam singularis actionis interrogatus respondebat: hominum superbiam castigari et ad crucem terminari debere. Idem anno 1802. sibi jam partes genitales clam resciderat, et sine chirurgicis auxiliis sanatus erat. Cfr. SPAZIER's *Entmannung o. Religionsschwärmerey. Berl. 1796.* et KOPF *Jahrbuch der Staatsarzneyk. 3. Jahrg. 1810. p. 249.*

93) RICHTER Progr. de mania erotica. Goett. 1741.

Frank Prax. II. I. 1.

Ecc

aut gestibus libidinosus insignitur. *Duplicem* hinc ea agnoscit *varietatem*. Enim vero aegrotus nunc amore pro individuo aliquo flagrat sive imaginario, sive a se tantum viso, et a quo saepe mutuam benevolentiam nec expectare licet, sive revera sibi quondam vinculis amoris connexo, verum absente, demortuo, infido — nunc autem ferino solum veneris desiderio ardet, per coitum quodammodo explendo. Ibi aegrotus diu noctuque de objecto amato vel cogitat, vel loquitur, vel scribit. Si quis accedat, illud num brevi adventurum sit interrogat, ac talem adventum expectans, horae momenta numerat. Quandoque alterius sexus objectum quodvis pro eo, quod amore prosequitur miser habet ⁹⁴). Sunt revera, qui se cum eo conversari, aut illius potestati se subjectos esse, credant ⁹⁵). Quarum erronearum idearum sub curriculo aegrotus pro re nata, hilaris, moestus, morosus est. In altera erotomaniae varietate, fusius alibi describenda ⁹⁶), aegroti, lasciviam oculorum huc illud volutantium exhibentes, manibus genitalia saepe fricant, quorum tactu insigniter delectantur; nil aliud imaginantur aut loquuntur, quam

94) PINELIS aeger, omnem feminam, quae illi obviam veniebat, nomine amasiae quondam suae, *Marie Adelaide*, salutabat (l. c. p. 167).

95) PINEL l. c. p. 482.

96) Part. IV. Vol. II. sect. I. cap. de priapismo s. satyriasi. Ibid. sect. II. De furore uterino s. nymphomania.

quam de alterius sexus consortio, de coitu, de rebus lascivis et inhonestis. Sunt immo, qui onaniae, zotomiae, sodomiae et tribadum flagitiis indulgeant. In genere nil boni malive agnoscunt; in libidine explenda omnia ponunt et vident. Quodlibet occurrens, etsi deforme objectum, mox cupidinem excitat, illud ad veneris opus sollicitant, cunctantem urgent et compellunt et si pertinacius reluctetur, pugnis et unguibus impetunt. Praesto sunt cetera maniarum generalia quaedam symptomata, ut agrypnia, famis sitisque defectus, fervor totius corporis, frigoris tolerantia, alvi pigrities, urinarum paucitas, macies tandem etc.

11. *Mania saeviens* ⁹⁷⁾ furore, audacia et *M. saevi-*
 nisu sibi aliisque vim inferendi stipatur. Morbi *viens.*
 istius, paroxysmi ^{98a)}, saepe periodici, plerumque a sensu constrictionis ad epigastrium, ardore intestinorum, voracitate, aut ciborum fastidio, loquacitate, et rubore oculorum adnuntiatur. Accedunt inquietudo, agitatio, terror panicus, insomnia idearumque perturbatio. Ferinam tunc vivendi rationem et mores tyrannicos aegri induunt, horrenda loquuntur, vociferant, exclamant, ejulant, in jurgia, increpationes, maledi-

E e e 2 ctiones

97) *Mania furibunda auct. LATIN.* Furor, insania. A. Lux diss. de mania furibunda. Berol. 1827.

98a) BOHMIVUS diss. exhibens statum furiosorum in paroxysmo constitutorum. Marb. 1740. BENEDICK diss. de mania et statu maniacorum sub paroxysmo. Ultraj. 1762.

ctiones prorumpunt, vestes, vincula dilacerant, fenestras infringunt, obvios, horrendo intuitu, truculenter, cum acerba rixa et feroci impetu invadunt, eosque manibus, unguibus morsibusque, quasi carnem humanam appetentes ^{98 b)} misere excipiunt, proprium caput parietibus illidunt, vulnera sibi infligunt, aut alio corpus exedunt modo ⁹⁹).

Pluri-

98 b) SAUVAGES I. c. REIL *Rhapsod.* p. 394.

99) ANT. BENVIGNI (lib. de abditis morbor. et sanitat. causis c. 99) de puella maniaca refert, quae, quidquid obvium habuit, dentibus arripuit, fregit, laniavit, et cum aliis objectis destitueretur, tandem suas manus, brachia, capillos apprehendit. Maniaci habetur exemplum, qui ferrum, quinque pollices longum deglutitum, per anum reddidit (*Medical and chirurg. observat. as an appendix to a former publicat. by Gooch. Lond. 1773. p. 177*). Nobilissimum Scotum Viennae curavi, qui advena pulcherrimam atque ornatisimam sibi elegit domum. Nullum tunc mentis alienatae exhibuit indicium, praeterquam quod a Nuntio Anglicano (tunc temporis *Lord Minto* gratissimae mihi semper memoriae), expetierat, ut cum veste nationali indutum (Romanorum quondam more sine bracciis), in aulam Imperatoriam, contra usus recepti legem introduceret. Derepente vero vir ille saevire incepit. Clausis januis, deuudato corpore, scroto chorda arcte circumdato, per cubicula sua huc et illuc vagabatur, omnia quae obviam venerunt, fenestras, specula, vascula, sub horrendo ejulatu, in mille frangendo frustula. Manibus sclopeta minora tenebat, asserens, se primum obvenientem trucidaturum esse. Famulum suum, num vivum adhuc, num jam demor-

Plurimi parietes literis mysticis explent, vel ex proprio stercore (quod nonnunquam comedere solent) foedant. In genere ideam, aut idearum seriem, quae mane ingruit, per totum nychthemorum prosequuntur, ac postridie mutant. Offensarum plerumque ita recordantur, ut vindictam de iis sumant. Nonnulli et beneficiorum sunt memores. Immo obvenerunt aegri, qui reconditam sacvitiam et ferociam dissimulare et abscondere sciebant, pro tempore de plurimis rebus sat rite disserendo¹⁰⁰); aliique obvenerunt fere involuntarie

tuum eegro cocium esse, certissime constabat. Omnibus incasum e me tentatis, milites poltiae, annuente Nuntio Anglicano, stratagematis ope furibundum imperio meo subjecerunt. Quo tempore nempe uno in latere terribili excitato rumore claustra revellere fingebant, eundemque ad locum omnem eegri attentionem direxerant, opposito in latere idem opus clandestine perfecerunt, prehensio a tergo exarmatoque furibundo, Scrotum illius ad capitis magnitudinem cum ecehymosi intumueret. Femula vivus sub acumino reconditus erat. Maniae iste paroxysmus spatio trium hebdomadarum evenit. Remisso convalescente ad Britanniam, alterum peroxysmum sub itinere expertus est, quo vigente aeger sese in mare praecipitavit, e nantis tamen feliciter extrectus.

- 100) Spectat huc celebratum PINELIS exemplum, viri scilicet in nosocomio *Bicêtre* jam diu reclusi, qui, cum rite ratiocineri videretur, a plebe Parisienai, tempore revolutionis nosocomium illud visitante, pro victima somnitate tyrannidis Regiae habitus fuit, atque hinc, incassum sese opponente custode aegrorum, li-

rie vim inferentes^{ros}). Atque huc spectat sic dicta

MONO-

bertati restituebatur, quo facto illico liberatorum arma ipse arripuit illosque adeo male tractare coepit, ut fuga sibi consulere debuerint (l. c. p. 159). Simile exemplum Cox, narrante GARGORY, refert (l. c. p. 222. in nota) aliudque in nobilissima femina prope Vilnam habui. Haec cum in paroxysmo maniae saevientis congruis vinculis circumdata fuerit, me, ut inde liberaretur, enixe rogavit, se placidam fore sancte asserens. Accessi ad aegrae nutum, ac revera remotis vinculis, sat placide loqui inceperat. Cum nihilominus fidem illi non plane tribuerem, ac aliquantulum ab ea recederem — propius, inquit, accede Domine! Accessi propius. „Rogo, subjunxit, vicinitus“, quod cum non sine cautela facerem, en alapsam mihi omni vi infligere tentavit. Frustrato tentamine, correptisque utrisque aegrae membris, ridens quaesivit: et quid mihi fecisses, si alapa ista te revera attigisset? Reddidissem eam cum usura, respondi. Minime, sit, celebrata tua humanitas feminae misere injuriam inferre, nunquam permisisset.

101) A. HASLAM in gyrgatho Londinensi, *Bedlam*, puerum decennem mihi monstravit, qui a secundo jam aetatis anno nisum continuum res obvias destruendi ac aliis injurias inferendi exhibebat. Haec omnia rapide perficit, et illico mali peracti poenitentiam tangitur. Quamvis de castigatione certus, nil celare solet. Immo declarat, custodis baculum necessarium ipsi esse auxiliium. Facultatibus enim animi intractus non solum non laefactatis, sed vario sub respectu excellentibus. Verbo, singula docent, puerum istum per motus involuntarios mechanice quasi exaptistos, saevire, deliberatione tarde nimis subsequente. Cfr. opus meum:

monomania homicida ¹⁰²). Qui continuo furunt, in acme morbi faciem pallidam et ad citrinum vergentem colorem, oculos sanguine suffusos, linguam siccam, cum spuma circa os, pulsum magnum et sub corporis jactatione veluti febrilem exhibent. Quodsi somnus hinc inde per breve concedatur intervallum, perturbatur is a somniis, flammis et incendia, pugnas, rixas, dimicationes et luctas referentibus. Visi etiam sunt aegri, qui inprimis ingruente somno, aut nocte, saevire incipiebant ¹⁰³).

12. *Ma-*

Reise nach Paris, London etc. 1. Th. p. 154. Casum quodammodo similem maximeque memorabilem describit cl. NIEMANN (v. Kopp's Jahrb. 6. Jahrg. p. 184. Geschichte einer höchst wahrscheinlich blüdsinnigen Einfaht bey einem 16jährigen Menschen mit einer unwiderstehlichen Neigung zu Neckereien, die zuletzt in Brandstiftung ausarteten).

102) GALL. *Monomanie homicide.* GERM. *Mordsucht*, Cfr. §. CIX. No. 13.

103) REMBERTUS DODONAEUS (obs. medicin.) viri cujusdam meminit, qui interdum mente et sensibus integris omnia sua negotia dextre obibat, quando autem quieti se dedit et dormiebat, mox insanire coepit. Similis casus apud HENC. SAXONIAM (lib. I. c. 17) extat, viri scilicet, qui dormiendo uxorem suam gravissimis saepe exceptit verberibus, nisi is magis ad somnambulium spectet. Ceterum et R. WHYTT de homine narrat, qui in actu obdormiendi semper delirabat (*Sämmth. z. pr. Arzneyk. gehörige Schriften. Leipz. 1774. p. 471*).

M. fatul-
tas.

12. *Mania fatuitas* ¹⁰⁴⁾ statum designat, in quo cunctae mentis facultates, quandoque ipsae animales inclinationes admodum fractae, et veluti paralyticae ¹⁰⁵⁾, cernuntur. Aeger sensus suos, interdum valde excitabiles, raro simul ad unum idemque objectum dirigit, atque hinc objecta externa vix aut ne vix quidem observat. Sonum vocis minitantis vix a blandiente distinguit. Ideae rapide, sine nexu, sibi invicem succedunt. Rerum ante actarum fere nulla servatur memoria. Fatuus quidem actuosus est, incendiis delectatur, verum sine scopo determinato. Loquela saepe balbutiens, plurimi salivam copiosam fundunt, subridet, facile in fletum prorumpunt. Porrecto cibo, comedere solent, ast nisi porrigatur, eum vix unquam expetunt. Interea haud pauci pecuniae usum minime ignorant.

M. idiotismus.

13. *Mania idiotismus* summum gradum fatuitatis designat ¹⁰⁶⁾, aegro aliquando brutis simili ¹⁰⁷⁾, sermone destituto, sonos minime articulatos

104) *ἡπαροσία* GRÆC. Dementia, amentia, vecordia LAT.

105) GALENUS (lib. II. de sympt. different. c. 8. cl. 3) *Amentiam* ratiocinalis facultatis paralytin vocat. Accedit FRÆNSELIVS (lib. V. patholog. c. 2). S. LEDER stupiditas et impotentia. Miscell. acad. nat. cur. dec. II. a. 9. 1690. p. 12. PH. J. HARTMANN stupiditas et impotentia. Ibid. dec. III. a. 4. 1696. p. 181.

106) BELHOMME *essai sur l'idiotisme*. Paris 1824.

107) PINEL (op. c. p. 182) de puella idiota loquitur, quae, quoad formam cranii, quoad inclinationes suas, quoad modum vivendi etc. ovibus similis erat. Car-

latos murmurante, inerte aut sese automatum instar movente, cum risu stupido. Spectat huc sic dicta *Fatuitas Alpina* sive *Cretinismus*¹⁰⁸). Morbus iste,

nem respuens, solis vegetabilibus vescebatnr, alia non pronunciabat verba, quam *bé, ma tante*, et capite pecorum more feriebat. Dorsum et scapulae pilo longitudinis duorum fere pollicum, lanæ nigrae simili, cooperta erant. Pecorum quoque more puella ista humi decumbebat.

- 108) A *Chrétien* (Christianus), cum aegri tali morbo detenti humiles sint (*Dict. des sciences méd. T. 7. p. 348*). GERM. *Trotten, Lallen, Simpel, Tennler Poppel, Tralle, Tremmler, Latsche, Daekel*. De hoc morbo scripsere: EUSTACHIUS RUDIVS lib. I. pract. cap. 6 (Refert se in Tyrolensi quodam comitatu amentium et stultorum frequentissimum observasse numerum). HALLER element. physiol. T. V. p. 370. ZIMMERMANN von der Erfahrung. 2. B. p. 150. SAUSSURE voyage aux Alpes. T. 2. p. 481. J. P. FRANK delectus opusculor. med. Vol. VI. p. 241. ACKERMANN über die Kretinen, eine besondere Menschenart in den Alpen. Gotha 1790. CLAYTON in *Memoirs of the literary society of Manchester. Vol. 3. No. 13*. FODÉRÉ essai sur le gôstre et le crétinisme. Turin 1792. Et (*Précédé d'un discours sur l'influence de l'air humide sur l'entendement humain.*) Parisiis ann. VIII. recus. WENZEL über den Cretinismus. Wien 1802. IPHOFEN diss. de Cretinismo. Vitemb. 1804. Der Cretinismus medietnisch und philosophisch untersucht. Dresd. 1817. REEVE some account of Cretinism. v. Edinb. medic. journal. Vol. 5. No. 18. MOYNE essai sur le Cretinisme et l'idiotisme. Paris 1814. ADAMS in *Medical and physical journal published by Fo-*

iate, a nobis pluries visus, in vallibus Galliam et Italiam separantibus, Tyroli, Salisburgi, Styriae, Carinthiae, Tartariae chinensis¹⁰⁹⁾ endemicus, descriptionem potius, quam definitionem admittit. Consistit enim in forma monstrosa totius fere corporis, ac in jactura omnium fere animi facultatum. Illa a primis nativitatis annis originem ducit, seseque primum per bronchocelen manifestat. Facies apparet tumidula, oblongata, simiae vultui quodammodo similis; ex ore hiantē lingua pendet spissa, tenaci saliva obducta. Oculi parvi, nunc protuberantes, nunc profunde in orbita positi, intuitus fixus et stupidus. Plurimi surdi et muti sunt, ac a fortissimis licet odoribus vix afficiuntur. Statura corporis raro quatuor pedes duosque pollices superat. Caput habita ratione corporis parvum, ad verticem et tempora complanatum, vix

THERCILL and WANT. Lond. 1815. Juny. SENSBURG der Cretinismus mit besonderer Rücksicht auf dessen Erscheinung im Unter-Main- und Rezat-Kreise des Königreich's Bayern. Würzb. 1825. KNOKE Beytrag zur Kenntniss des Kretinismus. In Med. Jahrbücher des k. k. Oestr. Staates. Neue Folge B. 1, St. 1. p. 86. St. 2. p. 146. C. G. A GUERARD diss. quaedam de cretinismo. Berol. 1829. BRAUN einige Bemerk. üb. d. Cretinism. in FRIEDREICH Magaz. f. d. philos. med. u. gerichtl. Seelenk. H. 3. Würzb. 1830. p. 81.
109) STAUNTON med. Bemerk. 2. Th. et: Beschreibung der Gesandtschaftsreise des Grafen MACARTNEY. 2. Th. Vid. VOISOT's Magazin f. d. neuesten Zustand d. Naturk. 1. B. 2. St. p. 29.

vix ad occiput protuberantia instructum, pectus depressum, digiti subtiles, oblongati, cum articulis parum prosilientibus, planta pedum larga, quandoque recurvata, pedesque extra conversi. Cutis universa flaccida, rugosa et livida. Functiones, praeter illas ventriculi et partium genitalium, languent. Sunt enim entia hujusmodi voracia et admodum salacia. Nihilominus juniora inprimis, ut ab aliis nutrantur, expetunt, vel res incongruas, ut carbones etc., comedunt. Pubertatis epocham tarde attingunt, sed partes dein genitales admodum evolvi solent, cum effraena ad onaniam inclinatione. Coire inter se et cum sanis valent, quin propria conditio necessario propagetur. Faeces brutorum instar deponunt. Videres cretinorum plurimos veluti sues in plateis decumbentes, radiosque solis quaerentes. Aegre nimirum e loco moventur. Dum gradiuntur, brachiis pendulis, vacillant. Directam eligunt viam, obstaculorum et periculi ignari. Nec parentibus obsequuntur, nec bona officia facile agnoscunt. Verbera et blandimenta aequo pacto ferunt. Adspectum senilem cito induentes, vita tamen longaeva frui queunt.

14. *Mania chaos* nullo hucusque descripto *M. chaos.* caractere insignitur. Ea enim vigente ideae omnis generis, quin una alterave ex iis eligatur, tumultuarie sibi succedunt, seseque invicem offendunt, cum inquietudine vaga, et gestibus proteiformibus.

15. *Maniarum* hucusque descriptae *formas* *Observatio.*
non

non solum inter se, sed et cum aliis morbis, praesertim *epilepsis* et *somniations* ¹¹⁰⁾, *complicari posse*, prout operis limites concedent, infra demonstrabitur.

Convalescentia.

16. *Convalescentes* ex mania praedispositionis circiter versantur in conditione ¹¹¹⁾. Illorum quivis quid de morbi praegressi forma retinet. Generatim perturbati et dubii cernuntur atque ad aspectum medicorum aliorumque, qui iis aerumnis vigentibus ministrarunt, aegre ferunt. Immo valét id et de perfecte sanatis, ita ut raro hic grati animi tributum expectare liceat ¹¹²⁾. Sunt quorum morbus nullam sui memoriam relinquit, existentia anteriori posteriori directe annexa ¹¹³⁾.

§. CVII.

Necroscopia.

Generatim.

1. *Necroscopiae maniacorum* ¹⁾, antiquissimae, ut videtur, originis ²⁾, exhibuit nunc nil, quod

110) CAZAINTE's *Beobachtungen einer merkwürdigen Nervenkrankheit, wobey das Ohr die Stelle des Auges vertrat*. Ex *Ephémérides médicales de Montpellier* T. 5. p. 285. in *GEBSON Magazin der aush. Literat. der gesamt. Heilk.* 1828. März, April.

111) No. 2 et 3.

112) Exemplo esto aegra cujus historiam infra (§. CXI. 2 (29)) narrabo.

113) Exempla huc spectantia lectique dignissima ex *American journal of sciences and arts*, Vol. 1. p. 431. recensentur in *GEBSON Magazin* cit. B. 4. 1822. p. 90.

1) TH. ZWINGER anatome maniaci. *Miscell. acad. nat.*

quod contra normalem conditionem partium corporis

- cur. dec. II. a. 6. 1687. p. 540. J. A. USKNEBENZ historia anatomica quaedam notabilis feminae ex delirio melancholico in propria viscera ssevientia. Ephem. acad. nat. cur. cent. 7 et 8. p. 122. J. G. HOYER manisci lethargo defuncti anatome. Acta acad. nat. cur. Vol. 4. p. 126. J. J. NEUMOLD sectio militia, per longum tempus melancholici, tandem tabe extincti. ibid. Vol. 3. append. p. 175. J. F. MACKEL *recherches anatomico-physiologiques sur les causes de la folie qui viennent du vice des parties internes du corps humain. Mémoires de Berlin* 1764. p. 65. J. CH. F. SCHERF dissectio melancholici. Nova acta acad. nat. cur. Vol. 7. p. 285. MARSHALL *the morbid anatomy of the brain in mania and hydrophobia, with the pathology of these two diseases. Lond.* 1815. FALRET *inductions des ouvertures des corps des aliénés, lues à l'Athénée de médecine. v. Nouvelle Bibliothèque médicale. Janv.* 1824. BURROWS *Commentaries etc. NEUMANN fünfzig Krankheits- und Sectionsgeschichten von Wahnsinnigen mit vergleichenden Resultaten. HUZELAND's Journ., der pr. Heilk.* 1824. July. p. 1. PHEL der Sohn, *Untersuchungen über die somatischen Ursachen der Geisteskrankheiten welche ihren Sitz entweder im Gehirn oder in den übrigen Organen des Körpers und deren Nervengeflechte haben. Ex MAOENDIE Journ., de physiol. expérimentale.* 1826. No. 1. in HECKEN's *liter. Annal. der gesamt. Heilk.* CRUVEILHIER *anatomie pathologique du corps humain.* 3. Livraison.
- 2) Teste MORBIO (l. c. §. 19). DEMOCRITUS dum cadavera secaret, ab HIPPOCRATE interrogatus, quid ageret, respondit: „pervestigo causam furoris et insanie hominum, ostensurus causam truculenti hujus affe-

poris humani in sensus caderet³⁾, nunc vitia multifaria tum encephali, tum aliarum cavitatum.

Vitia encephali.

2. Ad vitia encephali spectant: *cranii* dimensio imminuta et figura irregularis⁴⁾, conica⁵⁾, complanata⁶⁾, obliqua⁷⁾, cum cavitate encephali angusta nimis⁸⁾, et ossibus nunc universe nunc partim crassioribus⁹⁾, tenuioribus¹⁰⁾, carie¹¹⁾, exostosis¹²⁾ aliisque excrescentiis¹³⁾ insignitis; —

menin-

ctus valde abstrusam et nodosam esse.“ DEMOCRITUM revera animalis rara secasse, ex PLINIO (lib. XXVIII. c. 8) apparet, de reliquis non spondeo.

- 3) HALLER elem. physiol. T. IV. p. 338. AARNEMANN *Versuche üb. d. Gehirn- u. Rückenmark*, Gött. 1787. p. 130—180. NEUMANN l. c. BURROWS *comment.* etc. (Inter 259 maniscorum cadavera, 56 nihil morboasi exhibuerunt).
- 4) PINEL l. c. p. 466. Tab. 2. fig. 5. 6.
- 5) GILIBERT *Samml. pr. Beobacht. u. Krankengeschicht.* Uebers. v. HEHENSTREIT. Leipz. 1792. p. 57. PINEL l. c. p. 465. Tab. I. fig. 1.
- 6) PINEL l. c. MARSHAL l. c. 7) NEUMANN l. c.
- 8) J. CHR. FAHNER *Beytr. z. pr. u. gerichtl. Arzneyk.* Stendal 1799. 1. B. 15. *Beobacht.*
- 9) GRADING l. c. p. 130. 141. NEUMANN l. c. WETZLER *Leichenöffnungen von Cretinen in HARLESS Rhein. Westph. Jahrbücher B. 9. St. 2. p. 56.*
- 10) Idem MARSHAL l. c.
- 11) Commere. liter. noric. 1732. p. 206. SIBBERN in Coll. soc. med. Hafn. 1. Vol. No. 11. NEUMANN l. c.
- 12) KÖHLER *Beschreibung der physiol. u. pathol. Präparate, welche in LODER'S Samml. enthalten sind.* Jen. 1795. No. 100. p. 29.
- 13) OSIANDER *Beobacht.* p. 137.

meninges crassiores ¹⁴⁾, a pseudomembrana obductae ¹⁵⁾, *dura mater* cranio firmiter accreta ¹⁶⁾, sicca et veluti tabula lignea indurata ¹⁷⁾, crassa ¹⁸⁾, ob-
sessa a concrementis osseis ¹⁹⁾, ab osse ²⁰⁾, a sub-
stantia calculosa ²¹⁾, a tumore ²²⁾, corpuscula al-
bida, mollia ad latera processus falciformis ²³⁾,
processus iste consumtus, hemisphaeriis cerebri
sese invicem tangentibus ²⁴⁾, *arachnoidea* increas-
sata ²⁵⁾, *pia mater* dura ²⁶⁾, callosa ²⁷⁾, coloris
subcoe-

14) LITTRÉ in *Mém. de l'acad. des scienc. de Paris* 1705.
GEOFFROY ibid. 1706. CAMERARIUS de apostemate
piae matris. Tüb. 1722. SWIETEN l. c. §. 1121.

15) LITTRÉ, GEOFFROY, CAMERARIUS, SWIETEN II. co.

16) GREDING l. c. 1. B. p. 293. JONES in *Med. com-
ment. of Edinburg. dec. II. v. Samml. auserl. Ab-
handl. für pr. Aerzte.* 13. B. p. 25.

17) BAGLIVIVS de fibra motrice, lib. I. cap. 5.

18) WETZLER l. c.

19) MECKEL l. c. WALTER *anat. Museum* 1. B. p. 136.
No. 269. p. 137. No. 270 (in furibundo). BAYLE l. c.
NEUMANN l. c.

20) LIEUTAUD op. c. lib. III. obs. 36. MECKEL l. c.
(in saeviente, dextrum hemisphaerium cerebri pungens).

21) Ephem. nat. cur. dec. III. ann. 3. obs. 166.

22) HORN l. c. p. 267.

23) MORGAGNI op. c. Epist. VIII. 2.

24) RAMSAY l. c. in cap. nostro l. §. I. 2 (21).

25) NEUMANN l. c.

26) NEUMANN l. c.

27) BARRY a mania from a calous pia mater. *Medical
essays and observat. Vol. 4. p. 414. Edinb. Versuche.*
4. B. No. 26. BAYLE l. c.

subcoerulei²⁸⁾, exrescentiis notata²⁹⁾, serum eam inter et reliquas meninges³⁰⁾, ac cerebrum³¹⁾ effusum, — *vasa sanguinea* capitis ossificata³²⁾, polypis referta³³⁾, venae turgentes varicosae³⁴⁾, anevrysmata carotidis internae³⁵⁾, haemorrhagiae³⁶⁾, — *cerebrum* specificè gravius³⁷⁾, volumine imminutum³⁸⁾, foetidum³⁹⁾, phosphoro

orba-

28) GREDING l. c. p. 298 (praecipue in melancholicis).

29) GREDING l. c. GÜNZ prolusio III. de cerebro. Lips. 1744.

30) JONES l. c. STARK's klin. Bemerk. MARSHAL l. c. BAYLE l. c.

31) SIMONS in Lond. med. Journ. Vol. 6. p. 159.

32) MARSHAL l. c. 33) BADER obs. 41.

34) BALLONIUS paradigmata. No. 184. BANG Act. soc. Havn. Vol. I. p. 100.

35) BLANE in Transact. of a society for the improvement of med. knowledge. Vol. 2. p. 192. v. Samml. auserl. Abh. für pr. Aerzte. 20. B. p. 559. HODGSON a treatise on the diseases of arteries and veins. p. 178.

36) ESQUIROL apoplexie suivie de paralysie et de démence, par épanchement considérable de sang entre la dure-mère et l'arachnoïde. Sédillot Recueil périod. de la soc. de méd. de Paris, T. 64 (seconde série T. 3). p. 350. Mémoires sur l'hémorrhagie de la couche corticale du cerveau. Revue médicale 1827. Mars. p. 402.

37) MECKEL l. c.

38) WILLIS anat. cerebri. c. 3 (in fatuo). CRAUVEILHIER l. c.

39) GREDING l. c. p. 306 (inter 39 maniacos saevientes, 4 erant, quorum cerebrum intolerabilem foctorem exhalabat, etsi ceterum normale).

orbatum ⁴⁰⁾, coloris brunei, coerulei et nigricantis ⁴¹⁾, mollissimum ⁴²⁾, pultaceum ⁴³⁾, lardaceum ⁴⁴⁾, coreaceum ⁴⁵⁾, durum ⁴⁶⁾, tenax ⁴⁷⁾, callosum ⁴⁸⁾, siccum ⁴⁹⁾, ossificatum ⁵⁰⁾, exulceratum ⁵¹⁾, cum tumoribus scirrhis ⁵²⁾, steatomatosis ⁵³⁾,

40) DEL - BUE *annalisti della massa cerebrale d'un maniaco furioso. Roma* 1826.

41) MOROAGNI op. c. Epist. VIII. 9. Epist. IX. 20. SOEMMERRING *Hirnschre.* §. 29.

42) LENTIN *Beobachtungen* p. 113. BAYLE l. c.

43) GRADINO l. c. p. 308 (Inter 100 cases, praesertim maniaco - epilepticorum 51 exempla). HALLEN l. c. p. 571. NEUMANN l. c.

44) *Neue allgem. deutsche Bibl.* 81. B. p. 339.

45) NEUMANN l. c. 46) MARSHAL l. c.

47) PLENCIZ act. et obs. med. p. 179.

48) Act. med. Berol. dec. I. Vol. 7. p. 88. 90. dec. II. Vol. 3. p. 41. 42.

49) HERN apud LIEUTAUD hist. anat. med. lib. III. sect. 2. obs. 77. T. II. p. 333.

50) DOMEIER in *Journ. d. ausländ. Liter.* v. HUFELAND, SCHROEDER u. HARLESS. 1. B. p. 258 (In mania prius furibunda, dein miti, ac demum immobilitate fere universali stipata). Analysis chemica cerebri ossificati exstat in *Annales de chimie et phys.* Octobr. 1829. p. 333.

51) BAUMIN in BONET. sepulchr. lib. I. sect. 15. obs. 18. p. 311 (In dextro hemisphaerio juvenis diu melancholici et paralytici). PLATNER instit. chirurg. p. 334. MARSHAL l. c. Atque hic ex doctrina de phthisi enccephalica ad memoriam revocare juvabit, magnam cerebri jacturam sine laesione facultatum animi exstare posse, quod et DUCAN confirmat in *The Edinburgh med. and surgical journ.* No. 78. July 1821.

tosia⁵³), concrementis calculosis⁵⁴), ossibus⁵⁵),
vermibus⁵⁶), gangraenosum⁵⁷), saepe non muta-
tum⁵⁸), — *corpus callosum* induratum⁵⁹), cum
hydatide⁶⁰); — *ventriculi anteriores* dilatati⁶¹),
angustati⁶²), exsiccati⁶³), vel saltem vacui⁶⁴),
sero

52) LONKE obs. tumor. scirrhusi in basi cranii reperti,
cui est adjuncta disquisitio de vero olfactus organo.
Jen. 1779 (In mania sat miti et epilepsia cum deletio
olfactus et visu. Ineumbat tumor ponderis unciae
fere semis laminae cribrosae ossis ethmoidi).

53) PLATER obs. p. 13. ENGEL in SCHMUCKER's *ver-
mischte Schriften* 1. B. p. 274. NEUMANN l. c. Etiam
tumores scirrhusos in cerebro sine mania latitare posse
inter alias observationes OTTO (*zweite Samml. seltener
Beobachtungen* etc. Breslau 1824. No. 35) docent.

54) WALTER obs. anat. p. 42. *Anat. Museum.* 1. B. No.
310. p. 156 (In femina mania ad internum latus
nervi optici sub transitu ejus per foramen opticum).
KERNRING specileg. anat. obs. 35. p. 76. Tab. XV.
(Calculus albus ponderis granorum tredecim in cere-
bro pueri fatui).

55) WALTER l. c. No. 291 (In viro mania miti labo-
rante, in sinistro hemisphaerio linearum sex longitu-
dinis, totidem latitudinis). SMITH in *Medical obser-
vat. and inquiries* Vol. VI.

56) BORET l. c. obs. 5.

57) GREDING l. c. p. 323 (In mania furibundo).

58) BAILLIE *neue Bemerkungen* etc. p. 475.

59) MURINNA *Beobacht.* 1. B. p. 131.

60) LORRY op. c. 1. B. p. 132. NEUMANN l. c.

61) GREDING l. c. p. 309 (In plurimis furibundis).

62) GREDING l. c. p. 310. 317 et 326.

sero repleti⁶⁵), *ventriculus tertius* dictis similis et infundibulum clausum⁶⁶), *ventriculus quartus* amplus, ut digiti phalangem admitteret⁶⁷), figurae abnormis fere triangularis⁶⁸), *valvula cerebri* a ventriculo quarto adeo distans, ut eum apertum relinqueret⁶⁹), *eminentia quadrigemina* valde complanata, flaccida, vix conspicua⁷⁰), *glandula pinealis* corrugata, ex flavo brunea, lapillis repleta⁷¹); — *plexus choroidaei* candidi⁷²), sanguine turgent⁷³), hydatidibus referti⁷⁴), cum annexis glandulis⁷⁵), calculo⁷⁶), *septum lucidum* induratum⁷⁷,

Fff 2

tum⁷⁷),

65) MORGAGNI epist. IV. 9. 13. VIII. 9 (In minori malo). GREDING L. c. p. 311 (In plurimis furibundis).

66) GREDING L. c. p. 311 (In quinque melancholicis).

67) RIVIERI opp. med. Genev. 1737. p. 437. MORGAGNI Ep. IX. 3. GREDING L. c. p. 311. 312. 313. 317.

68) GREDING L. c. p. 322. (A firma membrana in maniaco saeviente).

69) GREDING L. c. p. 326.

68) Idem L. c. p. 327.

69) Idem L. c. p. 322. 70) Idem L. c. p. 321 (In fatuo).

71) GÜNZ prolusio de lapillis glandulae pinealis in quinque mente alienatis inventis. Lips. 1753. V. HALLER collect. diss. P. I. No. 45.

72) MARSHAL L. c.

73) DUVERNEY *oeuvres anatom.* T. 1. p. 41 (Praesertim in mania saeviente). LIEUTAUD L. c. obs. 123. GREDING L. c. p. 314 (Etiam in melancholicis et fatuis).

74) GREDING L. c. 2. B. p. 314 (In 96 maniacis furibundis et in 24 melancholicis).

75) MORGAGNI epist. VIII. 2.

76) WALTER *museum anat.* T. I. p. 155. No. 309 (In fatuo).

tum ⁷⁷⁾, *thalami optici* parvuli et inter se distantes ⁷⁸⁾, concreti, antrorsum separati, sed retrorsum corticali substantiae juncti et corporibus striatis commixti ⁷⁹⁾; *corpus striatum* sine striis et ex substantia medullari, quam cinerea circumdabat, compositum ⁸⁰⁾, durum, ut forfice, quin laceretur, attolli potuerit ⁸¹⁾; *pons Varolii* disruptus ⁸²⁾; — *cerebellum* ex minori laminarum copia compositum ⁸³⁾, tentorio deficiente a cerebro compressum ⁸⁴⁾, cum concremento osseo ⁸⁵⁾, calculo ⁸⁶⁾; — *medulla oblongata* duritiei tendinosae ⁸⁷⁾, tubercu-

77) MECKEL l. c.

78) GREISING l. c. p. 312 (In duobus fatiis).

79) Idem l. c. p. 322 (In mania saeviente cum epilepsia).

80) METZGER *vermischte Schriften. Königsb.* 1782. 1. B. p. 53.

81) MECKEL l. c. (In femina diu melancholica).

82) AUENBRUGGER *über die stille Wuth.*

83) MALACARNE *neuro-encefalotomia. Pavia* 1791. p. 7 (Contendit, se in cerebello fatui solum 300 laminas numerasse, cum illud sani 800 habere). NEUMANN l. c.

84) D. GILBERT in *The Western med. and phys. journ.* 1828. January. Vitia autem similia, animi facultatibus perstantibus, obvenire testatur CARLISLE in *Transact. of the society for improvement of medical and surgical knowledge.* p. 212.

85) GREISING in LUDWIGII *advers. med. pract.* Vol. III. p. 657.

86) GREISING op. c. 2. B. p. 475.

87) HOPFENGARTNER in HUFELAND's *Journ. der pr. Heilk.* 1. B. p. 521.

berculis obsessa⁸⁸⁾, origines nervorum firmæ nimia⁸⁹⁾, *specus vertebralis* sero repletus⁹⁰⁾, et *nervus sympathicus magnus* præter modum evolutus⁹¹⁾.

3. *Cavitas pectoris* exhibuit: *costas* emollitas⁹²⁾, *mediastinum* et *pleuram* fluido flavo gelatinoso cooperta⁹³⁾, *pericardium* inflammatum et sero purulento repletum⁹⁴⁾, *cor*⁹⁵⁾ aridum, exsuccum⁹⁶⁾, cum pituita⁹⁷⁾, polypo⁹⁸⁾, apostemate auriculæ dextræ⁹⁹⁾ et adhaesione cum pericardio¹⁰⁰⁾, anevrysma subclaviæ¹⁰¹⁾, calculum

Vitia reliq. cavitatatum.

in

88) HOME l. c. p. 270.

89) MARSHAL l. c.

90) MARSHAL l. c.

91) *Ungewöhnliche Entwicklung des grossen sympathischen Nervens, welche man in den Leichnamen von Personen entdeckt hat, die an Blödsinn verstorben sind.* Von PINEL. Ex *Nouveau Journ. de méd.* 1819. Août in HUFELAND's *Journ. der pr. Heilk.* 1820. Nov. p. 118.

92) MORGAGNI epist. XVIII. art. 25. Epist. XXVI. 5. GREDING l. c. p. 332.

93) GREDING l. c. 1. B. p. 339 (In duobus maniacis).

94) SOEMMERRING in not. ad BAILLIE. not. 1 (In aegro nostalgia et maniae accessibus laborante). MARSHAL l. c.

95) De vitiorum cordis in maniacis (et in somnibus) frequentis lege NASSE in HORN's *Archiv für med. Erfahr.* 1817. et AMELUNG in NASSE's *Jahrb. für Anthropologie und zur Pathologie etc. des Irreseyns.* B. 1. p. 34.

96) BONET sepulchr. lib. I. sect. 9. obs. 5. 8. MARSHAL l. c.

97) Idem obs. 13.

98) Idem obs. 35.

99) CRUIKHANK's *neweste Beyträge.* 100) BAYLE l. c.

101) BONET l. c. obs. 38.

in *aorta* ¹⁰²), *pulmones* flaccidos, tuberculosos ¹⁰³), exsiccatos ¹⁰⁴), eorum lobum dextrum inferiorem in vesicam liquido quodam repletam, degeneratum ¹⁰⁵), ulcus diaphragmatis ¹⁰⁶). *Cavitas abdominis* includebat: vitia *omenti* ¹⁰⁷), *mesenterium* cum *steatmate* ¹⁰⁸) et glandulis *scirrhis* ¹⁰⁹), viscera abdominalia in unam massam concreta ¹¹⁰), *scirrhum pylori* ¹¹¹), *ventriculum* corporibus extraneis repletum *), *intestina* inflammata ¹¹²), angusta ¹¹³) et *coli transversi* situm abnormem ¹¹⁴),

pan-

102) CHIFFLET observat. Paris. 1611. MARSHAL l. c.

103) GREDING l. c. 1. B. p. 330—350. BAYLE l. c.

104) SWIETEN l. c. §. 1121. GREDING l. c. p. 341.

105) GREDING apud LUDWIG op. c. Vol. II. Part. III. p. 622.

106) MACKEL l. c. p. 88 (In manisco saciente).

107) BONET l. c. obs. 39.

108) TULPIUS obs. med. lib. II. c. 33. p. 147.

109) BONET l. c. obs. 33. 40.

110) J. H. SCHULZE et FR. W. BRUNN l. c.

111) BONET l. c. obs. 33.

*) Med. Jahrb. des k. k. Oesterreich. Staates. Neue Folge. B. 1. St. 2. p. 184 („7, 1½ Zoll lange oxydirte Lattennägeln; 33 zwey Zoll lange und 49 kleine eiserne Nägel; 3 Stücke gewundenen Eisendraht; eine Zoll lange, federispuldicke eiserne Schraube, die Hälfte einer gewöhnlichen Stricknadel; 2 eiserne Pfeifenräumer; 1 messingenes Heiligenbild; eine viereckige messingene Hutschnalle; 1 zwey Zoll langes Stück einer Messerklinge“).

112) BAYLE l. c.

113) MÜLLER l. c. SIBERGUNDI Beschreibung einiger Abnormitäten, die sich an dem Darmkanal eines erhäng-

*pancreas scirrhosum*¹¹⁵), cum calculis¹¹⁶), *hepar* justo majus, cum *vesicula fellea* rubicundâ¹¹⁷), bile orbatâ¹¹⁸), câque tenaci nigerrima repleta¹¹⁹),

COR-

ten Mannes fanden; mit der Epicrise und einem Anhange über Darmkanal-Verengerung in einem andern Falle. HANLESS Rheintisch-Westphäl. Jahrb. der Med. und Chir. B. 8. H. 2. p. 52. PREUTTER Nachtrag zu meinem Tagebuch über die Geisteszerrüttung der Gräfin N. nebst Sectionsbericht. HORN's Archiv für med. Erfahr. 1826. Mai, Jun. p. 410.

- 114) ESQUIROL observations sur le déplacement du colon transverse dans l'aliénation mentale. Biblioth. médicale. 1818. Septembre. Ouvertures des corps aliénés qui présentent le colon transverse dans une direction perpendiculaire et son extrémité splénique descendue derrière le pubis. SEDILLLOT recueil périod. de la soc. de méd. de Paris T. 62 (serie 2. T. 1) p. 341. T. 63 (Serie 2. T. 2) p. 176. 289. HIRZ Wahnsinn, welcher mit Selbstentleibung endigte, Folge der normwidrigen Lage des Querkrummdarms. HUFELAND's Journ. der pr. Heilk. 1820. Mai. p. 29.

- 115) HUNTER Wahrnehmung. 1. B. No. 382. Ejusd. Dissectio duorum cadaverum melancholicorum, qui aquae submersione sibi met ipsis mortem intulerant; ubi in primis quaedam singularia curiosa circa ductus felleos cysticos, et pancreas describuntur. Ephem. acad. nat. cur. cent. 5 et 6. p. 242.

- 116) Commere. liter. Norimb. 1742.

- 117) MARCARD medicinische Versuche 2. B.

- 118) WIDEMANN in HUFELAND's Journ. der pr. Heilk. 8. B. p. 383.

- 119) GREDDING apud LUDWIG l. c. Vol. III. P. I. NIETZKI elem. physiol. universal. Lausann. 1784.

corpusculum extraneum ¹²⁰⁾ calculosque ¹²¹⁾ continente et affectiones plexuum nervorum ¹²²⁾. In pelvi obveniebant: uterus scirrhosus ¹²³⁾, ovarium cum steatomate piloso ¹²⁴⁾ et hydatidibus ¹²⁵⁾. Nec marium partes genitales semper juxta normam constituta cernuntur ¹²⁶⁾.

§. CVIII.

C a u s s a e.

Prædispo- 1. *Caussae prædisponentes* (quæ etiam per
nentes. se manias sæpius excitare valent) quaerun-
tur: in climate ¹⁾, anni tempore ²⁾, constitu-
tione

120) WIDEMANN l. c.

121) BAYLE l. c.

122) BICHAT *anatom. générale*. T. 1. p. 225.123) OBERTRUPFER in STARK's *Archiv f. d. Geburtshülfe*.
1. B. p. 681.124) BUDDRUS in *Miscell. Berol.* T. III. p. 16.125) *Commerc. liter. Norimb.* l. c.126) A. CH. TERNSTIUS *dissectio melancholici lethargo tan-
dem mortui, miram genitalium conformationem habentis*.
Ephem. acad. nat. cur. cent. 3 et 4. p. 279.

1) FODÉRIÉ *discours sur l'influence de l'air humide sur l'entendement humain*. TH. FORSTER *observations of the influence of atmosphere on human health particularly insanity*. Lond. 1817. Ejusd. *Observations on insanity being a supplement etc.* Lond. 1817. J. REHMANN *Bemerkungen über die Ursachen des endemischen Wahnsinn's im Schwarzwalde*. HARLESS *Rheinisch-Westphälische Jahrbücher* 1819. B. 1. Heft 1. p. 1.
Ne vero frequentiam solito majorem maniae una alterave in regione praepostere climati adscribas! Potest enim illa a plurimis causis adventitiis pendere. Sic

tione epidemica ³⁾, aetate ⁴⁾, sexu ⁵⁾, evolutione
imper-

fertur mania in pago Belgiae *Gheel* endemica (C. M. ANDRÉE *neuester Zustand der vorzüglichsten Spitäler und Armen-Anstalten einiger Hauptorte des Inn- und Auslandes*, Leipz. 1810. B. 2. p. 49. ESQUINOZ in OMODEI *annali universali di medicina* 1822. T. 22. p. 127. et GERSON *Magaz. der ausländ. Liter. der gesammten Heilkunde* 1822. B. 4. p. 167) ac revera vix ibi domus reperitur sine aegro illo morbo laborante; ast solum propterea quod maniacy illuc curationis gratia transferuntur, *Novocomii* et *Bergamo* mania, habita ratione numeri incolarum, crebrina quam in aliis Insubriae urbibus obvenit. Si vero propius in causas trias illius phaenomeni inquiratur, non clima, sed matrimonia inter familias mania haereditario jure mulctatas, inculpanda esse, ex eo palam fit, quod morbus dumtaxat in familiis nobilioribus solito frequentius obvenit, neutiquam apud vulgum a conjugii imparibus minus alienum. Meae hac in re observationes plane cum illis BURNOWS (*commentaries* etc.) et BLACK (*über das häufige Vorkommen des Wahnsinnes und der erblichen Verrücktheit in England*. Vid. *Ex-hand med. chir. Zeitung* 1827. B. 3. No. 76. p. 415) convenire, gaudeo.

- 2) *Aetatem* praecipue maniis favere, praeter quotidianam experientiam et dictum comprobatur: „Cum faba florescit, stultorum insania crescit.“ HIPPOCRATES *ver* et *autumnum* accusavit (apb. 20 et 22), quod praecipue de mania periodica valere videtur. ARETAEUS saltem affirmat: „qui penitus soluti mania videbantur, aut *vernum tempus*, aut error in victu, aut ira, maniam revocavit.“ SCHULZE duo maniarum exempla sex menses durantium narrat, quorum aegrorum unus per hiemem, alter per aetatem laborabat. REIL l. c.

imperfecta ossium capitis ⁶⁾ et sensuum, epochâ
puber-

p. 385. ESQUIROL *Dictionnaire* l. c. p. 166. et *della pazzia. Versione CALVETTI cap. 1. Tav. 1.*

3) Eph. nat. cur. dec. III. ann. 5 et 6, append. p. 121.

QUELMALZ diss. de epidemica mentis alienatione. Lips. 1752. R. POWELL *observations upon the comparative prevalence of insanity, at different periods. Medical transactions. Vol. 4. p. 131.* De furore uterino epidemico refert STEGMANN in Hist. epid. Mansfeld. a. 1698.

V. SYDENH. opp. T. II. p. 125. ESQUIROL *Dict.* p. 167.

Sub certis anni constitutionibus in consuetum aegrorum numerum ad gyrgathum Viennense affluxisse, dixi.

4) Teste PINEL (l. c. p. 456) in gyrgatho Bicêtre inter

71 aegros nullus erat, qui morbum ante pubertatem contraxerat. Contraxerunt autem cum tres ab anno

15 ad 20, — viginti tres ab ann. 20 ad 30, — quin-

decim ab ann. 30 ad 40; totidem ab ann. 40 ad 50;

novem ab ann. 50 ad 60, et sex ab ann. 60. et ultra.

ESQUIROL de *infante* octo annorum maniaco loquitur

(*Dict.* p. 168. 170. et *della pazzia. cap. 1. Tavol. 2*).

De puero decem annorum maniaco alibi narravi (Joa.

FRANK's *Reise nach Paris, Lond. etc. Th. 2. Wien*

1816. p. 253). De senum mania vid. PLATNER *progr.*

de mania senili occulta. Lips. 1806.

5) In singulis a me visitatis gyrgathis numerus femina-

rum illum marium excedebat. Sic et apud ESQUIROL

(*Dict.* p. 171—173. et *della pazzia. cap. 1. Tavol.*

3). Contrariam interdum rationem exstare elucet ex

The medical recorder of med. and surgery. Philadelph.

1824, Jun. BURROW's (l. c.) asserit marces frequentius

quam feminas mania laborare, exceptis tamen urbibus

majoribus.

6) PINEL l. c. p. 73 (Præcipue in idiotismo).

pubertatis ⁷⁾, menstruatione ⁸⁾, graviditate ⁹⁾, puerperio ¹⁰⁾, cessatione catameniorum ¹¹⁾, vitiis hæredi-

7) Hæc sub periodo, præsertim in sexu sequiori, causas maniarum maxime aditum invenire, expertus sum. HALY (theor. lib. IX. c. 7) idem de mania phantastica contenderat.

8) PERFECT l. c. obs. 50. PINEL p. 40.

9) J. A. EUTH de muliere aliàs mente sana, gravida demente. *Miscell. acad. nat. cur. dec. III. a. 2. 1694. p. 10.* FL. CALDANI *osservazioni anatomiche. Mem. 2. Osserv. 1. in Memor. della Società Italiana. T. 16. P. 2. p. 119.* HUVELAND 7. B. 2. St. p. 166 (maniae sævientis, graviditatem constanter comitantis, narratur exemplum). JAHN *Klinik der chronisch. Krankheiten. Erfurt 1815. 2. Abschnitt.*

10) J. G. HOYER de delirio melancholico hæreditario post puerperium. *Acta acad. nat. cur. Vol. 3. p. 261.* BERGER diss. de puerperarum mania et melancholia. Goett. 1745. RASCHER diss. de mania et melancholia puerperar. Erf. 1794. BANG *Act. R. soc. Havn. Vol. I. p. 15. Vol. II. p. 52.* PERFECT l. c. p. 99. ESQUIROL *observations sur l'aliénation mentale à la suite des couches, pendant et après l'allaitement. SÉDILLOT recueil périod. de la soc. de méd. de Paris T. 62 (Série 2. T. 1) p. 137. 145. 148. et HUVELAND's Journ. der pr. Heilk. 1820. Mai. p. 110.* GOOCH in *Medical transactions. Vol. 6. 1820. et OMODEI annali universali di medicina. Vol. 24. 1822. p. 118.* OOSTERLOO diss. de mania puerperali. Götting. 1822. BERNDT *Bemerkungen über die Natur und Behandlung der mania puerperalis u. von dem Gebrauche des Kampfers in derselben mit Beyfügung einiger Krankengeschichten. HUVELAND l. c. 1828. Novembr. p. 1. BARTH ein*

reditariis ¹²⁾ et congenitis ¹¹⁾, affectionibus glandularum ¹⁴⁾, temperamentis corporisque constitutionibus ¹⁵⁾, educatione ¹⁶⁾, animi cultura ¹⁷⁾,
 imagi-

Fall von plötzlicher nach Entbindung entstandener mania transitoria. HENKE Zeitschrift für die gerichtl. Arzneywissenschaft. 8. Jahrg. 1828. Heft 1. No. 7.

11) PERFECT l. c. obs. 20. 21. 35. 44. PINEL l. c. p. 51.

12) GREYING l. c. No. 6. PERFECT l. c. No. 42. 51. 65. 64. 75. 76. 77. 95. 100. 101. 104. 105. Exemplum maniae per tres generationes in solis individuis sexus feminet propagatae habeo. ESQUIROL Dict. p. 189. Della pazzia. cap. 1. Tavol. 7.

13) ESQUIROL Dict. p. 190.

14) SCHENK obs. lib. I. No. 262. Magnus pars maniacorum, quorum curam suscepi, in prima juventute tumoribus glandularum, praesertim circa collum subjecta erat.

15) Temperamentum quodeunque, ejus character fortiter expressus est, in primis si cum constitutione corporis illud suffulciente cohaereat, quandam ad manias designat dispositionem. Sic temperamentum sanguineum in hominibus plethoricia et robustis, ad maniam saevientem, — temperamentum cholericum in hominibus parum sensibilibus ad fatuitatem etc. disponere solent. Observante PINELIO (l. c. p. 141), qui crinibus fulvis instructi sunt (*blondins*), ad M. fatuam (*dementiam Pinelii*), qui castaneis (*châtains*), ad manias suaviter decurrentes; et qui (potissimum inter mares) crinibus nigris, ad M. saevientem inclinant. Cfr. ESQUIROL Dict. p. 175.

16) Homines ingenio mediocri, animi pathematibus modicis et inclinationibus sanis instructi, et singulis facultatibus cum animi tum corporis harmoniam exhi-

imaginatione ardente¹⁸⁾, habitu animi¹⁹⁾, vitae ratione²⁰⁾, attentione constanter uni eidemque objecto addicta²¹⁾, muneribus et officiis²²⁾.

2. Caus-

bentibus quæcumque sub educatione plus minus prosperare solent. Non ita homines in una alteraque animi aut corporis facultate sive excellentes, sive deficientes. Illic enim quoties in educatione committitur error, quo dispositio eminens, vel deficiens non reprimitur vel excitatur; toties mania sternitur vis. Si imaginatio exeat, fabulas aniles de spectris maximum afferunt damnum.

- 17) Barbaros maniae vix subjectos esse constat ex KANTIO (*Samml. einiger bisher unbekannt gebliebener (kantischer) Schriften, herausgeg. v. RINK. Königsb. 1800. p. 50*) et COX (l. c. p. VIII), ESQUIROL (*Dict. p. 179*) et MADDEN *travels in Turkey, Egypt, Nubia etc. in the year 1824—27. Lond. 1829. Cfr. HUFELAND's Journ. der pr. Heilk. 1830. Mai. p. 121.*
- 18) HAUTIN ergo melancholia imaginationis effectus. Paris. 1610. PROBST de phantasia ejusque per melancholiam affectione. Berol. 1654. MURATORI *della forza della fantasia umana. Venezia 1745. Parma 1770.*
- 19) Inclinationes depravatae tum physicae tum morales, nisi frenum iis mature injiciatur, ad potiores causas praedisponentes maniarum spectant. Loquor de crapula, pie, luxuria, nec non de philautia, superbis, vanitate, ostentatione, dissidentia, avaritie, feritate, credulitate, loquacitate, timiditate, iracundiis etc.
- 20) Vita irregularis, quæ *ultima societatis classis*, praecipue in urbibus majoribus crapulam inter et rixas ducit, valde potius ad manias praedisponit. Idem apud homines ordinis superioris efficit consuetudo pastum sine regula sumendi, horis indeterminatis somno pra-

Excitan-
tes.2. *Causis excitantibus* adnumerantur: mor-

sus

sertim diurno indulgendi, per integras noctes vigilandi, lusui chartarum, lectioni librorum imaginationem exaltantium, obscenorum vacandi, et similia. Periculosus quoque est transitus e vita activa ad passivam. *ESQUIROL Dict. p. 180—182. Della pazzia, cap. 1. Tavol. 5.*

21) Cox l. c. p. 17. *ESQUIROL l. c. p. 176.*

22) Munera et officia, quae imaginationem intendunt, evidenter manias viam sternere solent. Mirum hinc non est, si gyrgsthi maxima ex parte sacerdotibus, pictoribus, sculptoribus, musicis, poetis etc. repleantur; sique status militaris, utpote honoris sensu, qui saepe nimis laeditur, ductus, permulta maniarum exempla offerat. De quo argumento legantur: *ESQUIROL Dict. p. 177—178. FALRET recherches statistiques dans le département de la Seine, depuis 1801 jusqu'en 1. Janvier 1828 sur le nombre des aliénés, et depuis 1813 jusqu'à la même époque sur les causes physiques et morales des maladies mentales, suivies de la statistique des suicides et des morts subites dans le département de la Seine, depuis 1794 jusqu'en 1824 inclusivement. Vide Auszüge der Parisischen heilk. Statistik in GERSON'S Magaz. der aul. Literat. der gesamm. Heilk. 1827. Nov. Decembr. p. 406. C. VAISSE des causes physiques et morales des maladies mentales et de quelques autres affections nerveuses, tel que l'hystérie, la nymphomanie et le satyriasis. Paris 1826. CHABROL recherches statistiques sur la ville de Paris et le département de la Seine etc. (Articulus hujus operis manias respiciens legitur ex Journal des débats in Allgemeine Zeitung 1826 Beilage No. 336. p. 1318).*

sus conscientiae ²³⁾, vota temeraria ²⁴⁾, tentationes ²⁵⁾, fanaticismus ²⁶⁾, revolutiones politicae ²⁷⁾,
fortu-

23) Felicissima vitae humanae momenta, modo illicito empti, morsu conscientiae venenantur. Poena ista aeterna aequae ac atrocissimae victoriarum et criminum praecipue melancholicis animum porrigit. Religio christiana, et, ut reor, maxime Catholica Romana, fragilitatis generis humani prae alia memor, poenitentis manus auxillares tendit, paceque divina animum sincerum perfundit. Quoties igitur ea contrarie agere videtur, id solum administris, genio religionis non imbutis, vel peccatorum imbecillitati tribuendum. Loquor de sermonibus sacris et confessione utpote maniarum causas excitante. Cfr. PINEL (l. c. p. 43) de sic dictis matrimonii republicanis disserens, et COX (l. c. p. 27) de aliis exercitiis religiosis.

24) Vota in aetate adeo tenera aliquando emittuntur, ut, mutata serius corporis compagine, nonnisi cum valetudinis detrimento sustineri possint. Nil vero magis inde laeditur, quam animi facultates, qua de se legatur PINEL l. c. p. 31.

25) Conflictus inter inclinationes physicas pathemataque animi, ac observantiam officiorum religiosorum civiorumque, dispositos haud raro ad manias impellit, unde MACHIAVELLI vere asserit: felicitatem hominum potissimum ex eo detrimentum capere, quod ipsi neque plane honesti, neque plane depravati esse sciant.

26) PERFECT l. c. obs. 23. 38. 59. 66. 67. 68. 69 — 71. 92. JUSTI *Elisabeth die Heilige, Landgräfin v. Thüringen. Zürich 1797.* BRISSOT *Reisen durch die nordamerikanischen Staaten.* 2. B. p. 245. M. HUDTWALCKER *über den Einfluss des sogenannten Mysticismus und der religiösen Schwärmeriey auf das Ueberhandnehmen der Geistes-*

fortuna ²⁸), gaudium ²⁹), recordatio temporum
felicitium ³⁰), spes frustrata ³¹), lusus ³²), infortu-
nia ³³),

*krankheiten und des Selbstmordes, besonders in Ham-
burg. Hamb. 1827. Inter 50,000 Quakers, quos Bri-
tannia complectitur, ann. 1803, quinquaginta maniaci
numerabantur. V. op. meum Reise nach Paris, Lon-
don etc. 2. Th. p. 181. Bibliorum lectio, testante Cox
(l. c. p. 73), locum hic meretur, quae, si in manus
hominum veniat, qui verbum Dei interpretari ne-
queunt, non solum sectis sine numero, sed aliquando
et mentis alienationi animum necessario porrigere debet.
Intellexit id jam dudum St. Ecclesia Romana, Biblio-
rum lectionum iis tantum permittendo, qui eam intelli-
gere valent (Cfr. Regula quarta praefixa Indici ex decreto
concil. Trident. peracto et BELLARMINUS de verbo Dei,
lib. II. c. 15 et 16). Quid igitur de *mania biblica*, no-
stris temporibus grassante, cogitandum erit?*

27) ESQUIROL l. c. p. 182 — 183, habita simul ratione
depravationis morum.

28) Forte id nemo crederet, cum aevo nostro plebejos sine
apertis maniae indiciis, thronum ascendisse viderimus.

29) Duo maniae exempla inde enarrat BURROW'S *com-
ment.* etc.

30) — *Nessun maggior dolore,
Che ricordarsi del tempo felice
Nella miseria.*

— DANTE,

31) Spes, gaudii anticipati species, unius imaginationis
soboles, inprimis si pro objecto superbiam aut vani-
tatem agnoscat, ac frustretur, saepe saepius maniam,
praesertim chimaeam, excitat.

32) Nec excepta *die Lotterie*, monente ERHARD in WAG-
NERS *Beiträge*. 1. B. p. 122.

nia³³⁾, amor³⁴⁾, zelotypia³⁵⁾, res matrimoniales et domesticae male incedentes³⁶⁾, fastus³⁷⁾, pudor³⁸⁾, timor³⁹⁾, terror⁴⁰⁾, ira⁴¹⁾, verbo animi

33) Ut incendia, naufragia, bella, rapinae, ruinae rei familiaris etc., quibus *Irus* fit subito, qui modo *Groesus* erat. Cfr. PERFECT l. c. p. 1.

34) CARL. AURELIAN. p. 326. BARTHOLINUS l. c. cent. II. No. 69. RIEDLIN l. c. 1700. ann. p. 375. SENAK obs. lib. I. No. 268. LANXONI Miscell. acad. nat. cur. dec. II, a. 10. 1691. p. 219. aliique multi, ut infra dicam, non indiscreuitim admittendi.

35) PLATER obs. lib. I. p. 83. MEYER in HUYSLAND's Journ. der pr. Heilk. 19. B. 2. St. p. 60. PINEL l. c. p. 48.

36) PERFECT l. c. p. 6. G. ROUX *histoire d'un idiotisme, produit par des affections morales*. SEDILLOZ rec. périod. de la soc. de médec. de Paris. T. 54. p. 312. T. 57. p. 421.

37) J. G. HOFER de mania haereditaria incurabili a fastu. Miscell. acad. nat. cur. cent. 5 et 6. p. 329. S. SCHULTZ de amentia melancholica ex fastu orta singularia aliquot exempla, cum addendis G. DETMARDING. Ibid. dec. I. a. 3. 1672. p. 284. dec. III. a. 7 et 8. 1699 et 1700. append. p. 75.

38) RIEDLIN l. c. p. 885. Puella innocens, furtim in lupanarium introdueta insanivit, referente PINEL l. c. p. 27. Aliae virgines prima matrimonii nocte insanire evaserunt. ESQUIROL Dict. p. 191.

39) *Timor imminuentis maniae periculi peculiari attentione dignus est. Excruciantur eo potissimum homines, quorum in familiis diu hujus morbi exempla occurrunt, nec fors a veritate valde alienum foret contendere, timorem istum quandoque plus ipsa hereditaria dispositione efficere.*

animi pathemata ⁴²), studia ⁴³), res imaginatio-
nem ferientes ⁴⁴), vigiliae ⁴⁵), motus nimius ⁴⁶),
quies ⁴⁷),

40) G. T. DÜRR conditura cadaveris et subsequens ma-
nia. Miscell. acad. nat. cur. dec. II. a. 8. 1689. p. 422.
S. LEBEL de amentia a terrore. Ibid. dec. III. a. 9
et 10. 1701—1705. p. 131. D. CRÜGER de melanco-
lia et febre intermittente ex terrore. Ibid. dec. III.
a. 2. 1694. p. 308. Cfr. PLATER l. c. p. 57. FARD.
HOFFMANN consult. cent. I. N. 37. PINEL l. c. p. 185.
Filius praefecti Lutetiae Parisiorum B*** ex adape-
ctu patris a *Guillotine* obtruncati, maniacum redditum
ipse Vienna curavi. Judaeae Polonicae adatiti, quae
in speculo sese intuens, proprium patrem nudum re-
tro, linguam ludibrii gratia exserentem, cum conspe-
xerit, adeo terrefacta est, ut in melancholiam incide-
ret. Quales tristes effectus ludibria hujus generis pro-
ducere possint, et exemplum in egregio diario politi-
co: *Der österreich. Beobachter* 1816. No. 40, enarra-
tum probat.

41) Csp. XX. §. LXXXVII. 2. GALEN. 6. aphor. 23.
Jam *Ajax*, cum arma *Achillis* obtinere non potuerit,
prae ira maniacus evasit.

42) CH. LAURE *dey verschiedena casus practici. Samml.
der med. Societät in Budissin.* p. 268. ESQUIROL *des
passions considérées comme causes, symptômes, at
moyens curatifs de l'aliénation mentale.* Paris 1805.
Della pazzia. cap. 1. Tavol. 6.

43) ARISTOTELES (probl. I. §. 30) melancholiam, pro
morbo viros celebratae eruditionis et judicii decla-
ravit. v. SMETIUS miscellan. p. 548. HOFFMANN de
delirio melancholico. Obs. 8. opp. III. p. 267. PER-
RECT l. c. No. 10. 94.

44) E. c. Phantasmagoria, femina invisibilis. ESQUIROL

quies ⁴⁷⁾, fames ⁴⁸⁾, crapula ⁴⁹⁾, sanguinis jactura ⁵⁰⁾, ebrietas ⁵¹⁾, effluvia carbonum ⁵²⁾, calor ⁵³⁾,

G g g 2 inso-

l. c. p. 177. nec spectacula theatralia excludenda. *ibid.* p. 229.

45) Dum scilicet mens passionum procellis concussa, objecta diu noctuque, nulla corpori concessa requie, animo versat. Cfr. CARL. AURELIAN. p. 326.

46) TIMAEUS lib. I. c. 8.

47) REIL l. c. p. 84. 403. PINEL l. c. p. 32. 33.

48) BORELLI cent. III. obs. 18. SANTACRUZ l. c. p. 39.

49) *Démence causée par une indigestion. Cas observé par Mr. J. DE SOUSA FERRAS in Mem. de mathemat. e phisica da acad. das scienc. de Lisboa. Vol. 2. Suppl. p. 21.*

50) G. CH. WINKLER de insania a venae sub lingua sectione cum addendis G. DETHARDINO. *Ephem. acad. nat. cur. cent. 1 et 2. p. 190.* De epilepsia et insania a venae-sectione sub lingua, cum addendis ROS. LENTILII. *Miscell. acad. nat. cur. dec. I. a. 6 et 7. 1675 et 1676. p. 135, dec. III. a. 7 et 8. 1699. append. p. 134.* P. ROMMEL loquelae, memoriae et rationis imbecillitas a venae-sectione. *Ibid. dec. II. a. 8. 1686. p. 280.* Plurimi etiam transfusioni sanguinis Parisiis subjecti, insaniverunt, unde haec operatio jussu Parliamenti prohibita fuit. v. DIONIS *cours des opérations de chirurgie. p. 498.*

51) CARL. AURELIAN. p. 326. J. GRÜNEL de mania ex spiritus vini juniperini, ejusque olei abusu nimio. *Miscell. acad. nat. curios. dec. III. a. 4. 1696. p. 202.* J. M. VENDRIES de mania a vini abusu. *Ephem. acad. nat. cur. cent. 3 et 4. p. 225.* F. H. CLAUDER stupiditas a spiritus vini potu. *Miscell. acad. nat. cur. dec. II. a. 8. 1689. p. 542.* PERFECT l. c. No. 17. 56. 61.

insolatio ⁵⁴), forte luna ⁵⁵), frigus ⁵⁶), sudor oppressus ⁵⁷), castitas ⁵⁸), onania et coitus ⁵⁹), partus ⁶⁰),

Cox p. 160. op. origin. (Prolem saltem ebriosorum maniae subjectam esse contendit). Cfr. J. M. STATION in *The Philadelphia journ. of the medical and physical sciences*. By CHAPMAN Vol. 4, 1822.

52) ESQUIROL *della pazzia. cap. 1. sez. 2.*

53) P. A. MICHELOTTI *observation sur une folie causée par la chaleur et les excès des liqueurs spiritueuses, guérie par des fréquentes saignées et des bains à la glace. Mém. de Paris a. 1734. hist. 41.*

54) BOERHAAVE *prax. med. Vol. V. p. 51. LORRY op. c. 2. B. p. 80. BATTIE l. c. p. 47.*

55) *De l'influence des nuits sur les maladies. Bruxelles 1806. p. 231. PARKMAN l. c. Hoc saltem certe scio, tempora plenilunii maniacos fere sine exceptione inquietiores fieri.*

56) BORELLUS *cent. II. obs. 13. Milites exercitus Napoleonis, hieme ann. 1812. Vilnam reduces, crebro insaniverunt, vel saltem tali fatuitate laborabant, ut centum eorum coram uno alterove Kosak, arma projicerent; quod tamen non a solo frigore derivari debet. Cfr. BIEHNITZ apud ESQUIROL Dict. p. 165.*

57) LENTILIUS *miscell. T. I. p. 36. PERFECT l. c. No. 24. 25 (Imperium constitutionis catarrhalis in manias patefaciens).*

58) Eph. nat. cur. dec. I. ann. 2. obs. 151. WARLIZ *de morb. bibl. p. 363. PLATON (prax. med. lib. I. c. 3) de nobili femina alioquin honesta narrat, quae, ob morbum mariti diuturnum caste vivens, adeo insanivit, ut tam homines quam canes ad congressum verba gestibusque turpissimis invitare non erubesceret. PANAROLLI (Pent. c. 3) de muliere refert, semper*

tus ⁶⁰), lochiorum defectus ⁶¹), metastasis lactea ⁶²), ipsa denique lactatio ⁶³), vitia abdominalia ⁶⁴), inpri-

extra graviditatis tempus libidinosissima et quaevis fomenta lasciviae impudicissime quaerente, donec utero gerebat, per illud enim tempus exemplar pudoris et prudentiae erat.

59) SCHENK obs. lib. III. No. 263. ESQUIROZ l. c. p. 179.

60) Ueber die Einwirkung des Wehendrangs auf das Seelenorgan. NIEMEYER Zeitschrift für Geburtshülfe und pr. Medic. B. 1. St. 1. p. 158.

61) W. TH. RAU de lochiorum defectu plenario in quinque puerperis, tandem in maniam cum furore desinente. Act. acad. nat. cur. Vol. 9. p. 161.

62) DÜRR in HUFELAND's Journ. der pr. Heilk. 25. B. 2. St. p. 31. CHRISTIEN in Samml. auserl. Abhandl. für pr. Aerzte. 22. B. 1. St. p. 48.

63) STREHMANN Seelenstörung mit der Milchabsonderung in ursächlicher Verbindung stehend. HORN's Archiv f. med. Erfahr. 1824. July, Aug. p. 1 (casus secundus).

64) Auszüge aus dem Tagebuche eines ausübenden Arztes. 2. Samml. No. 10. Num observationes A. L. J. BAYLE (sur l'influence des phlegmasies gastro-intestinales chroniques, dans la production des maladies mentales, et sur celle des maladies mentales dans la production de ces phlegmasies. Revue médicale 1827. Août, Novembre) solum, ut suspicor, mori diei, et non, ut malim, experientiae superstructae sint, tempus docebit. Ut ut sit, quid vitia abdominalia in mania, et praesertim in melancholia, excitanda valeant, jam dudum notum est, atque nuper ab ANNEXLY (researches into the causes, nature and treatment of the more prevalent diseases of India and of warm climates generally, Vol. 2. Lond. 1828) comprobatum.

inprimis bilis ⁶⁵), flatus ⁶⁶), vermes ⁶⁷), intestini coli transversi situs abnormis ⁶⁸), morbi praegressi,

65) RIEDLIN obs. cent. III. No. 95. FORESTUS lib. X. obs. 21. 23. BALDINGER n. *Magaz.* 9. B. p. 83. Plurice rejecta vel pauca sed atra bile, paroxysmum maniae saevientis fractum vidi.

66) FIENUS de flatibus. c. 20.

67) CH. F. PAULLINI mania a vermibus. *Miscell. acad. nat. cur.* dec. II. a. 5. 1686. append. p. 77. FR. MOLLER a lumbricis horrenda symptomata. *Ibid.* dec. II. a. 5. 1686. p. 41. GIRANDY *observations sur les maladies vermineuses*, obs. 2 et 3. SEDILLOT *recueil périod. de la soc. de méd. de Paris* T. 21. p. 149. REVOLAT *observations relatives à la variété des symptômes et à la complication de l'affection vermineuse avec différentes maladies*. Obs. 1. *Annales de médecine, de la soc. de méd. pratique de Montpellier*. T. 4. P. I. p. 288. VOGL *Beobachtungen*. No. 20. THUSSING *Waarnemingen*. No. 24. s. PERFECT l. c. obs. 53. LENTIN memorabil. p. 138. In judaica Lithuania ascarides saepe delirium saeviens et tæniæ melancholiam produxisse vidi.

68) ESQUIROL loco supra (§. CVII. 3 (114)) citato. Quam ceterum maniae jactatam causam jure in dubium vocavit KRIMMER (*sankrechte Lage des Queerdarmes ohne Wahnsinn* in HUFELAND's *Journ. der pr. Heilk.* 1821. Junius. p. 29) ad observationes provocans (apud MORGAGNI de sedib. et caus. morb. T. II. Epiat. IV. 16. XVII. 35. ROTH *pathologia intestini Coloni*. Erlang. 1803. p. 14. SOEMMERRING *Anmerk. zu BAILLE's Anat. des krankhaft. Baues* No. 36. p. 124. HENNING in HUFELAND's *Journ.* c. B. 8. St. 4.

gressi, ut febres intermittentes ⁶⁹), continuæ ⁷⁰), coryza ⁷¹), encephalitis ⁷²), apoplexia ⁷³), phthisis pulmonalis ⁷⁴), dentitio difficilis ⁷⁵), colica ⁷⁶), dysenteria cohibita ⁷⁷), erysipelas ⁷⁸), exanthemata ⁷⁹), impetigines ⁸⁰) retropulsa, hæmorrhagiæ consue-

VOIGT *Handb. der pathol. Anatom.* B. 2. p. 627) ubi situs intestini illius abnormis sine mania notatus est.

69) SYDENHAM *obs. med. sect. I. c. 5* (post quartanam).

HAGENDORN *cent. I. obs. 37.* BALDINGER *l. c. 10.*

B. p. 76. PERFECT *l. c. No. 51* (Aliae intermittentes).

COLLIN *ann. med. III. p. 78.*

70) FORESTUS *lib. IV. obs. 27.* MUZZELL *lib. I. cas. 9.*

RUDOLPHI *schwed. Annalen. 1. Heft. p. 62.*

71) J. G. VOLCKAMER ex obstructione narum. melancholia. *Miscell. acad. nat. cur. dec. II. a. 5. 1686.*

p. 310.

72) Cap. III. §. XVII. 4. 73) Cap. V. §. XXVIII. 6.

74) CASTEL *exemple de manie, dépendante d'une affection chronique des poumons, et réflexions sur les causes prochaines de la manie.* SEDILLOT *rec. périod. de la soc. de méd. de Paris. T. 56. p. 54.*

75) PERFECT *l. c. p. 213.* PINEL *l. c. p. 71.*

76) FABR. HILDANUS *cent. IV. obs. 8.* BURGER in

HORN'S *Archiv. 2. B. p. 348.* PERFECT *l. c. No. 96.*

77) BIRNSTIEL *über die Ruhr. p. 218.* HORN'S *Archiv.*

3. B. 1. *Heft. p. 38.*

78) PERFECT *l. c. No. 84.*

79) G. CH. WINCKLER de mania post variolas. *Miscell.*

acad. nat. cur. dec. I. ann. 6 et 7. obs. 93. LENTIN *Beobacht. p. 105.*

80) C. CH. ECKNER de morbo melancholico, quem liehen in capite et facie primum obortus, deinde vero ad encephali nobiliores partes retrogressus, produxit, feli-

consuetae retentae ⁸¹⁾, pellagra ⁸²⁾, plica rescissa ⁸³⁾, ulcera praepostere sanata ⁸⁴⁾, violentiae capiti

citer sanato. Nov. act. acad. nat. cur. T. 8. p. 108. V. SCHAD de foemina ex scabie in melancholiam desperatam incidente, lochiorum fluxu curata. Miscell. acad. nat. cur. dec. II. s. 2. 1683. p. 417. PERFECT l. c. No. 27. 85. THULENIUS *med. chir. Bemerkung.* p. 236. ODIER *manuel de mid. pratiq.* p. 184. HUFELAND's *Journ. der pr. Heilk.* 15. B. 2. St. p. 58. 26. B. 4. St. p. 110. SIBBERN in Coll. soc. med. Havn. Vol. I. No. 11.

81) Ex epistaxi habituali suppressa maniam melancholicam ann. 1815. in clinico curavi. Eodem circiter tempore juvenem vidi, qui vix suppressâ epistaxi, cui ariarium polypus, feliciter operatus, anam porreixerat, melancholicus redditus est; nisi forte hic excrecentia polyposa radicem in ipso encephalo habuerit, sicuti apud cl. SCHAEFFERUM contigisse lego (HUFELAND's *Journ. der pr. Heilk.* 1816. Jun. p. 19—22). Quantum haemorrhoidum suppressio in manias excitandas influat, praeter copiosas proprias observationes, facta a BANGIO (l. c. p. 23), PERFECT (l. c. No. 3. 43. 79. 80) aliisque collecta, docent. Neo lochiorum et menstruum suppressio, semper ut causa solum praedisponens agit.

82) S. LIBERALI *lettera sulla natura flogistica (?) della mania pellagrosa.* OMODEI *annali universali di medicina fasc.* 132. 137. Edit. 2. P. I. Vol. III. sect. II. cap. de Pellagra.

83) Ibid. Cap. de Plica. G. CH. S. AB HARTENFELD de mania ex plica Polonica abscissa lethali. *Ephem. acad. nat. cur. cent.* 1 et 2. p. 102.

84) AMATUS LUSITANUS cent. II. cur. 67. FORESTUS lib. X. obs. 24. PERFECT l. c. No. 38. 68. 83. 282.

capiti illatae ⁸⁵), vulnera manus ⁸⁶), insecta ⁸⁷), convalescentia ⁸⁸), pharmaca ⁸⁹), philtrea ⁹⁰), magneti-

85) CARL. AURELIAN. p. 326. HAGENBORN cent. I. obs.

86. FR. ORTLOF perpetuae infentiae ex lapsu in caput notabile exemplum. Miscell. acad. nat. cur. dec. I. e. 4 et 5. 1673 et 1674. p. 268. J. LANZONI mania ex

vulnere capitis curata. Acta acad. nat. cur. Vol. I. p.

85. WILLICH in BALDINGER's *W. Magazin*. 10. B.

p. 107. Multiplici experientia edoctus sum, violentias

externas capiti infensas, haud vero primam sistere ma-

niarum originem. Sic curam judaeae viginti quatuor

ennorum habui, e biennio mania fatua laborantis.

Nulle ecussa detegi potuerat; — quo primum autem

de lapsu, contusione quaestionem institui, illico lux

effulsit. Retulerunt nempe, aegram anno aetatis deci-

mo reuersum super cepit cecidisse; et ab eo momento

continuo de cephalaea, intercurrente vomitu conque-

stam esse, circa apparitionem mensesuorum solitudi-

nem quaesivisse, et tandem absoluto primo pertu usum

rationis amisisse. Cfr. ESQUIROL *Diet.* p. 190.

86) RIEDLIN de deapientia ex fua parte manus dextrae

infixa, ejusque curatione. Miscell. acad. nat. cur. dec.

III. a. 2. 1694. p. 260.

87) BOERHAAVE (de morb. nerv. Vol. II) docet, insecte

in auribus nidulante, cum maniis eliquendo nexum

habere.

88) SYDENHAM opusc. p. 100. 122. WENDELSTADT

Wahrnehmungen 1. B. p. 35. Cfr. Edit. 2. P. I. Vol.

I. sect. II. cap. V. §. XXXII.

89) G. FR. FRANCUS A FRANKENAU de mania gravi et

immodica, daturae semina exhibitione. Miscell. acad.

nat. cur. dec. III. a. 3. 1695 et 1696. p. 302. M. B.

VALENTINI mania ab esu belledonnae pro myrtillis.

ibid. dec. II. e. 1691. p. 213.

gnetismus animalis ⁹¹⁾ et consuetudo cum maniacis ⁹²⁾.

Proxima. 3. *Causa proxima* morborum ubique obscura, hic obscurissima. Quaerebatur in vitiosa dispositione spirituum vaporibus melancholicis inquinatorum ⁹³⁾; — in spirituum animalium opaca, crassa et tenebricosa dispositione cum depravatione phantasmatum ⁹⁴⁾; — in spiritu vitae veneno mercurii infecto ⁹⁵⁾; — in luna lumine vacua, saturno conjuncta, imprimis in horoscopo ⁹⁶⁾; — in inflexu diaboli ⁹⁷⁾; — in fervida et ignea spirituum animalium qualitate ⁹⁸⁾; — in aquarum cerebra-

90) STALPANT VAN DER WIEL obs. rar. cent. post. part. pr. obs. 19. WEDEL phys. med. sect. 3. c. 29. §. 2. FRIDERICI de mania ex philtro. Jen. 1670.

91) In nonnullis aatem, dixerim ex officio, *clairvoyantes*, cum ex tripode quasi vaticinentur, ac ab aegrotis consilii gratia adeantur, evidentia vesaniarum signa percipere credo.

92) REIZ *Fischerl.* l. c. p. 410. MICHAELIS (*med. pr. Bibl.* 1. B. 1. *St. Anhang*) de mania ex maniaci intuitu orta narrat. In plurimis gyrgathis custodes vix ab aegrotis distinguere potui; et imprimis chirurgus, in gyrgatho Vindobonensi quondam residens, habitum et gestus maniacorum induerat. Cfr. *Esquirol Dict.* p. 187.

93) ARISTOTELES L. de insomniis. c. 3.

94) GALEN. III. de loc. affect.

95) PARACELUS T. I. c. 5. 96) Astrologorum secta.

97) V. WIENUS cap. 25. lib. IV. c. 9. 10 et seq. lib. III. De lamiis.

98) SENNERTUS in institut. et prax. libr.

rebralium nimia elasticitate ⁹⁹); — in plethora cerebri ¹⁰⁰); — in sthenia ¹⁰¹), et maxime in peculiari exaltatione nervosa ¹⁰²). Ad nos quod spectat, rejectis quibuscunque hypothesebus circa intimam morbi naturam ¹⁰³), id solum contendimus: *manias sistere genus morborum a reliquis morbis cerebri haud omnino diversum*. Rem ita se habere probat maniarum frequens origo ex encephalitiide, apoplexia, probat societas quam saepe cum epilepsia, paralyti aliisque morbis eadem ineunt, probat communis maniarum in alios morbos transitus, ne alia argumenta ex sequenti paragrapho elucetia anticipemus. Demonstrabimus enim, manias ex iisdem conditionibus morboris pullulare, quae aliis aegritudinibus ansam porrigunt. Qua in re si triumphabimus, opinio absurda ac religioni et morali aequae adversa, *quae manias ex morbosa animae ipsius conditione derivat* ¹⁰⁴), sponte corruet.

Intel-

99) ERHART in HUZELAND's Journ. der pr. Heilk. 14. B. 2. St. p. 85.

100) COX l. c. p. 20 et 36. 101) Elem. med. BRUXONIS.

102) PINEL l. c. p. 155.

103) DON PEDRO GARCIA BRISO del mecanismo, como se causa la mania. Memor. acad. de la R. Soc. de Sevilla. T. 3. p. 361. DE BEAUSOBNE réflexions sur la nature et les causes de la folie. Mém. de Berlin 1759. 1760. AUTENRIETH diss. de natura maniac. Tüb. 1806.

104) Quisnam sequentem propositionem REILII (Rhaph. p. 9) sine indignatione perleget? „Eine Faser im Gehirn erschläft, und der in uns wohnende Götterfunk-

Intelligetur enim, in maniis solum *instrumenta*, quibus anima ad actionem suam in corpus exercendam utitur, labefactata esse. Quo posito, doctrina maniarum, vestem, quâ eam nonnulli inter recentiores induerunt ¹⁰⁵), deponet, ac in sphaeram

• ist zu einem Feen - Märchen geworden.“ Nec meliora docuit BROUSSAIS (op. c.) quem pulchre ad ordinem revocavit J. J. VINET: *Examen de la doctrine médico-philosophique du matérialisme. Revue médicale* Decembr. 1828. p. 465. Mars 1829. p. 421 („Etrange contraste! ceux qui, rendant l'homme une pure machine matérielle asservis à la fatalité, immolent notre libre arbitre et enchaînent l'esprit dans le jeu automatique de son organisme, ceux-là se vantent de nous offrir de tout préjugé et de toute erreur. Quiconque au contraire atteste la conscience universelle du genre humain, et tout ce qui nous relève à la liberté, à l'héroïsme de la vertu, à la dignité morale de notre nature, celui ne serait que fanatique ou superstitieux adorateur de chimères!“)

105) Benigne lector! Pervolve PINELLI de maniis opus, detrahe casus nonnullos practicos, quos in curriculo hujus operis grato cum animo in usum duxi, et dic dein, si quod reliquum est, non magis cum fabulis milesiis, quam cum opere medico conveniat? Nimirum omnia inordinate PINELLUS scribens, basin rerum medicarum, anatomiam scilicet pathologicam, plane neglexit, aetiologiam physicam vix per transennam tetigit, ac materiae medicae infamiae fere notam inuasit. Adde contemptum, quo de plerisque antecessoribus suis loquitur, adde silentium, quo classicum de maniis scriptorem LONAX praeterit, adde jactantiam, qua se veluti in fundatorem doctrinae maniarum eri-

ram aliorum morborum modeste redibit, et quidem cum evidenti aegrorum lucro ¹⁰⁶⁾.

§. CIX.

Diagnosis.

1. Limites, qui sanitatem ¹⁾ ipsamque sapientiam a stultitia separant, interdum adeo inter se confluent, ut arduum evadat, eos rite determinare. Nisi tamen determinantur, in periculum, civibus gravissimas injurias inferendi, continuo incurrimus. Si videlicet in *diagnosi maniae* erres, praeter mala omni in morbo hac sub rerum positione expectanda, alia adhuc, prorsus peculiararia praesto sunt. Dum enim hominem praepostere pro maniaco declaras, si ille maniam, ut vel poenas, vel carceres, vel aliud periculum effugere pos-

gere conatur etc. et iudicium meum haud nimis invenies severum.

106) COXUS (l. c. p. 79) jam monuit, neglectum curae materialis, et tentamen directe in animam agendi, felici praxi in manibus obstare. Ac re quidem vera, nisi risum, misericordiam ismen conatus eorum, qui manias solo regimine psychico debellare student, ad lectos aegrorum excitant, ac simplices barbitonsores felicius hic quandoque per venae sectiones, emetica etc. infedunt, quam isti medici pseudo-philosophi chimaeis debellandis intenti, ac res obvias praetervehentes.

1) G. PARKMAN *analogie entre la santé et la folie*. Ex *London medical and physical journal* No. 234. in SEDILLON *rec. périod. de la soc. de méd. de Paris*, T. 64 (serie 2. T. 3). p. 376.

possit, *simulaverit* ²⁾, leges defraudas et securitatem publicam periculo exponis; sin non, miserum privilegiis, quot quot sunt, civicis et libertate privabis, ac malorum ejus innumerabilium eris auctor. Contra ea si hominem de mania suspectum, vel ob id, quod morbum cum astutia *abscondere* sciat, vel quod obiter eum examinaveris, ut sanum absolvas, injuriis gravibus, quas aeger aut sibi aut aliis inferre poterit, tua onerabitur conscientia.

M. periodica.

2. Nullibi vero periculum in diagnosi maniarum errandi majus est, quam ubi in *lucidum intervallum maniae periodicae* incidimus. Hic enim aeger, ratione aliquando omnino gaudens, attamen eodem jure pro maniaco declaratur, quo ille, qui sub stadio apyrexiae febris intermittens versatur, febre nihilominus laborare dicitur, aut epilepsiae obnoxius etiam extra paroxysmum pro epileptico habetur. Atque hic non de illa *mania periodica* loquimur, quae e febre intermittente larvata pullulat, sed de alia, cum hac nil commune habente et chronice, sub formis variis, praecipue autem sub ea maniae saevientis, per *paroxysmos*,

- 2) J. B. MÖLLING mutitas ex melancholia vel simulata rustici 12 annorum. Ephem. acad. nat. cur. cent. 9 et 10. p. 334. ALBERTI diss. de melancholia vera et simulata. Hal. 1743. Ueber verstellte Krankheiten in FROBIEP's Notizen aus dem Gebiete der Natur- und Heilk. B. 22. No. 9. ex H. MARSHALL hints to young medical officers of the army, on the examination of recruits respecting the feigned disabilities of soldiers.

xymsos, concessa *quiete adumbratâ*, decurrente, de qua pulcherrime scripserunt CELSUS ³⁾, LUPINIUS ⁴⁾, LANZONI ⁵⁾, DE MEZA ⁶⁾, BENEDECK ⁷⁾, GMELIN ⁸⁾ et PINEL ⁹⁾.

3. Cum alienatio mentis facile fingi possit, quaeritur, num inter reliqua maniae symptomata aliquod *pathognomonicum* invenire liceat nec ne? Maxime quidem maniis familiaria sunt: facultas conspicuum frigoris gradum sustinendi, — defectus somni, — actio muscularis aucta, — pulsus normalis, — appetitus depravatus — et vis, conspicuis emeticorum ac narcoticorum dosibus absque emesi et somno resistendi. Ast nullum ex istis symptomatibus adeo constans et maniis exclusive proprium est, ut *pathognomonicum* dici posset. Enimvero facultas frigoris sustinendi, ad id solum restringitur, quod maniaci intemperiem aëris sine querelis sustineant, non quod inde non male afficiantur ¹⁰⁾. Somnus neque in omni mania

An dentur
sympt.
patho-
gnomo-
nica?

3) Lib. XVIII. §. 1. 4) *Histor. morbor. difficil.* p. 112.

5) De insania diurna seu solari. *Miscell. acad. nat. cur.* dec. III. a. 3. 1695 et 1696. p. 36.

6) *Act. soc. reg. Hafn.* Vol. 3. p. 294.

7) De statu maniacorum in paroxysmo. *Traj.* 1762.

8) In MAUCHART *Repertor. für empir. Psychologia.* 4. B. No. 7.

9) l. c. p. 153. et: *Mémoire sur la manie périodique et intermittente.* *Bulletin de la soc. philomath.* 1798. p. 88. *Mém. de la soc. méd. d'émulation.* Ann. 5. p. 94.

10) Nosocomio Parisiensi la Salpêtrière jam dudum

nia desideratur, neque aliis in morbis constanter adest. Idem de vi musculari aucta dicendum. Pulsus in mania saeviente ob aegri agitationem cum frequentia micare solet, aliquando voluntatis imperio subjicitur ¹¹⁾, aut et lentior sano observatur. Ad appetitus depravatos quod spectat, homines visi sunt maniam simulantes, qui tamen proprias comederunt faeces ¹²⁾. Emeticorum magnae doses vel in aliis morbis cerebri, e. c. post apoplexiam, quin vomitus sequatur, perferri possunt, et, quavis raro ¹³⁾, a maniacis non semper perferuntur; quod et de narcoticis relate ad somnum dicendum. Valent interea plurima signa simul sumta, quae inter

(v. opus meum *Reise nach Paris, London* etc. 1. Th.) objeci, maniacos ibi reclusos frigori nimis expositos esse, illudque ab aegria hujusmodi non ita sustineri, ut vulgo creditur. Huic opinioni nuper PIERL (l. c. p. 62) et TURN (l. c.) accesserunt.

11) Hanc COXII observationem (l. c. p. 118), quam amplector, jam ann. 1792. confirmatam habui. Florentiis enim degens, a celebr. FALICE FONTANA ad nobilem ductus fui feminam, magna imaginatione praeditam, quaeque *solo voluntatis nisu* pulsum prius 76 vices in minuto primo micantem, ultra 100 sugere poterat.

12) Tale exemplum pater meus in incendiariorum carceribus Bruchsalensibus recluso habuit.

13) Inter ducentos circiter maniacos, quibus tartarum emeticum praescripsi, *unum* tantum numero, qui a consueta illius dosi emesin perpressus est. Reliqui tale remedium a scrupulo uno usque ad drachmas duas spatio nychthemeri, quin vomerent, sustinebant.

inter examen potestatis res sive auditas sive lectas ad verbum recitandi utpote mente alienatis denegatae ¹⁴). Et odoris transpirationis specifici in mania ratio habenda ¹⁵).

4. Priusquam ad diagnosin morbi maniae Cautelarum, suspicionem excitantis enunciandam nos accingamus, *cautelarum* sequentium memores erimus:

1. hominem suspectum diuturnae observationi subicere, 2. illum observare, dum se solum et ab inspectione immunem existimat, 3. illi opportunitatem cum extraneis utriusque sexus conversandi praebere, ac colloquiorum accurate rationem habere, 4. veniam loca publica adeundi concedere ¹⁶), 5. habitum corporis, functiones quot quot sunt, et maxime sensus, perceptiones, ideas,

memo-

14) Legitur in FROMER's Notizen aus dem Gebiete der Natur- und Heilk. B. 25. No. 10. p. 158. „In der Versammlung des College of physicians zu London lenkte am 1. July 1829 Sir Henry Hallford die Aufmerksamkeit der Versammlung auf die Stelle im Hamlet: Verführung? Mein Puls hält ordentlich wie eurer Tacht, spielt eben so gesunde Melodien; es ist kein Wahnwitz, was ich vorgebracht. Bringt mich zur Prüfung, und ich wiederhole die Sacheuch Wort für Wort, wovon der Wahnwitz abspringen würde. Nach SCHLEGEL's Uebersetzung von SHAKESPEARE.“

15) BURROWS commentaries etc.

16) Vidi plurimos, qui in gyrgathis reclusi ratione plane pollere apparebant, qui vero vix ad loca publica deducti, omnes maniae exhibebant notas.

memoriam, imaginacionem, iudicium, voluntatem, pathemata animi, appetitus etc. strictissimis iisque specialibus et repetitis tentaminibus per-
scrutari, 6. a parentibus, affinibus, institutoribus, famulis omnia colligere, quae lucem super morbos hereditarios, infantiam et pubertatem, educationem, vivendi modum, perpessa animi pathemata etc. spargere possunt et 7. cum consanguinei et familiares contra hominem insontem conjurare possint, etiam illorum adversarios et inimicos auscultare. In genere plus ad facta, quam ad verba respiciendum. Atque hic plurima alia praecepta, utpote plane ad *forum* spectantia silentio praeterimus ¹⁷⁾.

5. Di-

- 17) Adeant doctrinae curiosi ZACCHIAM quaest. med. legal. lib. II. Tit. I. quaest. 16. lib. III. T. 2. quaest. 3. Consult. No. 86. THOMASIIUM diss. de praesumpt. furoris et dementiae. Hal. 1719. HEBENSTAEITIIUM de homicida delirante ejusque criteriis et poena. Lips. 1723. CAMERARIUM diss. medicae quaedam annotationes ad THOMASIIANAM disputat. de praesumptione furoris atque dementiae. Tüb. 1730. CRELLIUM diss. de probationibus sanae mentis. Vitemb. 1737. FITSCHMANN praxis criminalis specimen de eo quod justum est in defensione inquisiti ex capite imbecillitatis mentis et quaestiones quousque excuset? Lips. 1743. ROSEUM de morbis mentis delicta excusantibus. Lips. 1774. GRUNERUM de causis melancholiae et maniae dubiis in medicina forensi caute admittendis. Jen. 1783. Progr. de fontibus melancholiae et maniae forensib. Jen. 1784. PLATNERUM Pr. quaestio medic. forens. de ament. oc-

5. Distingui solet *delirium* a *maniis* sequentibus signis ¹⁸⁾.

M. a delirio distinguenda.

Delirium.

1. Morbus est acutus.

Mania.

1. Morbus est chronicus.

H h h 2

2. Febre

culta. Lips. 1797. Pr. de melancholia senili occulta. Lips. 1806. JOHANNATONIUM *medical jurisprudence on madness*. Lond. 1800. SEILERUM diss. de exploranda dubia mentis alienatione in hominibus facinorosis. Viteb. 1805. HOFFBAUERUM *Psychologie in ihren Hauptanwendungen auf die Rechtspflege, nach d. allgemeinen Gesichtspunkten der Gesetzgebung*. Hal. 1808. Versio exstat Gallica cum notis ESQUIROL et ITARD, Paris 1827. ELVERTUM *über ärztliche Untersuchung des Gemüthszustandes*. Tab. 1810. MARIUM medic. Bemerk. über einige ältere und neuere Gesetze, besond. über einige Artikel d. Code Napoleon. Rostock 1813. PINEL *resultats d'observations pour servir de base aux rapports juridiques dans les cas d'aliénation mentale*. Mem. de la soc. méd. d'émulation, ann. 8. 1816. P. 2. p. 675. FODÉRE *traité du délire appliqué à la médecine, à la morale et à la législation*. Strasbourg 1818. R. MITTERMAIER *disquisitio de alienationibus mentis quatenus ad jus criminale spectant*. Heidelberg. 1825. GEORGE *nouvelle discussion médic. légale sur la folie ou l'aliénation mentale, suivie de l'examen de plusieurs procès criminels dans lesquels cette maladie a été alléguée comme moyen de défense*. Paris 1828. FLAMMINO *Erörterung üb. d. Frage der Zurechnungsfähigk. bei zweifelhaft. Gemüthszuständen* in HORN'S Archiv 1830. Juli, Aug. p. 604. ne dicam de compendiis medicinae forensis.

18) SWEDIAUR op. c. Vol. I. p. 545.

2. Febre stipatur.

3. Aeger neque percipit neque objecta praesentia cognoscit.

4. Ideae sunt omnes perturbatae et sine nexu.

5. Rationis usus plane deletus est.

2. Febris nulla.

3. Aeger percipit omnia et saepe cognoscit.

4. Excepto subjecto peculiari, ideae justae sunt.

5. Ratiocinium solum ob falsa praemissa erroneum videtur.

Quisne autem non videret, signa ista diagnostica valde esse ambigua? Sic in mania periodica quivis paroxysmus veluti morbus acutus decurrit; sic febris non omne absolute comitatur delirium, nec semper in maniis desideratur¹⁹⁾. Praeterea sunt aegri, qui se delirasse cognoscunt, et vaniloquium illico corrigunt. In mania chaos etiam omnes ideae perturbatae obveniunt, et contra ea extant deliria circa unum tantum objectum versantia. Postremo aegri delirantes aliquando majori quam in statu sano ingenio pollent, ac poetice plane loquuntur. Concludimus hinc inter delirium et maniam verisimiliter tantum non existere discrimen, ut scholis asserere placuit. Quo posito, in casu dubio, potius *delirii* aut *encephalitidis*²⁰⁾, nomen, ut
mitius

19) De hoc argumento legi merentur RIVERIUS lib. I. prax. med. c. 13. et A. CAMERARIUS diss. num mania sit apyretos. Tüb. 1734.

20) Non auderem exemplo BURROWS (l. c.) signa dia-

mitius resonans, terribili illi maniae (etsi epitheto *transitoriae* mitigato) praeferre solemus ²¹⁾).

6. Jam vero nos ad *diagnosin formarum maniarum* accingimus, quo opere absoluto, aditus ad indagationem *naturae* morbi, eo magis patebit.

D. formarum generatim.

7. *Maniam hypochondriacam* adesse dicimus, dum aeger vel perceptiones erroneas circa conditionem proprii corporis accipit, quas, nisi imaginatio rationem obscuraret, sensuum externorum ope facile corrigere posset, — vel perceptionibus a sensu universali interno suppeditatis attentionem exclusive impendit, ac, reliquis objectis neglectis, ad munera sua exercenda ineptus evadit. *Mania hypochondriaca*, cum melancholia evidentem alens nexum ²²⁾, a *simplici hypochondriasi* in eo differt, quod in ista aeger solum circa conditionem corporis sui *internam*, igitur circa objecta, quae aliis sensibus impervia sunt, hallucinatur; in *mania autem hypochondriaca* etiam circa conditionem corporis sui *externam*, ubi tamen perceptio erronea, ab uno sensu proficiscens, facile a reliquis sensi-

M. hypochondriaca.

gnostica inter encephalitidem et maniam tradere, ut ex No. 16. infra elucebit.

21) Displicet sane BURROWS (l. c.) maniam *acutam* stabilivisse.

22) KRAEY diss. de connubio inter melancholiam et malum hypochondriacum, Erford. 1797. Sciendum autem est, plurimos auctores sub nomine *melancholiae hypochondriacae* eam intelligere maniam, cujus causa in hypochondriis latet; exemplo esto SCHRÖTZER l. c.

sensibus corrigi posset, errat. Interea et hîc limites certos statui haud posse libenter concedimus. *Diagnosis lycanthropiae*, morbi plerumque vernalis et periodici, cautelas speciales exposcit, ne scilicet haec maniae hypochondriacae species confundatur cum *hydrophobia rabiosa* ²³⁾, cum *somnambulismo* ²⁴⁾, et cum *conditione hominum in sylvis belluarum instar errantium* ²⁵⁾, ne dicamus de *fabulis* ²⁶⁾ et *metaphoricis narrationibus* ²⁷⁾.

8. In

23) Accidit interdum, quod delirium in hydrophobia rabiosa, imaginationem ab idea canis, vel lupi, qui aegrum momorderat, laesam, exhibeat, nude facillie cum lycanthropia confusio. Cfr. *Salzburger med. chirurg. Zeitung*. 1809. No. 38.

24) Cum et in lycanthropis aegri nocta vagentur, similitudo quaedam cum somnambulismo oritur, quae interdum in errorem ducit.

25) CAMERARIUS *horr. subcis.* cent. I. Francf. 1602. c. 75. RZACZYŃSKI *hist. nat. Polon.* Sandomir. 1721. p. 355. CONNER *natural history of Poland*. T. I. p. 342. TULPIUS *obs. med.* lib. IV. c. 10. p. 296. *Breslauer Samml. von N. und K. G.* 21. *Versuch.* p. 438. LINNAEUS *smoen. acad.* T. VI. p. 65. H...t *histoire d'une jeune fille sauvage.* Paris 1755. RAGINE, *filz, poëme de la religion.* *Eclaircissement de l'épître 2. sur l'homme.* BONNATERRE *notice historique sur le sauvage de l'Aveyron.* Paris l'an. VIII. VIREY *histoire naturelle du genre humain.* T. 2. p. 289.

26) Lege de *Circe maga* ex HOMERO. Apud PLINIUM ex HERODOTO narratur: populos quosdam quotannis fieri lupos et postmodum redire homines. Eadem fabula de incolis Borussiae et Lithuaniae jectabatur, ut

8. In diagnosi *maniae chimaerae*, morbi a vi-
tiosa imaginatione derivandi, et M. hypochondria-
cae affinis, maxime ad *actiones* aegri respiciendum
est, quae si rationi consentaneae forent, idea chi-
maerica per se maniam minime constitueret. Enim-
vero „si illi, qui falsas et inutiles, i. e. nimis ab-
stractas ideas fabricant, et de iis tanquam pro aris
et focus disceptant; si illi, qui falsas propositiones
defendunt; si illi, qui ineptis syllogismis utuntur,
aut fallacias in argumentando committunt; si illi,
qui de logomachijs litigant aut meteoris orationis
utuntur; si denique illi, qui sine methodo docent,
et flosculis oratorijs affectus audientium et legen-
tium corrumpere intendunt, pro dementibus ha-
bendi essent, sequeretur illud absurdum, pleros-
que eruditorum in omnibus facultatibus et discipli-
nis pro dementibus esse habendos“ 28).

9. Gaudium singulas actiones concomitans et M. moris.
fontem inexplebilem felicitatis constituens 29), ne-
quidem

videre est apud CAMDENUM (Hibernia sua. p. 2),
OLAUM MAGNUM (lib. XVIII. tribus extremis capi-
tibus) resantibus PEZELIO (disp. de transmutatione
hominum in lupos. Lips. 1673) et WANTSCHERO (disp.
de lupo et lycanthropia. Wittenb. 1666).

27) TH. BARTHOLINUS in epist. med. cent. II. epist. 100.
et in miscellaneis de morbis biblicis. c. 13. p. 53.
NIMFTSCH diss. de metamorphosi Nabuchodonosoris.
Lips. 1688.

28) THOMASIVS l. c. p. 19.

29) Ajax apud SOPHOCLEM, qui jam ex insania resipue-
rat, ait:

quidem pro morbo haberi posset, nisi aegri *mania moria* detenti omnium ludibrio viverent, et familiis gravi oneri essent. Praeteriere enim et *sannionum aulicorum* ³⁰⁾ tempora, ac jam nationes integrae illorum privilegium, principibus veritatem aperte dicendi, usurparunt.

M. melancholica.

10. Sicuti *mania moria* characterem exhibet gaudii, ita *mania melancholica* illum moeroris. Extat vero inter ipsas melancholias conspicua differentia. Nunc enim aditus per sensus externos ad animum clausi sunt, et attentio plane in contemplatione ideae cujusdam, sive a memoria, sive ab imaginatione suggestae, tota est, ita, ut similitudo quaedam inter talem melancholiam et catalepsin intercedat: nunc autem perceptio objectorum externorum non interrumpitur, iisque debita impenditur attentio, ast iudicium et voluntas languent,

Suavissima hinc est vita, et sapias nil.

Nam sapere nil, doloris expers est malum.

HONATI versus lippis et tonsoribus noti sunt:

Fuit homo ignobilis Argis,

Qui se credebat miras audire tragoedias,

In vacuo laetus sessor, plausorque theatro.

Hic ubi cognatorum opibus, curisque refectus

Expulit helleboro morbum, bilemque meraco,

Et redit ad sese: Pol me occidistis, amici,

Non servastis, ait, cui sic extorta voluptas.

Cfr. ZIRKOLDI diss. moralis: de fortunata stultitia; et

ERASMI encomium moriae. ESQUIROL l. c. p. 159.

30) FLÖGEL *Geschichte der Hofnarren.*

guent, ac aeger infelicissimus ¹¹⁾ aequè sibi met ipsi ac aliis molestus evadit.

11. *Ma-*

31) *Forgotten' quite*

All former scenes of dear delight,

Connubial love — parental joy,

No sympathies like these his soul employ;

But all is dark within ...

PENROSE *Flights of Fancy.*

Conditionem ejusmodi infelicissimam mihi ann. 1819. Vilnae exhibuit juvenis formosaeque femina, trium prolium mater. Ex familia rhachitica ortum ducens, a systemate nervoso valde sensili insinstructa atque copiose menstruata, ipsa semper sanitate gavisae erat, praeter quam quod ultimis binis absolutis partibus tristis evaserit saepeque terroribus panicis prehensa. Accidit interea ut dilectum maritum crimine flagranti adulterii comprehenderit. Mox inde in melancholiam omnibus numeris absolutam incidit. Jam maritum non solum, sed et proprios infantes proximosque parentes, ac si alieni essent, respiciebat. Aggravabatur aegrotans a conspectu solis, et a hominum consortio; sublavabatur contra a nebulis atque a solitudine. Nisi ad suicidium extorquebatur, cui tamen Religio obstitit. Timebat nihilominus vitam aeternam optabatque existentiam suam in sepulcro terminare. Objecta plurima secus ac revera exstabant cernebat; hallucinationum ceterum conscia, ac libenter adversus morbum, quo se laborare sciebat, medicorum consilia exposcens. Hallucinationes quibus exercebatur, plerumque ex idearum adassociatione pullulabant. Sic mitra, vel ejus vinculum, formam aut colorem, illis rivalis similes, ipsius rivalis speciem labefactatae menti exhibebant. Vestis qualiscunque coloris eserulei (utpote a marito infideli-

M. phan-
tastica.

11. *Maniam phantasticam* inter et ecstasin, haud raro affinitatem animadvertere licet. Attamen ideae religiosae in illa potius *symptoma* quam causam morbi sistunt ³²). Homines saltem vidimus, fide religiosa quamquam non excellentes, maniae tamen phantasticae cum continuis religionis cogitationibus obnoxios. Praeterea maniam phantasticam non solum objecta religiosa respicere, sed quandoque et circa res ad politicam ³³) et ad scientias

tatis tempore induta) graves miserae molestias inferbat. Aegerrime autem ictus horologii horam quartam pomeridianam indicantes sustinebat; hoc etenim tempore terribilis scenae testis fuerat. Pharmacis res solventibus et inprimis balneis maris, aegram multum sublevare licuit.

32) Haec mea et P. KNOTT (*Edinburgh Journ. of medical sciences* 1827. et *FRONTIER Notizen* etc. B. 20. No. 1) et BURROWS (l. c.) sententia est.

33) *Enthusiasmum politicum* inter vesanias refert DANIEL NICOLAUS (exul gallicus) in diss. de mania. Francf. ad Viadr. 1692. edita. „Redeunt subinde, ait, tanquam per insomnium patrii lares animumque pristini instituti ratio subit, furorem vesaniamque eorum, qui me extorrem egerunt, saepe saepius doleo. Atque dum haec mecum subinde repeto, affine insaniae genus inter morbos deprehendo, ubi aegri cum studio insaniunt, maniacos intellige; aequae enim hi atque illi suae passioni tenaciter adhaerent, reliqua negligunt omnia, coelum terra miscent, diffringunt obvia, in se ipsos sunt injurii, sibi quae violentas injiciunt manus, quae vera sane patriae quondam meae imago.“ Videntur mehercle haec aevo nostro scripta fuisse!

tias spectantes versari, terribilis illa epidemica mania ab anno MDCCXCI usque ad annum MDCCXCIV et ultra in Gallia saeviens, nec non altera mitior, in Germania initio seculi XIX, inter assecclas philosophiae naturae regnans, testantur. Sunt tandem *visiones*, quae, utpote perstante iudicio occurrentes, maniis non adscribi, sed a solo vitio imaginationis, sensum quendam (plerumque visum) imperio suo subjiciente³⁴⁾, vel etiam a mentis imbecillitate³⁵⁾, derivari debent³⁶⁾.

Neque

34) PLOMANN diss. de paradoxis sensuum. 1676.

35) THRELWALL *on imperfect development of the faculties mental and moral as well as constitutional and organic and on the treatment of impediment of speech.* Lond. 1810.

36) Exempla huc spectantia collegerunt CARDANUS in HALLER element. physiol. T. V. p. 537. BONNET *analytische Versuche über die Seelenkräfte.* Bremen 1770. 2. Th. p. 67. VALSALVA in PLENN de morbis oculorum. p. 206. HOOLE *life of Tasso.* p. 48. REIL *Fieberlehre.* l. c. p. 283. ESQUIROL *mémoire sur l'hallucination dans les maladies mentales.* Annales de la soc. de méd. prat. de Montpellier. T. 44. p. 140. BAYLE *mémoire sur les hallucinations des sens.* Revue médicale. Janvier 1825. S. HIEBERT *Andeutung zur Philosophie der Geistererscheinungen, oder Versuch die darüber Statt habenden Täuschungen auf ihre natürlichen Ursachen zurückgeführt.* A. d. E. Weimar 1825. J. MÜLLER *über die phantastischen Gesichtserscheinungen.* Coblenz 1826. POUJOL *sur les hallucinations des sens.* Revue médicale. Novembr. 1828. *Fälle von merkwürdigen Gespenstererscheinungen.* Ex Edinburgh

Neque obliuiscendum dari, qui credulos, experimentorum optidorum ope ac ludibrii causa, in errorem ducunt ³⁷⁾.

- M. erotica. 12. Quae in amore effreno solum periclitatur ratio, haec in *mania erotica* reuera deficit. Porro in mania erotica amor saepissime *symptoma morbi*, in amore autem effreno *morbum ipsum* constituit. CRICHTONIO hinc omnino assentimur contendenti ³⁸⁾, maniam saepe immerito ab amore repeti hocce animi pathema, dum morbum proxime praecedat, ad aegritudinis initium plerumque spectare ³⁹⁾. Quodsi etiam amor maniam quandoque producit, inde absolute non sequitur, talem maniam semper eroticam fore. Vidimus saltem, quod ab amore nunc melancholia, nunc mania phantastica etc. ortae fuerant. Sic et mania erotica, a nymphomania vel satyriasi concomitata, haud semper ex veneris desiderio oritur, sed tale desi-

journal of science. April 1830. In FROBIEF's Notizen aus dem Gebiete der Natur- und Heilk. B. 27. No. 13. Ueber Geisteserscheinung in FROBIEF's Notizen ex WALTER SCOTT demonology and witchcraft. Lond. 1830 aliiq. e. gr. in Berlinische Monatschrift. May 1799.

37) *Oesterreichischer Beobachter* 1816. No. 234.

38) l. c. p. 496.

39) Pater meus Viennae pro virgine, ut aiebant, ex amore maniaca facta, in consilium vocatus est. Optimum morbi auxilium videbatur matrimonium. Ast co vix inito, en haec ipsa aegra pristinam amoris ideam derelinquit, et odio matrum prosequitur.

desiderium potius pro symptomate agnoscit. Quae de re testatur observatio, quod, mania erotica libidinosa *periodice* decurrente, aegri tempore intervalli lucidi haud raro casti et morigeri sunt.

13. *Mania saeviens* facillime cum *delirio* M. saevi-
ens. *transitorio furioso* ⁴⁰⁾, cum *irae accessu* et *ma-*
litia confunditur: quod praecipue de ea mania valet, quae a PINELIO ⁴¹⁾ pro *furore sine rationis laesione* declaratur, atque nuper *monomania* ⁴²⁾ *homicida sine alio mentis captae indicio* ⁴³⁾ vocata est. Arduum sane est, iudicium hic proferre, quod neque humanitati, neque ordini sociali adversetur. Aequae enim crudele foret hominem

40) Sic casus a cl. HEIM (HUFELAND's Journ. der pr. Heilk. 1816. Jan. p. 118) enarratus, viri scilicet, qui prius sanus, extemplo uxorem noctu sine ulla causa e fenestra dejicere voluit, altera mane autem, porrecto emetico integrae et permanenti sanitati restitutus est, potius ad delirium, quam ad maniam spectat. Delirii furiosi horarum duarum quæstio fit in RUSCH Magazin der gesammten Heilk. B. 19. Heft 3. p. 510.

41) l. c. p. 156—159.

42) Α πρός, solus, et *parva* delirium. GRÆC. Μόρδ-
sucht.

43) Placuit ESQUINOT (note sur la monomanie homicide. Paris 1827) duas monomaniae homicidae species statuere. In prima illa aeger *alioquin mente alienatus* praeterea nisu homicidium perficiendi exeruciatur. In secunda, homo, absque ullo alio maniae indicio, dumtaxat insuperabilem impulsionem ad homicidium experitur.

nem ob actiones, a quibus se abstinere non potuit, punire, quam insanum, existentiam furoris cum illaeso iudicio, ut morbum, admittere. Tali enim pacto de societate civili actum foret, ac scelerones ad crimina omnis generis committenda liberum invenirent campum! Attamen in tam gravem philanthropiae abusum, de quo non immerito juris consulti hodierni ⁴⁴⁾ nonnullique medicorum ⁴⁵⁾ conqueruntur, incurreremus, si doctrina, a PINELIO ⁴⁶⁾, ESQUIROL ⁴⁷⁾ aliisque ⁴⁸⁾ allata, pro norma admitteretur ⁴⁹⁾.

14. Dia-

44) TITTMANN *Vorträge und Urtheile über merkwürdige Straffälle*. Leipz. 1815. E. REGNAULT *avocat, du degré de competence des médecins dans les questions judiciaires relativement aux aliénations mentales*. Paris 1828. Ejusdem: *Nouvelles réflexions sur la monomanie homicide, le suicide et la liberté morale*. Paris 1830.

45) CLARUS *die Zurechnungsfähigkeit des Mörders J. C. Woyzeck*. Leipz. 1824. BUCHHEIM *über amentia occulta bei Mördern*. In PIERRE's *allgem. med. Annal. des Jahrs 1825. Heft 4*. LUTHER *etwas über die Zurechnungsfähigkeit bei gesetzwidrigen Handlungen*. HUFELAND's *Journ. der pr. Heilk.* Juni 1826. *Supplementheft*, p. 136.

46) VIR, de quo PINEL p. 156. narrat, scelero mihi est, non gyrgatho sed furca dignus. Aegrotus, cujus p. 157. mentionem injicit, saltem tempore furoris (quem imminere sentiebat, unde adstantes praemonere erat solitus) ratione destituebatur. Alter aperte iudicio orbatus erat, aliàs, cur liberatores suos aggressus esset, intelligi non posset.

14. *Diagnosin maniae fatuitatis, idiotismi* Compli-
et chaos, utpote vix peculiare difficultates exhi- cat. loi-
mar.
bentem,

47) l. c.

48) BRIÈRE DE VOISMONT *observations médico-légales sur la monomanie homicide. Paris 1827.*

49) Mecum consentiunt: HUFELAND (*Journ. der pr. Heilk.* 1829. Febr. *Ueber Monomanie, Unfreiheit und Zurechnungsfähigkeit*); et F. RHODES (*Rust's Repertorium für die gesammte Heilk.* B. 22. Heft 3. p. 422). Legantur pro et contra argumentum de quo agitur: C. C. H. MARC *consultation médico-légale pour Henriette Cornier, femme Breton, accusée d'homicide commis volontairement et avec préméditation. Paris 1826.* J. L. MICHU *discussion médico-légale sur la monomanie homicide à propos du meurtre commis par H. Cornier. Paris 1826.* N. GRAND *réfutation de la discussion légale du Dr. MICHU sur la monomanie homicide à propos du meurtre commis par H. Cornier. Paris 1826.* *Fundbericht nebst Gutachten über den körperlichen und Gemüths-Zustand des an Mania transitoria leidenden J. Schuster aus T.* (HENKE *Zeitschrift für die Staatsarzneykunde.* 8. Jahrg. B. 5. 2. Vierteljahrsheft No. 18). SUNDLING *über einen Aufsatz des Prof. HEIDNOCH in HITZIO's Zeitschrift für Criminalpflege. Jahrg. 1828. B. 1* (HENKE *ibid.* 3. Vierteljahrsheft No. 1). WENDT, P. Nielsen *der Mörder setner vier von ihm zärtlich geliebten Kinder* (*ibid.* No. 3) et: *Mörderin ihrer geliebten Tochter* (*ibid.* No. 10). *Gerechtliche Untersuchung über den Geistes- und Gemüths-Zustand eines Inquitsiten der sich selbst freywillig als Brandstifter und Raubmörder angegeben hat* (*ibid.* 4. Vierteljahr. No. 20). TRYSSIER *mémoire sur la monomanie homicide, et réflexions suc-*

bentem, silentio praeterimus, doctrinam *complicationum formarum* insectantes. Nulla enim datur maniarum forma, quae cum alia, quandoque ad aspectus oppositi, societatem inire non posset. Saepissime complicantur aut sibi invicem succedunt⁵⁰⁾ *mania chimaera* cum *moria*, *moria* cum *melancholia*⁵¹⁾, et *phantastica* nec non *erotica* cum *sae- viente*⁵²⁾.

15. Ex

quelques procès criminels, Paris 1829. C. C. H. SANDER *Aphorismen über die Zurechnungsfähigkeit der Verbrecher* (HORN'S Archiv für med. Erfahr. Jahrg. 1829. Nov. Dec. p. 945). LE VISKEUR *über Monomanie* (ibid. p. 991. et Jahrg. 1830. Jan. Febr. p. 17. März. April. p. 234). Cui recentiori literaturae antiquiorem superaddo: BACO DE VERULAMIO hist. vitae et mortis. De diactae influxu in mores et temperamento hominum. Opp. fol. 49. Edit. Lips. 1714. CORNEL. DE BONTAEGHE discurs. de vita, morbia et morte hominis. Hag. 1676. FR. HOFFMANN diss. de temperamento, fundamento morum et morborum in gentibus. Hal. 1705. G. P. MÜLLER diss. de temperamentorum propensionumque humanarum connexionione. Lips. 1708. Quibus duas dissertationes, utpote plura huc spectantia continentes, adjungeretur, alteram videlicet de *magnetismo morali*, alteramque de *fortunata stultitia*, si illarum suctores propius designare possem. Exstant in Bibliotheca Vilmensi Volum. 23. dissertationum. E. STAHL de fundamento moralitatis personalis in sanguine. Hal. 1710. SEELMANN disp. de temperamentorum in sectiones morales influxu. Hal. 1713.

50) MARCHAND diss. ergo a melancholis manis. Paris. 1600.

51) Anno 1814. a Doct. Barankewicz in consilium ad-

15. Ex facili transitu unius maniae formae Conclu-
sio.
in

ductus fui pro nobili femina, 45 annos nata, menstruorum fluxu necdum orbata, quae post mille infortunia derepente a tremore totius corporis correpta est, subsequente unius noctis spatio erythemate, quasi dixerim *ecchymomate* ad dorsum manuum, omnibus hucusque auxiliis rebelli. Nunc vero jam ab anno per quindecim dies veluti *moria* et dein per tres quatuorve hebdomadas quasi *melancholia* laborat. Hoc in casu silensiosa uni loco affixa manet, parumque cibi sumit. In illo hilaris et admodum loquax fit atque continua habitationis mutatione delectatur. Tantus tunc observatur loquendi impulsus, ut solum defatigationis aut somni causa os claudat. Adstantium sermonem, utpote propriam loquacitatem impediens, aegre fert; quin immo concionatorem in ecclesia invidia prosequitur, dolenter exclamans: „cur illi loqui licitum est, et non mihi?“ — Sub paroxysmo loquacitatis animo adeo strenuo dotatur, ut (sunt verba aegrae) libenter aggeres tormentis munitos aggredieretur. Simul impulsus aliis injuriam inferendi tunc percipit ac saepe a famula sua, pro renumeratione, venism verberibus illam afficiendi obtinere studet, affirmans, se ipsam sic a sensu molestiae optime liberari. Judicium nunquam deletur, unde casum praesentem potius pro hysteria quam pro mania declaravi.

- 52) PINEL de monacho narrat (l. c. p. 165), mania phantastica laborante, qui visionem St. Virginis expertum se esse credebatur, imperantis, ut hominem quendam incredulum necaret. Jam aeger se ad nefandum opus accingebat, cum propositum innotuit. Et Cox animadvertit (l. c. p. 78), aegros, mania phantastica affectos, saepe in medicos et custodes, quos pro impiis

in aliam, nec non ex frequenti earum complicatione concludimus, *manias, qualemcumque exhibeant formam, in radice tamen invicem convenire, typum saepe a circumstantiis fortuitis accipere* 53), et *intrinsecam illarum indolem vix a variis formis, quas induunt, pendere*. Credimus immo, praxin medicam parum lucri ex collectione verborum et actionum omnis generis stultorum recipere posse, ac ad doctrinam, de qua agitur, excolendam viam longe aliam eligendam esse. Si enim perpendimus, manias a morbosa sensuum, nervorum et cerebri conditione pullulare, quâ anima instrumentis suis plus minusve orbat, unde major minorve privatio usus rationis subsequitur, directe ad conclusionem adigimur, maniarum causas a causis aliorum morborum systematis nervorum non differre, ac in iisdem prorsus conditionibus corporis

et haereticis habent, saevire. ZIEGLERUS (Part. I. cent. 3. ep. 30. p. 677) refert, sponsum Bohemum a. 1606. novam thori sociam prima statim nocte in lecto geniali a se suffocatam injectis pectori dentibus atrocissime. Alium casum FRID. LUCAS (Chron. Siles. P. II. p. 2225) exhibet, ubi quis dilectam sibi puellam, sed a parentibus negatam aliique promissam, prius tamen ad devotas preces secum fundendas advocatam cultro jugulavit.

- 53) Disposito jam homine ad maniam, hanc typum a causa excitante accipere videtur, ac verisimiliter idem aeger, qui per exercitia religiosa in manism phantasticam conjicitur, per exercitia militaria in maniam saevientem conjiceretur.

poris humani morborum, ex quibus morbos in genere derivavimus, quaerendas esse.

16. Conjice enim primum oculos in secta cavera maniacorum, ac cunctas in iis invenies *inflammationum encephali reliquias*⁵¹): nempe, meningis crassiores, pseudomembranis obductas, serum inter eas effusum, duram matrem cranio adcretam, vasa sanguinea encephali varicosa, cerebrum durum, exulceratum, gangraenosum, ventriculos sero repletos, plexus choroideos cruore turgentes etc. Descende dein ad examen causarum manias excitantium, ac reperies earum per multas morbis inflammatoriis in genere et illis encephali in specie faventes, ut iram, studia, vigiliis, motum nimium, ebrietatem, insolationem, violentias capiti illatas, narcotica, haemorrhagias consuetas suppressas etc. Compara tandem haec omnia cum maniarum plurimarum symptomatibus, e. c. calore universali, lucis intolerantia, rubore oculorum, pulsu magno etc. et non dubitabis, diathesin inflammatoriam maniae haud paucis, praesertim sub formae chimaerae, phantasticae, eroticae et maxime saevientis, comparentibus, anamorphosin porrigere, quas manias *inflammatorias* vocare, nil prorsus impedit.

17. *Manias dari gastricas*, intelliges rationem habendo: a. consensus abdominis cum cerebro;

Diathesis gastrica.

iii 2

bro;

51) BAYLE *recherches sur l'arachnitis chronique* . . .
considérée comme cause de l'aliénation mentale.

bro; b. sectionum cadaverum, intestina faecibus repleta, bilem tenacem nigerrimam plurimamque vitia viscerum abdominalium exhibentium; c. aestatis, sicuti morbis gastricis in genere, ita evolutioni maniae faventis; d. irae, ut bilis secretionem praeter modum elicientis, flatuum, vermium, obstructionum etc. Maniae, de quibus agitur, cum hypochondriorum tensione, cuti subflava, sputatione crebra, halitu oris foetido, flatuum eructatione ac augmento molorum horis vespertinis insigniri solent. Spectant huc frequenter mania hypochondriaca, melancholica et saeviens. Interea scias quoque viscerum abdominalium labem, haud raro *effectum praevis aut praesentis morbi cerebri*, maniam gignentis sistere⁵⁵⁾.

Diathesis
arthritica.

18 *Diathesis arthritica*, praesertim in maniis periodicis, quarum accessus cum anni tempestatibus cohaerent, quaeque in hominibus laute viventibus, morbis herpeticis, sudoribus et diarrhoeis salutaribus quondam subjectis, obveniunt, sibi jus vindicat. Observationem hujusmodi, LORRYO plane notam⁵⁶⁾, classico aliàs de morbis arthriticis scriptori⁵⁷⁾ latuisse, miramur. Confirmatur tamen vel ab ipsa cadaverum maniacorum autopsiâ. Nullibi saltem certiores arthritidis notas,

quam

55) Convenire itaque nequeo cum BURROWS ubi (*the London medical repository Vol. 6. Octobr.*) contendit, conspicuam maniarum partem ex abdomine et maxime ex hepate ortum ducere.

56) *Op. c. 1. Th. p. 209.*

57) BARTHEZ *op. c.*

quam calculi in processu falciformi, cerebro et cerebello exhibent, invenies. Adde, maniacos haud raro ex stirpe arthritica oriri, ac in paroxysmos per frigus, sudores suppressos, crapulam conjici.

19. Adspice formam cranii e. c. in idiotismo, — perpende conditionem ossium encephalum componentium, ac processum ossificationis in dura matre, cerebro, cerebello, et aliis in maniis obvium, — considera habitum rhachiticum praecipue eorum, qui maniam ex vitio hereditario contraxerunt, et conditionem columnae vertebralis, quam saepe a recta linea aberrare videbis, et convictus eris, saltem dispositionem ad varias alienationes mentis in *labe rhachitica* thecam cerebri laedente, aut in *labe scrophulosa* glandulis encephali infensa, quaerendam esse, idque inprimis si *complicatio* quaedam *syphilitica* lateat ⁵⁸). Ad labem illam praecipue concludimus habita ratione: a. imperii constitutionis scrophulosae in facultates animi, b. habitus scrophulosi, quem plurimi maniacorum, praesertim sexus sequioris, prae se ferunt, et c. vitiorum glandularum in cerebro et abdomine maniacorum repertorum.

20. Nec *diathesin carcinomaticam* ex mor-
bosis conditionibus maniae ansam porrigentibus
excludendam esse credimus: a. cum plurimae ma-
niae,

Diathes.
rhachitic.
et scro-
phulos.

Diathes.
carcino-
mat.

58) J. DUBUISSON *observation d'une manie aiguë, compliquée de syphilis. Bulletin de la faculté de médecine et de la société de Paris. ann. 9 (1813). p. 361.*

niae, praesertim in feminis, circa epocham vitae affectionibus carcinomaticis faventem, evolvantur; b. cum animi pathemata, tam frequens maniarum causa, in diathesi carcinomatica gignenda multum quoque valeant; c. cum morbi alii systematis nervosi adsint, e. c. prosopalgia, quae evidenter ex diathesi carcinomatica pullulant; d. cum plica, utpote leprae, carcinomatis fontis, progenies, haud raro maniis ansam porrigat, et e. cum partes variae speciatim vitio carcinomatico obnoxiae, e. c. mammae et uterus scenam magni momenti in maniis ludere soleant.

Monitum. 21. Sicuti enim morbi systematis nervosi in genere, non semper directe ex affectione morbosa cerebri, medullae spinalis et nervorum oriuntur, sed saepe indirecte a labe aliorum viscerum proveniunt, sic et maniae in specie non constanter ex vitio encephali⁵⁹⁾, sed haud raro ex affectione qualicunque demum, inflammatoria, arthritica, carcinomatica etc., *cordis*⁶⁰⁾, *hepatis*, *lienis* et praecipue *uteri*⁶¹⁾ ortum trahit. Ex quibus singulis colli-

59) C. R. DE PATVA epicrisis de affectu atrabilario seu de morbis cerebri et mentis qui extra cerebrum originem ducunt. Romae 1751.

60) Cor in melancholia affici, jam SENNERTUS (lib. II. institut. P. III. sect. 2. c. 4) et FORESTUS (lib. X. obs. 12) docuerunt.

61) SCHENK lib. IV. obs. 240. J. MURALTO de melancholia uterina. Miscell. acad. nat. cur. dec. II. s. 7. 1688. p. 165. J. CM. BAUTEMANN de melancholia ute-

colligitur, quanti momenti examen abdominis et exploratio uteri in maniis esse debeat.

22. Quamobrem solum, ubi certitudinem Diathes.
nervosa. acquisivimus, maniam neque ex vitio inflammatorio, neque ex vitio gastrico, neque ex vitio arthritico, neque ex vitio rhachitico aut scrophuloso, neque ex vitio carcinomatico, neque ex vitio quodam organico causae traumaticae adscribendo pullulare, illius originem in *exaltatione peculiari systematis nervosi, diatheseos nervosae progenie*, quaerimus. Huc spectant maniae ex onania, venere nimia, unis animi pathematibus, et inanitione, ortae. Posse enim vel simplicem *debilitatem* maniis ansam porrigere, aut earum curae obstatere, praeter COXII ⁶²⁾ aliorumque ⁶³⁾, nostra quoque docet experientia ⁶⁴⁾.

23. Quo

rina periodica. *ibid.* a. 8. 1689. p. 115. M. F. LOCHNER de ferali quadam melancholiae uterinae causa. *Ephem. acad. nat. cur. cent. 7 et 8.* p. 255. GAUTIER de irritabil. p. 114. SELLE *med. Bemerk.* 1783. p. 524. CHAMBERLAIN *Krankh. der Frauen.* Frankf. 1789. 2. Th. p. 337. Ejusdem *Arzt für Schwangere.* DORMMÜLLER in STARK's *Archiv für die Geburtshülfe.* 3. B. p. 38. REHFELD diss. sistens descriptionem periodicae insaniae melancholici generis. Goett. 1809. BURROWS *commentar.* etc.

62) l. c. p. 109.

63) C. A. KLOECHER diss. de morbis animi ab infirmato ignore medullae cerebri. Traj. ad Rhen. 1758.

64) Virgo viginti annorum constitutionis scrophulosae, in rheumatismum acutum altera incidit vice. Morbo

Diagn.
convale-
scentiae.

23. Quo pacto *genuina convalescentia* post maniam, ab *intervallis lucidis* ejus morbi, distinguatur possit, nisi annorum plurimorum curriculum ad diagnosin adjuvet⁶⁵⁾, indicare nequimus. Id solum nobis persuasum est, numerum maniacorum

ad acmen perducto, sub cruciatibus acerbis noctem insomnem trahens, canum horrendum ululatum audi-
vit. Talem ululatum pro certissimo augurio mortis suae imminenti cum haberet, vehementer terrefacta est, ac brevi post rationis usu privata, surrexit, fores petiit, affines timebat, affirmans eos jam paratos esse ad ipsam viventem accipienda. Applicitis hirudinibus et dein vesicatorio ad caput, exhibitisque variis antiphlogisticis et dispanoicis auxiliis, aegra quietior fiebat, at incidit in perfectam *melancholiam* fere cum *fatuitate*. Dr. Herberst caussam nunc in rheumate, nunc in metastasi ad cerebrum, nunc in vitio scrophuloso, nunc in liquore extravasato cerebrum comprimente, quaerens, deductis in consilium et aliis medicis meque ipso, omnia tentabat, at incassum. Haec cum viderem et perpenderem, morbum in convalescentia fuisse graviores redditum, habita simul ratione menstruorum parum fluentium, ad *martialia* confugiendum esse, statui. Ac revera sumta *tinctura martis pomata* ad sat largam dosin per sex hebdomadam spatium, rationis usus cum viribus rediit. Jam duo excurrerunt anni et recidiva non comparuit. Cfr. PANCZEN in *Mém. de la soc. méd. d'émulation*. T. 2. p. 241.

65) In gyrgaitho Saxoniae loco *Sonnenstein* stabilito, nemo maniacorum pro sanato declaratur, nisi *per tres annos* a morbi insultu immunis vixerit (E. KLOTZ diss. de vesaniae prognosi. Lips. 1827).

rum pro *sanatis* et *recidivis* ⁶⁶⁾ venditorum, longe minorem fore, si major illius distinctionis haberetur ratio.

§. CX.

P r o g n o s i s.

1. Inter omnia mala, quae miseram flagellant ^{Genera-} humanitatem ^{tum.} ¹⁾, nullum eo deterius, ex quo silentis rationis periculum imminet, invenitur ²⁾. Pertinent praeterea maniae ad morbos difficilioris curationis. Num veteres medici in sanatione illarum feliciores fuerint ³⁾, quam recentiores, numque mania modo frequentius quam olim obveniat ⁴⁾, non aude-

66) Libenter quidem concedo maniss morbis admodum ad recidivas pronas adnumerandos esse, idque imprimis in maribus; verum altera ex parte persuasus quoque sum, multas sic dictas recidivas nihil aliud esse quam novos unius ejusdemque morbi proxysmos.

1) De animalium mania vide J. B. C. ROBERT in *Journ. complémentaire du dictionnaire des sciences médicales*. T. 16. cahier 64. p. 303.

2) „Of the uncertainties of our present state, the most dreadful and alarming is the uncertain continuance of reason“ (JOHNSON in *Rasselas Prince of Abyssinia*).

3) LORRY op. c. Vol. II. Cox l. c. p. X. Vol. I. in nota.

4) ESQUIROL (*Mém. de l'acad. R. de mède. T. 1. Paris 1828. No. 3*) reputat maniam nostris temporibus haud crebrius quam antes grassari; sed dumtaxat magis in propatulo esse, ob meliorem gyrgathorum conditionem majoremque mente captorum curam. Viro egregio assentire nequeo. Enimvero morbi, qui haereditario,

audemus determinare. Maxime rebelles observantur maniae haereditariae⁵⁾, epilepsiae⁶⁾, vel paralyti^{7a)} junctae, ex terrore^{7b)}, in sexu sequiori⁸⁾ ortae, et habituales redditae. Sunt tamen maniae inveteratae, quae tandem sponte evanescent⁹⁾. Ex quo apparet, quam arduum sit iudicium de maniis insanabilibus proferre¹⁰⁾. Non minus arduum est, proportionem inter maniacos sanatos et reliquos statuere¹¹⁾.

2. Si

ut mania, propagantur jure, nisi legibus arceantur, necessario augmentum capere debent. Praeterea nostro aevo plurimae maniarum causae, e. g. bella, eorum reliquiae, ruinae rerum familiarium, phanatismus politicus, scientificus, mysticismus, praecipue sese copularunt.

- 5) MIRROR BATTIE (l. c.) contendere, manias haereditarias haud difficiliter quam reliquae curari.
- 6) MANUEL ergo melancholiae et epilepsiae mutuae vires, Paris. 1650.
- 7a) CALMEIL *de la paralysie considérée chez les aliénés. Recherches faites dans le service de Mr. ROYER-COLLARD et Mr. ESQUIROL. Paris 1826.*
- 7b) BURKOWS commentaries etc. 8) BURKOWS l. c.
- 9) PINEL (p. 88. in nota) casum matronae refert, quae a mania saeva per viginti septem annos durante convalevit. Vix meutis compos reddita, illico suos infantes quaevisit, quos in tenera aetate dereliquerat. Verum cum illi dictum fuerit, eos jam adeo adolevisse, ut matrimonium inire potuerint, vix id concipere valebat. Cfr. ESQUIROL l. c. p. 206.
- 10) REIL (in append. ad version. germ. op. cit. COXIS p. 8) leviter hoc objectum pertractat.
- 11) Qui calculis istis delectantur, adhauc PINELIUM l. c.

2. Si ex *forma* maniarum prognosin desuma- P. ex for-
mus, elucet: *maniam hypochondriacam* aliquando^{ma.}
stragemate, casu, temporis curriculo cessare, aut
saltem ad conditionem hypochondriasis simplicis
redire, alias facillime in melancholiam transire; —
maniam chimaeram, si inveterata, rarius curam ad-
mittere; — idem de *mania moria* dicendum esse,
quamvis deliratio, quae cum risu fit, pro tutiore
ea, quae adhibito studio contingit, declarata fue-
rit¹²⁾; — *maniam melancholicam* difficilius sa-
cipienti sanationem admittere¹³⁾, nisi vero tempe-
stive

p. 404. et *Résultats d'observations et construction des tables pour servir à déterminer le degré de probabilité de la guérison des aliénés. Mém. de l'institut de France. a. 1807. T. 8. Semestr. 1. mém. 169*), ESQUIROL (*Dict. p. 204. et della pazzia, cap. 1. Tavol. 8. 9*), TUKKUM (l. c.), BISSET HAWKINS (*elements of medical statistic, chap. 9*) et KLOTZ (l. c.). TUKKO referente in nosocomio Londinensi St. Lucas ann. 1807. inter 235 maniacos, 108 sanati, 27 mortui sunt, et 100 incurabiles mansere. In nosocomio ejusdem urbis Bedlam dicto, ab ann. 1784. — usque ad ann. 1794, suscepti sunt 1664 aegri, inter quos 564 sanati fuere. Me opinante calculi hujus generis quo minus splendent, eo sinceriores sunt.

12) HIPPOCR. aph. sect. 6. aph. 53. PLINIUS contra risum in furoris morbo pro letali declarat (lib. VII. cap. 51), quod verisimiliter de risu sardonico in febribus acutis intelligendum est.

13) TUKK contra omnium experientiam contrarium sustinet, asserens, duas tertias partes melancholicorum, dimidium autem maniacorum furentium, sanari.

stive debelletur, monente jam HIPPOCRATE ¹⁴⁾ „vel in apoplexiam, vel in epilepsiam et spasmus, vel in coecitatem et maniam degenerare;“ — *maniam phantasticam*, nisi in melancholiam transeat, aut ex meditatione nimis protracta oriatur, multum spei relinquere; — nec adeo timendam esse *maniam eroticam*, inprimis si platonica fuerit, *nymphomaniam* enim vix sanationis spem relinquere; — *maniam saevientem* prae reliquis facillime evanescere ¹⁵⁾, saltem pro tempore; — *maniam fatuitatem* plerumque rebellem, et *idiotismum*, saltem congenitum, insanabilem esse ¹⁶⁾. *Maniac chaos* prognosis *m. saevientis* adaptari potest.

Fr. ex indole.

3. Longe tutius prognosis *ex indole morbi* hauritur. *Maniae inflammatoriae*, si recentes, facillime curantur. Nec magnas exhibere solet difficultates *mania gastrica*. *Mania arthritica* fugata,

14) Lib. VI. aph. 56.

15) BENIZOT ergo vera mania, melancholia et phrenitis, faciles ut fiant, ita et curantur. Paris. 1586.

16) Il n'est tamen praepostere desperandum esse jure monet TH. MOORE (*mémoires sur la vie de Mr. R. Shéridan*. Paris 1825. T. 1. p. 4) dicens: „Les parens lorsqu'ils reconnoissent dans leurs enfans une stupidité désespérante, éprouvent tant d'impatience et de douleur, apprendront peut-être avec quelque consolation que la première aurore de Shéridan fut aussi sombre et aussi décourageante, que son midi fut brillant. Il étoit déclaré en 1759, par le consentement commun de ses parens et de son précepteur, être un enfant épais, dont l'esprit étoit absolument bouché.“

fugats, libenter recrudescit, nisi alter morbus ejusdem indolis, vices illius agat. *Maniae rhachiticae et scrophulosae*, jam jam stabilitae, omnia plerumque artis conamina eludunt. Idem de *maniis* valet *indolis carcinomaticae*, in quibus spes omnis in eo posita est, quod ingruens alter morbus, criseos quasi vices agere possit. *Maniae ex vitiiis organicis*, caussis traumaticis et praegressis inflammationibus originem debentibus, difficillime fugantur. Interes permulta quoque obstacula inveniunt consmen *manias nervosas* curandi. Prognosis *maniae puerperarum* illi *maniae inflammatoriae* similis.

4. Prodroma rationis redeuntis plus minusve Signa bona.
secura sunt; notio proprii status, desiderium ex eo exeundi, amicum acquirendi, affines, infantes suos revisendi, crebrae physiognomiae mutationes, facies mox rubra, mox pallida, timiditas, consuetudines et inclinationes antiquae renatae, somnus reficiens, mutatio in formam morbi ¹⁷⁾, accessus *maniae saevientis* ¹⁸⁾, febris delirio peculiari

17) ALIBERT observation sur une manie avec un délire furieux, transformé en idiotisme le plus complet, lequel à son tour, après une durée de quinze ans environ, disparoit subitement pour être remplacé par le retour à la raison. *Annales de la soc. de méd. pratique de Montpellier*. T. 43. p. 43. EAQUINOL mémoire sur les crises de l'aliénation mentale. *Journ. de méd. de Sa-DILOT* 1804.

18) Maniam hypochondriacam et melancholicam aliquo-

liari stipata (sub cuius curriculo mania haud raro silet¹⁹⁾), apparitio epistaxeos²⁰⁾, haemorrhoidum²¹⁾, menstruorum²²⁾, lochiorum et graviditatis²³⁾, varicum²⁴⁾, exanthematum²⁵⁾, apostematis²⁶⁾, exulcerationis spontaneae²⁷⁾, gangraenae²⁸⁾, diarrhoeae²⁹⁾, dysenteriae³⁰⁾, quartanae³¹⁾,

tunc a superveniente paroxysmo maniae saevientis fugatas vidi. Idem Cox (l. c. p. 72) de mania phantastica fatetur.

19) TUKE l. c. LINDBERSON *Svenska Läkare-Sällskapets Handlingar. Andra Bandet. Stockholm* 1815.

20) D. WINKLER de haemorrhagia narium critica in delirio melancholico aphrodisio. *Miscell. acad. nat. cur.* dec. I, a. 6 et 7. 1675 et 1676. p. 87.

21) MERLET ergo melancholicis haemorrhoides salutares? Paris, 1615.

22) PAUL. ARGENTÆ lib. III. c. 14. HELWIG obs. p. 39. et alii cruenti e vagina fluxus apud STÖRK *vom weissen Diptam* etc.

23) ESQUIROL in tract. cit. de mania puerperarum.

24) HIPPOCR. 6. aph. 11 et 21. SCHENK obs. lib. I. No. 267.

25) RIEDLIN cent. I. obs. 4. FISCHER in RICHTER's *Chirurg. Biblioth.* 7. B. p. 772. GARDANE *gazette de santé.* p. 269. CHIARUOI l. c.

26) BOGDANUS obs. anat. chirurg. No. 2. HÄCKER diss. Biga obs. Argent. 1768.

27) SIEBERN in Collect. soc. med. Havn. Vol. I. No. 11.

28) J. F. BAUER melancholiae subitanea cessatio, aphaelo accedente. *Acta acad. nat. cur.* Vol. 3. p. 212.

29) *Journ. de médecine* T. 36. p. 20. T. 41. p. 21.

30) SCHENK lib. I. obs. 266. WEBER obs. med. Fasc. I. p. 42.

nae³¹⁾, fluoris albi³²⁾, ptyalism³³⁾, tetani³⁴⁾, et certissime ingruens obesitas³⁵⁾.

5. Dictis contraria, mala. Maxime displicet mutatio reliquarum maniarum in fatuitatem et idiotismum, habitus aegri sanus, exercitium normale functionum corporis, effectus nulli, neque boni neque mali pharmacorum, praecipue emeticorum et drasticorum, periodi cardinales vitae, ut epocha pubertatis, cessationis menstruorum etc. sine mutatione in morbo contingentes, capitis dolor diuturnus, imprimis circa cerebellum, strabismus, intolerantia lucis et motus inordinati capitis.

Signa mala.

6. Maniaci rarius aetatem provectam attingunt³⁶⁾, ac plerumque sub insultu sive epileptico

Terni-
nusquis?

sive

31) GALEN fragment. ex aph. Raby Moys. p. 40. CANANIS rapport physique et morale de l'homme. Vol. 1. p. 52. FERRUS Journ. de méd. T. 70. p. 424.

32) BALDINGER n. Magazin 8. B. p. 285.

33) PERFECT l. c. 112.

34) HEINECKE in HUFELAND's Journ. d. pr. Heilk. 7. B. 3. St. p. 119.

35) ESQUIROL in Journ. de méd. 1814. Mai.

36) Contrarium quidem defendit TUXE (l. c.), ast observationes suae a septuaginta tantum aegrotis desumptae, certe ad exceptiones pertinent et generalem experientiam haud subvertunt. Inter allatum nempe maniacorum numerum TUXE observavit duo inter ann. 15 et 20, octo inter 20—30, — duodecim inter 30—40, viginti quatuor inter 50—60, undecim inter 60—70, quatuor inter 70—80 et duo inter 80—90. Legatur de hoc ipso argumento HANMES diss. in causas mor-

sive apoplectico pereunt³⁷⁾, vel marasmo, febre lenta nervosa, aut hydropse moriuntur³⁸⁾. Plurimi irrita omni solitudine et custodia propriae vitae ipsi terminum imponunt. Quandoque tentamina hujus generis frustrata inopinate sanitatem restitunt³⁹⁾, quae aliàs quasi obtenta, ab obstaculis improvise accidentibus ultra Garamantes rejiciuntur⁴⁰⁾. In genere vulnera in maniacis malae indolis

borum et mortis subjecti maniaci. Regiom. 1724. v. HALLERI coll. diss. pract. Vol. I. No. 15. et ESQUIROL *Diet.* 213.

37) A. BAIRE DE BOISMONT *des congestions sanguines cérébrales avec symptômes épileptiformes qui surviennent chez les aliénés. Archives générales de médecine. Février 1829.*

38) De morbis quibus maniaci obnoxii sunt, certe nemo docius disseruit BURROWS in commentariis etc.

39) Maniacus, qui in nosocomio Vindobonensi e fenestris primae contiguationis se projecit, fracto crure, rationi restitutus est. Matronam Vilnensem mania melancholica detentam ad thermas Carolinas misi, quibus sine apparente fructu usa est. Iter patriam versus insitutura, rebusque omnibus, armis non exceptis, a socio ad hoc paratis, aegrotas sclopetum minus arripit, sibi grave vulnus abdominale inflixit. Eo sanato et a mania convaluit. Solum post plures annos typhi epidemici victima periit. Cfr. *Observation sur une imbécillité guérie par une chute. Mém. de Paris 1757. Hist. p. 29. REIL Rhapsod. p. 71. Repertorio di medicina, chirurgia e farmacia di Torino. Serie seconda No. 12. 26.*

40) Plurima hujus generis exempla PINEL (l. c. p. 477—478) enarrat.

dolis et interdum letalia ⁴¹⁾ observantur. Et maniae aliquando boni quid portendunt. Constat enim, eas contra morbos febriles epidemicos munire ⁴²⁾, herniam ⁴³⁾ et hydropem ⁴⁴⁾, maxime autem phthisin pulmonalem ⁴⁵⁾ debellasse. Maniacos aliis saepe periculosos evadere, jam dictum est ⁴⁶⁾.

§. CXI.

41) HAEFERUS in Hercule suo medico. lib. I. de affect. cap. 7.

42) MEAD monita. p. 72. Cox l. c. p. 7.

43) CH. F. PAULLINI: hernia maniâ curata. Miscell. acad. nat. cur. dec. II. a. 10. 1691. p. 369.

44) MEAD (l. c.) de hydropc ascite a superveniente maniâ sanato refert. Fugata tandem et moriâ sanitas omnino rediit.

45) MEAD. Ipse cum professore *Sniadecki*, uxorem comitis P. curavi, quae pectore admodum debili instructa erat, ac de phthisi pulmonali suspecta. A mania prehensa, signa phthiseos plane evanuerunt, ac pectus ejulatus diu noctuque protractos plane sustinuit. — Nobilissima virgo ex Volhynia Vilnam adducta meneque curae commissa, ex matre maniaca descendens, ipsa melancholiae proxima erat. Tristis enim solitudinem quaerens, de sensu anxietatis conquecebatur, vitae taedium asserente. Extremitates tum superiores tum inferiores coerulei cernebantur coloris. En inopinate haemoptysis et ea vix absoluta, animus placatus et serenus. Ast pectore restaurato pristina rediit animi conditio atque sic altera vice, donec ab utrisque malis liberata fuerat.

46) §. CVI. 8 (75). Cfr. *Deutsche Justiz- und Polizey-Fama* 1803. No. 12. p. 97. Et: *Sieben im Wahnsinne*

Frank Prax. II. I. 1.

K k k

§. CXI.

C u r a.

Genera-
tim.

1. Quum maniaci raro in familiarum medio tolerari queant, et experientia docuerit, eos difficilius in proprio habitaculo sanari; maxima illorum pars, aevo saltem nostro¹⁾, gyrgathis sive publicis sive privatis tradi solet. Haec cum ita sint, primum *de gyrgathis* deque *regimine diaetetico et psychico maniacorum* locuturi sumus. Sequetur reliqua therapiae pars, quae *auxilia chirurgica* aliaque *externa*, et *pharmaceutica* respicit.

De gyrga-
this, re-
gim. diae-
tet. et
psychico.

2. Liceat ante omnia pro gyrgathis, *nomen*, quod appellationibus usitatissimis²⁾ animum minus feriat, impetrare. *Asyli* illud proponimus. Rogamus porro, ne gyrgathus alterius xenodochii³⁾ et longe adhuc minus carcerum⁴⁾ constituat partem.

vollbrachte Mordthaten, ex *The constitutions or Cork advertiser* 1828. in *Gerson Magazin der aust. Liter. der gesamt Heilk.* 1829. Nov. Decembr. p. 477.

1) Veteres gyrgathos non habuisse, LONN docte demonstrat. op. c. 2. Th. p. 284.

2) E. c. *petites maisons*. — *Narrenhaus*, *Tollhaus*.

3) E. c. gyrgathus Vindobonensis, qui nosocomio civico universali aggregatus est. Item *la Salpêtrière* Parisiis. Cfr. op. m. citat. *Reise nach Paris*, London etc. 1. Th.

4) E. c. *Bicêtre* Parisiis et plura ergastula Germaniae. Cfr. cit. op. meum et PÖCKEL'S *Bemerkungen über das cellische Zucht- und Irrenhaus in den Denkwürdigkeiten zur Bereicherung d. Erfahrungsseelenlehre*, Halle 1794.

tem. Quin immo, ipsi gyrgathi nimios non contineant aegrotos, — eorum non ultra centum optamus ⁵⁾. Praeterea aedificium gyrgatho dicatum, potius extensione, quam altitudine excellat ⁶⁾. Esto illius forma simplex et aedificiis consuetis, saltem exterius, similis ⁷⁾. — Structuram in tabula aenea hic addita exaratam, minus tamen, si lubet, columnis ornatam, proponimus ⁸⁾. Eligatur pro

K k k 2

tali

- 5) *La Salpêtrière* Parisiis 600 maniacos continet, sed etiam pro norma a me non proponitur. Gyrgathus Londinensis 300 aegros numerat, est incomparabile hoc institutum etiam a 115,015 libris Sterlinis sustentetur! Habeat modo quaevis urbs aliorum nosocomiorum instar et proprium gyrgathum, atque tunc necessitas in metropoli amplissimum gyrgathum erigendi non urgebit.
- 6) Nil pejus, quam homines impuros unum super alterum locare. Miror hinc W. STARKIUM (op. mox citando) gyrgathum ex tribus contignationibus proposuisse.
- 7) Vir lepidus, formam altissimae et rotundae turris gyrgathi Vindobonensis, jussu divi Imperatoris *Josephi II.* conditi, observans, epigramma inscribere ausus est: JOSEPHUS, ubique secundus, hic primus.
- 8) De structura et administratione gyrgathorum legi possunt: COLOMBIER *introduction sur la manière de gouverner les insensés et travailler à leur guérison dans les asiles, qui leur sont destinés. Paris 1736.* KRÜNITZ *Encyclopädie. B. 47.* ROBIN *du traitement des insensés dans l'hôpital de Bedlam. Paris 1768.* MARCUS *von den Vortheilen der Krankenhäuser für den Staat. Bamb. 1790.* HOWARD *Nachrichten von*

tali construendo aedificio locus, ab habitationibus
civium

den vorzüglichsten Krankenhäusern in Europa. A. d. E. Leipz. 1791. CABANIS quelques principes et quelques vues sur les secours publics extraits de plusieurs rapports faits à la commission des hospices et des hôpitaux de Paris. Paris 1791—1793. BROUTET notice sur la médecine morale appliquée au traitement des insensés à Avignon. SEDILLOT recueil périod. de la soc. de méd. de Paris T. 3. p. 75. Tableau du nombre des fous admis dans les hôpitaux de Paris dans les années XI. et XII. ibid. T. 20. p. 171. JOS. FRANK's Reise nach Paris, London etc. HÖCK's historische Nachrichten und Bemerkungen über die merkwürdigsten Irrenanstalten. Regensb. 1804. W. STARK remarks on the construction of the public hospital for the cure of mental derangement. Glasgow 1810. S. TURNER description of the retreat, and institution for insane persons of the society of friends, containing an account of its origin and progress, the modes of treatment and statement of cases. York 1813. DE LA RIVE description de la maison dite de retraite de York. Bibliothèque Britannique. Science. et arts, T. 8. Report from the committee of the house of commons on mad-houses in England; together with minutes of evidence and an appendix. Lond. 1815. PARKINSON observations on the act of regulating mad-houses. ROBERTS statement of the cruelties, abuses and fraudes, which are practised in madhouses. London 1816. HALLIDAY a letter to the right honourable Lord Binning containing some remarks on the state of lunatic asylums and on the number and condition of the insane poor in Scotland. Edinb. 1816. Idem: Letter to the magistrates of Middlesex on the propriety of erecting an

civium segregatus, quodammodo elevatus, aëre
optimo

asylum for the pauper Lunatics of the County. Lond. 1826. Et: *A general view of the present state of lunatics and lunatic asylums in great Britain and Ireland and some others Kingdoms.* Lond. 1827 (Cfr. *FRONIER* Notizen aus dem Gebiete d. Natur- u. Heilk. B. 24. No. 8. p. 121). *The first report on madhouses made in the year 1816.* Lond. 1816. *BURROWS* cursory remarks on a bill now in the house of peers for regulating madhouses. Lond. 1817. *HORN* summarischer Generalbericht über die in der Irrenanstalt der Charité in Berlin, während den letzten fünf Jahren vom 1. Oct. 1806. bis 1. Oct. 1817. geheilten, ungeheilt entlassenen, und gestorbenen Gemüthskranken und Epileptischen. *HUTELAND's Journ.* der pr. Heilk. 1818. Novembr. p. 77. *Des établissements des aliénés en France et des moyens d'améliorer le sort de ces infortunés.* Mémoire présenté à S. E. Ministre de l'Intérieur par le Dr. *ESQUIROL.* Bibliothèque universelle 1819. Septembr. scienc. et arts. p. 53. Et: *Rapport statistique sur la maison Royale de Charenton, pendant les années 1826. 1827 et 1828.* *Revue médicale* 1829. Juin. p. 118. *Privat-Heilanstalt für Gemüthskranke in Wien, eröffnet von B. GORZGEN* 1820. *J. L. CASPER* Charakteristik der französischen Medicin. Leipzig 1822. 8. Kap. Geisteskrankheiten und Irrenhäuser. *Rapport fait au conseil général des hospices civils de Paris dans la séance du 13. Novembre 1822. sur le service des aliénés traités dans les établissements de l'administration depuis le 1. Janvier 1801. jusqu'au 1. Janvier 1822, par le membre de la commission administrative chargé de ces hospices.* Paris 1823. *Etat général des aliénés entrés dans la maison Royale de Charenton pendant les an-*

optimo et bonis iisque copiosis aquis dotatus 9).

Janua

nées 1818, 1819, 1820 et 1821 et rapport sur cet état adressé à S. E. le Ministre de l'intérieur par Mr. ROYER-COLLARD. *Journal des débats*. Le 10. Février 1823. DESPORTES in *Revue médicale* 1823. Novembre, Décembre. GAULANDI osservazioni sopra il celebre stabilimento d'Aversa nel regno di Napoli, e sopra molti altri spedali d'Italia destinati alla reclusione e cura dei pazzi, con alcune considerazioni sopra i perfezionamenti di che sembra suscettivo questo genere di stabilimenti, con due tavole in foglio. Bologna 1823. BRÜCKNER über die Unterbringung und Verpflegung der gemüthskranken Personen in den Herzoglich Gothaischen Landen, besonders einer neuen Irrenanstalt in der Stadt Gotha. Gotha 1824. A. MÜLLER die Irrenanstalt in dem K. Julius-Spital zu Würzburg. Würzb. 1824. Neunjähriger Bericht über die Irrenanstalt in Glasgow. GERSON *Magaz. der ausl. Literatur. der gesammten Heilk.* B. 9. p. 370. BRICHETEAU des établissements destinés au traitement de l'aliénation mentale et en particulier de celui de Mr. VOISIN et FALRET fondé à Fautres près de Paris. *Journ. complément. du dictionnaire des scienc. médicales* 1825. cah. 89. KRAMER Bemerkungen über einige Irrenanstalten in Frankreich. HORN's *Archiv für med. Erfahr.* 1825. July. Aug. p. 104. M. PIENITZ diss. quaedam de nosocomii quo animo segrotantibus cura adhibetur institutione optima. Lips. 1825. J. M. LEUFOLDT über Leben und Wirken und über psychiatrische Klinik in einer Irrenanstalt. Nürnberg. 1825. SCHÜNBERG ein Wort über die Irrenanstalt in Aversa. GERSON *Magazin* cit. 1825. Mai. Jun. p. 465. RECH Ergebnisse des Irrenhauses zu Montpellier. Ex Ephémérides

Janua, antica (Tab. — a.) nonnisi ex jussu aperienda,

médicales de Montpellier 1826. T. 2. p. 109. in *Gerson Magaz. citat.* 1827. Mai. Jun. p. 489. RONCHI ex *Giornale del regno delle due Sicilie* 1827. Mario, in *Bulletin des sciences médicales* 1827. Juin. p. 125. *Del R. stabilimento de' pazzi di Aversa per l'anno 1826.* *Osservatore medico di Napoli* 1827. Settembre. *Neues Irrenhaus zu Plagwitz bei Löwenberg in Schlesien,* ERHARD's *med chir. Zeitung* 1827. B. 3. No. 68. *Report from select committee on pauper lunatics in the county of Middlesex, and on lunatic asylums. Ordered by the house of commons, to be printed.* Lond. 1827. J. C. W. WENDT über die Irrenanstalt zu Bidstrupgaard, ex *Meddelelser om Anstalten for Afstige i Tydsland og Danmark,* Kopenh. 1827. p. 64—107. in *Gerson Magaz. citat.* 1828. July. Aug. p. 46. Bericht über das Irrenhaus zu Moskau und die Behandlungsweise in demselben. *Ibid.* 1829. Jul. Aug. p. 32. RAHN Bericht über die Versorgung der Kranken im Zürcher Spital im Jahr 1826 (*Verhandlungen der med. chir. Gesellschaft des Kantons Zürich.* 1828. No. 2). *Etablissement consacré à la guérison des maladies mentales formé à Mache près de Bienne canton Berne,* *Bulletin des scienc. méd.* 1828. No. 7. p. 290. S. W. NICOLL an inquiry into the present state of visitation in Asylums for the reception of the insane; and into the modes by which such visitation may be improved. Lond. 1828. *Ueber die Irrenhäuser in Grossbritannien und eine von GORDON dem Parlamente den 25. Febr. 1828. vorgelegte Bill.* *FRORIER Notizen citat.* B. 20. No. 9. p. 142. *Zur Kenntniss des Zustandes der englischen Irrenanstalten von Dr. JULIUS, ejus et Gerson's Magaz. citat.* 1828. Jul. Aug. p. 1. HOLST Beretning,

da, semper clausa maneat. Foricula b. ad janitoris habitationem c. ducat, quam quivis intrare cupiens transire coactus erit. Exceptis familiaribus nemo hic sine schedula admissionis, a *directore gyrgathi*

Betänkning, og Indstilling til at undersøge de Sindsvages kaar i Norge. Christian. 1828. Verhältniss der Irren im Königreiche der Niederlande. Ex Rapport sur l'état des institutions de bienfaisance du Royaume en 1825. Bruxelles 1827. p. 8. in GERSON'S Magaz. l. c. p. 49. Nachrichten von den nordamerikanischen Irren-Anstalten in GERSON'S Magaz. 1828. Nov. Decembr. p. 466. et 1829. Juli. Aug. p. 18. Ex: An account of Asylum for the insane, established by the society of Friends, near Frankford, in the vicinity of Philadelphia, by R. WALN in Philadelphia journal of the medical and physical sciences, New Series Vol. I. p. 225; ex An account of some of the lunatic Asylums in the united states, by T. R. BECK in New-York medical and physical journal, New Series Vol. 1. p. 186; ex The American recorder. T. 13. p. 229. et ex W. G. MALIN some account of the origin, objects and present state of Pennsylvania Hospitals. Philadelphia. 1828. p. 24. G. A. E. NOSTITZ und JÄNKENDORF Beschreibung der K. Sächsischen Heilungs- und Verpflegungs-Anstalt Sonnenstein. Leipzig 1829. B. TROMPERO prospetto statistico del R. manicomio di Torino. Torino 1830. R. MADDEN Beschreibung des Irrenhauses in Cairo. Ex London medical gazette. March. 6. 1830, in FROBIEF Notiz. B. 27. No. 15. p. 213.

- 9) Positio gyrgathi sub nomine *Retraite*, Yorkii existentis, optima est. Pessima ea gyrgathi Viennensis prope cloacem *Alsterbach*,

gathi subscripta, admittatur. Directoris officium ab eo medici ordinarii ejusdem instituti sejunctum vellemus ¹⁰⁾. Scheda autem admissionis pro curiosis non nisi diebus et horis determinatis concedatur. Ad curiosorum molestorum numerum imminuendum et pro instituto simul lucri fontem aperiendum nemo sine pecuniae conspicua quantitate schedulam admissionis acquirat. Tempore, quo extranei introducuntur, aegri in cellulis reclusi maneant. Nemini, ne medicis quidem peregrinantibus ¹¹⁾, aegrotos ipsos visitare sit concessum. Si medicus extraneus consilii gratia adveniat, videat ille tantum aegrotum, pro quo advocatur. Sic et cum iis, qui aegrum consanguineum visitare cupiunt, agendum est. His tamen venia consanguineos adeundi, nisi prius medicus ordinarius annuerit, a direttore concedi haud liceat ¹²⁾.

Si

10) Aliter quidem sentit expertus EsQUIROZ (*Diet.* l. c. p. 223), ast ob faciles aegrorum eorumque parentum contra medicum gyrgathi querelas, judex tamen requiritur, ac supremus inspector.

11) Huic praecepto in gyrgatho Londinensi St. Lucae ipse subjectus fui. Ac revera a solo maniacorum adspectu nil addiscitur, ac gyrgathum in clinicum convertere omni ordini adversatur. Habeant contra instituta clinica cubiculum unum alterumve maniacis dictum, sicuti Vilnae stabilivi.

12) Visitatio maniacorum ab affinibus vix unquam indifferens est, atque plerumque effectum vel bonum vel malum producit, quem solum medicus ordinarius, nupote totius morbi historię gnarus, praevidere potest.

Si liceat, aeger tunc ad *parlatorium* d. deducitur. Quoad aegrotos ipsoa, ii solum ut tales in *gyrgathum* recipiuntur, quorum conditio maniaca ab authenticis medicorum approbatorum testimoniis ¹³⁾ confirmata habetur. Recipiuntur tamen et ii, qui, quatenus de mania suspecti, a Politia observationis gratia instituto committuntur. Hi autem cum aegrotis reliquis non locantur, aed *cubacula probativa* e. inhabitant, ad quae cubacula et sanati prope exitum transferuntur. De singulis sive receptis sive remissis processus verbalis protocollo inseri, idque cum reliquis chartis archivo tradi debet. Archivo praeest *inspector gyrgathi*. Eligatur pro tam gravi officio vir prudens, urbanus, sobrius, non iracundus, ac famulis instituti debitam concilians reverentiam. Inspector autem politiae totius domus intentus, ut simul aegrorum peculiarem curam babeat, vix expectandum. Constituatur ad hoc matrona, nomine *inspectricis*. Ambo ex classe institutorum infantum optime eliguntur, nil enim ad directionem maniacorum magis idoneum reddit, quam consuetudo infantes educandi. *Custodes* pro *gyrgatho*, centum aegros continente, decem requiruntur, utriusque sexus. Possunt eorum nonnulli ex convalescentibus pauperibus ipsius instituti desumi ¹⁴⁾. Sic fatui saepe officii

¹³⁾ Cfr. Cox l. c. p. 214.

¹⁴⁾ Exemplo *gyrgathi* Amstelodamensis. v. PINEL l. c. p. 210. in nota.

officiis in culina f., aut in lavacro g. praestandis egregie inserviunt. Custodes aegrorum optime vestis uniformis quodammodo monastica amicit, ne maniaci in iis vulgares famulos facile agnoscant. Veluti elingues, aegrotis secundum regulas praescriptas famulari et injurias sine contradictione tolerare debent¹⁵⁾. Plane enim inutile est, maniacos *argumentis* persuadere velle, praecipue si ea ex ore hominum educatione destitutorum proveniant. Defendantur custodes adversus aegros rebelles, superiorum ope, qui coram maniacis, quid agendum sit, praescribunt, et custodes executionis responsores constituunt. Generatim enim juvat, maniacos non directe alloqui, sed fixo in eos intuitu¹⁶⁾, sermonem ad adstantes dirigere¹⁷⁾. *Medicus ordinarius instituti* inspectoribus et custodibus imperet, et coram aegrotantibus ut despecta compareat¹⁸⁾. Nisi enim maniaci persuasi sint, omnem eorum sortem a medici uno arbitrio pendere,

15) *Instruction für den Irrenwärter und dessen Gehülfen beim Irrenhaus zu St. Georgen am See.* v. Höck op. c. p. 22.

16) PAROTEN l. c.

17) WINTINGHAM in *Samml. auserl. Abhandl. für pr. Aerzte.* 8. B. p. 282. LARGERMANN l. c. p. 62: REIL *Rhapsod.* p. 229.

18) HEINROTH de voluntate medici, medicamento insaniae. Lips. 1818. De vi imaginationis in maniacos lege FRONIER's Notizen aus dem Gebiete der Natur- und Heilk. B. 19. No. 15.

dere, de cura actum est¹⁹⁾. Medicus autem non solum in universa doctrina, quam profitetur, versatus, sed simul animi cordisque humani gnarus sit. Optandum, ut illius habitus et sese gerendi modus, ab aegrotis reverentiam extorqueat. Pauca dicat verba, sed quod dicit, factis suffulciatur. Nunquam aegroto quid polliceri debet, quin id stricte adimpleatur. Astu enim vel *fraude*, vel *strategematibus* raro, et solum in *mania hypochondriaca* et aliquando in *erotica*²⁰⁾ uti oportet, quibus scilicet in morbi formis a regula generali deflectere juvat, quod ab experientia AETII²¹⁾, DONATI²²⁾, QUERCETANI²³⁾, SENNERTI²⁴⁾, SCHENKII²⁵⁾,

19) Cfr. *Reise nach Paris, London etc.* 2. Th. p. 163. et REIL's *Hypochond.* p. 25.

20) A. СТОМАНИ de amore insanio ejusque causa, melancholia astu curata. *Miscell. acad. nat. cur.* dec. III. a. 1. 1694. p. 25. Cfr. ib. p. 32. De studioso, sanguine caustico et melancholia amatoria laborante, astu curato, mox ob personam amatam denegatam, ex prioris morbi recidiva succumbente.

21) Quidam se omnino capite destitutum putabat, ad quem sanandum Philotimus excogitavit *pileum plumbeum*, a quo gravatus caput se habere intelligeret. l. c.

22) Qui urinam pertinaciter retinebat, persuasus, si mingeret, quod tota urbs periret diluvio, strategemate quodam lepido, quasi tota incendio flagraret urbs, campania pulsatis, ad liberandam civitatem per urinae emissionem, sollicitatus, precibusque idea erronea ablata, sanitati pristinae restitutus est. l. c.

23) Vir, qui nasum se credebat habere ulnae magnitudi-

KII²⁵⁾, GATINARI²⁶⁾, TULPI²⁷⁾, SAUVAGESII²⁸⁾
et nostra²⁹⁾ comprobatur. Cum maniacis quot-
quot

ne, ab imaginatione ista liberatus est, astu chirurgi,
qui accommodato illius naso hepate bubulo, magna
frustra rescindebat cum euphoria aegri. l. c.

24) Qui cornua se gestare credebat, sensit levamen, post-
quam capiti alligata cervi cornua, serra secarentur. l. c.

25) Feminae illi, quae putabat, ventriculo inhaerere ser-
pentem et rodere illum, vomitorinm prius exhibitum
est, dein clam talis bestia matulae imponebatur, unde
persuasa eam expulsam medicamentis ope, convaleuit. l. c.

26) Aegrum, qui accusabat se habere ranas in ventre, ita
allocutus est GATINARIUS: „verum dicis et scio te
multas habere in corpore.“ Purgans dein praescripsit
et iussit, ut affines ostenderent aegro egestionem cum
ranis vivis impositis. l. c.

27) Pictor imaginaria illa laborans ossium mollitie, ami-
sit hanc insaniam, et juxta eundem auctorem (lib. IV.
c. 83) alii, qui coecos se credebant, visus est restitutus,
solis strategematibus medicis, l. c.

28) „Artificio quodam ZACUTUS LUSITANUS sanavit
olim melancholicum, qui se perpetuo frigere arbitra-
batur, et vidimus hic Gratianopolitanum simili delirio
per annos etiam calidissimos detentum; ipsum spiritu
vini madida pelle lanigerâ cooperuit, et accenso spi-
ritu per semi-horam calcfecit ad combustionem usque
LUSITANUS, unde laetus et tripudians se jam nimis
calere exclamavit aeger, et brevi convaleuit melanco-
licus.“ l. c.

29) Nobilissima femina, triginta circiter annorum, plu-
rimarum prolium mater, rebus mirabilibus, uti prae-
sagiis ex chartis lusoriis, praeparationi cosmeticorum
fidens, ab animi pathematibus praecipue ab amore il-

quot sunt leniter et cum commiseratione agat medicus,

licito agitata, quamvis parum menstruata, attamen jam a sex mensibus, quavis catameniorum periodo accedente, periculum letalis metrorrhagiae sibi imminere imaginabatur. Cui ficto periculo obviam tunc ire conabatur, statnae instar in lecto decumbendo, atragula rejiciendo, per signa loquendo, cibos potumque gelidum aumendo et abdomini aquam frigidissimam imponendo. Nec satis! simul enim vaginam turundis clam adimplebat, ad quas magis magisque firmandas manu sinistra partes genitales externas comprimere erat solita. Quoniam vero eodem pacto et alvinam evacuationem timebat, a qua ea quammaxime debilitari assebat, faecum excretioni digitorum manus dextrae ano immittendo obstabat. Verisimiliter ut evacuationibus facilius invigilare posset, sese undique candelis accensis circumdabat. Tempore menstruali periodo intermedio, vitam valetudinariam veluti hysterica duxit. Ultima menstruatione accedente, uti antea, se gessit, ea solum cum diversitate, quod nunc et lucem adverbabatur et diutius solito, ob magis protractum metrorrhagiae timorem, quin vel lavationi vel linteorum mutationi indulserit, decumbebat. Advocatus ad aegram (mihi prius ignotam), secunda jam hebdomade lecto affixam, interrogavi, quid pateretur? Tremente et demissa voce, verbisque intersectis, timorem suum de metrorrhagia et lucis horrorem patefecit. Omnia, nulla mota difficultate, accepi, immo prudentiam aegrae in fluxu sanguinis praepediendo laudavi. Quoad horrorem lucis, me nialum istud in longaeva praxi pro secunda tantum vice observare asserui. Quae singula fiduciam et benevolentiam aegrae quammaxime captarunt. Quaeso, addidit, sanastine aegrotum, qui lucem

dicus, ac praeterea altiori loco natis ea urbanitate,
cui

abhorrebat? Utique. Quibusnam remediis? Certo non pharmaceuticis. Quibus igitur? Libros pretiosos hereditario jure acquisivi, ex quibus plurima secreta, vulgo medicorum ignota, didici. Num communicabis mihi quid ex istis? Videbo, pro primum fortior eris; sed dic ante omnia, undenam horror tuus lucis originem ducat? Originem ducit a luce, quâ tota imbuta sum. Lux enim in venis meis in circulum agitatur, lucida sunt mihi ossa, et omnia ad combustionem parata. Sed quo pacto ita a luce imbuta fuisti? Per candelas accensas, quibus me, incaute nimis, tam diu circumdedi. — Jam satis! Liberabo te a nimia luce, et a haemorrhagiae periculo. Sumpsi tunc solutionem oleosam phosphori in cavum manus meae cybotbecae munitae, eaque clausa, aegram adivi, rogando ut brachium mihi porrigeret suum. Exhibito brachio frictiones deorsum institui, sub quibus manum tantillum aperiendo, lux revera ex aegrae superficie manare videbatur. Obstupuit ipsa, et se valdopere recreatam esse asseruit. Illico cessavi. Rogo, ait, perge facere, perge. Nequeo — nisi prius experiar, utrum nunc radium lucis a candela emanantis perferre poteris nec ne. Successit experimentum, et sic repetitis periculis phosphoricis nunc manus nunc pedes perfricando sensim sensimque secundo jam nycthemero candelam umbraculo munitam in ipso suo cubiculo perferebat. Rebus huc perductis faeces in intestino recto, et lintea in vagina collecta, ulterioribus experimentis obstare, monui. Tunc aegra remotioni horum obstaculorum non obstitit. Exhibui interea elixirium acidum Halleri cum aqua et syrupo rubi idaci. Munditie, quae aegra aliâs valdopere delectabatur, adeo recreata fuit,

cui adsueta sunt, obviam eat; nec obliviscatur inveniri quacunq̃ue in civium classe maniacos, qui per sensum gloriae et honoris optime duci possunt³⁰⁾. Captatâ aegrorum reverentiâ, benevolentiae illorum studendum. Conceditur hinc vel major libertas, vel melior diaeta, aut dona offeruntur etc. Medicus ordinarius suum habeat *secundarium* historias morborum exacte describentem. Visitatio

ut paullo post et elegantia, sese limbis denticulatis et margaritis ornando, accesserit. Totam diem cum ipsa transigendo, colloquium a rebus ad morbum spectantibus ad res musicas, theatrales aliaque hujus generis deducere aetegi. Cum semel aegram in chartis futura quaerentem invenerim, ut instrumenta haec insaniae mihi traderet, expetii. Recusavit. Me illico, nisi accederet, abiturum fore (habitabat nempe in urbe quadraginta et ultra miliaria Vilna distante) declaravi. Annuit tandem. Tali triumpho obtento omnia dein facile ad nutum procedebant. Iter nunc Vilnam proponi, quo valde recreata est. Proxima hic accedente menstruatione ipse quietem et medicamenta ad haemorrhagiam uteri praepediendam, pro forma certe, exhibui. Aegra hac cautelâ contenta, nulla patefecit alienatae mentis signa. Jam sanitati tonicorum an usu restituta vidabatur, cum fervidissimae aestatis anni 1810 tempore, derepente in paroxysmum maniae saevientis per mensem durantem inciderit. Eo, veluti critico, terminato, omnino convaleuit ac Vilnam dereliquit. Sibi ipsi nunc commissa vitam adhuc ducit sanam, sed ut antea absurdam et probrosam.

30) ERHARD in WAGNER's *Beiträge* 1. B. p. 137. et REIL *Rhapsod.* p. 251.

sitatio medica, nisi quid inconsueti accidat, alter-
nis diebus sufficit. Praeterea vir in operationibus
chirurgicis minoribus et in praeparatione medica-
mentorum versatus ipso in gyrgatho resideat; ab-
sente medico inspectori submissus. Receptus
aeger, secundum jussum medici, vel proprias ve-
stes retinet, vel eas gyrgathi induit. Curandum,
ne arma, cultros et similia celet. Inquirendum
etiam, num psora, ulcera chronica, hernia etc. la-
teant. Capitis munditiei studeatur et, nisi de pli-
coso vel convallescente ex alio morbo agatur, cri-
nes rescindantur ³¹⁾. Sexus inter se ³²⁾ et aegroti
altiore loco nati ab hominibus vulgi separandi ³³⁾,
item aegri sanabiles ab insanabilibus ³⁴⁾. Nil enim
curae magis adversatur, quam maniacos diversae
condi-

31) MOROACNI de sed. et caus. morbor. Epist. VIII. 7.

HARKE in HUFELAND's Journ. d. pr. Heilk. 25. B. 2. St.
p. 69. MORREAU sur une manie guérie par la coupe
des cheveux, in Mémoir. de la soc. méd. d'émulation
2. T. p. 196. Et SEDILLLOT rec. périod. de la soc. de
méd. de Paris T. 4. p. 280.

32) Vix concipi potest, REILIIUM separationi sexuum in-
ter maniacos non favere (v. app. ad vers. germ. op. o.
COXII p. 63).

33) Et huic separationi REIL non favebat. l. c. Attamen
ea instituto fontem lucri aperit. A justitia enim de-
flectere haud credimus, ut quivis dives, qui beneficio
asyli publici pro modico fruitur pretio, ad sustentan-
dum simul unum ex pauperibus persolvat; qui usus
in asylo Yordiano locum habet.

34) PIENITZ l. c.

Frank Praex. II. I. 1.

conditionis et educationis inter se miscere. Aedificium a nobis propositum, utpote quatuor alas exhibens, separationes indicatas faciles reddit. Quivis autem aeger, sine distinctione conditionis, specialem inhabitet cellulam. Aegri inquieti et immundi ad extremitates alarum, prope latrinas h. collocentur. Quousque fieri potest, aegri latrinas has communes adeant. Apud reliquos trullae citissime e cellulis removendae. Maniaci quietiores hic solum noctem transigant. Cum lecti quamvis ferrei a maniacis facile rumpi possint, ac lignei munditiei obstant, fulcrum lecti esto murale, parieti cellulae adhaerens parumque declive i. Murales sunt et mensa et sedilia opposito parieti affixa. Cooperiantur paries, lecto respondens, et lecti ipsius fulcrum culcitris stramentitiis, non neglectis ad aegrum cooperiendum debitis linteis et lodicibus. In cellulis, aegris saevientibus dicatis, murus undique ad hominis altitudinem contabuletur. Ad propagationem soni ab aegrotis ejulantibus editi impediendum, plurima auxilia, at hucusque incassum, indicata fuere³⁵⁾. Ostium sat amplum pro fenestra, januae opposita, adeo sit altum, ut aeger illud attingere nequeat. Fenestrae foris aperiuntur. Ostium supra ipsam januam positum, fenestrâ non indiget. Janua esto densa,
sine

35) AUTENRIETH *Beyträge* 1. B. p. 212. Opus meum: *Reise nach Paris, London etc.* 2. Th. p. 182. REIL append. cit. p. 67.

sine sera, locoque illius obice, corio, ad rumorem impediendum obducto, extrinsecus munita. Praeter ostium fenestrae locum tenens, janua adhuc habeat foramen forulo extrinsecus claudendum, per quod custos, quid aeger cellulae inclusus agat, videre possit. Ciborum quoque introductionem tale admittit foramen ³⁶⁾. Absint catenae et vincula ferrea ³⁷⁾, et aliae coercitiones ³⁸⁾, locumque eorum teneat *tunica manicata* ³⁹⁾ (aut similis ⁴⁰⁾), qua ad dorsum ligata, brachia decus-

LII 2

satim

36) *Huitième lettre du professeur PICTET à ses collaborateurs. Bibliothèque universelle 1822. Mai, p. 77.*

37) Jam consilio MORBII (l. c. §. 73) blanda ligamenta commendantur. Cfr. H. A. FIELITZ de variis methodis frenandi furibundos. Hallae 1819.

38) E. c. sedile a RASCH propositum, aut, ut dicunt, *der Brenkenhoff'sche Trog* (WAGNITZ hist. Nachricht. 2. B. p. 262).

39) ANGL. *The straight waistcoat.* GERM. *Das Zwangskamisol.* Imago habetur apud CHIAUCCI T. I. d. *Ubers.* fig. 4.

40) PICTET l. c. („C'est une espèce de manchon fait en cuir très-fort, dont les deux entrées sont étroites, et le milieu plus large, de manière que les deux mains y sont fort à leur aise, et se ferme quand la main est entrée dans le manchon, au moyen d'un anneau de fer, qui passe dans une gance; une forte courroie passe ensuite de l'un de ces anneaux à l'autre, et est bouclée en retour, de manière que le porteur du manchon ne peut pas faire le mouvement nécessaire pour en sortir ses mains, dont il ne peut non plus faire aucun usage“).

satim trunco figuntur. Flagellatio proscribenda⁴¹⁾, nisi medicus maniacis saevientibus, aut pertinaciter malitiosis, aliisque ictibus infensis, unam alteramve plagam, se praesente, infligere jubeat⁴²⁾, quo facto aegro illico blandiendum⁴³⁾. Aegrotis quie-

tiori-

41) Praeceptum istud aevo nostro non tribnendum esse, ex sequentibus THOMASII verbis elucet: „accedit quod etiam Principibus et nobilibus furiosis dentur custodes homines vilioris conditionis, vel plebeji, iisque permittatur, metu furiosis, etiam ubi opus sit per verbera incusso, illos coercere, ne conatus furiosos ita facile in actum deducant. At quis quaeso, ita ruditer ab hominibus rusticia et crudelioribus quotidie habitus, posset evidentia signa rationis restitutae alia praebere, cum potius illa durities custodum et rusticitas, si homini mentis integerrimae saltem per aliquot dies accidat, capax sit, eum furiosissimum reddere.“ l. c. p. 12.

42) Quamvis consilium CAZSI (lib. III. c. 28): „ubi perperam aliquid dixit aut fecit, fame, vinculis, plagis coercendus est“ — nonnulli brute secuti sint, at tamen neque in oppositum extremum incidendum, et methodus, ut ipse expertus sum, aliquando efficax, plane rejicienda. Cfr. SANCASSANI epist. v. HALLEN bibl. med. pr. Vol. III. p. 601. et WEDDEL propempticon inaugurale de verberibus medicis. Jen. 1721.

43) SWIETANIUS ait: „Fuit homo satis celebris apud Batavos insanientium cura, qui hac methodo utebatur et multos sanabat. Simul ac delirarent, tractabat miasmos, ferarum instar, verberibus, catenis, perfusione aquae frigidissimae, fame, siti etc. Dum mirescebant, omni modo blandiebatur illis, nihilque omnino negabat illarum rerum, quas desiderabant. Hoc modo ef-

tioribus atrium commune k, pro mora diurna, praesertim hieme, inservit. Solitudo enim protracta, inprimis in loco non satis lucido ⁴⁴⁾, maniacis constanter nocet. Custodes e centro aedificii l, uno oculi ictu, non solum quatuor atriis, sed etiam totidem hortulis m, invigilare possunt. Fenestrae atriorum eam habeant formam, quam alibi fusius descripsimus ⁴⁵⁾ et tabula aenea illustravimus, quaque clathri et inde adspectus carceralis evitantur, quin accessus liber aëris aut necessaria aegrorum securitas impediatur. Hieme pars totius aedificii, quae aegrotantibus inservit, ope canalium subterraneorum, veluti loca culturae hiemali vegetabilium dicata, calefiat. Possunt quoque atria, arboribus et plantis exoticis, interpositis avariis volucris adspectu et cantu recreantibus, ornari. Fenestris nonnullis naba, sic dicta, Aeoli ⁴⁶⁾ adeptari potest. Atque haec singula tunc tantum, dum non timemus peculiarem nonnullorum aegrorum vitiatam imaginationem inde magis adhuc laedi posse. Materiae calefaciendi gratia adhibitae et lucem suppeditare possent

fecit, ut melius verberum coereret incipiens delirium et tandem deleteret vanas illas imaginationes: contra ea dum pacatum statum mox sequebantur omnia, quae placere ipsis poterant, felix saepe successit curatio." l. c.

44) Cox l. c. p. 81. REIZ in HOFFBAUER'S *Beiträge* 1. Th. p. 609.

45) *Reise nach Paris, London etc.* 1. Th.

46) *Aeolus - Harfe.*

possent nocturnam ⁴⁷⁾. Ceterum qualiscumque lux in atria stabilita, per foramina super januas cellularum, et cellulas abunde illuminabit. Aestate fervida et hieme rigida exceptis, aegris quietioribus aditus ad hortulos, umbra non carentes, conceditur. Hic amplam opportunitatem invenient varia exercitiis gymnastica et lusibus indulgendi, uti equitationi ⁴⁸⁾, conorum lusui ⁴⁹⁾, decursioni ad annulos ⁵⁰⁾, cui ob id palmam concedimus, quod constet, *motum rotatorium*, quatenus nauseam et salutarem effectum in cerebrum excitat, ad potiora auxilia, quibus therapia maniarum locupletata est, pertinent. Omnem hinc laudem et *machinae rotatoriae* ⁵¹⁾ (aut aliae *vibrationi* dictae ⁵²⁾),

47) De sic dictis *Thermolampes* loquor.

48) In hortulorum uno domitorem equariam nec constitui, quae saltem aegrotantibus divitibus inservire potest. Stabula in propinquis sunt o. simul cum locis curribus recipiendis idoneis, si aegro vectio concedi vellet.

49) Porticus p. locum idoneum pro eo exhibent.

50) Vulgo *Carroselli*.

51) Legatur hoc de argumento Cox l. c. p. 158—213, quem pro inventore hujus machinae habeo, quamvis editor operis illius germanici, BARTELSMANNI (in nota ad p. 207) docte demonstraverit, motum rotatorium tum ab ENN SINA (lib. III, fen 1, Tr. 4. c. 17. p. 488), tum a KRAETZENSTEIN (novum medicinae genus, nimirum vim centrifugam ad morbos sanandos applicitem, more geometrarum. a. 1765) jam dudum commendatum fuisse.

catae⁵²⁾), tribuimus, quâ tum in mania saeviente, tum in melancholica pluries utiliter usi sumus⁵³⁾. Tempestate moram in hortulis impediende, *porticus* p. praesto sunt, sub quibus *balnea* tepida calida, vaporosa, frigida, cum vel sine immersione aut praecipitatione locum inveniunt aa. *Balnea* enim ad potiora adversus manias auxilia spectant. his, praecipue *tepidis*⁵⁴⁾, utimur, maxime in maniis arthriticis aliisque amenorrhoea, cutis siccitate, agrypniis stipatis, vel ex fugatis impetiginibus ortis, nec non in genere puritatis causa. *Balnea*, *fervidissima* gradatim *reddita* (a gradu scilicet 28 ad 31 thermometri Reaumuriani), affusa simul aquâ frigidissimâ super caput⁵⁵⁾, necdum adhibuimus. Contra ea saepe ad tempe-

52) *Vibrationsmaschine zum medicinischen Gebrauch von Rieffelsens*,. descripta a SCHÖNBERG in *HARTZES Jahrbücher der deutschen Medicin*. B. 1. Heft 1.

53) Idem testatur cl. HORN v. *Archiv für med. Erfahrung*. 1813. Jan. et Febr. p. 114.

54) De balnearum tepidorum in maniis usu legantur: WINTRINGHAM comment. de quibusdam morbis. No. 258. HALLÉ in *Mém. de la soc. R. de médec.* T. 8. PERFECT l. c. No. 78. PIKEL (l. c. p. 329) asserens: „et depuis près de huit années ces bains sont devenus la base fondamentale du traitement de maniaques et des mélancholiques.“

55) Hac in methodo secretum DELAHOT et LUCETT consistere TARDY (*the medical and philosophical journal*) affirmat. Methodum vero istam novam non esse, DANIEL (*Beiträge z. medicin. Gelehrsamkeit*, No. 5) docet.

temperandum nimium cruoris ad encephalum impetum, sedenti in balneo tepido maniaco, *embrocationem* capiti utiliter applicuimus ⁵⁶⁾. *Balnea frigida* valde hic laudata ⁵⁷⁾, si agatur de diuturna in iis mora, excepto in mare, timemus, nequaquam autem si solum de *immersione* ⁵⁸⁾, aut *methodo irrorandi* ⁵⁹⁾ quaestio sit. Indicatur ea potis—

56) Cfr. *Reise nach Paris, London etc.* 1. Th. p. 87. TOLBERG in HUFELAND's *Journ. d. pr. Heilk.* 26. B. 3. St. p. 32. PINEL l. c. p. 329.

57) P. A. MICHELOTTI maniae per gelidae balneum curationem complectens, *Acta acad. nat. cur.* Vol. I. p. 191. DON FLORENCIO DELGADO *de la virind de los baños de agua fria para curar los maniacos. Mem. acad. de la R. Soc. de Sevilla.* T. 4. p. 84. MUELLER l. c. THEEDEN *neue Bemerk.* 1. B. p. 145. 146. TODD *Annalen.* 5. B. p. 72. FAXE l. c. LAZARUS *curat. morb.* Vol. I. p. 101.

58) PINEL (op. c. p. 325) praconceptam opinionem contra istam methodum alit, quae hucusque omnium suffragia merito obtinuit. Ne enim dicam de VANHELMONTIO (demens ides p. 228); ad БОЕННАВІУМ (SWIET. comment. T. III. §. 1123) provocho dicentem: „praecipitatio in mare, submersio in ea continuata, quamdiu ferri potest, princeps remedium est.“ Accedunt: PECHLIN de vita sub aquis. WINSLOW *sur l'incertitude des signes de la mort.* *Acta medica Berolinensis.* dec. I. Vol. 7. p. 61. BAYARD *of the use of baths append.* TODD *Annalen.* 5. St. p. 72. BERNARD in *Journ. de méd.* T. 64. p. 47. HILSCHER in TODD *med. Journ.* 5. B. 4. St. p. 14. WEBER *obs. med.* Fasc. I. p. 26.

59) Creberrime ea utor, ac raro sine quodam levamine.

potissimum, si mania ex abusu liquorum fermentatorum originem ducat ⁶⁰⁾, si conditio morbi inflammatoria aut gastrica prius ablata fuerit, eique nulla adsint arthritidis signa. Hac sub rerum positione et *epithemata frigida capitis* ⁶¹⁾, dummodo non diu protracta, adhiberi queunt. *Pediluviis*, praesertim irritantibus, maxime in mania periodica, tempore paroxysmi locus est. Ut aegrorum mens et hiemali tempore recreari possit, latrunculi ⁶²⁾ alique hujus generis lusus ⁶³⁾ praesto erunt. Spectaculis theatralibus, a REILIO propositis ⁶⁴⁾ et in nonnullis gyrgathis usitatis, non favemus ⁶⁵⁾. Maniaci enim per se jam nimis alienas ludunt partes. Praeterea omnia apud eos evitanda sunt, quae imaginationi pabulum praebent. Qua de causa et libros ⁶⁶⁾ maniacis non facile et nunquam aliter quam

60) CURRIE über die Wirkungen des kalten und warmen Wassers, p. 150.

61) HILSCHER l. c. WENDT Nachrichten von dem klinischen Institut in Erlangen. HUFELAND neues Journ. der pr. Heilk. 27. B. 1. St. p. 146. vel: Journ. d. pr. Heilk. 27. B. 1. St. p. 62. LEUTHNER praktische Heilungsversuche der Milzdünste. Ulm 1779. PIDERIT pr. Annalen. 2. St. p. 171.

62) JAM RHAEUS lusum latrunculorum hic commendat. lib. I. c. 3. f. 6.

63) Cap. XVII. §. LXXVII. 2. 64) Rhapsod. p. 246.

65) Et ESQUIROL (Dict. p. 229) non favet.

66) HOAR aegrotos hosmet inconsulto ad lectionem librorum et ephemeridum politicarum adigere videtur, l. c.

quam pro lectione alta voce instituenda ⁶⁷⁾ tradimus. Contra ea opportunitatem variis instrumentis musicis ludendi aegrotis procuramus. De *musicæ* enim in maniis efficacia, dummodo ea vario illius characteri accommodata sit, nec antiquitas dubitaverat ⁶⁸⁾, nec illi, qui effectuum symphonie in animum memores sunt, dubitabunt, nec quis medicorum præsentis ævi dubitat ⁶⁹⁾, quamvis et hic exceptiones nobis obvenerint ⁷⁰⁾. Et *cho-reis* determinatis diebus et horis indulgere licebit, quo in casu aegroti utriusque sexus *usui rationis proximiores*, sub debita inspectione convenire poterunt. Cubiculum quoque *magicis apparitionibus* dicavimus ⁷¹⁾, quibus tamen non nisi cum
summa

67) — „Et vocis exercitium, quod cuique convenit.“
CALPUS l. c.

68) ASCLEPIADES apud CAEL. AURELIAN. Cfr. *Miscell. acad. nat. cur.* a. 1. 1692. p. 4.

69) COX l. c. p. 89—93. ROCHLITZ in: *Musikalische Zeitung*. 6. Jahrg. No. 39—42. RAUSCH *physiologische Abhandl. über den Einfluss der Töne u. der Musik auf die Seele*. Breslau 1782. In ipso clinico Vilnensi bonos musicæ effectus adversus maniam sævientem ann. 1815. experti sumus.

70) Mense Maio ann. 1815. a Dr. *Herberti* ad juvenem e stirpe maniaca ortum in consilium advocatus fui, qui omni mense per curriculum hebdomadis mania melancholica laborabat, ceterum vero sanus videbatur. Sub paroxysmo aeger iste a qualicunque musica in furorem præcipitabatur.

71) Sub lit. r. Pavimentum hujus cubiculi ponte ver-

summa cautela ⁷²⁾ in mania chimaera ⁷³⁾, phantastica ⁷⁴⁾ et saeviente ⁷⁵⁾ uti licebit, semper memores, impressiones sic suscitatas, maniacos longe aliter, quam homines sanos afficere. Haec cum ita sint,

satili instructum esse deberet, ut aegri machinae ope in cubiculum inferioris contignationis s. et ex hoc per foramen in subterraneum t. demitti possent. Hic tentamina, quibus, ut mihi narratum est, *franco-murratores* ad explorandum animum sociorum recipiendorum uti solent, in usum medicum deducere forte liceat. Cfr. CHIARUGI l. c. p. 384. Et REIL *Rhapsod.* p. 209. Jam CELSUS dixerat: „Subito etiam terri et expavescere in hoc morbo prodeat; et fere quidquid animum vehementer perturbat“ (lib. II. esp. 18). Legi hoc sub respectu meretur in *Neuen Schriften der Gesellschaft naturforschender Freunde Westphalens* B. 2. p. 42. *Ursach der in der Lipstadter Zeitung vom J. 1798. No. 155. erzählten Thätigkeit und des Rettungsseifers der Wahnsinnigen, und von der Stille der Wüthenden und über Gelassenheit in dem Brande des Irrenhauses zu Berlin.*

72) Consilia, a REILIO data (*Rhapsod.* p. 225. 226. 238), potius ad homines maniacos reddendos, quam sanandos idonea mihi videntur.

73) E. c. ad impressionem fortem super sensus faciendum, quae suggestiones imaginationis extinguere valeat. Cfr. W. L. WILLE de singulari affectu melancholico in femina moestitia suborto, et per quatuor annos eum dimidio durato, ac repentino terrore iterum sublato. *Nova acta acad. nat. cur.* Vol. 5. p. 166.

74) E. c. ad pacem animo per apparitionem quandam visioni angenti oppositam conciliandam.

75) E. c. ad timorem audacise opponendum.

sint, maniaci etiam non indiscriminatim ad *cultum Dei* admitti debent ⁷⁶⁾. Qua de causa *aediculam* n. potius convalescentibus, quam ipsis aegris dicavimus. Attamen ordine medici, inprimis si cum *ecclesiastico* instituti conveniret, exceptio fieri posset. Ecclesiasticus iste, si doctrinae maniarum non alienus foret, in plurimos aegros medici veluti manum dextram constitueret ⁷⁷⁾. Diebus operariis aegri et praecipue convalescentes ⁷⁸⁾ variis laboribus manuariis, mechanicis, domesticis aut rusticis (dummodo evitetur, quod sol caput allidat) occupandi ⁷⁹⁾. Hortus et campi gyrgathum circum-

76) Quaestio magni momenti: *utrum maniacis exercitia religiosa concedenda sint nec ne?* a NISMETERO (*Philotas* 8. 86) negative resoluta est; quam sententiam REIL (app. ad vers. germ. op. COXII p. 35) merito restrinxit. Ex professo allatam quaestionem enucleavit P. SLADE KNIGHT (op. c.), uti videre quoque est apud FRORIEF *Notizen etc.* B. 17. No. 4. p. 57. ex *The London med. repository* No. 19. New Series Vol. 4. p. 1827.

77) Gratias hic publicae theologiae nostro profesori (modo Episcopo Vilmensi) *Klękiewicz* ago, utpote qui aegrotis meis maniacis in clinico summo cum emolumento adstiterat.

78) PINEL l. c. p. 247. REIL l. c. p. 31.

79) REIL hoc argumentum pulchre dilucidavit (*Rhaps.* p. 240). Otium certe non solum vitia, sed et insaniam fovet. Praeterea laborum ope *attentio* aegrorum figitur, cui scopo interdum et *itineris* inserviunt. Quare CARL. AURELIAN.: „Utendum etiam peregrinatione

cum dantes v., et species villae illis annexa ⁸⁰), non solum oeconomiae instituti, sed et aegrorum saluti providere poterunt. *Diaeta* conditioni aegrorum peculiari accommodanda. Sunt, qui *fame*, ad audaciam aegrorum frangendam, utantur, ac revera maniaci, veluti bruta, aliquando tali auxilio domantur. Verum facile inde contingit, ut aeger scenam mutet, ac ipse dein alimenta recuset ⁸¹). Praeterea nonnulli per abstinentiam aut victum parcum vel magis saevire incipiunt, vel magis fatui evadunt ⁸²). Quare si morbus aut ex inedia proficiscitur, aut in hominibus victu lauto quondam adsuetis residet, aegri potius bene nutriendi sunt, concessa, praeter juscule carnea, ipsa carne, quam alias tamen, illa amphibiorum ⁸³) excepta, non libenter, saltem quotidie maniacis concedimus. Conducunt enim illis potissimum

vege-

terrena atque maritima, et animi avocamentis, quibus mentia laxatio fiat." l. c.

80) Lit. x. Legatur PINEL (p. 241) de gyrgathis in villis erigendis. Item PISSEITZ l. c.

81) Sic mihi binis vicibus accidit. Cfr. HUSLAND'S *Journ. d. pr. Heilk.* 1. Th. p. 290. et 20. B. 1. St. p. 179.

82) PANOTER l. c. p. 103. 108.

83) Juscule e ranis, limacibus, testudinibus, viperis, non spernenda esse alibi docui. Cfr. LONAT l. c. p. 527, qui doctos vir et veterum opiniones circa esum carnis leporinae, piscium etc. in melancholicis, ad trutinam vocavit (p. 297).

vegetabilia ⁸⁴⁾ subacida, antiscorbutica, non flatulenta ⁸⁵⁾, farinacea, panis, oryza, hordeum, avena, milium, solanum tuberosum, zea mais et maxime fructus horaei sive recentes sive conditi ⁸⁶⁾; nec non cibi lactei, butyrum, caseus acidinis expers, lacque purum vaccinum, equinum ⁸⁷⁾, asininum ⁸⁸⁾. Praeter sal commune ⁸⁹⁾ et semina coriandri sativi, anethi foeniculi, ac sinapis nigrae, alia non facile admittimus condimenta.

Quoad

84) Dolendum, nos ignorare, quid veteres sub nomine *Troximum* sive *Troximia* intellexerint, num scilicet aliquod vegetabile in specie, num olera in genere, constat enim solum troxymium in melancholiis ex observationibus victum admodum celebratum constituisse. LORRY l. c. p. 314.

85) Miror tabulam dieteticam nosocomii *la Salpêtrière* favas et lentos continere, quas unanimi consensu in vesaniis rejecerunt veteres. Longe magis mihi dieta arridet, quae in gyrgatho *Neuruppinensi* et *Baireuthensi* praescripta est (NIEMANN *Handbuch d. Staatsarzneiwissenschaft*, Leipz. 1813. 1. Th. p. 457).

86) LORRY pro victu hiemali maniacorum, roob aliasque praeparata ex fructibus cum melle commendat. l. c. p. 315.

87) POSIDONIUS, v. LORRY l. c. p. 294.

88) Teste LORRY (l. c. p. 361), lac hujusmodi praesertim in melancholiis cum vitis licis in usu quondam erat.

89) Sicuti generatim in dieta nosocomiali ordinanda quam maxime ad sal, oeconomiae animalis tam necessarium, respicere soleo, ita speciatim in dieta gyrgathorum.

Quoad quantitatem cibi exhibendi, nisi media via semper teneri queat, potius excessu quam defectu ⁹⁰⁾ peccandum est. Si noctes fuerint longae et tunc voracibus quid porrigi debet. Optimum *potum* pro maniacis *aqua* constituit; vel si nutritionis necessitas urget, *cerevisia*. *Vinum* praecipue indicatur, sub virium jactura, animi abjectione, extremitatibus semper subfrigidis, pulsu debili, et potissimum in aegrotis a pharmacis quondam inutiliter obrutis. Nec de regime diaetetico loqui cessabimus, quin *veneris* mentionem injiciamus, utpote quae in maniis plurimis, praecipue in erotica, melancholia ⁹¹⁾, moria ⁹²⁾ etc. sub rerum positionibus facile intelligendis, auxilium omni aevo celebratum ⁹³⁾ sistit. Illud in gyrgathis vix

90) De pernicie defectus necessarii victus in maniis legantur Cox l. c. p. 95. et PINEL l. c. p. 232—236.

91) PRANAUD ergo melancholiae venus. Paris. 1658.

92) MARCELLUS DONATUS lib. II. c. 1. p. 96.

93) Imperator AUGUSTUS melancholia aegrotantibus Romanis, suavem et cujusalibet ingenio bene convenientem conjugem, quae tanquam fidelis socia in laetis et dulcis consolatrix in adversis, tum sanum exhilarare, tum aegrum curare posset, ut praestantissimum remedium imperasse legitur (DIO CASS. in Caes. Aug. lib. LVI). Quam etiam expertam curatricem, quippe quae cor a curis avertat, et animum irritatum placet, nomine *Viriplacae* et *Verticordiae*, Romani sibi ipsis invicem commendarunt animis aegrotantes postea (MARLIAN. antiquit. Rom. lib. III. c. 3. AL. AB ALEX. p. 57 etc. BAISSON lib. I. VALER. MAX. lib. II.

vix unquam locum obtinere posse, per se elucet. Omni enim sub respectu disciplina istiusmodi in institutis perfecta requiritur, non excepto ordine relate ad horas pastus, somni, laborum etc. ⁹⁴). Tandem cum maniaci vel ab aliis morbis non immunes sint, et tales aegri peculiarem curam exposcant, in ipso gyrgatho peculiare valetudinarium y. constituimus. Nec loci depositioni cadaverum dicati, cum cubiculis pro sectionibus, musei pathologici, ac bibliothecae, monographias de maniis continentes, obliti sumus z.

De auxiliis chirurgicis aliisque externis.

3. Jam vero ad *auxilia chirurgica* accedimus, quorum princeps, *venae sectio*, omni aevo controversiis multis ansam dedit. Favebant illi medici

c. 1. lib. VIII. c. 15). Notat ARNOLD DE VILLANOVA poitum per intervalla multum prodesse, et pulchras mulieres amplecti, tangere, secum jacere ac verba sa-lacia mirabiliter valere (breviar. lib. I. c. 18): addit-que BARTHOLINUS ex relatione SYLVATICI maniacam mulierem a ministris nosocomii St. Francisci Patavii saepius compressam convaluisse (hist. anat. 2. obs. 69). Tandem ALEXANDER BENEDICTUS VERONENSIS de maniaci narrat per totam noctem a quindecim viris venere defatigatam, et hinc longum mensium, qui annos aliquot substituerant, profluvium passam, non sine pudore, diluculo, menti sanae restituta est (lib. I. c. 8). Cfr. C. TH. BIRNLINE melancholiae anniversariae in maniam degenerantis admiranda species, cum observationibus R. LENTILII miscell. acad. nat. cur. dec. I. ann. 2. 1671. p. 224. dec. III, ann. 8. 1694. append. p. 129.

94) REIZ (append. p. 62) hoc obiectum plene explanavit.

dici veteres⁹⁵⁾. Restrinxerunt illius usum FERRIAR⁹⁶⁾, PINEL⁹⁷⁾ aliique inter recentiores⁹⁸⁾, inprimis obijciendo phlebotomiam segros in fatuitatem conjicere. Mediam viam calcantes cum REILIO⁹⁹⁾ toties ad venae sectionem confugimus, quoties mania est recens¹⁰⁰⁾, ac in hominibus robu-

95) ALEXANDER TRALLIANUS lib. I. c. 22. CELSUS lib.

III. c. 8. AVICENNA lib. III. fen I. Tr. 4. c. 17. SY-

DENHAMUS opp. T. I. p. 61. THEOPHRASTUS T. I.

lib. I. de origine morbor. cap. 4. sicut („Saget an im

mania, was helft da, als allein sein Ader anzuschla-

gen, so geneist er, das ist sein Arcanum, nicht Cam-

pfer, nicht Menphar, nicht Salvia, nicht Majorana,

nicht Chysteria, nicht infrigidantia, nicht das, nicht

diess, sondern phlebotomia“). MERCURIALIS lib. X.

c. 6. (dicens: „omnia fere vis curationis in celeritate

phlebotomiae posita est“). ROLFINCK meth. med. spec.

consult. lib. II. cons. 8 (ad lipothymiam usque). RI-

VERIUS prax. med. lib. I. c. 13. RIEDLIN lin. med.

1696. p. 620. PLATZER obs. lib. I. p. 86. a LEBEN-

WALDT delir. melancholico - maniac. sola sanguin.

missione curat. in Miscell. acad. nat. cur. dec. II. a. 5.

1686. p. 91 etc.

96) Medical histories. Vol. 2. No. 2.

97) Op. c. p. 318: „C'est un événement très rare et qui fait époque (!) dans l'hospice des aliénés, qu'une saignée, depuis que je dirige ce traitement.“

98) KINOLAKE in The London medical journ. 1818. Novembr. BURROWS comment. citat.

99) Fieberlehre, I. c. §. 80.

100) ARETAeus lib. I. diuturn. curat. Forte gyrgathorum medici ob id, quod plerumque segros jam diu mania detentis accipiunt, venae sectioni minus favent.

Frank Prax. II. I. 1.

M m m

robustis et succi plenis a suppressione haemorrhoidum, menstruorum, lochiorum, epistaxeos, pneumonorrhagiae oritur. Faciei rubor, pulsus plenus, fortis, minus hic pro norma inserviunt, cum saepius ab agitatione aegri proveniant. Praeterea constat ¹⁰¹⁾, ipsam inanitionem quandoque fallacia signa inflammatoria largiri. Cum vero maniaci saepe phlebotomiae sese opponant, nisi stratagemate uti liceat ¹⁰²⁾, delectus venae, ne dicamus de arteria ¹⁰³⁾, non semper in potestate medentium est. Generatim nisi jugularem externam ¹⁰⁴⁾ attingere possemus, saphenam tundimus. Quondam et venae sublinguales ¹⁰⁵⁾ et mammarum ¹⁰⁶⁾ aperiebantur. Copia cruoris detrahendi ad minimum libra ¹⁰⁷⁾. Ne fascia aut emplastrum ad sanguin-

101) Cox l. c. p. 49.

102) BRUCKMANNI aegra (l. c.) se a spectris circumdata credebat. Medicus hanc ideam amplexus est, affirmans spectra huiusmodi sanguinem abhorrere. Sic aegra sibi venam secare permisit et convuluit.

103) CARL. AURELIANUS (p. 338) sectionem arteriae temporalis prope supercilis commendavit, at nonne in maniacis plus quam in ceteris timendum, sanguinem sisti non posse?

104) LOCHER obs. p. 60.

105) AVICENNA l. c. *TH. SPRÜGER* de puella manisco-melancholica haemorrhagia (enormi venaesecione ex venis raninis) curata. *Miscell. Berolinens.* T. 6. p. 65.

106) SLEGGIUS in succincta de venarum sanciantarum delectu disputatione.

107) De mania per enormem venae sectionem sanata, te-

sanguinem sistendum adhibita, ab aegro rejiciantur probe cavendum. Venae sectione peracta aut non indicata, casu inanitionis excepto, curam morbi fere semper *hirudinibus*¹⁰⁸⁾ capiti sive ano, aut *cucurbitulis scarificantibus* nuchae sive dorso admotis inchoamus; haecque auxilia pro re nata repetimus. Ad revulsionem obtinendam, et cu-

M m m 2

cur-

statur, praeter auctores citatos, *Med. National-Zeitung*. 1798. p. 574. En novum exemplum. Die 15. Octobr. 1816, puella furibunda ad clinicum Vilsense, me absente, delata est. Nil de morbi historia innotuit, praeterquam quod a cane rabido morsu petita fuerit. Cum aegra poculum aqua repletum rejecerit, morbus pro hydrophobia rabiosa declaratus, et venae sectionibus usque ad lipothymias subjectus est. Detractis quatuor et ultra libris sanguinis aegra illico mentis compos evssit, ita ut mihi accedenti diagnosis errorem corrigere facile licuerit. Erat nempe puella a patre maniaco orta, admodum iracunda, veneri et baccho indulgens, ante duas solum hebdomadas morsu petita, et ob timorem suscepti contagii diu noctuque ab animi pathematibus excruciat. Sana post sex hebdomadas clinico valedixit, relicto in parte saucia fomiculo.

- 108) De hirudinum in mantia usu legi merentur: CAEL. AURELIANUS (l. c. suadet totam corporis superficiem hirudinibus cooperiendam esse). PAULUS AEGINETA (lib. III. c. 14. Hirudines naribus et auribus admovebat). *Ephem. nat. cur.* dec. II, ann. 4. obs. 19. CONSTANT atrium medicinae Helveticum. JAYMES in *Journ. de méd. T.* 54. p. 425. HASLAM l. c. p. 39. REIL *Fieberlehre*. l. c. p. 453.

curbitulas *sine scarificatione* hypochondriis aut uteri regioni imponi iubemus ¹⁰⁹), non neglecta quandoque *compressione carotidum* ¹¹⁰), vel *regionis epigastricae* ¹¹¹) et *varicum sectione* ¹¹²). In mania ex diathesi arthritica et scrophulosa, aut ex alia aegritudine imperfecte iudicata, aut ex impetigine praepostere fugata pullulante, item ad attentionem doloris ope ab idea quadam divertendam (e. c. in mania chimaera, moria, phantastica) aut libidinem per cruciatus excutendam ¹¹³), nullum auxilium *ulceribus artificialibus* palmam praeripit. De *vesicatoriis* ¹¹⁴), *setaceis* ¹¹⁵),

109) FUCHS disput. de melancholia. Jen. 1671. Praesid. FRIDERICI. Cucurbitulis siccis multum quoque faver BURROWS l. c.

110) PARRY in *Samml. auserl. Abhandl. f. pr. Aerzte.* 13. B. p. 576.

111) S. BROWN *deux observations de convulsions, alternant avec une manie momentanée, soulagées par une forte compression sur l'épigastre.* SEDILLOT *recueil périod. de la soc. de méd. de Paris* T. 63 (serie 2. T. 2). p. 367.

112) MATTHIAS disputat. de mania. Argent. 1669.

113) Ante biennium judaeam maniacam libidinosam curavi, quae quoties a vesicatoriis aut setaceis, alioquin indicatis, excruciabatur, toties nulla libidinis vestigia patefaciebat.

114) N. act. nat. cur. Vol. VIII. obs. 28. PARACELSUS (lib. II. de morb. ament. c. 2. Apertionem spicuum digitorum manuum et pedum per valida vesicatoria suz-

ceis ¹¹⁵⁾, *fonticulis* ¹¹⁶⁾, *cauteriis* ¹¹⁷⁾ et *ustione* ¹¹⁸⁾ loquimur, quorum singulorum unum vel alterum, nisi sanguinis affluxus ad caput jam aliunde magnus sit, ad basin cranii aut ad nucham, aliis ad extremitates, ad hypochondria etc. applicantur ¹¹⁹⁾. Si morbus a peiorae mala medela ortum

det). AUENBRUGGER von der stillen Wuth. THIERIUS med. chir. Bemerk. p. 236. HUFELAND's Journ. der pr. Heilk. 2. B. 4. St. p. 157.

115) FERRIAR, PERFECT. l. c.

116) ZAGUT. LUSITANUS l. c. lib. I. obs. 46.

117) GORDONIUS (lib. med. P. H. c. 19) efficaciam cauteriorum ad suturas coronales probat. MERCURIALIS brachia et crura eligebat. Septem cauteriis usus est SEVERINUS (med. efficaci). Cauteria ad cranium, ut os nudum inde compareat, praescribit ARNOLD. DE VILLANOVA l. c.

118) Praeter auctores cap. II, §. XII. 2. citatos, legi meretur PY mémoire sur les bons effets de l'asténie dans quelques cas, où l'observation a démontré depuis longtemps l'insuffisance des méthodes ordinaires du traitement. Annales de la soc. de méd. pratique de Montpellier. Serie 2. T. 2. p. 137. GROSS Zeitschrift für psychische Aerzte. 1821. Heft 4. J. ORAO über die Anwendung des Glüheisens zur Heilung psychischer Krankh. HUFELAND's Journ. der pr. Heilk. 1823. Sept. p. 3.

119) PANGERTER (l. c. p. 55) et PERFECT (l. c. Anh. p. 11) omni jure usum vesicatorii capiti indiscriminatim applicandi reprobant, haeque auxilia saepe cruribus admovent.

tum duxerit, illius resitutio¹²⁰⁾ indicatur. Psorae insitio et iu mania melancholica attonita quoad motum, cum successu tentata est¹²¹⁾. Quae mania a violentiis externis et a carie calvariae oritur, haec, praesentibus generalibus *terebrationis cranii* indicationibus, hanc ipsam admittit operationem¹²²⁾. *Castratio*¹²³⁾, a nobis alio in morbo nervoso cum stupendo effectu adhibita¹²⁴⁾, institui posset, si mania praecipue ab affectione testiculorum, et a pollutionibus, aliis remediis rebellibus foveretur. Forte aliquando et de *ovariorum exstirpatione* cogitare liceret. Dum caus-

82

120) ODIER *manuel de médecine pratique*, p. 184. DASCOTT in *Journ. de méd.* T. 46, p. 474. BARTHOLOMAEUS in HUFELAND'S *Journ. der pr. Heilk.* 26. B. 4. St. p. 113.

121) MUTZELL *collection d'observations*, T. 4, p. 30. REIL *Fieberlehre*, I. c. p. 483.

122) RHODIUS cent. I. obs. 43. REVERIUS de efficaci medicina, p. 125. HARTMANN *prax. chymistrica*, cap. prop. GARNARIUS tract. II. c. 9. SACHTLEBEN *Pathologie der auszehrenden Krankheiten*.

123) J. LANZONI de mania in puero castratione curata. *Ephem. nat. eur.* cent. 1 et 2, obs. 62. cent. IX. obs. 67. ROLYINK I. c. p. 79. VALENTINI *prax. infallibil.* p. 225. SCHURIG *Spermatologia*, p. 432. 439. SMERTIUS *miscellan.* lib. X. p. 524. RIVERIUS *observat. communic.* p. 689. *Repertorio di medicina, chirurgia e di chimica medico-farmacentica di Torino. Serie 2. Febbr. 1828. No. 26.*

124) Sect. II. cap. de epilepsia.

sa maniam excitans in abdomine aut pelvi haeret, *emplastra* variae indolis ¹²⁵⁾ et *cataplasmata* ¹²⁶⁾ regionibus affectis superimponi possunt. Nec frictiones universi corporis ¹²⁷⁾, abdominis ¹²⁸⁾ et partis capillatae capitis, quasi vellendo ¹²⁹⁾, negligendae sunt. Veteres crebro caput variis cum *decoctis* ¹³⁰⁾ lavabant, et *errhinis* utebantur ¹³¹⁾. Aliquando cum successu *unguentum supertartratem potassae* et *antimonii* continens nuchae inniximus ¹³²⁾. Familiare nobis sunt *clysteres* ¹³³⁾,

125) Cap. I. §. VI.

126) AVERNBRUGER (l. c.) in mania erotica cataplasma emolliens tepidum, abdomini et partibus genitalibus applicabat.

127) BOERHAAVE de morbis nervor. Vol. II. HILSCHER in TODE med. chir. Journ. 5. B. 4. St. p. 15.

128) SALAMADE (Journ. général de médecine etc. 1811. Novembre p. 272) frictionem abdominis cum unguento, *colocynthidem* continente, commendat, asserens alvum inde moveri, quod a mea experientia non confirmatur.

129) Furiosi tam simplici artificio aliquando placentur.

130) E. c. ex speciebus cephalicis. QUERCETANUS de re medica. lib. IV.

131) RUIAND cur. empir. cent. VI. cur. 100. REIL *Fleberl.* l. c. p. 481. *Gas acidum mariaticum* ut siernutatorium commendat PARGETER l. c. p. 67. CHIARUGI opium, scopo narcotico, naribus illiniri curat. *Pulverem nicotianae* maniacis pro praemio exhibere soleo.

132) Familiare hoc auxilium erat D. NOOD quondam gyrgathi Viennensis medico experto.

steres ¹³³), cum eodem *sale stibiato*. Tandem *electricitas*, praesertim in mania melancholica et fatua, utiliter adhibita est ¹³⁴); quod et de *galvanismo* ¹³⁵) et *magnetismo animali* ¹³⁶) contenditur.

De pharm-
acis in-
ternis.

4. *Pharmaca interna* ¹³⁷), in mania celebra-
ta; ac si fieri potest sine magna violentia haud-
que tumultuarie ¹³⁸), si opus sit ¹³⁹); porrigen-
da,

133) Eorum laudem canit praecipue SAXONIA (Pr. med. lib. I. c. 16).

134) BERTHOLON DE ST. LAZARE *Anwendung u. Wirksamkeit der Electricität*. 2. B. p. 39. PETETIN in *Séances publiques de la soc. de méd. à Lyon. ann. VIII*. PERFECT l. c. No. 106. 107 et 108; simul ad auctoritatem chirurgi J. Birch provocans.

135) ALDINI *essai sur le galvanisme*. P. 3. et BRUGNATELLI *annali di chimica e storia naturale*. T. 29. WALTHER *über die therapeutische Indication der Operation des Galvanismus*.

136) REIL *Fieberlehre*. l. c. p. 469. GMELIN apud MAUCHART l. c. 4. B. p. 128. ESQUIROL l. c. p. 237. BRANDIS *über psychische Heilmittel und Magnetismus*. Kopenh. 1818.

137) J. R. BUXTON *Bemerkungen über die Anwendung einiger gegen die ... Manie gerühmten Mittel*. Museum der Heilk. B. 1. p. 349. J. H. SCHÖNHEIDER confirmata quarundam medicaminum efficacia. Acta R. soc. med. Havn. Vol. V (Nova, Vol. I) p. 71. SANDTMANN nonnulla de quibusdam remediis ad animi morbos curandos summo cum fructu adhibendis. Berol. 1817.

138) S. LEDZL de natura in opere suo non turbanda. Miscell. acad. nat. cur. dec. III, a. 9 et 10. 1701—1705. p. 128.

da, ex classe *emeti-
corum, purgantium, resolu-
entium, tonicorum, stimulantium nateotico-
rumque* petuntur. *Emetica* omnium fere¹⁴⁰⁾ suffragia col-
legerunt¹⁴¹⁾, ac revera, absente encephali ple-
thora¹⁴²⁾, in aegrotis non admodum sensibili-
bus¹⁴³⁾, veluti sacram ancoram constituunt. Quae
laus praesertim *supertartrati potassae et stibii*
tribuenda est, nunc ad nauseam excitandam¹⁴⁴⁾,
nunc ad vomitum ciendum, dosin circiter tripli-
cem solita¹⁴⁵⁾, praescribendo, vix unquam ali-
mentis

139) CH. M. ADOLPHI de felici melancholiae hypochon-
driacae sine ullo remedio solutione. Act. acad. nat.
cur. Vol. I. p. 546.

140) Certe immerito BURROWS emeticorum usum ad
paucos restrinxit casus.

141) CELSUS lib. III. c. 18. E. HAGEDORN de grvida
melancholia nonnisi vomitoriis curata. Miscell. acad.
nat. cur. dec. I. a. 9 et 10. 1678 et 1679. p. 202. J. A.
HÜNERWOLF de curatione maniae per emeticum. Ibid.
dec. II. a. 1687. p. 184. FERRIAR l. c. Vol. II. No. 2.
PERFECT l. c. No. 48. COX l. c. p. 118.

142) HASLAM (l. c. p. 92) in aegrotto plethorico, ab
emetici usu apoplexiam et paralyseu vidit.

143) LOWRY l. c. 2. Th. p. 230.

144) J. B. GRÜNDEL mania tartaro emetico curata. Mis-
cell. acad. nat. cur. dec. II. a. 4. 1685. p. 327. WIN-
TRINCHAM in not. ad MEAD monit. BALDINGER l.
c. VOSS in HUFELAND's Journ. der pr. Heilk. 5. B.
p. 908. WESENER ibid. B. 60. Jan. 1828. p. 68.
SCHLEGEL *Materialien f. d. Staatsarzneiwissenschaft.*

145) R. BUCHHAUSE magna tartari emetici praebis in ma-

mentis commiscendo ¹⁴⁶). *Purgantia* ¹⁴⁷) praescribuntur, si mania ex primis viis originem trahat, si aeger vorax fuerit, si alvi obstructio pertinax sit et praecipue si morbus sub forma melancholiae compareat ¹⁴⁸). Nisi *eccoprotica* et *mitiora purgantia* ¹⁴⁹), ut *salia media*, potissimum *tartras potassae* ¹⁵⁰), effectum praestent, ad fortiora et *drastica* deveniendum, inter quae maxime *extractum herbae gratiolae officinalis* ¹⁵¹), *ra-*
dix

nia et melancholia. Acta R. soc. med. Havniens. Vol. II. p. 404. Plerumque grana decem tartari *emetic*i in libra una aquae destillatae, omni secunda hora ad uncias duas exhibeo.

146) Quum tartarum emeticum aliquoties inscio aegrotocum potu aut cibis porrexerim, contigit, ut idea veneni exhibitii orta sit, quo facto omne dein genus alimentorum recusabatur.

147) HALLÉ *réflexions sur le traitement de la manie atrabilaire, comparé à celui de plusieurs autres maladies chroniques, et sur les avantages de la méthode évacuante dans ces maladies. Hist. et mém. de la soc. R. de médecine. a. 1786. mém. p. 310.*

148) BOERHAAVE apud SWIETEN l. c. §. 1117. LORRY l. c. p. 302.

149) LORRY animadvertit (l. c. p. 230), leniora purgantia interdum facilius alvum ciere quam fortiora, quod tamen videre mihi nunquam contigit.

150) Reliquis salibus anteponitur a FORDYCE (*Samml. auserl. Abhandl. f. pr. Aerzte. 11. B. p. 487*). WIL-
LICH (BALDINO, n. *Magazin. 8. B. p. 252*). PERFECT l. c. COX l. c. p. 137.

151) KOSTARZEWSKY diss. de gratiola. Vindob. 1775. Fi-

dix veratri albi ¹⁵²⁾, *aloes succotrina* ¹⁵³⁾ et *colocynthis* ¹⁵⁴⁾ familiaria sunt. In sensillioribus aegrotis, antispasmodicis jungenda sunt ¹⁵⁵⁾; et in genere

SCHER *Anleitung zur Armenprax.* p. 375. 383. BEYER in *N. Abhandl. der Schwed. Akad.* 20. B. HUFELAND l. c. 14. B. 1. St. p. 184. SRELLIO in *Allgemein. Annal. f. d. Jahr* 1811. Dosis a scrupulo uno usque ad drachmam spatio nychthemeri.

152) De quaestione, utrum haec stirps *helleborus albus* praeceptorum Graecorum fuerit, legatur: J. L. APIN de delirio maniaco-melancholico helleborinis curato. *Miscell. acad. nat. cur. dec.* III. a. 5 et 6. 1697. et 1698. p. 238. SCHULZ diss. de elleborismo veterum. Hal. 1717. LORRY l. c. p. 403. GREDINGO l. c. 1. B. p. 179. ARNOLD l. c. 1. Th. p. 81. REIL *Fieberl.* l. c. p. 476. et HANNAMANN de Helleborismo veterum. Lips. 1812. BRAUNDS diss. observationes miscellae, de morbis mentis, cum subjuncta historia maniae hellebori nigri efficaciam novo experimento confirmante. Francf. ad Viadr. 1801. *Medical sketches on the following subjects: 1. on the use of helleborus, as a remedy for insanity and other diseases.* By G. KERR. Lond. 1818. Exhibetur extractum veratri albi a grana tribus ad scrupulum unum, spatio nychthemeri.

153) ARISTAEUS l. c. lib. I. c. 5. PERFECT l. c. No. 80. COX l. c. p. 138. Exhibatur praecipue ad fluxum menstruorum et haemorrhoidum, absente plethora restituendum.

154) SALMADE *observations sur une manie compliquée de convulsions, guérie par l'usage des frictions de coloquinte.* SEDILLOT *rec. périod. de la soc. de méd. de Paris*, T. 42. p. 267.

155) Sic veteras omni fecisse jure LORRY monet. l. c.

nere vehemens alvi evacuatio evitanda ¹⁵⁶). Quamobrem tutissime *resolventibus* utimur, et quidem non tantum in mania melancholica, sed et in omni alia labefactioni viscerum abdominalium juncta. Spectant huc: *serum lactis* ¹⁵⁷), *mel* ¹⁵⁸), *aquae minerales saponaceae* ¹⁵⁹) et *salinae* ¹⁶⁰), decocta saturata *radicis tritici repentis* ¹⁶¹), *leon-
todontis taraxaci*, *rubiae tinctorum*, herbae *asplenii scolopendrii* ¹⁶²), *cuscutae epithymi* ¹⁶³), *anagallidis arvensis* ¹⁶⁴), *hederæ sylvestris* ¹⁶⁵), porro
gemmae

p. 231. JAHN (l. c.) gratiolam cum aqua laurocerasi jungebat.

156) Consilio LORRY l. c. p. 252, qui, si tale malum accideret, usum lenis *narcotici* suadet.

157) BARICELLUS de lactis seri et butyri facultatibus et usu. LORRY l. c. p. 178.

158) LORRY l. c. p. 292. Mel sero lactis junctus, quondam pro antidoto melancholiae habebatur.

159) Edit. secundae P. I. Vol. I. sect. II. csp. VI. §. XXXVIII. 27.

160) Ibid. Cfr. HUFELAND l. c. 14. B. 1. St. p. 185.

161) E. c. cum melle e granis nonnullis tartari emetici, aut drachma una alterave tartari tartarisati.

162) GALEN. praesertim in affectionibus lienis commendat. Cfr. LORRY l. c. p. 356.

163) Obsoletum est, ast obtinuerat suffragia GALENI (lib. XIV. method.), AETII (lib. II. c. 29), DIOSCORIDIS (lib. IV. §. 1), WEDELII (ann. med. p. 244).

Cfr. LORRY l. c. p. 350.

164) QUERCETANUS. MATTHIIS II. cc. et MOER. l. c. §. 68.

165) E. ANGLIC. *Ground - Ivy*. Adhibetur praecipue suc-

gemmae conditae capparidis spinosae¹⁶⁶), extractum chelidonii majoris¹⁶⁷), eupatorii cannabini¹⁶⁸), et quodammodo mercurius¹⁶⁹). Indicatur vero hoc pharmacum non solum ad resolvendam obstructionem hepatis, tam frequentem comitem maniarum¹⁷⁰), sed etiam ad latens in cerebro

cus expressus ad plures uncias, vel etiam extractum. SUTTLIFF in *The London med. and phys. journ.* Lond. 1819. Vol. 142.

166) GALENO sudente.

167) LORRY l. c. a scrupulo uno ad drachmam de die, cum vino, sero lactis etc. praesertim labefactato hepate.

168) LORRY l. c. p. 358.

169) De usu mercurii in maniis legatur: SPIES diss. de melancholia hypochondriaca salivatione mercuriali extirpata. Weimar. SMITH in *Medical repository*. Vol. I. No. 2. art. 6. J. D. SCHLICHTING mania chronica et rebellis, ptyalismo sublata. Nova act. acad. nat. cur. dec. II. a. 5. 1686. p. 94. ROUGET observation sur un jeune homme véritable automate, et dont l'intelligence étoit tellement bornée, que son père ne put lui apprendre la moindre chose, mais qui a éprouvé une amélioration remarquable dans ses facultés intellectuelles par suite d'un traitement mercuriel pour combattre un vice syphilitique. Bulletin de l'école de médecine et de la soc. de Paris (année 3) a. 1807. p. 71.

C. CHISHOLM two examples of the effects of mercury in severe affections of the brain. *Med. chir. transact.* Vol. 4. p. 35. SCHULZ in Fort- Sättning of Provincial Doctorernas Berättelser. p. 271. BELINO in Memorabilien der Heilkunde v. KAUSCH, Züllichau 1813.

170) Sic duas hystericas, praeviis capitis et hypochondriacis. Frank Prax. II. I. 1.

N n n

rebro extravasatum absorbendum ¹⁷²⁾, ad salivationem salutarem excitandam ¹⁷³⁾, quandoque nocivam cohibendam ¹⁷⁴⁾ et vitium scrophulosum debellandum. Quo ultimo in casu plerumque *oxydum hydrargyri et antimonii sulphuratum*, alternatim cum *muriate calcis* aut *muriate barytis* ¹⁷⁵⁾ exhibemus, in reliquis vero vel *muriatem hydrargyri* vel *unguentum hydrargyri griseum* praescribere solemus. Ad *tonica* recurrimus, nullo habito respectu formae maniae, si aeger fuerit exhaustus, debilis, et absente primarum viarum saburra. Maxime hic sese commendant *cortex cinchonae officinalis* ¹⁷⁶⁾ et *mars* ¹⁷⁷⁾, illud sub forma *infusi frigidi*, hic in *aquis* sic dictis *ferrugineosis* ¹⁷⁷⁾. Si labefactatum systema nervosum tonica simplicia respuat, ea cum *aromaticis* exhi-

drii dextri doloribus maniacas redditas, mercurii ope sanavit CHISHOLME l. c.

171) Quo in casu vires hydrargyri ope *florum arnicae montanae* sustinere soleo.

172) PERFECT l. c. No. 2.

173) Judacam Vilnensem, mania melancholica attonita cum magno pyralismo laborantem, frictionum mercurialium ope, sanitati restituit Dr. LIBOSCHITZ.

174) HUTELAND *vollständige Darstellung* etc. 2. Abschn. Berlin 1794.

175) LORRY l. c. p. 237. FERRIAR l. c. p. 93. REIL l. c. p. 467.

176) LORRY l. c. p. 101. Vide supra §. CIX. 22.

177) LORRY l. c. p. 216.

exhiberi debent. Inter haec laudem acquisiverunt *siliqua epidendron vanillae*¹⁷⁸⁾, *stirps hyperici perforati*¹⁷⁹⁾, et *hyacinthus*¹⁸⁰⁾. Maniâ ab imperio, quod partes genitales in cerebrum exercent, pendente, eaque sub forma nymphomaniae, satyriasis obveniente, aut quocunque demum in casu, si pollutiones urgeant, vel morbus ex puerperio originem ducat, dummodo plethora etordes primarum viarum non obstant, *camphora* veluti specificum agit¹⁸¹⁾. Neque ad hoc semper

N n n 2

indi-

178) *Medical museum. Lond. 1781. Vol. 3. p. 342. PARROTTER l. c. p. 110. REIL l. c. p. 468.*

179) *WELSH lib. obstr. c. 38. ANGLIUS SALA oper. med. chimica. p. 7. LOCHER (observat. pract. p. 71). hoc remedium sub forma infusi iacassum adhibuit.*

180) *CARDANUS curat. mirab. 3. Pro specifico habuit.*

181) Sic jure testantur: *PANACEUS Bücher und Schriften de morbis ament. tract. II. c. 2. T. I. p. 601. ETTMÜLLER opp. Francf. T. I. p. 578. SENNERT op. c. lib. IV. P. 2. sect. 3. c. 5. WERLHOF Commere. Norimb. 1733. p. 221. JOERDENS ibid. 1736. p. 5. D. KINKEITH on the efficacy of camphor in maniacal disorder. Philosoph. transact. Y. 1727. p. 347. J. WILLEMSA Waarneeming van eene mania cum moerore met de Kamfer geneezen. Verhandl. van der Maatsch. te Haarlem. Deel 14. Ber. Bl. 28. M. TRIEWALD Rön angående camphers Stora ock underbara värken i mania eller hos mänads rasande människor. Svenska Vetensk. acad. Handl. A. 1744. p. 53. BERNDT l. c. PAULIZKI med. prakt. Beobacht. 2. Th. HERZ in SEL-*

indicationes ab AUENBRUGGERO ¹⁸²) et aliis ¹⁸³) stabilitae requiruntur. Exhiberi solet cum *aceto* ¹⁸⁴), aut cum *nitrate potassae* ¹⁸⁵), et quidem
eiusque,

LE's *Beiträge zur Natur- und Arzneywissenschaft*, 1. Th. p. 127. Interea camphoram et incassum hio exhibitam fuisse, praeter nonnullas proprias observationes docent MUELL (*med. und chir. Wahrnehm.* 1. Samml. p. 50. 65), CULLEN (*first lines of the practice*, Vol. 4. p. 164) et RICHTER (*med. chir. Bemerk.* Berlin 1813. 2. B.).

182) Experimentum nascens de remedio specifico sub signo specifico in mania virorum. Viennae 1776. Docet camphoram apud eos insanicos indicari, quorum membrum virile sub paroxysmo contractum, mirabiliter exile, duriusculum, leniter ad anteriora flexum est, quorum scrotum corrugatum et manibus palpatum vacuum cernitur, ambis testiculis revulsis et ad superiora quasi inclavatis, ac genitalibus subfrigidis. In femina vero camphorae usum ex tremore digitorum, praecipue vero ex singulari manuum ad interiora intorsione colligit, dum pulsus carpi contractentur, quae quidem signa et sese supra dictis associare in viris refert. l. c. p. 6. 145.

183) Camphoram tutius dari illis, quorum facies pallet, extrema frigent, respiratio lenta et arteriarum ictus torpent, creditum fuit, unde BUNAZENUS illam maxime melancholicis conducere asserit (*inst. med. pract.* Vol. III. p. 189).

184) Formula LOCHENT (l. o. p. 64): R. Camphorae drachmam semis, sacchari et gummi arabici 3ā drachmas duas. Subige et adde aceti calidi unciā semis. Aquae florum sambuci uncias sex. Syrupi florum

eousque, donec motus febrilis, sudor et somnus inducantur ¹⁸⁶). Ad *moschum* in maniis a suppressis sive morbis cutaneis, sive transpiratione, et maxime in juvenibus et feminis admodum sensibilibus, confugimus ¹⁸⁷). Sensibilitatis enim in maniis tanta habenda est ratio, ut, quo primum ea valde exaltata animadvertitur, a stimulantibus ¹⁸⁸) abstinendum, et ad *emulsiones* ¹⁸⁹), ad *acida vegetabilia* ac inprimis ad *acetum* ¹⁹⁰) devenien-

rhocados unciam unam. M. Cfr. SCHÖNHAYDER in Soc. med. Havn. collect. Vol. II. p. 107.

185) BOENNEKEN *Fränkische Samml.* Vol. 5. p. 291.

186) PERCIVAL hunc ad scopum camphoram omni hora ad scrupulum exhibebat (*Mem. of the medical society of London.* Vol. 2. p. 288); minori dosi contentus sum.

187) Vide de usu moschi in maniis: LOCHER l. c. p. 62. PAROETER l. c. p. 64. GMELIN diss. sistens specificum novum adversus morsus rabidi canis, manias et melancholias. Tüb. 1750. TRUKENMÜLLER diss. affectus melancholici historia. Erlang. 1786. TRILERNIUS l. c. p. 233. MEDICUS *Beobachtungen.* 2. B. p. 603. et: *Abhandl. der Bayer. Academie.* 2. B. p. 209. PERFECT l. c. p. 364. G. H. SEBASTIANI observationes de manlaco, usu pulveris tunquinensis sanato. Act. acad. Moguntinae. T. II. p. 482.

188) Inter haec etiam oleum terebinthinæ commendatum fuit (E. PERCIVAL in *Dublin hospital reports.* T. 1. p. 116), quod reprobat BURROWS (*comment. cit.*).

189) MONROANI op. c. epist. VIII. art. 5.

190) LORRY l. c. 2. B. p. 380. BANO in Act. R. soc.

veniendum sit. — *Opii* in maniis usum ad angustos limites reducimus. Utimur enim eo solummodo in maniis periodicis et puerperarum, praemissis indicatis sanguinis et saburrarum evacuationibus, ac urgente vigilia, convalescentiam impediante, — in maniis unis animi pathematibus originem debentibus, — et in maniis melancholicis aut phantasticis¹⁹¹⁾, peculiari moerore vel anxietate stipatis. Sunt, qui indicationibus pro opii usu majorem latitudinem concedant¹⁹²⁾. Quocunque in casu quoties id revera indicatur, liberali manu incidendum¹⁹³⁾. Vix unquam mo-

rem,

med. Havn. Vol. I. p. 95. 106. 114. Vol. II. p. 52. Lochan l. c. p. 56. BUCHOZ diſs. en forme de lettre sur la propriété du vinaigre distillé pour guérir la manie. Paris l'an. VI.

191) N. FRIBERG casus duplex de mania cum et sine opio curata. Soc. med. Havniensis collectanea. Vol. II. p. 176. HANCT de melancholia religiosa opio sanata. Jen. 1804. Remède contre la mélancholie (Laudanum par gouttes dans le café). Annuaire de la soc. de méd. du Départ. de l'Eure. a. 1810. p. 93. Cfr. SONNINI biblioth. phys. oeconom. a. 1809. T. 2. p. 402.

192) Sic asserit COX (l. c. p. 150) emetica postdrie exhibenda facilius vomitum eiere, si segro ante cubitum debita opii dosi porrigatur. Et ODIER, in notis ad versionem gallicam COXII, opii usum in maniis extendere opiat.

193) Exemplo WENDELSTAEDT Samml. med. Aufz. 1. B. Cap. 3. No. 7. WINIKER in HORN's Archiv für med. Erfahrung. 3. B. 1. St. p. 161. ROBERT in Journ. de

rem, opium aliis pharmacis, ut nitrati potassae¹⁹⁴), camphorae¹⁹⁵), cinchonae¹⁹⁶), acidisque vegetabilibus¹⁹⁷) miscendi, sequimur. Extractum hyoscyami nigri, iisdem circiter sub rerum positionibus ac opium, et tutius quidem, cum alvum non cohibeat, sed minori cum effectu, exhibetur. FOTHERGILLIO¹⁹⁸) vero et STÖRKIO¹⁹⁹), utpote vires hyoscyami nimis extollentibus, cum GREDINGIO²⁰⁰) non assentimur. Majoris certe momenti atropam belladonnam facimus, praesertim si mania cum epilepsia²⁰¹) aut cum visionibus obveniat²⁰²). Dosis sive foliorum

med. Vol. 13. p. 265. BINNS in *New medical journal*. Vol. I. P. 2. BRANDRETH in *Medical comment*, of Edinburgh. 2. dec. Vol. 6.

194) PERFECT l. c. No. 88.

195) FRIBORO Coll. soc. med. Havn. Vol. II. p. 176.

196) FENNIA l. c. p. 93. HEROT spud HUFELAND l. c. 27. B. 1. St. p. 48.

197) COX l. c. p. 151.

198) *Of the efficacy of hyoscyamus, or henbane, in certain cases of insanity. Memoir. of the medic. society of Lond. Vol. 1. p. 310.*

199) Lib. de stramonio, hyoscyamo etc. p. 26.

200) Op. c. 1. B. p. 1—36.

201) GREDING l. c. p. 114—168. KAEFER in *Journ. der Erfind.* 6. B. p. 130.

202) EVERE in *Berl. Samml.* 2. *Beförderung der Arzneiwissenschaft.* Th. 5. p. 565. MÜNCH diss. observat. prop. circa usum belladonnae in melancholia, mania

rum sive extracti ab uno ad quinque grana, bis terve de die. *Datura stramonium*, sub forma vel *extracti*, a grano uno ad scrupulum, vel *tincturas*, a guttis decem ad sexaginta, dosibus bis terve de die repetitis, in maniis inquietudine, vigiliis, alvo tarda, cuti sicca, urina pauca stipatis, exhibitum, singulis istis incommodis, monente jam GREDINGIO ²⁰³), occurrere solet. Stramonio praesertim ibi utimur, ubi latentis vitii carcinomatici occurrit suspicio; quo in casu et *arsenico* ²⁰⁴) prudentissime locus foret. Ceterum uno casu excepto, nullam maniam radicitus ope stramonii curare licuit. Feliciores hinc fuere STÖRK ²⁰⁵), REEF ²⁰⁶), ALLIONI ²⁰⁷), GRANDIDIER ²⁰⁸) aliique ²⁰⁹). Miramur *agaricum muscarium*,

et epilepsia. Goett. 1783. LUDWIG diss. de belladonna ejusque usu in vesania. Jen. 1789. REMER apud HUFELAND op. c. 17. B. 2. St. p. 127. *Annalen* 1. B. p. 215. SCHMALZ *seltenerer Fälle*. p. 79.

203) Op. c. 1. B. p. 37—103.

204) ACKERMANN in BALDING, n. *Magazin für Aerzte*. 2. B. 5. St. 1780.

205) Lib. de stramon.

206) STRANDENBERG om *chron. Spikd.* p. 16.

207) Flora pedemontana. T. 1. p. 113.

208) MÖNCH's *Arzneymittellehre*. p. 282.

209) REIL *Fleberlehre* B. 4. p. 437. SCHMALZ *chlr. med. Vorfälle*. p. 178. NEUBECK in HUFELAND's *Journ.* B. 36. St. 2. p. 107. BANTON (EBERLE *treat. of mat. med. Vol. 2*). BERNARD in GERSON *Magaz.* B. 8.

rium, utpote vehementem in cerebrum actionem exercentem, necdum in maniis tentatum fuisse. Postremo *digitalis purpurea* nobis auxilium exhibet, certe non idoneum ad manias inveteratas, ex vitiis organicis pullulantes debellandas, sed esse par, praedispositioni ad manias, ex causa acrophuloso-inflammatoria pendenti, frenum injiciendo ²¹⁰), affluxui sanguinis ad caput imminuendo, obstructionibus glandularum lymphaticarum resolvendis, humoribus extravasatis absorbendis, eliminandis, sensuum, inprimis vius exaltationi compescendae, atque salutari nausae aut vomitui promovendo, hinc communissimis in maniis indicationibus satisfaciendis. Quam ob rem digitalem hic libenter cum PERFECT ²¹¹), Cox ²¹²), multisque aliis ²¹³) canimus. — De

pro-

p. 291. C. A. TOTT in HORN's *Archiv für med. Erf.* 1828. *Mai. Jun.* p. 441. GÜNTHER in HUFELAND's *Journ.* 1829. *Novembr.* p. 111.

210) Sic pluries expertus sum. Formâ fortis infusi foliorum utor.

211) l. c. p. 375. 212) l. c. p. 131—136.

213) FERRIAR l. c. p. 92. CURRIE in *Mem. of the medical society of Lond.* Vol. 6. No. 2. DARWIN *Arzneyk. Abh. v. London.* 3. B. p. 214. JONES in *medic. comm. v. Edinb.* 2. Dec. 1. B. p. 18-13. B. p. 23. PINDERIT *prakt. Annalen* 1. St. p. 76. FANZAGO *sulle virtù della digitale purpurea nelle alienazioni mentali.* Padova 1810. SANDER *von der digitalis purpurea als Heilmittel gegen die Geistesverwirrung.* *Annalen für*

Frank Prax. II. I. 1.

000

*prophylactica maniarum*²¹⁴⁾ cura, praesertim hereditariorum agendum nunc foret, ast, cum omnia, quae ad hujusmodi spectant argumentum, ex rebus hucusque in medium allatis sponte intelligi possint, praesenti capiti, quin immo tractatui de morbis cerebri finem imponimus.

die gesammte Heilk., unter der Redaktion der Grossh. Badisch. Sanitäts-Commission. Jahrgang 1. Heft 2. p. 28.

214) Legi meretur Esquirol Dict, p. 237.



In bibliopolio Kuehniano prodierunt:

- ATHENARI deipnosophistarum libri XV. Ad edit. Lugd. postrem. emend. expressi. Acc. Villebrunii interp. gall. et notae, itemque Jo. Casaub. anim. integr. Curav. vir. doct. emend. adnot. vel edit. vel ined. adiec. indices nov. conf. H. G. SCHAEFER. Tom. I. Pars I, II, III. 8 maj. 4 Rthlr. Charta script. 6 Rthlr.
- Abbildung u. Beschreib. d. neuen u. geschmackvoll. Blumen-
gestells f. Zimmer u. Gärten brauchbar u. s. w. mit
Kupf. 8. broch. 9 Gr.
- Briefe üb. d. sächsischen Erzgebirge. 8. 18 Gr.
- DEMOSTHENIS orat. de pace. Rec. adnot. et crit. et exeget.
instrux. ind. adiec. CH. DAN. BECK. Acc. A. DOUNAEI
praelect. 8. 1 Rthlr. 16 Gr. Charta script. 2 Rthlr. 12 Gr.
- Deutschlands vorzüglichste Messplätze, s. Handb. f. Kauf-
leute, Gelehrte, Statistiker u. Reisende. 8. broch.
1 Rthlr. 4 Gr.
- DINDORFII, GUIL., grammatici graeci. Vol. I. Acc.
HERODIANI de irregulari dictione libri II. primum editi.
— ARCADIIUS de accentibus ex libro MS. auct. et emend.
— FAVORINI eclogae. Editoris annotat. critica. 8 maj.
2 Rthlr. 16 Gr. Charta script. 4 Rthlr. Charta membr.
5 Rthlr. 8 Gr.
- EICHSTADT, H. C. ABR., quaestion. philolog. specim. 4.
12 Gr.
- ERHARD, CHR. DAN., Versuch d. Kritik d. allgem. Ge-
setzb. f. d. preuss. Staaten. B. 1. Abth. 1. gr. 8.
1 Rthlr. 8 Gr.
- FISCHER, CHR. AUG., neues spanisch. Lesebuch. 8. 21 Gr.
- FLANDRIN, PET., üb. d. Kunst, Schafe zu ziehen u. d.
Wolle zu veredeln. A. d. Franz. mit Anmerk. v. M.
G. A. WICHMANN. gr. 8. 20 Gr.
- Fragmenta Theognidis, Archilochi, Solonis, Simonidis,
Mimnermi, Callini, Tyrtaei, Phocylidis, Naumachii,
Lini, Panyasidis, Rhiani, Eueni, Pythagorae, Empedo-
clis, Parmenidis, Sapphonis, Alcaeï, Stesichori, Anti-
machi (mit Anmerk. v. BRUNCK, JACOBS, GAISFORD,
BLOMFIELD, DINDORF u. a. — aus Poetae min. graeci
besonders). 8 maj. 2 Rthlr. 16 Gr.
- Gesfs Schicksal. geschildert durch d. Gesellsch. v. Schwei-
zern. Herausgeg. v. E. A. W. ZIMMERMANN. 8. 5 Gr.
- GRÜNER, JOH. ERNST, üb. d. Abschaffung d. Lehnwe-
sens. 8. 15 Gr.
- HEDWIG, JP., filicum genera et species recent. method.
accommodatae, icon. ad nat. pict. illustratae a ROM.
HEDWIG. IV Fasc. fol. a 3 Rthlr. 12 Rthlr.
- ROM., Aphorismen üb. d. Pflanzenkunde, z. Ge-
brauch sein. Vorlesungen. 8. 12 Gr.
- observat. botanic. Fasc. I. Tab. XI. color. 4. 3 Rthlr.
- HERIODI carmina et fragmenta, cum schol. Ed. TH.
GAISFORD. Ed. nova et aucta. II Voll. (aus Poetae min.
graei besonders). 8 maj. 5 Rthlr. 16 Gr.

HINDENBURG, CHR. FR., *Archiv d. rein. u. angewandt. Mathemat.* XI Hefte m. viel. Kupf. gr. 8. u. 12 Gr.

3 Rthlr. 12 Gr.

HÜBLER, D. G. J., *Beiträge z. Bibliopöle in prakt. Anmerk. f. Schriftstell. u. Verleger.* 8. 10 Gr.

INGENHOUS, JON., *üb. Ernähr. d. Pflanzen u. Feuchtbark. d. Bodens. A. d. Engl. m. Anmerk. v. GOTT. FISCHER. nebst e. Einleit. üb. ein. Gegenstände d. Pflanzenphysiologie v. F. A. v. HUMBOLDT.* 8. 18 Gr.

JUSTINI histor. Philipp. Ex fec. ABR. GRONOVII et cum div. lect. GRAEVIANAE aecom. edid. CAROL. HENN. FROTSCHER. Praemitt. notitia histor. et A. II J. HENRIS comment. de Trogi Pompeii laudib. et auctoritate. 8 maj. 1 Rthlr. 8 Gr. Charta script. 2 Rthlr. Charta membr. 2 Rthlr. 16 Gr.

Kinderstube, die, von ihr. m. nat. u. physisch. Seite dargestellt, u. Beharzig. f. Hausm. u. Hausmütter u. s. w. nebst e. Vorrede v. D. J. C. ROSENKRANTZ. m. Kupf. 8. 20 Gr.

KRETSCHMANN *Handbuch f. Sachsen u. Ausländer, enth. e. alphab. Verzeichn. d. in Sachsen u. incorpor. Landen befindl. Besitz. u. Ortschaften.* gr. 8. 1 Rthlr. 16 Gr.

LAMBERT, J. H., *Grundregeln d. Perspektiv aus Betracht. e. perspekt. gezeichnet. Landich. abgeleitet. Zum Druck befördert v. C. H. HINDENBURG.* m. 1. fol. Kupf. 8. 10 Gr.

LEONHARDI, FR. G., *der Frühlings- und Sommer-Gärtner in Zimmern u. Gärten, od. Anweis. wie man jede Art Blumen, wohlriechende Stauden-, Strauch- u. Küchen-Gewächse, dergl. nach d. vortreffl. chinesischn. Art jede Sorte Fruchtbäume in Scherben pflanzen, erziehen, warten u. f. d. Winter aufbewahr. soll u. s. w. m. illum. u. schwarz. Kupf.* 8. 1 Rthlr. 12 Gr.

Leipzig, e. Handb. f. Kaufleute u. s. w. (s. Deutschlands Messplätze).

LIPSI, J. G., *bibliotheca numaria s. cael. auct. qui usque ad fin. sec. XVIII. de re numar. scrips. Praef. est CH. GLO. HEYNE.* II Tom. 8 maj. 3 Rthlr.

LUNTZ, JO. GLO., *monimenter. typograph. dress.* 8. 3 Gr. — — — — — tridecas. 8. 4 Gr.

MARX, M. A. F., *Predigt üb. d. landesherrl. Abschaffung d. Bettelns in Sachsen, am Feste Mariä Heimsuch. gehalten.* 8. broch. 3 Gr.

MICHAELIS, C. FR., *ab. d. Geist d. Tonkunst. e. Beitr. z. KANT's Kritik der ästhet. Urtheilskr. m. Vignett.* gr. 8. 9 Gr. 2r. Vers. 16 Gr.

MURR, CHR. G. V., *novus Journ. z. Kunst u. Literat.* m. Kupf. 8. 1. Th. 1 Rthlr. 12 Gr. 2. Th. 1 Rthlr. 8 Gr.

PAUSANIAS Graeciae descriptio, gr. lat. Rec. emend. explan. JO. FR. FACIUS, IV Tomi, 8 maj. 7 Rthlr.

PLUTARCHI vitae parall. Demosthenis et Ciceronis, Graeca recognov. et in us. schol. ed. CAROL. HENN. FROTSCHER. 8. 9 Gr. Charta script. 12 Gr. Charta membr. 1 Rthlr.



17 G 202





